
प्रकाशक

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय सस्कृति एव साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)
कें० ३७/१९७, गोपालमन्दिर लेन
पो० बा० न० १९२९, वाराणसी २२१००१
दूरभाष '३३३४३९

सर्वाधिकार सुरक्षित द्वितीय संस्करण १९९३



बन्य प्राप्तिस्थान
चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू ए बगलो रोड, जवाहरनगर
पो० वा० न० २११३
दिल्ली ११०००७
दूरभाष २३६३९१

प्रधान वितरक चौखम्बा विद्याभवन

चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे) पो॰ बा॰ न॰ १०६९, वाराणसी २२१००१

दूरमाव: ३२०४०४

मुद्रक **श्रीजी मुद्रणालय** बाराणसी

प्राक्कथन

भारतीय चिकित्सा-विज्ञान मानवीय सवेदना, चेतना, तपस्या, साघना, अनुभूति, सस्कृति और मानव के अन्त करण से उद्भूत भावोमियो से उच्छरित ज्ञान का एक दिव्य प्रकाश-पुञ्ज है, जो जन-जन को आरोग्य संपन्न, पौरुष-पराक्रम-साहस-शौर्य से समृद्ध और दया-प्रेम-करुणा-सहानुभूति आदि से ओत-प्रोत बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उसकी विस्नक्षणताएँ अनिवंचनीय हैं, जिन्हें बतलाने की चेष्टा करना आसमान को गिलाफ चढाने जैसा है।

भारतीय चिकित्सा-विज्ञान हमारी सस्कृति और सभ्यता की वह आलोकमयी शिखा है, जिसकी शाश्वत ज्योति ने विश्व की समस्त मानवता का, सम्पूर्ण सस्कृतियो का मार्गदर्शन किया है।

उस चिकित्सा-विज्ञान के उत्कर्ष की कसौटी है उसका कायचिकित्सा अङ्ग । जिसकी बदौलत आज आयुर्वेद को विश्वव्यापी सम्मान और गौरव प्राप्त हो रहा है ।

वर्तमान में, सम्पूर्ण भारतवर्ष मे आयुर्वेद का एक ही पाठ्यक्रम चल रहा है, जो केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिपद्, नई दिल्ली द्वारा संचालित है। अध्ययनाध्यापन की सुविधा से कायचिकिरसा के पाठ्य विषय चार प्रक्तपत्रों में विभक्त हैं। प्रथम प्रक्रमपत्र में आयुर्वेदीय कायचिकित्सा के सैद्धान्तिक विषय और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एव आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का सामान्य सिद्धान्त आदि विषय निहित हैं। इनसे सम्बद्ध समस्त ज्ञातन्य विषयों का सकलन और उनकी समीक्षा का विस्तारपूर्वेक वर्णन मेरी पुस्तक कायचिकित्सा (प्रथम भाग) में किया गया है। यह रचना श्रद्धालु एव जिज्ञासु पाठकों, छात्रों और नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से विभूषित अध्यापक-वन्धुओं को रास आयी, इस बात की मुझे हार्दिक प्रसन्नता है।

सम्प्रति कायचिकित्सा के द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बद्ध विषयो की विशद व्याख्या से सविलत यह द्वितीय भाग आप के खोजी हाथो में अपित करते हुए मैं अन्त करण से आनन्दानुभव कर रहा हूँ।

पाठको की पसन्दीदा आँखों के सामने मेरी पूर्व की रचनाओं की झलक की रिंक्मियों आभासित हैं, इसलिए अग्रिंम पाठ्यविषयों की पुस्तकों के प्रकाशन की प्रतीक्षा करने की जनकी प्रवृत्ति एक स्वाभाविक मानसिकता है और यही एक सवल है, कि मुझे वार्षक्यजनित दुर्वलताओं के दमन में कामयाबी हासिल है और मैं यथाशक्य शारीरिक या मानिसक क्षमता को बरकरार रख पाता हूँ।

जहां तक बन पड़ा है, मैंने भरसक प्रयास किया है कि इस द्वितीय भाग में द्वितीय प्रश्नपत्र का समस्त विषय समाहित हो जावे। इसके समायोजन में पूर्वाचार्यों की परम्परा का बाहुल्येन अनुसरण किया गया है। फिर भी आवश्यकता और अनुभय के आधार पर प्रत्येक शोपंक को सुबोध बनाने की चेष्टा की गयी है।

आमार — में उन यशस्वी महर्षियो और लाघुनिक गवेपको के प्रति लाभार व्यक्त करना अपना माधुर्यपूर्ण कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी कृतियो से इस रचना को संपन्न करने मे यत्कि चित्र भी सहायता मिली है।

धन्यवाद—मेरे आत्मज ढाँ० आशुतीप शुक्ल ने इस प्रन्थ के प्रणयन में अपेक्षित सभी प्रकार से सहयोग दिया है। भगवान् विश्वनाथ उनकी आयुर्वेद के उत्यान की अभिकृषि को सतत अप्रसारित करें, यही आकाङ्झा है।

अन्त मे, चीखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी परिवार को अनेकश साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा एव सहयोग से प्रेरित होकर यह ग्रन्थ सपूर्ण हुआ और उन्होंने सुन्दर, सुरुचिपूर्ण ढग से ग्रन्थ का प्रकाशन किया।

महाशिवरात्रि स॰ २०४७ १२ फरवरी १९९१ आशुतोप भौपघालय जलकल रोड, देवरिया विनयावनत विद्याघार शुक्ल

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

ज्वर-विवेचन

१-२६

ज्वर का महत्त्व १, ज्वर की उत्पत्ति २, ज्वर शब्द के पारिभाषिक अयं २, ज्वर की प्रकृति ५, ज्वर की प्रवृत्ति ५, ज्वर का प्रभाव ६, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण ६, ज्वर के पर्याय ७, वैदिक वाङ्मय मे ज्वर ७, ज्वर के भेद की छह तालिकाएँ ९, समज्वर और विषम-ज्वर ११, ज्वर का सामान्य निदान १२, निज ज्वरो की सामान्य सप्राप्ति १३, निज ज्वरो का सामान्य पूर्वेरूप १४, निज ज्वरो का विशिष्ट पूर्वेरूप १५, ज्वर का सामान्य लक्षण १५, आमज्वर, ' पच्यमान ज्वर और निरामज्वर १५, प्रकार के भेद से ज्वर १७. शारीर ज्वर १७, मानस ज्वर १७, अविसर्गी ज्वर १७, विसर्गी ज्वर १८, पुनरावर्तक ज्वर १८, जीर्णज्वर १८, ज्वर के उपद्रव १८, साध्य ज्वर का लक्षण १८, असाध्य ज्वर का लक्षण १९, ज्वर के अरिष्ट १९, ज्वरमोक्ष का पूर्वरूप २०, ज्वरमोक्ष--दारुण मोक्ष २१, अदारुण मोक्ष २१, विषमगति मोक्ष २१, ज्वरमुक्त के लक्षण २२, ज्वर चिकित्सा मे विचारणीय विषय २२, ज्वर के पूर्व रूप मे उपचार २३, तापशामक बाह्य उपचार २३, ज्वर मे सामान्य बाभ्यन्तर उपचार २४।

द्वितीय अध्याय

निजज्वर

२७-४४

वातज्वर—निदान २७, सम्प्राप्ति २८, लक्षण २८, उपचार २९, पित्तज्वर—निदान ३९, सम्प्राप्ति ३९, लक्षण ३२, उपचार ३२, कफज्वर—निदान ३४, सम्प्राप्ति ३५, लक्षण ३५, चिंकित्सासूत्र ३५, चिकित्सा ३६, 'द्वन्द्वज और त्रिदोषज ज्वरो के निदान ३८, वात-पित्तज्वर के लक्षण ३९, वात-इलेब्म ज्वर के लक्षण ३९, इलेब्म पित्तज्वर के लक्षण ३९, द्वन्द्वज ज्वरो का चिकित्सासूत्र ४०, वातिपत्तज्वर-चिकित्सा ४०, वातिकफज्वर-चिकित्सा ४१, इलेब्म-फ्तज्वर-चिकित्सा ४३।

तृतीय अध्याय

सन्निपातज्वर

४५-७२

सित्रपातज्यर—निदान और सप्राप्ति ४५, कुछ विशिष्ट निदान ४५, सित्रपातज्वर का दिद्या आरम्म ४५, सित्रपातज्वर की साध्या-साध्यता ४६, सित्रपातज्वर दुिश्चिकित्स्य ४६, सित्रपातज्वर की मर्यादा ४६, समसर्वदोषोल्बण-विकृतिविषमसमवेत सित्रपातज्वर के लक्षण ४७, सित्रपातज्वर के भेद ४७, सित्रपातज्वर के

लक्षण-- १ वातोत्वण ४८, २ पित्तोत्वण ४९, ३. कफोल्वण ४९, ४. वात्पित्तोत्वण मन्दकफज ४९, ५. वातक्लेब्मोल्वण मन्दिपत्त ४९. ६. पित्तकफोल्बण मन्दवात ५०, ७. हीनवात-मध्यपित्त-क्लेष्माधिक ५०, ८. हीनवात-मध्यकफ-पित्ताधिक ५०, ९ हीनपित्त-१० हीनपित्त-मध्यवात-कफाधिक ५१, मध्यकफ-वाताधिक ५०, ११. हीनकफ-मध्यपित्त-वाताधिक ५१, १२ हीनकफ-मध्यवात-पित्ताधिक ५१, १३ समसर्वदोषोल्वण ५१, तन्त्रान्तर पठित सिन्नपातज्वर के लक्षण-- १ कुम्मीपाक ५२, २. प्रोर्णुनाव ५२, ३ प्रलापी ५२, ४ अन्तर्दाह ५२, ५. दण्डपात ५३, ६. अन्तक ५३, ७ एणीदाह ५३, ८. हारिद्रक ५३, ९. अजघोष ५३, १०. भूतहास ५३, यन्त्रापीह ५४, १२. सन्यास ५४, १३ सशोषी ५४, तन्त्रान्तरीय सिमातज्वर के लक्षण-१. शीताङ्क ५४, २. तन्द्रिक ५४, ३ प्रलापक ५४, ४ रक्तष्ठीवी ५५, ५ भुग्ननेत्र ५५, ६ अभिन्यास ५५, ७, जिह्नक ५५, ८ सन्धिक ५६, ९. अन्तक ५६, १० रुग्दाह ५६, ११ चित्तविभ्रम ५६, १२ कणिक ५६, १३. कण्ठकुञ्ज ५६, सिन्नपातज्वरो का सापेक्ष निदान ५७, विषम सिन्नपातज्वर का चिकित्सासूत्र ५७, समसन्निपातज्वर का चिकित्सासूत्र ५८, सम-सिन्नपातज्वरो मे चिकित्साक्रम-- १. लघन ६०, २ स्वेदन ६०, ३ नस्य ६१, ४. निष्ठीवन ६१, ५ अवलेह ६१, और ६ अञ्जन ६२, आवस्थिकी चिकित्सा ६२, उपद्रवयुक्त सिन्नपातज्वर की चिकित्सा-१ शीताङ्ग ६७, २. तन्द्रिक ६८, ३ प्रलापक ६८, ४ रक्तष्ठीवी ६८, ५. भूग्ननेत्र ६९, ६. अभिन्यास ६९, ७ जिह्नक ६९, ८. सन्धिक् ७०, ९ अन्तक ७०, १०. रुग्दाह ७०, ११ चित्त-विभ्रम ७०, १२. कणिक ७१, १३ कण्ठकुब्ज ७१, सिन्नपातज्वर मे उपयोगी प्रमुख औषधें ७१।

चतुर्थं अध्याय आगन्तुकज्वर, नवज्यर, जीर्णज्वर तथा पुनरावर्तकज्वर ७३-८६

आगन्तुकज्वर—अभिघात ७३, अभिचार ७३, अभिशाप ७३, अभिष्कुज्वर—१ कामाभिष्कु ७४, २ शोकाभिष्कु ७४, ३. भयाभिष्कु ७४, ४ क्रोधाभिष्कु ७४, ५ भूताभिष्कु ७४, ६. विषाभिष्कु ७४, ७. ओषधिगन्धाभिष्कु ७५, आगन्तुक ज्वर-सारणी ७५, आमज्वर जपचार ७५, नवज्वर या तरुणज्वर ७६, जीर्णज्यर ७९, ज्वर का चिकित्सासूत्र ८३, पुनरावर्तकृज्वर—निदान ८४, लक्षण ८४, असंध्य लक्षण ८५, चिकित्सासूत्र ८५, व्यवस्थापत्र ८६।

विषमज्वर का परिचय ८७, विषमज्वर का मुक्तानुवन्धित्व ८७, विषमज्वर का निदान ८८, निज विषमज्वर की सप्राप्ति ८९, विषमज्वर निदान-संप्राप्ति सारणी ९०, विषमज्वर के भेद ९०, विषमज्वर सारणी ९२, विषमज्वर के वेगो के अन्तर मे युक्ति ९२, विषमज्वर के आश्रय धातु ९३, दोषगति के अनुसार विषमज्वरो की भिन्नता ९३, विषमज्वरों की भिन्नता के कारण ९४, विषमज्वर के वेग समुद्री ज्वार-भाटे की तरह ९४, सन्ततज्वर ९४, सन्ततज्वर की दोषानुसार अवधि ९४, सन्ततज्वर की असहनीयता ९५, सन्ततज्वर के वारह आश्रय ९५, सन्ततज्वर का कालक्रम ९५, सन्ततज्वर की विषमता ९६, सन्ततज्वर की सप्राप्ति ९७, सन्ततज्वर की चिकित्सा ९८, सततकज्वर ९८, सततकज्वर की चिकित्सा ९९, अन्येद्यक्कज्वर ९९, अन्येद्यब्कज्वर की सप्राप्ति १००, अन्येद्यब्कज्वर की चिकित्सा १००, तृतीयकज्वर १०१, तृतीयकज्वर की सप्राप्ति १०१, तृतीयकज्वर के तीन प्रकार १०१, तृतीयकज्वर की चिकित्सा १०१, चतुर्थंकज्वर १०३, चतुर्थंकज्वर की चिकित्सा १०३, चतुर्थंक विपर्ययज्वर १०४, तृतीयक विपर्ययज्वर १०४, अन्येद्युष्क विपर्ययज्वर १०४, सततक विपर्ययज्वर १०४, कफस्यानानुसार ज्वरोत्पत्ति १०५, मलेरिया-परिचय १०६, मलेरिया का कारण १०६, घातक मलेरिया १०७, मलेरिया का प्रभाव १०७, मलेरिया की तीन अवस्थाएँ १०८, मलेरिया की जीवाणुजन्य सप्राप्ति १०९, घीत विषमज्वर ११०, दाह विषमज्वर ११०, विषमज्वर का विशेष प्रकार १११, प्रलेपक-ज्वर १११, वातवलासकज्वर १११, प्रतोत्यज्वर और ग्रहोत्यज्वर ११२, औपद्रविकज्वर ११२, विषमज्वरो मे सामान्य चिकित्सास्य ११३, विपमञ्चर मे एक-एक औषध का प्रयोग ११४, वेगकालीन चिकित्सा ११५, विषमज्वर की आधुनिक औषघें ११७, वेग-प्रतिपेधक चिकित्सा ११८, दैवव्यपाश्रय चिकित्सा ११९, विपम-ज्वर मे पथ्य १२०।

षष्ठ अघ्याय श्लेपदिकज्वर, मन्यरज्वर, श्वसनकज्वर, १२१-१५६ इलेष्मकज्वर तथा आक्षेपकज्वर

श्लैपिंदकण्वर—परिचय तथा निर्वचन १२१, निदान १२१, सहायक निदान १२२, वातज लक्षण १२२, पित्तज लक्षण १२३, कफज लक्षण १२३, सप्राप्ति १२३, श्लीपद का उर्वेरक देश १२३, असाध्य लक्षण १२३, चिकित्सासूत्र १२४, सामान्य चिकित्सा १२४, एकल औषध-प्रयोग १२५, विशिष्ट चिकित्सा १२६, पध्यापध्य १२६, प्रतिषेध १२७।

मन्यरज्वर—परिचय १२७, निदान १२८, सक्रमण १२९, सप्राप्ति १२९, लक्षण १३०, असाध्य लक्षण १३२, उपद्रव १३२, सामान्य चिकित्सा १३२, आवस्थिकी चिकित्सा १३४, लाक्षणिक चिकित्सा १३७।

श्वसनकज्वर—पर्याय और परिचय १४०, (क) फुप्फुसखण्ड-प्रदाह—निदान १४१, सक्रमण १४१, सप्राप्ति १४१, पूर्वरूप १४३, लक्षण १४३, (ख) श्वासप्रणालिकाप्रदाह—परिचय १४३, निदान १४३, सप्राप्ति १४४, लक्षण १४४, चिकित्सासूत्र १४४, औषघो-पचार १४५, आवस्थिकी चिकित्सा १४६, पथ्य १४८।

श्लेष्मकज्वर—परिचय १४८, निदान १४९, सक्रमण १४९, संग्राप्ति १४९, लक्षण १५०, साध्यासाध्यता १५१, चिकित्सासूत्र १५१, औषधव्यवस्था १५२, पथ्य १५२।

आक्षेपकज्वर—परिचय १५३, निदान १५३, सप्राप्ति १५४, सक्रमण १५४, लक्षण १५४, उपद्रव १५५, चिकित्सासूत्र १५५, औषध-व्यवस्था १५५।

सप्तम अध्याय दण्डकज्वर, पीतज्वर, कृष्णमेहज्वर, १५७-१८४ मूषिकदंशज्वर, कर्गमूलिक ज्वर, मसूरिका, छघु मसूरिका, रोमान्तिका

वण्डकज्वर-पर्याय और परिचय १५७, निदान १५७, लक्षण १५७, चिकित्सा १५८।

पोतज्वर--परिचय १५९, - निदान १५९, लक्षण १६०, चिकित्सा १६०।

कुष्णमेहज्वर-परिचय १६२, निदान १६२, लक्षण १६२, चिकित्सा १६२।

मूषिकदंशज्यर—परिचय १६३, निदान १६३, लक्षण १६३, चिकित्सा १६४।

कर्णमूलिकज्वर—परिचय १६६, निदान १६७, सक्रमण १६७, सम्प्राप्ति १६७, लक्षण १६८, उपद्रव १६८, चिकित्सा १६८। मसूरिका—परिचय १७०, निदान १७१, सक्रमण १७१, सम्प्राप्ति १७१, लक्षण १७२, उपद्रव १७३, गोमसूरिका तथा वैक्सीनिया १७४, चिकित्सा १७४।

लघु मसूरिका-परिचय १७८, निदान १७९, लक्षण १७९, चिकित्सा १८०।

रोमान्तिका-परिचय, निदान, लक्षण, उपद्रव, चिकित्सा १८२।

अष्टम अध्याय अरुचि, अग्निमान्छ, अजीर्ण

१८५-२२०

अरुचि—पर्याय एव परिचय १८५, निदान १८६, सप्राप्ति १८७, लक्षण १८७, चिकित्सासूत्र १८८, मनोऽनुकूल पथ्य और सौम्य वातावरण मे रुचि का परिवर्तन १९१।

अग्निमान्द्य—अग्नि और उसका महत्त्व १९३, तीन और तेरह अग्नियाँ १९४, जठराग्नि की प्रधानता १९४, धात्वग्नि १९४, पश्चभूताग्नि १९५, अग्निमान्द्य का परिचय १९५, निदान १९५, सप्राप्ति १९८, लक्षण १९९, चिकित्सासूत्र १९९, आवस्थिकी चिकित्सा २०१, लाक्षणिक चिकित्सा २०२, औषध-प्रयोग २०४, आहार २०५ और विहार २०६।

अजीणं—परिचय २०७, निदान २०८, सामान्य लक्षण २०९, अश्रविप के लक्षण २१०, अजीणं की सप्राप्ति २१०, अजीणं के विशेष लक्षण २१३, अजीणं के उपद्रव २१४, चिकित्सासूत्रं २१५, सामान्य चिकित्सा २१६, अजीणंनाशक प्रमुख औषध योग २१७, लाक्षणिक चिकित्सा—आमाजीणं मे औषध-प्रयोग २१७, विदग्धा-जीणं चिकित्सा २१८, विष्टब्धाजीणं चिकित्सा २१९, रसशेषाजीणं चिकित्सा २१९।

नवम अध्याय विसूचिका, अलसक, विलम्बिका, आनाह, २२१-२४९ आध्मान, प्रत्याध्मान, आटोप

विसूचिका—परिचय २२१, निदान २२१, सप्राप्ति २२१, लक्षण २२४, शुक्क विसूचिका २२६, विसूचिका के उपद्रव २२६, असाध्य लक्षण २२७, साध्य लक्षण २२७, सामान्य चिकित्सा २२७, औषध-प्रयोग २२९, लाक्षणिक चिकित्सा २३०, जलाल्पता २३२, लवण जल निक्षेप के सामान्य नियम २३४, पथ्यापथ्य एव प्रतिवेध २३५। अलसक—निदान २३६, सप्राप्ति २३६, दण्डालसक २३७, अलसक के लक्षण २३८।

विलिम्बिका—लक्षण २३८, सापेक्ष निदान २३८, अलसक और विलिम्बिका का चिकित्सासूत्र २३९, औषध-प्रयोग २३९, पथ्यापथ्य २४०।

आताह—परिचय २४०, निदान २४१, निर्वेचन २४२, आनाह के भेद २४२, सप्राप्ति २४२, आमज आनाह का लक्षण २४२, पुरीषज आनाह का लक्षण २४३, आमज आनाह चिकित्सासूत्र २४३, आमज आनाह मे औषध-प्रयोग २४३, पुरीषज आनाह चिकित्सासूत्र २४४, पुरीषज आनाह मे औषध २४४, पथ्यापथ्य २४५।

आध्मान—निदान, सप्राप्ति एव लक्षण २४६, चिकित्सासूत्र २४६, अीषध-प्रयोग २४६।

प्रत्यादमान--निदान एवं लक्षण २४७, ब्यवस्थापत्र २४७, सापेक्ष निदान २४८।

आटोप---लक्षण २४८, चिकित्सा २४९।

दशम अध्याय

छदि तथा अम्लपित्त

२५०-२७५

छिदि-पर्याय और परिचय २५०, छिद शब्द का निवंचन २५१, सामान्य निदान २५१, छिद की बाधुनिक परिभाषा २५३, सम्प्राप्ति २५४, छिद का पूर्व रूप २५५, छिद के भेद २५५, वातज छिद का निदान और सम्प्राप्ति २५५, लक्षण २५६, पित्तज छिद का निदान, सम्प्राप्ति और लक्षण २५६, कफज छिद का निदान, सम्प्राप्ति और लक्षण २५७, सिन्नपातज छिद का निदान, सम्प्राप्ति और लक्षण २५७, हिष्टार्थसयोगज छिद २५८, आगन्तुक छिद के लक्षण २५८, छिमज छिद के लक्षण २५८, छिद के उपद्रव २५८, असाध्य छिद के लक्षण २५९, सामान्य चिकित्सा २५९, प्रयोजय औषधें २६१, व्यवस्थापत्र २६३, वातज छिद चिकित्सा २६३, पित्तज छिद चिकित्सा २६६, हिष्टार्थसयोगज छिद चिकित्सा २६६, कृमिज छिद चिकित्सा २६६, कृमिज छिद चिकित्सा २६६, एस्यापथ्य २६७।

अस्लिपित — पर्याय और परिचय २६७, निदान २६७, सम्प्राप्ति २६८, सामान्य लक्षण २६९, भेद २६९, स्रध्वंग अम्लिपित्त के लक्षण २७०, अद्योग अम्लिपित्त कोर पैत्तिक ग्रहणी २७०, वाताधिक अम्लिपित्त के लक्षण २७१, कफाधिक अम्लिपित्त के लक्षण २७१, कफाधिक अम्लिपित्त के लक्षण २७१, वातकफाधिक अम्लिपत्त के लक्षण २७१, व्यवस्थापत्र २७३, अम्लिपत्त नाशक योग २७४, पथ्यापथ्य २७५।

एकादश अध्याय

ः शूलरोग

२७६-३०३

परिचय २७६, निरुक्ति २७६, प्रकार २७७, शूलभेद सारणी २७८, वातजशूल निदान और सप्राप्ति २७७, लक्षण २७९, पित्तजशूल निदान और सम्प्राप्ति २७९, लक्षण २७९, कफज शूल निदान और सम्प्राप्ति २८०, लक्षण २८०, द्वन्द्वज शूल के लक्षण २८०, शूल की साध्यासाध्यता २८१, शूल के जपद्रव २८१, सिश्चपातज शूल का लक्षण २८१, वातिक परिणामशूल विद्यामशूल का दोषानुसार लक्षण २८२, वातिक परिणामशूल

२८२, पैत्तिक परिणामशूल २८२, कफज परिणामशूल २८२, द्वन्द्वज तथा सिन्नपातज परिणामशूल २८३, परिणामशूल की असाध्यता २८३, अन्नद्रनशूल २८४, पार्श्वशूल २८४, कुक्षिशूल २८४, हृदयशूल २८४, वस्तिशूल २८५, मूत्रशूल २८५, विद्यूल २८५, अविपाकज शूल २८६, शूलरोग का चिकित्सासूत्र २८६, विशिष्ट चिकित्सा— वातज शूल २८८, पित्तज शूल २९०, कफज शूल २९२, द्वन्द्वज शूल २९३, त्रिदोषज शूल २९४, आमज शूल २९४, परिणाम शूल २९६, अन्नद्रव शूल २९८, पार्श्वशूल २९८, कुक्षिशूल २९९, हृदयशूल ३००, वस्तिशूल ३०१, मूत्रज शूल ३०२, विद्शूल ३०३, अविपाकज शूल ३०३।

द्वादश अध्याय

गुल्मरोग

३०४-३२९

परिचय एव निरुक्ति ३०४, गुल्म का स्थान ३०५, गुल्म के प्रकार बीर सख्या ३०६, रक्तज गुल्म के दो प्रकार ३०६, गुल्म का सामान्य निदान ३०७, गुल्म का पूर्वरूप ३०७, गुल्म का सामान्य लक्षण ३०७, अन्तर्गुल्म का लक्षण ३०७, वाह्यगुल्म का लक्षण ३०७, गुल्म की सामान्य सप्राप्ति ३०८, वातज गुल्म का निदान ३०८, वातज गुल्म का लक्षण ३०९, पित्तज गुल्म का निदान ३०९, पित्तज गुल्म के लक्षण ३०९, कफज गुल्म का निदान ३१०, कफज गुल्म के लक्षण ३१०, त्रिदोषज गुल्म का निदान और लक्षण ३१०, रक्तज गुल्म का निदान ३१०, रक्तज गुल्म के लक्षण ३१०, असाध्य गुल्म के लक्षण ३१०, पक्व गुल्म के लक्षण ३१२, अपक्व गुल्म के लक्षण ३१२, पच्यमान गुल्म के लक्षण ३१२, आभ्यन्तर पच्यमान गुल्म के लक्षण ३१३, आभ्यन्तर पक्व गुल्म के रूप ३१३, रक्तज गुल्म और गर्भ का सापेक्ष निदान ३१३, गुल्म और अन्तर्विद्रिध का सापेक्ष निदान ३१४, गुल्म और विद्रधि के भेदक लक्षण ३१४, गुल्म का सामान्य चिकित्सासूत्र ३१५, गुल्म की चिकित्सा के एकादश सूत्र ३१५, वातज गुल्म का चिकित्सासूत्र ३१६, वातज गुल्म मे औपघ ३१७, वातज गुल्म की आवस्थिकी चिकित्सा ३१८, पित्तज गुल्म का चिकित्सासूत्र ३१९, पित्तज गुल्म मे औषध ३२०, कफज गुल्म का चिकित्सासूत्र ३२२, कफज गुल्म की आवस्थिकी चिकित्सा ३२२, कफज गुल्म मे विशिष्ट उपचार ३२३, कफज गुल्म मे औषध ३२४, द्वन्द्वज तथा सन्निपातज गुल्म चिकित्सा ३२५, रक्तज गुल्म का चिकित्सासूत्र ३२६, रक्तज गुल्म की चिकित्सा ३२७, सिद्ध औषधयोग ३२७, वाह्य उपचार ३२७, अति रक्तस्राव मे उपचार ३२७, सिद्ध औषध ३२८, व्यवस्थापत्र ३२८, सामान्य पथ्य ३२८, विशिष्ट पथ्य ३२९, अपथ्य ३२९।

त्रयोवश अध्याय कृमिरोग, अर्शरोग एवं रक्तार्श ३३०-३७।

कृमिरोग -- कृमि शब्द का निर्वचन ३३०, अथवंवेद मे कृमि-वर्णन ३३०, आसोपदेश ३३१, कृमियो के प्रकार, उनके नाम और सख्या ३३२, बाह्य कृमि ३३४, चिकित्सासूत्र ३३५, चिकित्सा ३३५, आभ्यन्तर कृमि ३३६, रक्तज कृमि ३३६, कफज कृमि ३३८, पुरीवन क्रमि ३३९, अकुशमुख कृमि ३४०, गण्डूपद कृमि ३४०, स्फीत कृषि ३४१, तन्तुकृषि ३४१, कृषिरोग का सामान्य निदान एव विशिष्ट निदान ३४१, सामान्य लक्षण एव सप्राप्ति ३४२, चिकित्सासूत्र ३४२, कफज एव पुरीषज कृमियो की सामान्य चिकित्सा ३४५, कृमिनाशक योग ३४६, व्यवस्थापत्र ३४९, पथ्यापथ्य ३४९। अर्शरोग---परिचय ३४९, सहज और दोषज वर्श ३५०, वर्श शब्द का निवंचन ३५०, अर्श एक महागद ३५१, अर्श का अधिष्ठान ३५१, अर्श के भेद ३५२, सामान्य निदान ३५३, अर्श का पूर्वरूप ३५५, सामान्य लक्षण ३५५, निदानार्थंकर रोग ३,५६, वातज अर्थ का निदान ३५६, लक्षण ३५७, पित्तज अर्श का निदान और लक्षण ३५७, कफज अर्श का निदान और लक्षण ३५७, त्रिदोषज अर्श का निदान और लक्षण ३५७, द्वद्वज अर्श का निदान और लक्षण ३५८, सहज अर्श का निदान और लक्षण ३५८, रक्तार्श का निदान और लक्षण ३५८, अर्श एक सर्वेशरीर कष्टकर त्रिदोषज रोग ३५९, सम्प्राप्ति ३६०, साध्यासाध्यता ३६१, सापेक्ष निदान ३६१, दोष-निरपेक्ष अर्श के लक्षणों के दो प्रकार ३६२, अर्शरोग की चिकित्सा ३६२, चिकित्सासूत्र ३६२, शुष्कार्श मे बाह्य उपचार ३६४, आभ्यन्तर प्रयोग और सिद्धयोग ३६६, व्यवस्थापत्र ३६९, प्रथापथ्य 1005

रक्तार्शं — रक्तार्शं का विशिष्ट चिकित्सासूत्र ३७०, रक्तार्शं मे बाह्य उपचार ३७१, आभ्यन्तर चिकित्सा ३७२, सिद्धयोग ३७४, व्यवस्थापत्र ३७५, अर्शरोग का सक्षिप्त उपक्रम ३७६, पथ्यापथ्य ३७७।

चतुर्दश अध्याय सूत्रकुच्छ्र, सूत्राचात तथा अश्मरी ३७८-४०६

मूत्रकृष्ण्र—परिचय और निर्वचन ३७८, सामान्य निदान ३७९, सप्राप्ति ३८०, सामान्य एव विधिष्ट लक्षण ३८०, अश्मरी और शर्करा की समानता और भेद ३८९, सामान्य चिकित्सा ३८२, विधिष्ट चिकित्सा—वातज मूत्रकृष्ण् ३८२, पित्तज मूत्रकृष्ण् ३८३, कफज मूत्रकृष्ण् ३८५, त्रिदोषज मूत्रकृष्ण् ३८६, शल्याभिघातज मूत्रकृष्ण् ३८६, शकृद विघातज मूत्रकृष्ण् ३८७, अश्मरी (शर्कराज) म् त्रकृच्छ्र ३८७, धुक्रज म् त्रकृच्छ्र ३८७, रक्तज म् त्रकृच्छ्र ३८७, पथ्यापथ्य ३८८।

मूत्राघात—परिचय एव निर्वेचन ३८८, सामान्य निदान ३८९, भेद ३८९, सप्राप्ति ३९०, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मूत्रवहसस्थान की विकृतियो का व्यापक अध्ययन ३९१, वस्तिकुण्डल की साध्यासाध्यता ३९३, सर्वविद्य मूत्राघात का चिकित्सासूत्र ३९३, सामान्य चिकित्सा—बाह्य उपचार ३९५, आभ्यन्तर औषध ३९५, विशिष्ट चिकित्सा ३९६, पथ्यापथ्य ३९७।

अश्मरी—परिचय एव निर्वंचन ३९८, निदान ३९८, भेद ३९८, सप्राप्ति ३९९, अदमरी का स्वरूप और सामान्य लक्षण ३९९, शक्रंरा का स्वरूप और लक्षण ३९९, अदमरी लक्षण ४००, साध्यासाध्यता ४०९, उपद्रव ४०९, चिकित्सासूत्र ४०९, सामान्य चिकित्सा ४०२, सिद्धयोग ४०३, विशिष्ट चिकित्सा ४०३, पथ्यापथ्य ४०६।

पञ्चदश अध्याय कासरोग, श्वासरोग तथा हिक्कारोग ४०७-४४२

कासरोग—परिचय ४०७, निवंचन ४०७, सामान्य निदान ४०८; सामान्य सप्राप्ति ४०८, सामान्य पूर्वेरूप ४०९, कास के भेद ४०९, विशिष्ट निदान और लक्षण ४९०, साध्यासाध्यता ४९९, वातज कास चिकित्सा ४९२, पित्तज कास चिकित्सा ४९३, कफज कास चिकित्सा ४९५, आवस्थिकी चिकित्सा ४९७, क्षतज कास चिकित्सा ४९८. क्षयज कास चिकित्सा ४२०, पथ्यापथ्य ४२२।

श्वासरोग—परिचय एव निर्वचन ४२३, निदान ४२४, संप्राप्ति ४२५, भेद ४२७, पूर्वे छप ४२७, महाश्वास का लक्षण ४२७, ऊर्घ्वेश्वास का लक्षण ४२७, छिन्नश्वास का लक्षण ४२८, तमकश्वास का लक्षण ४२८, प्रतमकश्वास का लक्षण ४२९, सन्तमकश्वास का लक्षण ४२९, स्नुद्रश्वास का लक्षण ४२९, साध्यासार्ध्यता ४२९, श्वासरोग विकित्सा ४३०, आवस्थिकी चिकित्सा ४३३, प्रथापथ्य ४३५।

हिक्कारोग—परिचय एव निर्वचन ४३६, निदान ४३६, सप्राप्ति४३७, हिक्का के भेद ४३८, पूर्वेरूप ४३८, अन्नजा हिक्का के लक्षण ४३८, यमला के लक्षण ४३९, क्षुद्रा के लक्षण ४३९, गम्भीरा के लक्षण ४३९, महाहिक्का के लक्षण ४३९, साव्यासाध्यता ४३९, चिकित्सा- सूत्र ४४०, चिकित्सा ४४०, पथ्यापथ्य ४४२।

षोडश अध्याय पार्श्वशूल, राजयक्ष्मा तथा शोषरोग ४४३-४७४ पार्श्वशूल-परिचय ४४३, निर्वचन ४४३, निदान ४४३, सप्राप्ति ४४३, लक्षण ४४४, चिकित्सा ४४४, पथ्यापथ्य ४४५।

राजयहमा—पर्याय व परिचय ४४५, निर्वचन ४४६, निदान ४४६, साहसजन्य राजयहमा का निदान और सप्राप्ति ४४७, स्वयं राजयहमा का निदान और सप्राप्ति ४४७, स्वयं राजयहमा का निदान और सप्राप्ति ४४७, स्वयं राजयहमा का निदान और सप्राप्ति ४४७, विषम भोजनजन्य राजयहमा का निदान और संप्राप्ति ४४८, राजयहमा की सामान्य सप्राप्ति ४५१, राजयहमा के भेद ४५३, फुप्फुसमूल राजयहमा के पूर्वेह्नप ४५२, राजयहमा के भेद ४५३, फुप्फुसमूल राजयहमा ४५३, राजयहमा के कारणों के आधार पर लक्षण ४५४, राजयहमा ४५३, राजयहमा ४५६, एकादशह्म राजयहमा ४५६, सापेस निदान ४५७, चिकित्सा ४६०, शोधन चिकित्सा ४६०, संशमन चिकित्सा ४६१, पथ्यापथ्य ४६६।

शोषरोग—कारणानुमार शोप के भेद ४६७, शोप के लक्षण ४६८, उर क्षत का निदान एव सप्राप्ति ४६९, उर क्षत का पूर्वरूप और लक्षण ४७०, साध्यासाध्यता ४७१, चिकित्सासूत्र ४७१, चिकित्सा ४७२, पथ्य ४७३, अपथ्य ४७४।

समदश अध्याय हृद्रोग, हुच्छूल तथा हृदयाभिद्यात ४७५-४९५ हृद्रोग—परिचय ४७५, सामान्य निदान ४७६, सामान्य लक्षण ४७६, हृद्रोग के भेद ४७७, आवरणिक ४७८, कौष्ठिक ४७८, पृथुक ४७८, आयामिका ४७८, परिक्षय ४७९, मेद सूत्र ४७९, विक्षेपिका ४७९, वातज-पित्तज-कफज-त्रिदोयज और कृमिज हृद्रोग के निदान तथा लक्षण ४७९-८१, हृद्रोग के उपद्रव ४८२, चिकित्सासूत्र ४८३, सामान्य चिकित्सा ४८४, वातज-पित्तज-कफज-त्रिदोयज और कृमिज हृद्रोगो की विशिष्ट चिकित्सा ४८६-४९१, पथ्यापथ्य ४९२।

हुच्छूल—निदान और सप्राप्ति ४९२, चिकित्सा ४९२। हृदयामिषात—लक्षण ४९४, चिकित्सासूत्र ४९४, चिकित्सा ४९५। सष्टादश अध्याय रक्तपित्त, कामला, कुम्भकामला ४९६-५२१ तथा हलीमक

रक्तिपत्त-परिचय ४९६, निरुक्ति ४९६, निदान ४९७, सप्राप्ति ४९८, रक्तिपत्त की गति ४९८, रक्तप्रवर्तन या निर्गमन का मार्ग ४९९, सापेक्ष निदान ५०१, पूर्वरूप ५०१, दोषानुसार रक्तिपत्त के भेद ५०१, रक्तिपत्त के लक्षण ५०१, उपद्रव ५०२, साध्यासाध्यता ५०२, चिकित्सासूत्र ५०४, सशोधन चिकित्सा ५०५, सशमन चिकित्सा ५०६, पथ्यापथ्य ५११।

कामला—परिचय ५१२, निदान ५१२, लक्षण ५१२, भेद निदान की दृष्टि से ५१२, शाखाश्रया कामला की सप्राप्ति ५१३, कोट्ठशाखाध्या कामला की सप्राप्ति ५१२, घाखाश्रित कामला के लक्षण ५१४, कोच्ठशाखाश्रित कामला के लक्षण ५१४, असाध्य लक्षण ५१४, चिकित्सासून ५१४, मामान्य चिकित्सा ५१५, पथ्यापथ्य ५१७।

कुम्मकामला—लक्षण ५१८, चिकित्सा ५१८, व्यवस्थापत्र ५१९। हुलीमक-लक्षण ५१९, चिकित्सासूत्र ५२०, चिकित्सा ५२०, व्यवस्थापत्र ५२१, पानकी ५२१।

एकोर्नीवश अध्याय वाहरोग, वातरक्तरोग, रक्तगत वात ५२२-५३५ तथा रक्तावृत वात

बाहरोग—परिचय एवं निदान ५२२, वातिक दाह निदान ५२२, पैतिक दाह निदान ५२२, दाह के भेद ५२३, सम्प्राप्ति ५२३, मराज दाह ५२३, रक्तज दाह ५२३, पित्तज दाह ५२३, तृष्णानिरोधज दाह ५२३, आभ्यन्तर रक्तलावज दाह ५२४, धातुष्तयज दाह ५२४, धतुष्तयज ५२४, धतुष्तयज्ञ ५२४, धतुष्त्रयज्ञ ५२४, धतुष्त्रयज्ञ ५२६, पथ्यापय्य ५२६।

वातरक्त रोग—परिचय, निवंचन और पर्याय ५२७, निवान ५२७, सम्प्राप्ति ५२८, वातरक्त का प्रसार-प्रकार ५२९, पूर्वेष्ट्य ५३०, भेद ५३०, उत्तान वातरक्त का प्रदाण ५३०, गम्भीर वातरक्त का लक्षण ५३०, उभय मिश्रित लक्षण ५३०, वातादि दोपप्रधान वातरक्त के लक्षण ५३१, साध्यासाध्यता ५३१, उपद्रव ५३९, लसाध्यता का कारण ५३१, चिकित्सासूत्र ५३२, सामान्य विकित्सा ५३२, व्यवस्थापत्र ५३३, प्रधापध्य ५३४।

रत्तगत यात-स्टाण भीर चिकित्मा ५३४। रक्तावृत यात-स्टाण भीर चिकित्मा ५३५।

विश अध्याय तृष्णारोग, अतिसार तथा प्रवाहिका ५३६-५५२ तृष्णारोग--परिचय ५३६, निदान ५३७, सम्प्राप्ति ५३७, पूर्वेरूप ५३७, प्रत्यात्म लक्षण ५३७, सामान्य रुक्षण ५३७, वातजा-पित्तजा-कफजा-सतजा-क्षयजा-आमजा-अप्रजा और उपसर्गजा तृष्णा के लक्षण ५३७-३८, असाध्य लक्षण ५३८, चिकित्सासूत्र ५३८, सामान्य चिकित्सा ५३९, विदाध्ट चिकित्सा ५३९, व्यवस्थापत्र ५४०, पथ्यापय्य ५४०।

अतिसार-परिचय ५४१, सामान्य निदान ५४१, सम्प्राप्ति ५४१, भेद ५४२, पूर्वेरूप ५४२, वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सप्तिपातज अतिसार लक्षण ५४३, शोकज अतिसार लक्षण ५४३, आमातिगार छक्षण ५४३, रक्तातिसार छक्षण ५४३, असाध्य छक्षण ५४३, आग पष्य मह छक्षण ५४८, मापेक्ष निदान ५४४, चिकित्मा- पूर्व ५४५, आगातिसार चिकित्सा ५४६, यातातिसार चिकित्मा ५४६, विक्तातिगार चिकित्सा ५४६, कफ्रजातिगार चिकित्सा ५४७, विद्यापजातिगार चिकित्सा ५४७, रक्तानिसार चिकित्सा ५४७, अय-शोकातिगार चिकित्सा ५४८, आयम्थिकी चिकित्सा ५४८, अययस्थापय ५४९, पथ्यापय्य ५४९, ।

प्रवाहिका --परिचय ५४९, स्वतन्त्र-प्रत्राहिका निदान ५५०, परतन्त्र-प्रवाहिका निदान ५५०, सम्प्राप्ति ५५०, भेर क्षीर छन्। ५५०, चिकित्सासूत्र ५५१, चिकित्मा ५५१, रष्टवरमापत्र ५५२, पद्मापद्य ५५२।

एकविश अध्याय पाण्डुरोग, आमवात, मद तथा मवात्यय ५५२-५७३

पाण्डुरोग-परिचय ५५३, मामान्य निदान ५५३, मामान्य मन्त्राप्ति ५५३, पूर्वत्य ५५४, मामान्य लहाण ५५४, वातज पाण्डु राह्मण ५५४, पित्तज भाण्डु लक्षण ५५४, कफण पाण्डु लक्षण ५५४, विद्योपज पाण्डु राक्षण ५५४, मृतिकाजन्य पाण्डु लक्षण ५५४, सम्प्राप्ति ५५५, असाध्य लक्षण ५५५, चित्रित्याम्त्र ५५५, चित्रित्या ५५६, व्यवस्थापत्र ५५७, प्रथापद्य ५५९।

आमवात—परिचय ५५९, निवंचन ५७९, निदान ५६०, मम्प्राप्ति ५६०, सामान्य लक्षण ५६१, तीव्रायस्या के लक्षण ५६१, दोव-विदोपज लक्षण ५६१, साध्यामाध्यता ५६१, मापेक्ष निदान ५६२, चिकित्सासूत्र ५६२, चिकित्सा ५६२, पध्यापथ्य ५६४।

मद—परिचय ५६५, निदान ५६६, भेद ५६६, वातज मद लक्षण ५६६, पित्तज मद लक्षण ५६६, कफ्रज मद लक्षण ५६६, मिन्न-पातज मद लक्षण ५६६, मद्यज मद निदान ५६६, मद्यज मद के भेद ५६७, प्रयम मद लक्षण ५६७, द्वितीय मद लक्षण ५६७, तृतीय मद लक्षण ५६७, चतुर्य मद लक्षण ५६७, चिकित्सासूत्र ५६८, चिकित्सा ५६८।

मवात्यय—सामान्य निदान ५६९, सम्प्राप्ति ५६९, सामान्य लक्षण ५६९, मदात्यय के भेद ५७०, वातज पानात्यय लक्षण ५७०, पित्तज पानात्यय लक्षण ५७०, किंफज पानात्यय लक्षण ५७०, विदोषज पानात्यय लक्षण ५७०, परमद लक्षण ५७०, पानाजीर्णे लक्षण ५७०, मदात्यय के उपद्रव ५७१, लक्षाच्य लक्षण ५७१, चिकित्सा-सूत्र ५७१, चिकित्सा ५७२, वातज एव पित्तज मदात्यय मे औषध

एव आहार-विहार ५७२, कफज मदात्यय चिकित्सा ५७२, त्रिदोषज मदात्यय चिकित्सा ५७३, ध्वसक और विक्षय ५७३, सामान्य चिकित्सा ५७३, पश्यायथ्य ५७३।

द्वाविश अध्याय यौनसंक्रमित रोग तथा यौनमनोगत विकार ५७४-५९६ यौनसक्रमित रोग

पूर्यमेह—पर्याय और परिचय ५७४, निर्वेचन ५७४, निदान ५७४, सक्रमण ५७५, सम्प्राप्ति ५७५, लक्षण ५७५, उपद्रव ५७५, चिकित्सासूत्र ५७६, चिकित्सा ५७६, व्यवस्थापत्र ५७८, पथ्यापथ्य ५७८।

फिरङ्गरोग—पर्याय और परिचय ५७८, निदान ५७९, सम्प्राप्ति ५७९, सक्तमण ५७९, फिरङ्ग के प्रकार ५७९, उपद्रव ५७९, लक्षण ५८०, फिरगज तथा उपदंशज वर्ण में अन्तर ५८०, चिकित्सासूत्र ५८१, चिकित्सा ५८१, व्यवस्थापत्र ५८२, पथ्यापथ्य ५८३।

उपदश-पर्याय और परिचय ५८३, निदान ५८३, सक्रमण ५८४, सम्प्राप्ति ५८४, लक्षण ५८५, उपद्रव ५८५, चिकित्सासूत्र ५८५, चिकित्सा व्यवस्था ५८५, व्यवस्थापत्र ५८६, पथ्यापथ्य ५८७।

,रितजन्य वंक्षणीय कणिकार्बुंद--पर्याय मौर परिचय ५८७, निदान ५८७, लक्षण ५८७, उपद्रव ५८८, साध्यासाध्यता ५८८, स्थानिक चिकित्सा ५८८।

वक्षणीय लक्षकणिकार्बुद--परिचय ५८८, निदान ५८८, संक्रमण ५८८, लक्षण ५८९, चिकित्सा ५८९, पथ्यापथ्य ५८९।

यौनमनोगत विकार

योवापस्मार या हिस्टीरिया—परिचय ५८९, निदान ५९०, लक्षण ५९०, चिकित्सासूत्र ५९१, चिकित्सा ५९२, पथ्यापथ्य ५९३। स्मरोन्माव—परिचय ५९३, निदान ५९३, लक्षण ५९३, काम की दश दशाएँ ५९३, चिकित्सासूत्र ५९४, चिकित्सा ५९४, पथ्यापथ्य ५९४।

बलात्कार—अप्राकृतिक मैथुन के प्रकार ५९५, गुदमैथुन ५९५, हस्तमैथुन ५९५, एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ मैथुन ५९६, पशुमैथुन ५९६, समिलङ्की मैथुन ५९६।

त्रयोविश अध्याय त्वचा के रोग ५९७-६२२

कुष्ठरोग—परिचय ५९७, निर्वेचन ५९७, निदान ५९७, सम्प्राप्ति ५९८, पूर्वेच्प ५९८, भेद ५९९, महाकुष्ठ मे दोष और नाम-भिन्नता ५९९, कुष्ठ के लक्षण ६००, क्षुद्रकुष्ठ के लक्षण ६००, विचर्चिका ६०१, कुष्ठ मे दोषानुसार लक्षण ६०१, धातुगत कुष्ठ के लक्षण ६०९, साध्यासाव्यता ६०२, सापेक्ष निदान ६०२, कुष्ठ की सक्राम- कता ६०२, चिकित्सासूय ६०२, चिकित्सा ६०२, व्यवस्थापत्र ६०४, पथ्यापथ्य ६०७।

किलास या श्वित्र—परिचय ६०७, निर्वचन ६०७, निरान ६०७, सम्प्राप्ति ६०८, सामान्य लक्षण ६०८, किलास के भेद ६०८, साध्यासाध्यता ६०९, सापेक्ष निदान ६०९, चिकित्सासूत्र ६०९, चिकित्सा ६०९, पथ्यापथ्य ६११।

विसर्प-परिचय ६११, निवंचन ६११, निदान ६११, विसर्प के कारण सम धातु ६११, सम्प्राप्ति ६११, विसर्प के भेद ६१२, विसर्प की विशेषताएँ ६१२, क्षतृज क्ष्रिमर्प का लक्षण ६१२, वातज, पित्तज और कफज विसर्प ६१२, सिश्चपातज विसर्प ६१२, वातिम्लज (अग्नि) विसर्प ६१३, वातकफज (ग्रन्थ) विसर्प ६१३, पित्तकफज (कर्दम) विसर्प ६१३, विसर्प के उपद्रव ६१४, साध्या-साध्यता ६१४, चिकित्सासूच ६१४, चिकित्सा ६१४, व्यवस्थापत्र ६१४, पथ्यापथ्य ६१६।

शीतिपत्त, उदर्व, फोठ --परिचय ६१६, तीनो का सामान्य निदान ६१६, पूर्वे रूप ६१७, शीतिपत्त के लक्षण ६१७, उदर्व के लक्षण ६१७, कीठ ६१७, सापेक्ष निदान ६१७, चिकित्सासूत्र ६१८, चिकित्सा ६१८, व्यवस्थापत्र ६१८, प्थ्यापय्य ६१९।

बाह्य जीवाणुओं का संक्रमण ६१९, उपसर्ग स्थान ६१९, संक्रमण का प्रसार ६२०, शरीर में सक्रमण के मार्ग ६२१।

चतुर्विश अध्याय मघुमेह, धमनी-प्रतिचय तथा ६२३–६३९ चयापचय-विशान

मधुमेह—परिचय ६२३, निदान ६२३, सम्प्राप्ति ६२३, सामान्य पूर्वे रूप ६२६, लक्षण ६२६, भेद ६२६, सापेक्ष निदान ६२६, चिकित्सासूत्र ६२६, चिकित्सा ६२६, पथ्यापथ्य ६२८। धमनी-प्रतिचय एक कफज रोग ६३०, निदान ६३०, सम्प्राप्ति ६३०, लक्षण ६३०, चिकित्सासूत्र ६३०, चिकित्सासूत्र ६३०, चिकित्सा ६३२, पथ्यापथ्य ६३२।

चयापचय-विज्ञान—चयापचय क्या है ? ६३३, चरक मे विणित चयापचय और घातुपाक आहारपाक की प्रक्रिया ६३४, आहार का परिणाम और कार्य ६३४, घातुपाक के भेद ६३५, सवतंन, परिवर्तन और निवर्तन ६३५, न्यूनतम घातुपाक ६३६, घातुपाक मे अग्नियो की मुख्य भूमिका ६३७, आम और चयापचय जन्य विकार ६३७, नव्यमत से आम की व्याख्या ६३८, घात्विंग के अपचय से राज-यक्ष्मा ६३९।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिवद्, नई दिल्ली द्वारा निर्घारित आयुर्वेदाचार्यं (बी० ए० एम० एस०) का पाठ्यक्रम

(कायचिकित्सा: द्वितीय प्रश्नपत्र)

(भागकः ५० अंक)

- (१) ज्वर की उत्पत्ति २, ज्वर की परिभाषा ३, ज्वर के पर्याय और भेद ७-११, निज ज्वर २७, आगन्तुक ज्वर ७३, समज्वर ११, विषमज्वर ८७, नव ज्वर ७६, जीणं ज्वर ७९, समवेगी ज्वर, विषमवेगी ज्वर, पुनरावर्तंक ज्वर ८४, मुक्तानुबन्धी ज्वर और सिन्नपात ज्वरो के विशिष्ट चिकित्सा सिद्धान्त ८७, ५७। मन्थर, आन्त्रिक, श्वसनक, श्लेष्मक एवं आक्षेपक ज्वरो के निदान-लक्षण-सम्प्राप्ति एव चिकित्सा का विवेचन १२७-१५५, विषमज्वर का निदान-लक्षण-सप्राप्ति एव चिकित्सा-विधि ८७-१२०, कालाजार-मलेरिया १०६, प्रलेपक १११, वातबलासक १११ तथा श्लोपद १२१ का निदान-लक्षण और चिकित्सा। अभिषञ्जज्वर ७४, भूताभिषञ्ज ज्वर तथा जीवाणुसम्मत ज्वरो के निदान लक्षण और चिकित्सा। पिडकामय-मसूरिका १७० और रोमान्तिका १८२, ज्वरो की प्रतिषेधक और प्रतिकारक चिकित्सा।
- (२) अन्नवहस्रोतोगत रोगो का नैदानिक वर्णन्, चिकित्सासूत्र और चिकित्सा, जैसे—अक्चि १८५, अजीर्णे २०७, अग्निमान्च १९३, आनाह २४०, आघ्मान २४६, आटोप २४८, छिंद २५०, विसूचिका २२०, अलसक २३६, विलम्बिका २३८, गुल्म ३०४, शूल २७६, अम्लपित्त २६७, कृमि ३३० और अर्थे रोग ३४९।
- (३) मूत्रवहस्रोतोगत रोगो का नैदानिक वर्णन, चिकित्सासूत्र और चिकित्सा, जैसे-मूत्रकृच्छु ३७८, मूत्राघात ३८८ एव अहमरी ३९८।
- (४) प्राणवहस्रोतोगत रोगो का नैदानिक वर्णन, चिकित्सासूत्र और चिकित्सा, जैसे—कास ४०७, श्वास ४२३, हिक्का ४३६, पार्क्क्षूल ४४३, राजयक्ष्मा ४४५, शोष ४६७, हृदयरोग ४७५, हृच्छूल ४९२ और हृदयाभिधात ४९४।
- (५) रक्तवहस्रोतोगत रोगो का नैदानिक वर्णन, चिकित्सासूत्र और चिकित्सा, जैसे—रक्तिपत्त ४९६, कामला ५१२, कुम्भकामला ५१८ और हलीलक ५२१। दाह् ५२२, वातरक्त ५२७, रक्तगत वात ५३४ और रक्ता- वृत वात ५३५।

- (६) उदकवहस्रोतोगत रोगो का नैदानिक वर्णन, चिकित्सासूत्र और चिकित्सा, जैसे—नृष्णा ५३६, अतीमार ५४१, प्रवाहिका ५४९ एव विसुचिका ५२९।
- (७) रसवहस्रोतोगत रोगो का नैदानिक वर्णन, चिकित्सासूत्र और चिकित्सा, जैसे—पाण्डुरोग ५५३, आमवात ५५९, मद ५५३, मदात्यय ५६९, तथा सम्बन्धित अवस्थाविधेय ।

(मागख ५० अंक)

- (१) यीनसक्रमित रोग एव यीन मनोगत विकार ५७४-५९६।
- (२) चयापचयदोप-जनित रोगो का नैदानिक वर्णन और चिकित्सा तया सामान्य परिचय ६३३-६३९, तरल-वैद्युत्-अम्ल और क्षार के असन्तुलन सम्बन्धी विकार। धातुविकृतिजन्य रोग, जैसे---मधुमेह ६२३, वातरक्त ५२७, धमनी-प्रतिचय ६३०।
- (३) त्वचा के रोगो का नैदानिक वर्णन और चिकित्सा, जैसे—कुष्ठ ५९७, किलास ६०७, विसर्प ६११, शीतिपत्त-उददं-कोठ ६१६ तथा बाह्य जीवाणुओ का सक्रमण ६१९।

भारतीय चिकित्मा केन्द्रीय परिषव्, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत पाठचक्रमानुसार

अभिनव कीमारभृत्य
डॉ॰ अयोध्याप्रसाद 'अचल'
मृत्य १००-००
अभिनव प्रसूति-विज्ञान
डॉ॰ अयोध्याप्रसाद 'अचल'
मृत्य १००-००
अभिनव स्त्रीरोग-विज्ञान
डॉ॰ अयोध्याप्रसाद 'अचल'
मृत्य १२०-००
अभिनव भेषज्यक्तपना विज्ञान
आवार्ग सिक्रिनम्बन मिम
मृत्य ८५-००

शार्ज्ज्घरसहिता
'दीपिका' हिन्दी न्याख्या सहित हॉ॰ मह्मानन्द त्रिपाठी
मूल्य ७५-०० कायचिकित्सा

भाचार्यं विद्याधर शुक्ल

मृत्य (१-४ माग) ४००-००

प्रत्येक माग १००-००

पदार्थं विज्ञान-दर्पण

भाचार्यं विद्याधर शुक्ल

मृत्य ४५-००

आयुर्वेदीय विकृतिविज्ञान

भाचार्यं विद्याधर शुक्ल

मृत्य ८०-००

आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय

भाषाय विद्याधर शुक्ल

प्रियनिघण्डु
भाचार्य प्रियमतशर्मा प्रणीत
स्वरचित पद्माख्य हिन्दी भ्याख्या
मूख्य २०-००

The Foundations of Contemporary Yoga Prof. R. H. Singh * Price. Rs. 75-60

प्रथम अध्याय

ज्वर-विवेचन

ज्वर का महत्त्व

जबर एक ज्यापक रोग है, जो सभी रोगो के पहले उत्पन्न हुआ। वह सभी रोगो मे बलवान् और प्रधान है। वह शरीर के तापमान को बढा देता है, मन मे विकलता, वेचैनी और ग्लानि उत्पन्न करता है तथा इन्द्रियों को अपने विषयों (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध) के ग्रहण में असमर्थ बना देता है। वह बुद्धि को, बल को, वणं को तथा हुपं और उत्साह को घटा देता है। वह शरीर को थका देता है, इन्द्रियों मे निष्क्रियता ला देता है, वेहोश बना देता है और भोजन में अनिच्छा उत्पन्न करता है।

गरीर मे ताप उत्पन्न करने के कारण उसे 'ज्वर' कहते हैं। वह वडा किठन रोग है। उसमे वहुत से ऐसे उपद्रव होते हैं, जिनकी चिकित्सा करना दुष्कर है। वह सभी रोगो का राजा है। प्राणियों के जन्म के समय और मृत्यु के समय वह अवश्य ही होता है, इसिलये सभी प्राणी सज्वर उत्पन्न होते हैं और सज्वर मरते हैं—'सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव च्रियन्ते च।' च० नि० १।३५। जन्म और मृत्यु के समय अवश्य होना और देह तथा मन इन दोनों को ही सतप्त करना एव सभी स्थावर-जङ्गमों को आक्रान्त करना ज्वर का विशिष्ट प्रभाव है।

ज्वर यमराज के समान मारनेवाला होता है। क्षय, तम, ज्वर, पाप्मा और मृत्यु, ये सव यमराज के रूप माने गये हैं। उवर अनेक प्रकार की तियंग्-योनियो (पशु-पक्षी-वृक्ष-पहाड-भूमि आदि) में भी होता है और विभिन्न नामों से कहा जाता है ।

विभिन्न योनियो मे ज्वर के नाम

योनि	ज्यर	योनि	ज्वर
हाथी मे	पाकल	भैसो मे	हारिद्र
गायो मे	ईश्वर	भैसो मे पक्षियो मे	वभिघात
भेंड वकरे मे	प्रलाप	पतगो में	पक्षपात

१ देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगायजो बळी। ज्वर प्रथानो रोगाणामुक्तो मगवता पुरा ॥ च० चि० ३।४

२ स सर्वरोगाधिपति । च० नि० १।३५

३ ज्वरप्रमावो जन्मादी निधने च महत्तम । च० चि० ३।२६

४ क्षयस्तमो ज्वर. पाप्मा मृत्युश्चीक्ता यमारमका ॥ च० वि० ३।१३

५. नानातियंग्योनियु च बहुविषे शब्दैरिभधीयते । च० नि० १।३५

जल मे	नीलिका (काई)	। गृगो में	मृगरोग
बृक्षो मे	कोटर आदि	मछलियो मे	इन्द्रमद
घोडो मे	अभिताप	सौपो मे	अक्षिक
मनुष्यो मे	ज्बर	भूमि मे	ऊषर
ऊँटो मे	अलस	1	

ज्वर महामोह-स्वरूप है, जिसके कारण ज्वराक्रान्त प्राणी अपने पूर्वंजन्मकृत कर्मों का कुछ भी स्मरण नहीं कर पाता। ज्वर ही जीवननाश के समय शरीर से प्राणों का हरण कर लेता है। देवता और मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी ज्वर के वेग को सहन नहीं कर पाते। कर्म के कारण मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और कर्म के क्षय से पून मनुष्य योनि में आ जाता है, फिर भी मनुष्य में देवत्व प्राप्त करने की क्षमता होने से, जब उसे ज्वर होता है, तो चिकित्सा करने पर वह ज्वरमुक्त हो जाता है।

ज्वर की उत्पत्ति

त्रेतायुग मे भगवान् शकर ने शान्त रहने का सकल्प लिया था, उसी समय असुर महात्माओं की तपस्या में विष्न डालना शुरू किया और समर्थ रहते हुए भी दक्ष प्रजापित ने असुरों का प्रतीकार नहीं किया। दूसरी वात यह हुई कि उन्हीं विनो दक्ष प्रजापित ने एक यज्ञ किया और देवताओं के आग्रह करने के वावजूद उस यज्ञ में उन्होंने शकर जी को भाग नहीं दिया। तीसरी उपेक्षा यह हुई कि यज्ञ की सफलता के लिए, जो शकर भगवान् के प्रार्थना के मन्त्र हैं, उनका पाठ नहीं हुआ और नहीं शिव को आहुतियाँ दी गयी।

अक्रोधवत के समाप्त हो जाने पर, जब दक्ष प्रजापित की उपेक्षा एव अपमान की ओर भगवान शकर का ध्यान गया, फिर तो वह जिन से रुद्र वन गये। उन्होंने अपने मस्तक के तृतीय नेत्र को खोल दिया और उसकी ज्वाला से विध्नकर्ता राक्षसों को नष्ट कर दिया, उन्हें जला दिया। तदनन्तर यज्ञ को नष्ट करनेवाले, क्रोध की अग्नि से सतम बालक को उत्पन्न किया। उस बालक ने यज्ञ का विध्वस कर दिया, फिर तो दाह और व्यथा से पीडित देवता और प्राणिमात्र पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगे। दक्ष के तवेले में भयद्भर चीत्कार और कुहराम मच गया। इस अातद्भ से त्राण देनेवाला भगवान् शकर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, यह सोचकर सप्तियों को साथ लेकर देवताओं ने शिव की ऋचाओं से उनकी तब तक स्तुति की, जब तक कि वे अपने शिव (कल्याणकारी) रूप में नहीं हो गये।

जब उस क्रोध के अवतारी बालक ने भगवान् शकर के शान्त भाव को देखा, तो उसने प्रार्थना की कि अब मैं क्या कहें ? भगवान् शकर ने उसे आदेश दिया कि प्राणियों के जन्म एवं मरण के समय तथा जब से वे अपथ्य करें, तब तुम उनके शरीर में प्रविष्ट होकर 'ज्वर' नाम से प्रसिद्ध होंगे।

१. च० चि० श१५-२५

इस प्रकार भगवान् शकर की क्रोधाग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई।

वक्तव्य—उक्त कथा को जवर का रूपक मानकर क्रोध से जवर की उत्पत्ति के कथन का अभिप्राय यह मानना चाहिए, कि शरीर मे तैजस भाव की वृद्धि के कारण जवर की उत्पत्ति होती है। महर्षि चरक ने क्रोध से पित्त की वृद्धि होना वतलाया है—'क्रोधात् पित्तम्' (चि० चि० ३।१९५)। अत क्रोध को आग्नेय माना गया है। पित्त और अग्ने का अभेद कहा गया है। सुश्रुत ने शरीरान्त सचारी पित्त को ही अग्ने की सज्ञा दी है—'न खल्डु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निक्पलभ्यते, आग्नेयत्वात् पित्ते दहनपचनादिष्वभिवर्तमानेष्वग्निवदुपचार क्रियतेऽन्तरग्निरिति।' (सु० सू० २९) 'आमान्य वृद्धि का कारण होता है'—इस सिद्धान्त से पित्तवर्धक क्रोध का भी आग्नेय होना सिद्ध हो जाता है। यदि क्रोध आग्नेय न होता, तो उससे पित्त की वृद्धि नही होती। उक्त मिद्धान्त के आधार पर ही प्रत्येक ज्वर मे पित्त को प्रकृतिस्य रखनेवाले उपचार किये जाते हैं। इसी आश्रय से चाग्मट ने भी कहा है कि पित्त के विना कष्मा नहीं हो सकती और ज्वर विना कष्मा या ताप के वढ नहीं सकता, इसल्ये ज्वर मे पित्त को कुपित करनेवाले औपध-आहार-विहार का परित्याग कर देना चाहिए।

माधव ने दक्ष द्वारा किये गये अपमान में क्रुद्ध रुद्र के निश्वास में ज्वर की उत्पत्ति कही है।

इस सन्दर्भ मे दक्ष का अर्थ वायु और रुद्र का अर्थ अग्नि है। वायु की विकृति से अग्नि की विकृति और इन दोनों की विकृति से ज्वर की जल्पित होती है।

अन्य दृष्टि से असात्म्य पदार्थों की शरीर में उपस्थित (वियोत्पत्ति = दक्ष प्रयुक्त अपमान), तापनियन्त्रक केन्द्र की विकृति (कद्रकोप), धात्वग्निव्यापार रक्त-प्रवाह की वृद्धि (कुपित रुद्र का निश्वास) एव त्वचा द्वारा तापनिहंरण के अभाव से तापवृद्धि अर्थात् ज्वर की उत्पत्ति होती है। एवश्व निष्कर्ष यह है कि 'प्रकुपित वायु ही अग्नि-पित्तस्वरूप रुद्र को प्रेरित करता है, जिससे प्रेरित पित्त रसानुग हो शरीर में प्रवाहित होता हुआ रस-रक्त को उष्ण कर मपूर्ण शरीर को सतम कर देता है। इस प्रकार शरीर के सतम हो जाने पर शरीर में ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है।'

ज्वर शब्द के पारिभाषिक अर्थ

आयुर्वेद-वाड्मय मे ज्वर शब्द का प्रयोग दो अर्थों मे किया गया है-

१ सामान्यतया ज्वर शब्द सभी रोगो के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—व्याधि, आमय, गद, आतन्द्व, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, ये सभी शब्द पर्यायवाची कहे गये हैं।

२ विशेष अर्थ मे—शरीर की ऊष्मा या ताप के वढ जाने की ज्वर कहते हैं। शारीरिक वाह्य तथा आभ्यन्तर अवयवी के जीवन्त व्यापार को लगातार सचालित रखने के लिए शरीर में ऊष्मा की नियत मात्रा विद्यमान रहती है।

१ ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातद्ध एव च । एकोऽर्थो नामपर्यायैविविधैरिमधीयते ॥ च० चि० ३।११

किन्ही कारणे से, जब उस ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, तो शरीर का ताप बढ जाता है। इस बढे हुए ताप का ही नाम ज्वर है। इस प्रकार ज्वर एक अलग रोग है, जिसमे तापदृद्धि के साथ शारीरिक एव मानसिक विकृतियाँ हो जाती हैं।

चरक ने कहा है कि ज्वर एक प्रकार का होता है और सन्ताप उत्पन्न करना जिसका लक्षण है। अन्यत्र उसे देह, इन्द्रिय एव मन को सतप्त करनेवाला कहा गया है।

सुश्रुत के अनुसार स्वेद का अवरोध, सन्ताप और सर्वाङ्ग मे पीडा, ये लक्षण एक साथ जिस रोग मे हो, उसे 'ज्वर' कहते हैं। ^२

स्वेदावरोध—आमरस के कारण या रक्त मे ज्वर-जन्य विष की प्रचुरता से स्वेद-ग्रन्थियों से स्वेद का निकलना वाधित हो जाता है। स्वेद शब्द स्नावसामान्य का उपलक्षण (बोधक) है, अत स्वेदावरोध से मुख, आमाशय, अन्त्र, वृक्क तथा अन्य ग्रन्थियों के स्नाव का कम होना या बन्द होना, यह अर्थ भी समझना चाहिए। रक्त मे परिश्रमण करनेवाले ज्वर-जनक विषो के कारण तापनियन्त्रक केन्द्र के अक्रियाशील हो जाने से परिसरीय केशिकाओं का विस्फार नहीं होने पाता। इस प्रकार भोजनाभाव तथा विषो एव आमदीष की प्रचुरता के कारण स्वेद-ग्रन्थियों का कार्य अवरुद्ध हो जाता है।

सन्ताप — ताप या ऊष्मा उत्पन्न करना पित्त का गुण है, जब पित्त की वृद्धि होती है, तभी सन्ताप होता है। इसिलये सामान्यत सभी ज्वरों में पित्त का अनुवन्ध मानकर उनमें पित्त शमन करनेवाली चिकित्सा का उपदेश किया गया है। शिश्वरी में ताप की वृद्धि होने पर त्वचा के स्पर्श द्वारा उसका अनुभव होता है। इन्द्रियों में सन्ताप होने पर उनकी क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और मन सन्ताप होने पर चित्त का न लगना, बेचैनी एव ग्लानि होती है।

शरीर में सन्ताप या तापबृद्धि होना शरीर की प्रतिक्रियात्मक शक्ति का निदर्शक है। तापबृद्धि का होना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए एक उपयोगी क्रिया है। ताप की अभिकता के दो लाभ हैं—प्रथम ताप बढ़ने पर जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है और दूसरा लाभ यह है कि तापबृद्धि होने से हृदय की गित तीव्र हो जाती है, जिससे विकृति के निराकरण के लिए रक्त प्रचुर मात्रा में विकृत स्थान में पहुँच जाता है।

सर्वाङ्गग्रहण—यह लक्षण प्रमुख रूप से सर्वाङ्गवात विकार मे होता है, किन्तु जब स्वेदावरोध तथा सन्ताप के साथ सर्वाङ्गग्रहण (सर्वाङ्ग पीडा) होता है, नो ये तीनो ज्वर के परिचायक लक्षण हो जाते हैं।

१ देहेन्द्रियमनस्तापी । च० चि० ३।१५

२ स्वेदावरोध. सन्ताप सर्वाङ्गग्रहण तथा। युगपद् यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते॥ सु० उ० ३९

कण्मा पित्तावृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना ।
 तस्माद पित्तविरुद्धानि त्यजेद पित्ताधिकेऽधिकम् ॥

ज्वर की प्रकृति

प्रकृति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है—(१) पहला अर्थ सिन्नकृष्ट कारण है। इस दृष्टि से शारीरिक दोय—वात-ियत्त-कफ एव मानस दोय—रज तथा तम, जबर की प्रकृति अर्थात् सिन्नकृष्ट कारण हैं। क्योंकि शारीरिक तथा मानसिक दोयों में जब विषमता होती है तभी जबर होता है और जब शारीर तथा मानस दोय विषम नहीं होते, तो जबर नहीं होता। जबर के विष्रकृष्ट कारण—मिध्या आहार-विहार, असात्म्येन्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम तथा आगन्तुक कारण होते हैं।

- (२) प्रकृति का दूसरा अयं स्वभाव है, जिसके अनुसार ज्वर की स्वाभाविक प्रकृतियो को जानना चाहिए। जैसे—
 - १ ज्वर देह और घातुओं का नाश करता है, इसलिए उसे क्षय कहते हैं।
- २. ज्वर से मोह उत्पन्न होता है, जो तमोगुण का कार्य है, अत उसे तम कहते हैं।
- ३. ज्वर शरीर मे ताप और मन तथा इन्द्रियों में सन्ताप उत्पन्न करने से ज्वर कहलाता है।
- ४ ज्वर पूर्व जन्मकृत पाप से भी होता है एव दु खप्रद होता है, अत पाप्मा कहलाता है।
 - ५. ज्वर मृत्युकाल मे अवश्य ही रहता है, इसलिए उसे मृत्यु कहते हैं।
- ६. ज्वर यमराज के समान मारनेवाला होता है, अत यमात्मक कहा जाता है।

ज्वर की प्रवृति

कृतयुग जब समाप्त हो रहा था तब कुछ सम्पन्न लोग इतना अधिक भोजन करने लगे कि उनका शरीर भारी हो गया और वे थकावट एव आलस्य से ग्रस्त हो गये। फिर तो उनमे श्रम से बचने के लिए धन-सम्पत्ति के सञ्चय की प्रवृत्ति का उदय हुआ। सञ्चय से धन-सम्पत्ति के प्रति ममता जगी और लोभ उत्पन्न हुआ।

त्रेतायुग मे लोभ से द्रोह, द्रोह से असत्य भाषण, असत्य भाषण से काम-क्रोध-अहकार द्वेष-कठोरता-अभिघात-भय सन्ताप-शोक-चिन्ता और उद्धेग आदि की उत्पत्ति हुई। घमं का भी है अश लूप हो गया, फिर महाभूतो के गुणो का चतुर्थांश नब्द हो जाने से द्रव्यो, आहार, औषध एव अन्नों में स्निग्धता तथा रस, वीर्य, विपाक एव प्रभाव भी घट गया। उन हीनगुणी आहारों के सेवन से एव मिथ्या विहार से मनुष्यों

१ तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषा शारीरमानसा । देहिनं नहि निर्दोपं ज्वर समुपसेवते ॥ च० चि० ३।१२ ।

२ क्षयस्तमो ज्वर पाप्मा मृत्युक्षोक्ता यमात्मका । पञ्चत्वप्रत्ययाञ्चणा निरुद्यतां स्वेन कर्मणा ॥ इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता । —च० चि० ३।१३ ।

के शरीर का सम्यक् पोपण नहीं हो पाता था, फिर तो अग्नि एव वायु के विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य ज्वर आदि रोगों से ग्रस्त होने लगे।

इस प्रकार ज्वर की प्रथमोत्पत्ति पूर्वविणित रुद्रकोप से तथा द्वितीय उत्पत्ति लोभ-परिग्रह या ममता से हुई। लोभ के वशीयूत मनुष्य सन्द्वयी हो जाता है, फिर वह आहार-विहार मे भी सन्तुलन खो बैठता है, जिसके परिणामस्वरूप ज्वर रोगोत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है।

ज्वर का प्रभावर

१. शारीरिक एव मानसिक सन्ताप होना, २ भोजन में रुचि का न होना, ३. प्यास अधिक लगना, ४ शरीर के अग-अग में पीडा का होना और ५ हृदय में व्यथा होना—ये सभी लक्षण ज्वर के प्रभाव कहे गये हैं। जन्म और मृत्यु के समय ज्वर बहुत वडा मोह जल्पन्न करता है। उस महामोह के ही कारण मनुष्य पूर्वजन्म की वातों को स्मरण नहीं कर पाता। अनीपाधिक शक्ति को प्रभाव कहते हैं, जिसके होने से ज्वर से आक्रान्त व्यक्ति में सन्ताप आदि लक्षण पाये जाते हैं। चूंकि यह ज्वररोग का प्रभाव है, इसलिए वातक्लेष्मज ज्वर में भी ईपदुष्ण रूप ताप होता ही है। जब शरीर में ताप बढता है तो प्यास भी बढ जाती है और जल की इच्छा होती है। पाचकािन की विकृति से भोजन में अविच होती है। ज्वर के वेग एव तीव रक्तसवहन के कारण अगमदं और हृदय में पीडा होती है।

चिकित्सा के पूर्व रोग के प्रतिपेध या रोग का साक्रमण होने पर उससे मुक्ति पाने के लिए उस रोग के कारण तथा स्वभाव रूप प्रकृति का, सिन्नकृष्ट एवं विप्रकृष्ट कारणजन्य प्रवृत्ति या उत्पत्ति का एव उसके प्रभाव का वर्णन कर दिया गया, जिससे चिकित्सक को चिकित्सा कार्य में सुगमता हो।

ज्वर का प्रत्यातम लक्षण³

प्रत्यातम लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो लक्षण अवश्यम्भावी होता है, जिस लक्षण की उपस्थित अनिवार्य रूप से होती ही है। जैसे—'शरीर और मन में संताप का होता' ज्वर का प्रत्यातम (अपना निजी) लक्षण है। शरीर में सताप होने से शरीर की त्वचा के स्पर्श से उण्णता प्रतीत होती है, अग-अग में वेदना होती है और मन में सताप होने पर विकलता, वेचैनी, कही मन न लगना एवं ग्लानि (हर्पक्षय) होती है। शरीर में ज्वर के प्रविष्ट होने पर प्राणिमार्थ (हाथी से चीटी तक) सतम होते हैं।

१ भ्रश्यति तु कृतयुरो ' प्रारज्वरादिभिराकान्तानि । च० वि० ३।२४ ।

२. सन्ताप सारुचिस्तुष्णा साङ्गमदौ इदि न्यथा। ज्वरप्रमावो जनमादौ निधने च महत्तम॥ च० चि० शश्ह

३ ज्वरप्रत्यात्मिकं लिक्नं सन्तापो देहमानस । ज्वरेणाविद्यता भूतं नहि किश्चित्र तप्यते ॥ च० चि० ३।३१

शरीर तथा मन मे एक साथ सताप का होना अनर्थंकर होता है। शारीरिक ज्वर या सताप पहले शरीर में होता है, फिर वह मन को भी आक्रान्त कर लेता है, कि वा मानसिक ज्वर या सताप पहले मन में उत्पन्न होता है और बाद में शरीर को भी सक्रान्त कर देता है, क्योंकि शरीर और मन का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि एक की स्थित का दूसरे के ऊपर निश्चित ही प्रभाव होता है। दोषानुसार ज्वर के विभिन्न लक्षण और प्रकार हैं, वे सभी लक्षण सर्वत्र नहीं होते, किन्तु 'सन्ताप होना' एक ऐसा लक्षण है, जो निश्चित रूप से सभी ज्वरों में पाया जाता है और अव्यभिचारी है। अत सन्ताप होना ज्वर का प्रत्यात्मलक्षण है।

ज्वर के पर्याय

व्याधि, आतस्क्क, ज्वर, विकार एव रोग-इन नाम पर्यायो से एक ही ज्वर रूप अर्थ जाना जाता है और ये ज्वर के पर्याय शब्द हैं।

वैदिक वाङ्मय में ज्वर्र

वेद मे ज्वर के लिए तक्मा पद आया है। 'तिक क्रुच्छ्रजीवने' घातु से तक्मा पद बना है, जिसका अर्थ है जीवन को कष्ट या दु ख देने वाला। गुण-भेद से ज्वर के लिए निम्नलिखित नाम वेद मे आते हैं—


	नाम	अर्थ		सन्दर्भ
9	बीर्षंलोक	शिर को पकडने वाला	अथर्व ०	१९।३९।१०
	सहस्राक्ष	हजारो आँखो वाला	"	६।२६।३
३	अचि	ज्वाला स्वरूप	,,	१।२५।२
	तपु.	तपाने वाला	"	६।२०।१
	शुष्मी	शोषण करनेवाला	21	६।२०।१
	तक्मा	कष्टमय जीवनकर्ता	"	५ ।२२।१
	ग्रभीता	पकडनेवाला	"	919717
6	शोचि	सतापक	11	१।२५।२
8	ह्रुड्	जिसके वेग मे मुख से हुडू की ध्वनि निक	ले ,,	१।२५।२
-	शोक	शोकातुर बनानेवाला 🕠	"	१।२५।३
99	अभिशोक	शोक से सतप्त करनेवाला	,,	१।२५।३
	वरुणस्य पुत्र	जलीय भूमि मे होनेवाला	***	१।२५।३
	व्याल	सपं की तरह प्राणघातक	"	५ ।२२।६
	विगद	विशेष प्रकार का रोग	"	५ ।२२।६
94	व्यङ्ग .	् अगो को विकृत ब्रनानेवाला	27	५ ।२२।६

१ ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च । एकोऽर्थो नामपर्यायैनिविधैरिमधीयते ॥ च० चि० ३।११

२ वेदों में आयुर्वेद' छे० रामगोपाल शास्त्री ए० ९०-९१ से साभार उद्भत ।

१६ अमर्त्य	जो कभी नही मरता अर्थात् वार-वार		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	होनेवाला	अषर्वे०	५ ।२६।३
१७ पाप्मा	क्षय करनेवाला	"	६।२६।१
१८ अभिशोचयिष्णु	सब ओर से तपानेवाला	11	६।२०।२
१९ रुद्र	रुलानेवाला	11 11	६।२०।२
२० हरितस्य देव	हरितवर्णं का देवता	,, ,,	१।२५।२
, Q	तक्मा ज्वर के भेद	,,	.,,,,,
२१ अभ्रजा	मेघ से उत्पन्न होनेवाला—कफज्वर	આપાર્સ ~	010213
	वात से उत्पन्न होनेवाला—वातज्वर		919213
२२ वातजा	यात त उत्पन्न हानपाला—यातण्यर बोषक ज्यर	"	\$15\$19
२३ जुब्म	_	23	919713
२४ पर्व	त्वचा मे रूक्षता उत्पन्न करनेवाला	11	५।२२।३
२५ अगज्वर	अगो मे रहन्वाला	"	९।८।५
२६ अगभेद	अगमर्द करनेवाला	23	९।८।५
२७ शीत	शीतपूर्वक होनेवाला ज्वर	17	५।१२।१०
२८ रूर	उप्ण (पैतिक) ज्वर	"	५।२२।१०
२९ तृतीयक	तीसरे दिन आनेवाला	"	५।२२।१३
३० वितृतीय	चातुर्धिक ज्वर	33	५।१२।१३
३१ सदन्दि	सदा रहनेवाला—सतत आदि	11	५।२२। १३
३२ शारद	शरद् ऋतु मे होनेवाला	11	५।२२।१३
३३ वापिक	वर्षा ऋतु मे होनेवाला	"	५ ।२२।१३
३४ ग्रैष्म	ग्रीष्म ऋतु मे होनेवाला	"	५।२२। १३
३५ विश्वशारद	शरद् ऋतु मे विशेष रूप से		
	फैलनेवाला—मलेरिया ज्वर	"	९।८।६
३६ अन्येद्यू	अन्ये द्यू ष्क	"	१।२५।४
३७ उभयसु	चातुर्थिक विपर्यंय	11	१।२५।४
३८ अरुण	लाल ज्वर (मसूरिका आदि मे)	"	६।२०।३
३९ बभ्रु	पीतज्वर	"	६।२०।३
४० वन्य	वन मे रहने से होनेवाला	2)	६।२०।३
४१ च्यवन	स्वेद लानेवाला	17	७।११६।१
४२ नोदन	जो ज्वर इधर-उधर दौडता है	"	७।११६।१
४३ अव्रत	विषमज्वर '	71	७।११६।२
४४ घृष्णु	जो धृष्टता पूर्वंक चढता है	11	७।११६।१
४५ हायन	धान पकने के समय होनेवाला	,,	१९।९।१०
• •	•		

ज्वर मे अग्नि की ज्वाला जैसी जलन, उन्मत्तवत् प्रलाप, कम्पन आदि सैंकडो उपद्रव होने का वेद-मन्त्रो मे वर्णन किया गया है।



वैकृत

संताप

सुखसाध्य

साध्य

असाध्य'

कुच्छ्र साध्य याप्य प्रत्याख्येय

সাক্তর

शारीर

मानस

१ (क) यस्य भीम प्रतिकाश उद्देपयति पूरुषम् । अथवं ० ९।८।६

⁽ख) अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्नपायित । अन्यमस्मिदिच्छतु कश्चिदन्नतस्तपुर्वधाय । अथर्व ० ६।३०।१

⁽ग) शत रोपीश्च तक्मन ।

कायचिकित्सा

(३) सिम्रपातज्वर के भेव

दोपानुबन्ध नाम १ वातोल्बण विस्फारक २ पित्तोल्वण वाशुकारी ३ कफोल्वण कम्पन ४ वातपित्तोल्वण वप्रू ५ वातकफोल्बण शीघ्रकारी ६ पित्तकफोल्वण भल्लू ७ हीनवात-पित्तमध्य-इलेप्साधिक वैदारिक ८ हीनवात-मध्यकफ पित्ताधिक यास्य ९ हीनपित्त-मध्यकफ-वाताधिक कक्रच १० हीनपित्त-वातमध्य-कफाधिक ककेंटक ११ हीनकफ-पित्तमध्य-वाताधिक सम्मोहक १२ हीनकफ-वातमध्य-पित्ताधिक पालक १३ सर्वदोपोल्बण कूटपालक

(४) सिन्नपातज्वरों के नाम-भेद

्सन्निपात ज्वरो के अन्य भेद मतान्तर मतान्तर १ कुम्भीपाक १ शीताङ्ग १ आन्त्रिक ज्वर २ प्रोर्णुनाव २ तन्द्रिक २ भ्रासनक ज्वर ३ प्रलापक ३ प्रलापी ३ प्रणालीय श्वसनक ज्वर ४ रक्तष्टीवी ४ उपखण्डीय " ४ अन्तर्दाह ५ भुग्नतेत्र ५ क्लेब्मक ज्वर (इन्पलूएङ्जा) ५ दण्डपात ६ अभिन्यास ६ आक्षेपक ज्वर ६ अन्तक ७ एणीदाह ७ जिह्नक ८ हारिद्रक ८ सन्धिग ९ अन्नक ९ अजघोष १० रग्दाह १० भूतहास ११ कणिक ११ यन्त्रापीह १२ चित्तविश्रम १२ सन्यास १३ कण्ठकुञ्ज १३ सशोषी

(५) ज्वर के भेव

		•	
			•
	जीवाणुसभव ज्वर	पिडकामय व	वर
٩	पीत ज्वर	१ गो मसूरिका	í
२	कृष्णमेह ज्वर	२ लघु मसूरिव	न
3	पृयज्ज्वर	३ वृहत् मसूरि	का
8	पाताल पृपज्ज्वर	४ रोमान्तिका	
ч	सातिज्वर	५ शोण ज्वर	
Ę	कि ज्वर	६ विसर्प	
ও	माल्टा ज्वर	७ जालगर्दभ	
6	सैकतमक्षिका ज्वर	८ रोहिणी	
9	मूपिकदंशज ज्वर	९ घूणदशज	
90	कर्णमूलिक ज्वर	१० एन्द्रोक्स	
99	ग्रत्थिक ज्वर		
92	क्लैपदिक ज्वर		
93	मलेरिया '		
98	कालाजार		
94	दण्डक ज्वर		

(६) कुछ अन्य ज्वर

४ उष्णाभित्रायी ५ ५ स्तेह्विभ्रमज ५ ६ सतपंणज १	८ रोगोत्यानज ९ साम्यविपयंयज १० ऋतुविपयंयज १९ प्रसृतिज १२ स्तन्यागमोत्य १३ ग्रहवाधोत्य ४ दुष्प्रजाता ज्वर	१५ देशान्तरीय १६ मृगमक्षिका १७ वातालिका १८ क्षतज १९ श्रमज २० शासानुसारी २१ विषज	२२ रात्रि ज्वर २३ अर्धाङ्ग ज्वर २४ ऋसदोषोद्भव २५ प्लीह ज्वर २६ अजीर्णज २७ अशुघात २८ तृणपुष्प २९ हारिद्रक ।
--	--	---	--

सम ज्वर और विषम ज्वर

समज्वर और विषम ज्वर की दृष्टि से भी ज्वर दो प्रकार का होता है— १ समज्वर — जो ज्वर स्वल्प कारणोवाला, बहिर्मागंसिश्रत, उपद्रवरहित, एकाश्रयवाला, सुखपूर्वक चिकित्सा करने योग्य तथा लघुपाकी होता है, उसे समज्वर कहते हैं।

१ अल्पहेतुर्वहिर्मागी वैकृतो निरुपद्रव । एकाश्रय सुखोपायो उद्युपाको समो ज्वर ॥ का० सं० खि० अ० १

२ विषमज्वर ने निपरीत लक्षणीवाला हो, एवन्त्र तीक्ष्ण होने के कारण सन्ततज्वर तथा प्रेत और ग्रहों से उत्पन्न होनेवाले तथा सतत आदि चारो ज्वर विषम गति के कारण विषमज्वर कहे जाते हैं। इसके सम्बन्ध के अन्य विषम ज्वर आगे कहे जायेंगे।

ज्वर का सामान्य निदान

- १. स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन-निरूह-अनुवासन एव रक्तमोक्षण का मिथ्यायोग या अतियोग होना ।
 - २. शस्त्र, काष्ट्र, लोब्द्र, पापाण, दण्ड, मुब्टि आदि का आघात ।
 - ३ जण, विद्रधि आदि का उभार या प्रपाक होना।
 - ४. श्रम करना, घातुक्षय होना, अजीर्ण या विपग्रस्त होना ।
 - ५ असातम्य सेवन एव मिथ्या आहार-विहार-सेवन ।
 - ६. ऋतु-परिवर्तन ।
 - ७. विपयुक्त औषधपुष्प की गन्ध लेना।
 - ८ शोकग्रस्त होना।
 - ९ जन्मनक्षत्र या लग्नस्थान मे विशिष्ट ग्रह की उपस्थिति से उत्पन्न पीडा।
- १०. अभिचार-कर्म (विपरीत मन्त्रोच्चारपूर्वक लोहस्रुवा से होम या सर्वेप आदि से होम कर मारण या उच्चाटन का प्रयोग करना)।
 - ११ देवता, गुरु या वृद्धजन द्वारा शाप दिया जाना ।
 - १२. काम-क्रोध-भय आदि का मन मे आवेश होना ।
 - १३. देवता, राक्षस मादि का अभियञ्ज होना।
- १४. असम्यक् रूप से प्रसूता स्त्रियो द्वारा अथवा यथाकाल प्रसूता स्त्रियो द्वारा मिथ्या आहार-विहार का सेवन करना।
 - १५. स्तन्य का प्रथम बार स्तनो मे आविर्भूत होना।

सुश्रुतसिहता चिकित्सास्थान अ० ३९ मे ज्वर के ये निदान कहे गये हैं। महिष चरक ने निजज्वरों के अलग-अलग निदान का उल्लेख किया है। वाग्मट ने मिथ्या-हार आदि को विप्रकृष्ट तथा वातादि दोषों को सिन्नकृष्ट कारण माना है। विश्वास्थान के मिथ्याहारादि वाह्य कारणों को निदान शब्द से लिया है, धातुवैपम्य उत्पन्न कर या साक्षात् ज्वरादि रोगों को उत्पन्न करते हैं। 3

१ विषमस्तद्विषर्यस्तस्तीक्ष्णत्वात् सन्ततो मत । तद्वत् प्रेतग्रहोत्था चै चत्वारो विषमागमात् ॥ का०स० सि० अ० २

२ वातादिसन्निकृष्टं च तथाहारादिसम्मवम् । अपर विप्रकृष्ट च रोगाणा कारणदयम् ॥

३ वाह्य निमित्तं रोगाणा निदानमिति कीर्तितम् । विधाय धातुर्वेपम्य साक्षाद् वा रोगकारि तत् ॥ सिद्धान्तनिदान, प्रथम माग

निज ज्वरों की सामान्य सम्प्राप्ति

मिध्या आहार-विहार से प्रकुपित पृथक्-पृथक् वात, पित्त या कक या द्वन्द्वज दोव—वातिपत्त, वातकफ या पितवात अथवा सिन्नपात—वात-पित्त-कफ रस नामव घातु से मिलकर अग्न्याशय से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी रे सम्पूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर, स्रोतों को रोककर, जब बढ़े हुए दोप सम्पूर्ण शरी मे फैल जाते हैं, तब शरीर मे अधिक ताप उत्पन्न करते हैं, जिससे मनुष्य क शरीर अधिक उष्ण हो जाता है और उष्णता सारे शरीर मे व्यास हो जाती है एवन्च वह व्यक्ति ज्वर से पीडित कहा जाता है।

वक्तरण—मिथ्या आहार विहार एव वलवान् के साथ युद्धादि कारणो से वर्णऋ में, वृद्धावस्था में, दिन के अन्त में, रात्रि के अन्त में या भोजन पच जाने प प्रकुषित वायु, मिथ्या आहार-विहार एव क्रोध आदि से शरद् ऋतु में, मध्य वय में मध्याह्म में, मध्य रात्रि में या भोजन के पचते समय प्रकुषित पित्त अथवा मिथ्य आहार-विहार तथा दिवास्वप्नादि स्वप्रकोपक कारणो से वसन्त ऋतु में, वाल्यकाल में, प्रात काल, प्रदोष वेला में अथवा भोजन के आदि में प्रकुषित कफ सम्पूर्ण शरी में व्याप्त होकर एकाकी, द्वन्द्व या सित्रपात रूप से ज्वर को उत्पन्न करते हैं। ये दोष्ट आमाश्य में पहुँचकर वहाँ की ऊष्मा के साथ मिलकर कि वा पाचकाणि या धात्विन या दोपानि के साथ मिलकर रसधातु के साथ मिश्रित होकर, रसवाहव तथा स्वेदवाहक स्रोतो के मार्ग को अवकद्ध कर जठरानि को मन्द कर, पित्तस्थान से ऊष्मा को निकालकर उसे सम्पूर्ण शरीर में फैलाकर अपने प्रकोपक काल में जव के वेग को उत्पन्न करते हैं। व

ं जब दोष न्वप्रकोषण काल में जबर उत्पन्न करते हैं, तब वह प्राकृत जबर होत है तथा अन्य काल में जब वे जबर उत्पन्न करते हैं, तब वह वैकृत जबर कहलाता है।

सम्प्राप्ति सारणी3

मिथ्या बाहार-विहार एव प्रकोपण काल

१ मंस्ष्टाः सित्तपितिता पृथग्वा कुपिता मलाः ।
रसाख्य थातुमन्वेत्य पित्तं स्थानान्निरस्य च ॥
स्वेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणी वलम् ।
स्रोतासि रुद्ध्वा सम्प्राप्ता केवलं देहमुल्वणा ॥
सन्तापमिषकं देहे जनयन्ति नरस्तदा ।
मवत्यत्युष्णसर्वाङ्गो ज्वरितस्तेन चोच्यते ॥ च० चि० ३।१२९-१३२

र. सु० उ० त• अ० ३९।१५-१८

३ मिथ्याहार्विहाराभ्यां दोषा धामाश्रयाश्रया । विहिनिरस्य कोष्ठारिन क्वरदा स्यूरसातुगाः ॥ माधवनि० क्वर०

वात-पित्त-कफ का पृथक्, द्वन्द्व या
सित्रपात रूप मे प्रकोप
|
आमाशय मे दोष-सन्धय
|
रस +दोप मिलन
|
कोष्ठाग्नि का वहिगंमन
|
सामरस सम्पृक्त दोष का रसवह एवं स्वेदवह
स्रोतो में अवरोध उत्पन्न करना
|
दोषो का रस के साथ
सर्वंशरीर मे फैलना
|
ज्वर की विभिनिर्वृत्ति

दोष-दूष्य-अधिष्ठान-स्रोतस्

१ दोष = वात-पित्त-कफ, पित्त का प्राधान्य

२. दूष्य = (क) कोष्ठाग्नि

= (ख) रस

३. अधिष्ठान = (क) आमाशय

= (ख) सर्वेशरीर

४ स्रोतस् = रसवह = स्वेदवह

५. स्रोतोदुष्टि लक्षण = रोग

निज ज्वरों का सामान्य पूर्वरूप

१ शरीर से थकावट
२ चित्त मे वेचैंनी
३ शारीरिक वर्ण मे विकृति होना
४ मुख का स्वाद विगडना
५ आंखो में आंसू आना
६ शीत वायु एव धूप की कभी इच्छा,
कभी अनिच्छा
७ कभी जल की इच्छा, कभी नहीं
८ जम्भाई आना
९ शरीराङ्गो में पीडा होना

१० अगो मे भारीपन
१९ रोगटे खडा होना
१२ भोज्य-पेय मे अरुचि
१३ आँखो मे अँघेरा छाना
१४ आनन्द न आना
१५ ठण्डक लगना (सुश्रुत)
१६ नीद का अधिक आना
१७ अगो का झुकना
१८ अगो का काँपना
१९ चक्कर आना

ज्वरविवेचन

३० बालको से द्वेष करना २० प्रलाप करना ३१ धार्मिक कर्म मे उपेक्षा २१ दांत का कोट होना ३२ माला-धारण से दुख २२ शब्दासहिष्णुता ३३ अनुलेपन से दुख होना २३ अविपाक ३४ भोजन से क्लेश होना २४ दुर्बलता ३५ मधुर आहार से द्वेष २५ मानसिक दुर्बेलता ३६ अम्लप्रियता २६ दीर्घसूत्रता २७ अभ्यस्त कर्म न करना ३७ लवणप्रियता २८ कार्यों को उलटा करना ३८ कटुप्रियता (चरक नि० १।३३) २९ श्रेष्ठो की बात न मानना

ये लक्षण ज्वर होने के पूर्व होते हैं और कदाचित् ज्वर हो जाने पर भी बने रहते हैं।

निज ज्वरो का विशिष्ट पूर्वरूप

१ ज्वर के पूर्वेरूप मे वायु की प्रवलता से जम्भाई अधिक आती है।

२,, ,, पित्त ,, नेत्रो मे दाह होता है।

३,, ,, कफ ्र चाने मे अनिच्छा होती है।

४,,,,, तीनो दोषो ,, तीनो दोषो के मिश्रित लक्षण होते हैं। ५,,,,, दो ,,,, दो-दो दोषो के ,,,,,,,

ज्वर के पूर्वरूप मे इन्द्रियों की स्वविषयों में अप्रवृत्ति, बल-वर्ण की हानि और व्यक्तियों के स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है।

ज्वर का सामान्य लक्षण

ज्वर के जो प्रभाव कहे गये हैं, वे ही ज्वर के सामान्य लक्षण हैं, जैसे—

१ संताप होना ।

२ अरुचि होना।

३ तृष्णा का अनुभव होना।

४ अङ्गमदं ।

५ हृदय मे वेदना होना।

ये ज्वर के सामान्य लक्षण हैं।

आम ज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर

आम ज्वर

जठराग्नि की दुर्बेलता से अपरिपक्व, आमाशयस्थित दोषयुक्त रस ही 'आम'र

१ सन्ताप सारुचिन्सुष्णा साङ्गमर्दो हृदि व्यथा। च० चि० ३।२६

२ जन्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाधमपाचितम् । दुष्टमामाश्चरातं रसमामं प्रचक्षते ॥ अ० ४० ५० १३।२५

है। यह दूषित रस शोषित होकर सर्वेशरीर मे धूमते हुए, आम ज्वर या अन् आमदोषजन्य विकार जत्पन्न करता है। चिकित्सा के समय आम एव अग्नि व विचार अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि आम ज्वर मे औषध देना निषद्ध है और इ अवस्था मे औषध देना—शोधन या शमन औषधियों का प्रयोग ज्वर को विषमज्व बना देता है।

लक्षण

- स्रोतोऽवरोध एव कोष्ठ से अग्नि के बहिगमन के कारण भोजन मे अरुचि।
- २ खाये हुए अन्न का समुचित रूप से न पचना।
- ३, उदर का भारी होना।
- ४ हृदय-प्रदेश में भारीपन की प्रतीति।
- ५. तन्द्रा--नीद की-सी उँघाई वाना ।
- ६ आलस्य--कर्म करने मे असमर्थता।
- ७. ज्वर का लगातार बने रहना।
- ८ दोष तथा मलो की प्रवृत्ति न होना-बाहर न निकलना।
- ९ मुख से लार टपकते रहना।
- १०. हुल्लास—वमन होने का आभास होना ।
- ११ भूख का न लगना।
- १२. मुख का स्वाद फीका बना रहना।
- १३. अगो मे जकडाहट, सूनापन और भारीपन का होना।
- १४ मूत्र का अधिक निकलना।
- १५. वाम मल का निकलना।
- १६ ग्लानि का न होना अर्थात् मास का क्षीण न होना ।
 - ये आमज्वर के लक्षण है।


पच्यमानज्वर

- १. ज्वर का वेग अधिक तीव्र होना।
- २ तृष्णा विधिक होना ।
- ३ प्रलाप होना।
- ४ तीव्र श्वास का वेग होना।
- ५ शिर मे चनकर मालूम होना।
- ६ मल-मूत्र-स्वेद एव नासामल की सम्यक् प्रवृत्ति ।
- ७. जी मचलाना
- ये पच्यमान ज्वर के लक्षण हैं।

१. ज्वरवेगोऽधिकस्तुःणा प्रलाप स्वसनं भ्रमः । मळप्रवृत्तिरुख्केशः पञ्चमानस्य छक्षणम् ॥ च० चि० ३।१३६

नरामज्वर1

- १ भूख का लगना।
- २ शरीर का कृश होना।
- ३ शरीर का हलका मालूम पडना।
- ४ ज्वर के वेग का मृदु होना।
- ५ मल मूत्र की प्रवृत्ति सम्यक् होना।
- ६ ज्वर का ८ दिन बीत जाना।
- ये सभी निरामज्वर के लक्षण हैं।



. जो ज्वर पहले वारीर में सताप, तृष्णा, अगमदं आदि उत्पन्न करता है और बाद में मानसिक ग्लानि आदि उत्पन्न करता है, उसे वारीर ज्वर कहते है।

मानस ज्वर

जिस ज्वर मे पहले मन मे व्यग्नता, बेचैनी, चचलता और ग्लानि होती है तथा बाद में सताप आदि शारीरिक लक्षण होते हैं, उसे मानसन्त्रवर कहते हैं।

अविसर्गी ज्वर

जो ज्वर अपनी अवधि काल तक बना रहता है और मध्य मे कभी घरीर के प्राकृतिक ताप पर नही उतरता है, उसे अविसर्गी ज्वर कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं—

(१) समवेगी जबर्-इसे कॉण्टीनुअस फीवर (Continuous fever) कहते हैं। इसमे ज्वर का वेग हमेशा बना रहता है, जिसके वेग मे दिन-रात मे बहुत थोडे अश मे कमी वेशी होती है।

१ क्षेत्र क्षामता रुघुत्व च गात्राणां ज्वरमार्ववम् । दोषमपुत्तिर्ष्याद्यो निरामस्मरकक्षणम् ॥ २० वि० १।१६७ २ सा० द्विक

(२) विषमवेगी ज्वर—इसे रेमिटेण्ट फीवर (Remittent fever) कहते हैं। इसमें ज्वर का वेग २४ घण्टे मे २ डिग्री तक न्यूनाधिक होता रहता है, किन्तु स्वाभाविक तापमान (Normal temperature) पर कभी नहीं आता है।

विसर्गी ज्वर

जिस ज्वर में ज्वर का वेग एक अहोरात्र में एकाधिक वार प्राकृत तापमान तक चला आता है और फिर वढ जाता है, उसे विसर्गी ज्वर कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं—

- (१) मुक्तानुबन्धी ज्वर—इस ज्वर मे एक या अनेक वार ज्वर का वेग घटकर प्राकृत तापमान पर आ जाता है। इसे इण्टरिमटेण्ट फीवर (Intermittent fever) कहते है।
- (२) पुनरावर्तक ज्वर के कारण और लक्षण—ज्वर के छूट जाने पर शरीर में प्राकृत वल होने के पहले ही जो व्यक्ति व्यायाम, व्यवाय, स्नान और अधिक घूमना-टहलना शुरू कर देता है, तो इसे पुन ज्वर आ जाता है, उसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं।

पुनरावर्तक ज्वर की मारकता —वह पुन लीटकर आया हुआ ज्वर अधिक दिनो से पीडित, अतएव दुर्वल तथा ओज क्षीण पुरुप को कुछ ही दिनो मे मार डालता है।

जीर्णज्वर

- १. २१ दिनो तक ज्वर का बना रहना।
- २ ३ सप्ताह तक ज्वर निरन्तर रहकर मृदुवेग होना।
- ३. प्राय प्लीहा का वढ जाना।
- ४ जठराग्नि का मन्द पड जाना।
- ये जीणें ज्वर के लक्षण हैं।

ज्वर के उपद्रव³

१. कास २ मूर्च्छा ३ अरुचि ४ तृषा ५. वमन ६ अतीसार ७ विबन्ध ८. हिचकी ९ श्वास और १० अगो का टूटना, ये ज्वर के दस उपद्रव होते हैं।

साध्य ज्वर का लक्षण

रोगी वलवान् हो, ज्वर अल्पदोपवाला हो और कोई उपद्रव न उत्पन्न हुआ हो, तो वह ज्वर साध्य होता है। ध

१ चिरकालपरिक्लिष्टं दुर्बल हीनतेजसम् । अचिरेणैव कालेन स हन्ति पुनरागत ॥ च० चि० ३।३३५

त्रिसप्ताहे न्यतीते तु ज्वरो यस्तनुता गत ।
 प्लीहाग्निसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥

३ कासमूर्च्छोऽरुचिर्च्छर्दितृष्णातीसारविद्यहा । हिका शासोऽङ्गमेदश्च ज्वरस्योपद्रवा दश्च ॥ आयु० दीपिका ४ बळवस्स्वरुपदोषेषु • ज्वर् साध्योऽनुपद्रव । च० चि० ३।५०

बसाध्य उबर का लक्षण

- १ जो उदर बहुनरपक बनवान् कारणो ने उत्तर हो।
- २. यो अनेक स्थापी में युक्त हो।
- र, को इन्त्रियों की राक्ति को सीम ही नहर कर दें।
- Y जो बबर लीप तथा बोयबुक्त रोगी को हुना हो।
- ५, जूड नशरी वाला सनावेंगी वहर ।
- ६, दीर्षं कान सर बना स्ट्रीयाना ।
- ७ जिम क्यर में बिता केंगी लगाये यातों में मोग बती दिनराई दें संघा कार का देग बनवान् हो।
- ८ अजर्राह, व्याम, मन एरं अपानपापु के अवरोध मधा आमकाम की अधिकता से युक्त गरभीर क्वर ।
 - ९ प्रारम्भ में ही विषय वेगवाना उत्तर ।
 - १० दीर्पकान एक लगातार रहीवाला कार ।
- 99. जिस क्यर का रोगी बेटोशी में कारमा कहता हो और उठते-बैटने में बयमर्प होने में विस्तर पर सोता रहता हो।
 - १२ जिम नवर में बाहर में जीत और भीतर में दाह मानुभ होता ही।
- 92. दिनमें रोगटे सहें हो आयें, और साल ही समा हृदय में और में भेट मगी जैसी पीड़ा हो एम रोगी मुल सीम्बार हॉच रहा हो ।
- १४. बिम नगर में दिमशी झाती हो, दम पूनता हो, ध्वाम नदनी हो, मूचां होती हो, स्रॉमें इचर-उग्रर नाप ग्हो हो, नग्भी सींगे निराहर पन ग्हो हो तमा रोगी धीण हो।
- 9'4 निसमें रोगी की कान्ति नष्ट ही आवे, इन्ट्रियों निव्हित हो, शीनसा एव अरचि हो।
 - १६ जिन ज्वर में रोगी गम्भीर या अन्तर्शह ज्वर के लोटन नेन ने प्रत्य हो।
 - १७ जिसमें गमी पूर्वमा के राखन उपनित हो, वह जबर समात्व होता है।

ज्बर के अरिष्ट¹

- १ जो ज्यर का रोगी स्वप्त में भूत-प्रेतो के गाम मिंदरा पीता है और कुत्ते द्वारा दक्षिण दिया में पगीटा जाता है, यह रोगी भवन्त जार में प्रस्त होकर प्राण त्याम कर देता है।
- े बल और मांग में तीन जिस स्पत्ति को दिन में १२ बजे के पूर्व ज्यर होता हो और नाम की भयद्वर मूली कांगी भी आती हो, यह कीच ही गर जाता है।
 - ? (या) प्रेने सह विक्र मर्च स्थानी य प्रत्यते शुपा। सुपोर्च ज्वरमामाच जीविन स विग्रुश्चनि ॥ न० ४० ५।०
 - (ग) ज्वर पीर्वाटिको प्रग्य शुष्त्रकामहा द्वारण । मल्मामविद्वीनस्य प्रया प्रेत्तरतमेव संगा

३..वल-मास से हीन जिस्व्यक्ति की दिन में १२ वजे के बाद ज्वर होता हो और साथ ही भयक्कर कफज कास हो, उसकी भी मृत्यु आसन्न (निकट) समझनी चाहिए।

४ सहसा उनर का तीव वेग होना, अधिक तृष्णा, मूर्च्छा, बल का क्षय और सन्धियों में शिविसता होना, ये मरणासन्न पुरुष के लक्षण हैं।

५. प्रहेपक उंदर के रोगी को यदि उप काल में शरीर से अधिक स्वेद निकलता हो, तो उसका जीविस रहना दुलैंभ होता है।

६. जिस बुबैल रोगी को रोग सहसा त्याग देता है, महर्षि आत्रेय उसका जीवन सन्दिग्ध मानते हैं बर्बात् यह अरिव्ट लक्षण है।

ज्वरमोक्ष का पूर्वरूप (दारुणमोक्ष)

ज्यर जब जाने लगता है, तब रोगी के घरीर मे-9. दाह, २. स्वेद, ३. भ्रम, ४. तृष्णा, ५. कम्पन, ६. अतिसार, ७. सज्ञानाश, ८ कूजन, (अव्यक्त शब्द बोलना) और ९. मुख मे दुगँच्य होना-ये लक्षण होते हैं।

ज्वरमोक्षकाल मे ज्वर से पीडित व्यक्ति अस्पष्ट बोलता हुआ वमन करता है और अनेक प्रकार की चेष्टायें करता है। उसकी श्वास तेज हो जाती है, शरीर की

(घ) सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णामूच्र्लांबलक्षयः । विश्लेषणं च सन्धीना सुमूर्योरुपजायते ॥ च० ६० ८।२३

(क्) गोसर्गे बदनाद् यस्य स्वेद. प्रच्यवते मृशम् । लेपक्वरोपतप्तस्य दुर्लमे तस्य जीवितम् ॥ च॰ १० ८।२४

(च)यं नरं सहसा रोगो दुर्वेल परिमुद्धति । संशयप्राप्तमात्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ॥ च० ६० ९।१५

थातुपाक होने पर वातज्वर सात दिन में, पिचज्वर दस दिन में और कफज्वर **बारह दिन** में रोगी को मार डालता है।

थातुपाक—निद्रानाशी हृदि स्तम्मो विष्टम्मो गौरवारुची ।

मरतिर्वेलहानिश्च धातूना पाकलक्षणम् ॥

त्रिदोष ज्वर की मारक अवधि ७ या १४, ९ या १८, ११ या २२ दिन है। तथ, च-

मप्तमी दिशुणा चैव नवम्येकादशी तथा।

एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ अ० ह० नि० २

१. दाइ. स्वेदो अमस्तुम्णा कम्पविड्भिदसंबता।

कूजनं चास्यवैरस्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ मा० नि० ज्वरनि०

ननु दोषक्षयं विना न व्याधिनिवृत्ति. क्षीणक्ष दोष. कथमेवविधं लक्षणं कुर्यात् ! उच्यते— कश्चिद् भाव. क्षीणोऽपि विनाशकाले स्वशक्ति दर्शयति, यथा निर्वाणावस्थो दीपो विशेषात् प्रन्तर्वति अथवा दोषाभिभृतानां धातूनां दोषापगमे क्षोभादाद्ययः तरलतरवानरपरिदीयमाननरणतरनक्ररीः विकारकम्पन्दिति । मधुकीव-म्यास्या ।

⁽ग) ज्वरो यस्यापराक्षेतु रुष्मकासम्ब दारुण । बलमांसविद्दीनस्य यथा प्रेतस्तर्थेव सः॥ च० ६० ६।१०-११

निक फीकी पड जाती है, अगो से पसीना छूटने लगता है, वारीर काँपने लगता है, र-बार मूच्छा आती है, प्रलाप करता है, कदाचित् सारी देह उष्ण हो जाती है । सर्वाङ्ग शीतलता हो जाती है एव सज्ञाशून्यता एव ज्वर के वेग से पीडित होकर गेघी व्यक्ति की तरह इधर-उधर देखता है। अपानवायु और आवाज के साथ वेग वंक द्रव मल का त्याग करता है। बुद्धिमान् चिकित्सक ज्वरमोक्षकालीन इन

ज्वरमोक्ष

ज्वर तीन प्रकार से रोगी का पिण्ड छोडता है-

- १. दारुण मोक्ष (By Crysis) ।
- २. अदारुण मोक्ष (By Lysis) !
- ३ विषमगति मोक्ष ।

(१.) दारुण मोक्ष

जब दोप अधिक हो, ज्वर प्रवल हो, ज्वर नया हो और उचित चिकित्सा से उसके दोप का पाचन हो गया हो, तो दोप नष्ट होते समय ऊपर पूर्वरूप मे यतलाये हए लक्षणो को उत्पन्न कर शान्त हो जाते हैं, इसे 'दारुण मोक्ष' कहा जाता। र

दारुण ज्वरमोक्ष तीव्र सक्षोभ सहित होता है। इसका कारण दोयो की अधिकता या सद्य ज्वरनाशक क्रियाओ का उपयोग या स्वत दोयो का परिपाक होना है। निमोनिया ज्वर मे यह लक्षण प्रधान रूप से पाया जाता है।

(२) अदारुण मोक्ष3

अधिक दिनो तक रहनेवाले जो ज्वर दोप के स्वभाव के अनुसार सन्ताप आदि लक्षणो को उत्पन्न करने के अनन्तर क्रमश धीरे-धीरे विना किसी उपद्रव के उतरते हैं, उनका यह उतरना 'अदारुण मोक्ष' कहलाता है।

यह आन्त्रिक ज्वर या यक्ष्मा जैसे दीर्घकालानुबन्धी ज्वरी मे देखा जाता है।

(३) विषमगति मोक्ष

एक ही दिन में अचानक उत्तर जाना, फिर चढ जाना, पुन घटना-बढना, जिन ज्वरों में होता है, उनके उत्तरने को-मोक्ष को-'विषमगित मोक्ष' कहा जाता है।

१ ज्वरप्रमोक्षे पुरुष कृजन् वमित चेष्टते।
श्वसन् विवर्ण स्विन्नाहो वेपते लीयते मुद्दु ॥
प्रलपत्युष्णसर्वाङ्ग शीताङ्गश्च भवत्यि ।
विसक्षो ज्वरवेगार्त सक्तोथ इव वीक्षते ॥
सदोषशब्द च शकुद् द्रवं स्रवित वेगवत्।
लिन्नान्येतानि जानीयाज्ज्वरमोक्षे विचक्षण ॥ च० वि० ३।३२४-३९६

२ बहुदोषस्य वलवान् प्रायेणाभिनवो ज्वर । सित्क्रयादोषपक्त्या चेद् विमुख्निति सुदारुणम् ॥ च० चि० ३।३२७

२ ऋत्वा दोपवशाद् वेगं क्रमादुपरमन्ति ये। तेपामदारुणो मोक्षो ज्वराणा चिरकारिणाम्॥ च० चि० ३।३२८

ज्वरमुक्त के लंक्षण

9 पसीना होना, २ शरीर में हलकापन, ३ शिर में खुजली, ४. मुखपाक, ५. छीक आना और ६. भोजन करने की इच्छा होना, ये ज्वरमुक्त के लक्षण हैं।

जिस पुरुष की इन्द्रियों में असमर्थंता (क्लम) न हो, बाह्य या आभ्यन्तर किसी प्रकार का सन्ताप न हो, शरीर में पीडा न.हो, इन्द्रियाँ निर्मल हो, मन प्रसन्न हो और स्वाभाविक प्रकृति के लक्षण व्यक्त हो जोर्ये तथा भूख-प्यास लगने लगे, तो उसे 'ज्वरमुक्त' समझना चाहिए।

वक्तव्य—यद्यपि ज्वरमोक्ष प्रत्यक्ष अनुभूत होता है, फिर भी ज्वरमुक्ति के लक्षण-भान की आवश्यकता विषमज्वर की आशका की निवृत्ति के लिए है, क्योंकि एक्वार ज्वरमोक्ष होकर विषमज्वर मे पुन ज्वर-वृद्धि हो जाती है। कुछ ज्वरों में प्रत्यक्ष तापक्रम होने पर भी ग्लानि, गौरव आदि लक्षण होते हैं। अतएव ज्वर वास्तव में मुक्त हो गया है, इस बात के भान के लिए ज्वरमुक्ति के लक्षण का ज्ञान आवश्यक है।

ज्वर की सामान्य चिकित्सा के सिद्धान्त

ज्वर चिकित्सा मे विचारणीय विषय

- पवर जनक कारणो का परित्याग करना चाहिए, क्योकि निदानवर्जन प्रथम
 चिकित्सा^२ है।
- २ ज्वर पित्तप्रधान व्याधि है, अत पित्तह्नासकर तथा पित्तप्रसादन औषधो का प्रयोग करे।
- ३. ज्वर के बढे हुए तापमान को कम करना प्रधान लक्ष्य जानें, क्योकि सताप ही ज्वर है।
- ४ परमज्बर या उच्च तापमान या सताप की अधिकता (Hyperpyrexia) की विषमयता से और मस्तिष्कगत तापनियन्त्रक केन्द्र के असन्तुलन से रोगी की रक्षा मे सावधानी वरतनी चाहिए।
 - ५ दोष की प्रधानता के अनुसार चिकित्सा का निर्धारण करना चाहिए।
 - ६ रोगी एव रोग की स्थित के अनुसार शोधन या शमन उपचार करे।
- ७ विकित्सा की व्यवस्था रोगी के शरीर, मन एव रोग, इन तीनो के अनुकूल होनी चाहिए।
 - ८ रोगी के हित को सर्वोपरि जाने और परीक्षित औपधो का ही प्रयोग करे।
- ९ बढे हुए सताप को स्व-िववेकानुसार वाह्य या आभ्यन्तर उपचार से नियन्त्रित करे।

१ (क) स्वेदो लघुत्व शिरस कण्डू पाको मुखस्य च। क्षवयुश्चात्रलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्॥ मा० नि०

⁽ख) विगतवल्लमसन्तापमन्यथ विमलेन्द्रियम्। युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात पुरुषमज्वरम्॥ च० चि० ३।३२९ २ सङ्क्षेपत क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्। सु० ७०

ज्वर के पूर्वरूप मे उपचार

- १ यदि कफ या पित्त का अनुबन्ध जान पडे, तो रोगी को उपवास करायें।
- २ यदि ज्वर का पूर्वेरूप वातज, श्रमज, क्षतज, भयज, क्रोधज, कामज अथवा शोकज हो तो उपवास न करायें, अपितु लघु आहार (मण्ड, पेया, विलेपी, यवागू, फलाहार, दुग्ध एव दाल का यूप आदि) देना चाहिए।
 - ३. लघु आहार देहलाघवकर होने से लघन के समान होता है। ३
- ४. ज्वर आमाशयोत्थ तथा 'आम' विकार प्रधान रोग है, जिससे स्रोतो में अवरोध'होता है, अत आमपाचनार्थं लघन कराना चाहिए। आमाशयोत्थ रोगो के लिए लघन या अपतर्पण प्रमुख उपचार है।
 - ५ ज्वर मे पित्तानुबन्ध मे विरेचन एव कफानुबन्ध मे वमन कराना चाहिए।
 - ६ वातानुबन्ध मे लघ्वाहार एव औपधिसद्ध या केवल घृत का पान करायें।
 - ७. द्वन्द्वज एव त्रिदोपज मे दोप के अवस्थानुसार उपचार करे।
- ८ तत्पश्चात् युक्तिपूर्वंक कवायपान, अभ्यग, स्वेद, स्नेह, प्रदेह, परिपेक, अनुलेप, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन आदि का प्रयोग करे।

तापशामक बाह्य उपचार

- १. रोगी को पूर्ण विश्वाम दे।
- २. शिर पर वरफ की थैली रखे।
- ३ मुख पर ठडे जल के छीटें दे।
- ४ मस्तक पर शीतल जल की धार गिरावे।
- ५ ललाट पर गुलावजल मे यूडीकोलन मिलाकर पट्टी रखे।
- ६ ललाट पर सिरका मे गुलावजल मिलाकर उसकी पट्टी रखे।
- ७ नौसादर और कलमी सोरा के समभाग घोल की पट्टी शिर पर रखे।
- ८ विष्णु तेल मे पुराना सिरका मिलाकर शिर पर पट्टी रखे।
- ९. ललाट पर घिसा श्वेत चन्दन लगावे ।
- १० मुचकुन्द का फूल पीसकर ललाट पर लगावे।
- ११ शीतल जल में कपडा भिगोकर सर्वाङ्ग को पोछे।
- १२. वफ के टुकडे तीलिया में लपेटकर नाभि पर रखे।
- १३ शतधीत, सहस्रधीत अथवा पुराना घी अगो पर लगावे।
- १४ श्वेत चन्दन, सुगन्धवाला और कपूर पीसकर शरीर मे अनुलेप लगावे।

१ ज्वरे लङ्गनमेवादाबुपदिष्टमृतं ज्वरात्। क्षयानिलभयकोषकामशोकश्रमोद्भवात्॥ च० चि० ३।१३९

२ ज्वरस्य पूर्वरूपदर्शने ज्वरादी वा हित छव्वश्चनमपतर्पण वा ज्वरस्यामाशयसमुत्थरवात् । तत कपायपानाभ्यत्र-स्नेह-स्वेद-प्रदेह-परिपेतानुलेपन-वमन-विरेचनास्थापनानुवासनोपशमन-नस्त कर्म भूप भूमपानाक्षन क्षीरमोजनविधान च यथास्व युक्त्या प्रयोज्यम् । च० नि० १।३६

१५ अत्यधिक सताप मे रोगी को सुलाकर चारो ओर बरफ की सिल्ली रखकर, पखे की हवा दे।

१६ बेर अथवा नीम की पत्ती को बारीक पीसकर, हाँडी मे रखकर थोडा जल डालकर मथे और उससे उत्पन्न फेन का सर्वाङ्क में लेप करे।

१७ चन्दनादि तैल या लाक्षाचन्दनादि तैल या लाक्षादि तैल का सर्वाङ्ग मे अभ्यग करे।

9८ रोगी को सेंघानमक और सोडाबाईकार्ब मिला जल पर्याप्त मात्रा में पिलाकर, ठडे जल मे चादर भिगोकर गले से पैर तक ओढा देवे, इससे पसीना और पेशाव आकर ज्वर उत्तर जाता है।

१९ चन्दनलिप्त गात्रा, विशाल उरोजोवाली, मधुर मुग्धभाषिणी, रमणीय विलासिनियो का आलिङ्गन सपूर्ण सताप को दूर करता है।

२० केले के पत्ते की या कमलपत्रमयी शय्या पर शयन करना, समवयस्कों के साथ पुष्प से लदे वृक्षो वाले उद्यान मे निवास, वीणावादन के साथ सगीत का सुनना, शुक, भ्रमर एव कोकिल के कलरव, मनोहर कथा-वार्ता तथा प्रियदिशनी ललनाओं का साहचर्य एवं पखे की शीतल वायु का सेवन, ये सभी ताप के दाह को दूर करनेवाले लिलत उपकरण हैं।

ज्वर मे सामान्य आभ्यन्तर उपचार

१ नये ज्वर में निषेध—ज्वर प्रारम्भ होने से ३-४ दिन के भीतर दिन में सोना, स्नान करना, तेल-जबटन की मालिश करना, अन्न खाना, मैथुन करना, क्रोध करना, सीधी ह्वा के झोके मे रहना, व्यायाम करना और कषायरस प्रधान औषधो का सेवन करना वर्जित है। २

२ चिकित्सा के आरम्भ में ही यह पता लगा लेना चाहिए कि जबर नया है, तरुण है, मध्य है, पुराणावस्था में है अथवा जीर्णंज्वर है। तीन दिन तक नव, ४ से
७ दिन तक तरुण, ७ से १२ दिन तक मध्य, १२ से २१ दिन तक पुराण तथा
२१वें दिन के बाद जीर्णंज्वर की सज्ञा होती है। 3

वैद्यजीवन १।२७ २८

१ (क) श्रीखण्डमण्डितकलेवरवछरीणां मुक्ताफलाकुलविशालकुचस्थलीनाम् । वैदग्ध्यमुग्धवचसां सुविलासिनीनामालिङ्गन सकलदाहमपाकरोति ॥

⁽ख) शय्या पल्लवपद्मपत्ररचिता वासो वयस्यै समं कान्तारे कुसुमस्फुरत्तरुवरे गान तु वीणान्वितम्। आलापाश्च शुकालिकोकिलकृता कान्ताश्च कान्ता कथा। वाताश्चामलवालकन्यजनजा दाघ निराकुवते॥

२ नवज्वरे दिवास्वप्नस्नानाभ्यक्षात्रमैथुनम् । क्रोधप्रवातन्यायामान् कषायाँश्च विवजयेत् ॥ च० चि० श१३८

३, आ सप्तरार्व तरुण ज्वरमाहुर्मनीषिण । मध्यं द्वादशरार्वं तु पुराणमत उत्तरम् ॥

३ ज्वर के आम, पच्यमान या निराम की अवस्था पहचान करके आवश्यक उपचार करे।

४ ज्वरोत्पादक प्रधान दोप तथा उसके अनुवन्ध या उपद्रवो का विचारकर चिकित्सा की व्यवस्था करे।

५ ज्वरारम्भ मे आमदोप की प्रवलता मे लघन, मध्यावस्था मे पाचन तथा निरामानस्था मे शमन उपचार करना चाहिए। ज्वर के निवृत्त हो जाने पर रोगी के वल आदि का विचार कर विरेचन औषध का प्रयोग करना चाहिए।

६ ज्वर के तरुण, आम या पच्यमान अवस्था मे लघन, स्वेदन, काल (७-८ दिन) की प्रतीक्षा, यवागू, तिक्तरस वाले द्रव्य तथा पाचन द्रव्यो का प्रयोग विचार-पूर्वक करना चाहिए।

७ ज्वर की तृष्णा के धामनायं निम्न 'पडङ्गपानीय'र का प्रयोग करना चाहिए— १ नागरमोथा, २ पित्तपापडा, ३ स्वर्ग, ४ लालचन्दन, ५ सुगन्धवाला और ६ सोठ, इन सबको समान भाग लेकर जीकुट कर रख दे। इसमे २५ ग्राम दवा को २ लीटर पानी मे औटायें और अर्धाविशिष्ट छानकर रख ले। यही वडगपानीय है।

८ कपाय प्रयोय—१ नागरमोथा और पित्तपापडा, २ सोठ और पित्तपापडा, ३ धमासा और पित्तपापडा, ४ चिरायता, नागरमोथा, गुरुच और पित्तपापडा, ५ पाठा, खश और सुगन्धवाला—ये पाँच योग हैं। २० ग्राम दवा आधा लीटर जल में चतुर्यां शाविष्ट क्वायकर, छान कर, सबेरे-शाम पिलाने से सभी तरह के ज्वर शान्त हो जाते हैं।

९ रसोधियां---

(क) व्यवस्था-पत्र—३-३ घण्टे पर दिन मे ४ वार—
गोदन्ती भस्म ५०० मि० ग्रा०
जहरमोहरा पिष्टी २५० मि० ग्रा०
रसादिवटी २५० मि० ग्रा०
मधु से— १ मात्रा

यह योग सभी प्रकार के जबरों में सन्ताप, दाह, तृष्णा, शिर शूल आदि को शान्त करता है।

अथवा

(ख) व्यवस्था पत्र—दिन मे ३-४ बार, ३-३ घण्टे पर-

त्रिसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरी यम्तनुता गत । रङीहाग्निसादं कुरुने स जीर्णज्वर उच्यते॥

१ ल्ड्रुनं स्वेदन काली यवाग्वस्तिक्तको रस । पाचनान्यविपनवानां दोषाणा तरणे ज्वरे ॥ च० चि० ३।१४२

मुस्तपपैटकोशीरच दनोदीच्यनागरे ।
 श्तशीत जल दद्यात् पिपासाज्वरशान्तये ॥ च० चि० ३।४५

१० पेय जल अर्घाविशिष्ट क्वथित जल में सेंघानमक या सोडाबाईकाव मिलाकर पिलाने से ज्वर की विषमयता का पाचन हो जाता है। २४ घण्टे में ४-५ लीटर जल पिलाना चाहिए।

१९ नवसादर १२५ मि० ग्रा० यवक्षार ३७५ मि० ग्रा० तथा कलमीसोरा ३७५ मि० ग्रा० = १ मात्रा षडगपानीय मे मिलाकर दिन मे २-३ बार दें।

१२ अन्य ज्वरघ्त रस-रसायन---

प्रवालिपण्टी सजीवनी वटी
मृगश्रृङ्ग भस्म त्रिभुवनकीति
हिंगुलेश्वर रस विषतिन्दुकादि वटी
मृत्युञ्जय रस जयमगल रस
ज्वरकेसरी जया वटी
ज्वरसहार अमरसुन्दरी वटी

रोगी के बल के अनुसार इनकी 9 मात्रा 9२५ मि० ग्रा० से २५० मि० ग्रा० दे। ज्वरध्न सहपान के साथ इनका प्रयोग करना चाहिए।

५३ पथ्य--पुराना साठी या अगहनी चावल, मूग, मसूर, कुलथी या चने की दाल का यूष, परवल, करेला, सिहजन, वथुआ, चौलाई, गुरुच, जीवन्ती के साग, मकोय, मुनक्का, कैथ, अनार, इनके पके फल तथा लघु आहार एव हितकर औषधियाँ मध्यज्वर मे लाभप्रद हैं।

मण्ड, पेया, विलेपी, कृशरा का सेवन करे। जौ की वार्ली, सावूदाना, लाजमण्ड, दूध फाडकर उसका पानी या दूध, मिश्री या ग्लूकोज का प्रयोग करे।


पुराने ज्वर मे पथ्य—वमन, विरेचन, अञ्जन, नस्य, अनुवासन, धूम्रपान एव सञ्चमन औषघो का प्रयोग हितकर है। प्रलेप, मालिश, शीतल पदार्थों का सेवन, गाय या वकरी का दूध, घी, एरण्ड स्नेह, चन्द्रमा की किरणो का सेवन तथा प्रियतमा का आलिङ्गन करना, ये सब साधन पुराने ज्वर मे हितकर हैं।

१४. अपथ्य-लाल फूलों की माला या लाल वस्त्रो का धारण, वमन के वेग की रोकना, दन्तधावन करना, अमात्म्य तथा परस्पर विरुद्ध भोजन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना, जलन पैदा करनेवाले और भारी पदार्थों का सेवन, दूपित जल, क्षार, खटाई, पत्तो के साग, अकुरित अन्न, खस का जल, पान, तरवूज, बडहल का फल, तिलकुट तथा कचौडी, बडा, दही आदि अभिष्यन्दी पदार्थों का सेवन करना ज्वर के रोगी के लिए अपथ्य है।

द्वितीय अध्याय

निज ज्वर

वात-पित्त-कफ, इन शारीरिक दोषो से उत्पन्न ज्वरो को 'निजज्वर' कहते हैं, सात हैं—१ वातज २. पित्तज ३. कफज ४. वातपित्तज ५ वातकफज ६ पित्त-क्रफज और ७ विदोषज ।



वातज्वर का 'निदान


स्क्ष-लघु-शीतगुणयुक्त, कटु-तिक्त कपाय-रसप्रधान आहार एव शुब्क शाक, शुब्क मास, मटर, मसूर, सेम, तीना का चावल—इनका अधिकाश सेवन आदि मिथ्या आहार और वमन-विरेचन-आस्थापन-नस्य का अतियोग, व्यायाम, वेगविधारण, अनशन, अभिधात, अतिमैथुन, रात्रिजागरण, शरीर से विपमचेष्टा आदि मिथ्याविहार तथा मानसिक उद्देग, काम, शोक, भय आदि एव अपतर्पण प्रभृति कारणो से प्रकृपित इसा वायू ज्वरोत्पादक हो जाता है।

- (ख) अपनी शक्ति मे अधिक या कम कार्य करना मिथ्या विदार है।
- (ग) अतिश्रम, उपवास, रात्रि-जागरण तथा धातुक्षय आदि से वायु प्रकोप होता है। तथा च--
 - (क) अकाले चातिमात्र च ह्यसात्म्यं यच भोजनम्। विषम चाषि यद् भुक्तं मिध्याहार स उच्यते॥
 - (ख) अशक्त कुम्ते कमें शक्तिमान्न करोति य। मिथ्याविहार श्र्युक्त सदा तं परिवर्जयेदा।
 - (ग) व्यायामादपतर्पणात् प्रपतनाद् मङ्गात् क्षयाज्जागरात् वेगानाञ्च विधारणादतिश्चच शैत्यादतित्रासत । रूश्रक्षोमकपायतिक्तकदुकैरेमि प्रकोप व्रजेद् वायुर्वारिधरागमे परिणते चान्नेऽपराक्षेऽपि च ॥ च० नि० १।१९

१ (क) बाठ प्रकार के आहार विधि विधान—१ प्रकृति, २ करण, ३, सयोग, ४ राशि, ३ देश, ६ काल, ७ उपयोगसंन्या और ८ उपयोक्ता—इनकी उपेक्षा कर भोजन करना मिथ्या प्राहार है तथा असमय में या अधिक मात्रा में या असारम्य या अनियमित भोजन करना मिथ्या आहार कहलाता है।

वातज्यर की सम्प्राप्ति

पूर्वोक्त कारणो से प्रकुपित हुआ वायु जब आमाशय मे जाकर ऊष्मा से मिल । जाता है और आहार-पाचन के परिणामस्वरूप बने रसनामक धातु से मिलकर, रसवह एव स्वेदवह स्रोतो को बन्द कर तथा अग्नि की शक्ति नष्ट कर और कोष्ठाग्नि को बाहर निकालकर, सम्पूर्ण शरीर मे फैल जाता है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है।



वातज्वर के लक्षण

9	अगो का काँपना	६ छीक का रुक जाना	११. स्वाद मे फीकापन -
२	ज्वरवेग की विषमता	े ७. अगो मे रूक्षता	१२ मल का वध जाना
₹	कण्ठ सूखना	८. शिर शूल	१३. उदरं मे शूल उठना
४	ओठ सूखना	९ हृदय शूल	१४ उदर मे आध्मान
4	नीद न आना	१०. अगों में वेदना	१५ जम्भाई आना

⁽ध) च० (न० १।१९

१ ज्वर की प्रवृत्ति या वृद्धि को वेग कहते हैं। वानज्वर में इन दोनों का समय निश्चित नहीं होता। अनण्य सुनुताचार्य ने इसे 'विषमवेग' कहा है। चरक भी इसे 'विषमारम्भविसर्गी' मानते हैं, जिनकी व्याख्या चक्रपाणि इस प्रकार करते हैं—'आरम्भ उत्पाद, विसर्गों मोदा ती विषमी 'पस्य स विषमारम्भविसर्गी' अर्थाद च्वर का वेग कभी शिर से प्रारम्भ होता है, कभी पीठ मे या जंपा से तथा कभी तेज होता है और कभी मन्द। इसी प्रकार उसकी निवृत्ति का रथान और काल भी अनियत होता है।

ये सब वातज्वर के लक्षण हैं।

वातज्वर मे उपचार

१, ज्वर के वेग को कम क्रने लिए पूर्वीक्त बाह्य उपचारो को करे।

२ प्रत्येक ज्वर में आमदोषे का सम्बन्ध होता है और उसके पाचनायें लघन का विधान है, किन्तु वातज्वर के प्रसङ्घ में लघन का अर्थ लघु भोजन समझकर हलका आहार खाने को दे।

३. ज्वर से पीडित मनुष्य को अरुचि होने पर भी हितकर लघु भोजन देना चाहिए, क्योंकि भोजन के समय भूख प्रतीत होने पर भोजन न करने से रोगी क्षीण हो जाता है या मर जाता है। र

४ ज्वरयुक्त या ज्वरमुक्त को अपराह्न में छघु भोजन देना चाहिए, क्यों ि उस समय कफ के क्षीण होने से जठराग्नि प्रवल होती है और ऐसे समय भोजन न देने से जठराग्नि रस-रक्तादि धातुओं को जलाती है, जिससे वल का हास होता है, अत ज्वरित को समय से हितकर मिताहार देना चाहिए।

५ वात, रूक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल और विशद गुणो वाला होता है। अत उसकी चिकित्सा मे इन गुणो के विपरीत गुण (स्निग्ध, उव्ण, गुरु, घन, स्थिर, स्रुक्षण एव पिच्छिल) वाले आहार एव औपघ द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए।

६. अन्य ज्वरो की तरह वातज्वर में भी ज्वर के साम-निराम एव तरुण और जीण होने का विचार आवश्यक है। लक्षणों के अनुसार वातज्वर की तरुणावस्था सात दिन तक मानी गयी है। यह अवस्था सामावस्था के लक्षणों से युक्त हो, तो पाचन औषघ देना हितकर होता है। एतदयं 'किरातादि सवाय' उपयुक्त औषघ है, योग—चिरायता, नागरमोथा, नीम की गीली छाल, गुरुच, छोटी वही कटेरी, गोसरू, शालिपणीं, पृहिनपणीं और सोठ—इनका विधिवत् बना हुआ क्वाय पिलावे।

इन सभी द्रव्यो का समभाग मिलित २० ग्राम मोटा चूणें लेकर, आधा लीटर जल में चतुर्याशाविशष्ट क्वाय कर, सबेरे-शाम पिलाना चाहिए। इसी प्रकार—

१. वेपग्रुविषमो वेग. कण्ठीष्ठपरिशोषणम् । निद्रानाश क्षवस्तम्मो गात्राणा रीक्ष्यमेव च ॥ शिरोहृद्गात्ररुग् ववत्रवेरस्यं गाढविट्कता । श्लाध्माने बृम्मण च भवन्त्यनिल्जे ज्वरे ॥ सु० उ० अ० ३९ तथा च० नि० १।२१ एवं अ० हृ० नि० २

२ ज्वरितो हितमश्नीयात् यद्यप्यस्यारिचर्मवेत्।, अन्नकाले हासुझान क्षीयते स्रियतेऽपि वा॥

३ ज्वरित ज्वरमुक्त वा दिनान्ते भो नयेरलघु। इलप्पक्षये प्रवृद्धीच्या बलवाननलस्तदा॥ सु०

४ रूक्षः शीतो लघु. स्हमश्रलोऽथ विशवः खरः। विपरीतगुणेर्द्रस्येमीहतः भन्मश्राम्यति ॥ न० स० १

```
७. वृहत्पश्चमूल क्वाय ।
```

८. पिप्पत्यादि नवाथ ।

९. गुहूच्यादि क्वाय ।

१०. द्राक्षादि क्वाथ ।

१९ रास्नादि क्वाय।

१२ भूनिम्बादि क्वाय या

१३ दशमूलादि क्वाय का सेवन कराने से वातज्वर शान्त हो जाता है।

१४. वातज्वर के पूर्वरूप मे घृत पान कराना प्रशस्त उपचार कहा गया है।

१५. रसौषघ प्रयोग—नये ज्वर मे सामान्यत दूध देना निषिद्ध है, परन्तु रस-योगों के प्रयोग के समय दूध अवश्यमेव देना चाहिए, क्योकि रसयोगो मे प्रायः विषद्रव्यो का उपयोग पाया जाता है। अत दूध विषष्टन होने से उत्तम पथ्य के रूप मे प्रयोगाहुँ है। रसिविकित्सा मे रोगी, रोग, दूष्य, देश, काल आदि विषयों के परीक्षण का प्रतिबन्ध नही है, क्योकि रस औषधियों मे अचिन्त्य शक्ति निहित होती है। इनकी मात्रा अल्प होती है। ये शीघ्र आरोग्यप्रद होती हैं और इनके खाने मे अरुचि का प्रश्न नहीं है, इसलिए काष्ठीषधियों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ हैं।

१६ व्यवहारोपयोगी योग-

(क) प्रात, दोपहर, शाम

हिंगुलेश्वररस ३६० एम जी०

गोदन्तीभस्म १ ग्राम

शुद्ध टकण ३६० एम० जी०

५५ ----

आर्द्रक स्वरस और मधु से अथवा भूने जीरे १ ग्राम चूर्ण के साथ उप्णोदक से ।

(ख) प्रात सायम्

किरातादि क्वाथ ५० एम० एल०

१७ अथवा---

प्रात, दोपहर, शाम

ज्वरधूमकेतु ३६० एम० जी०

३ मात्रा

वार्द्रक स्वरम और मधु से।

१८ कव्ज रहने पर-प्रात -सायम्

विश्वतापहरण रस २४० एम० जी०

२ मात्रा

भाईक स्वरस व मधु से।

१९ प्रतिश्याय भी हो तो---३-३ घण्टे पर ४ बार

संजीवनीवटी ४ वटी

१ भृग भस्म ५०० एम० जी०

शुद्ध नरसार १ ग्राम

४ मात्रा

उष्णोदक से

२० अन्य योग—त्रिभुवनकीर्तिरम, मृत्युञ्जय, जयन्ती वटी एव महाज्वरा-इकुश रस का भी अकेले-अकेले १२५ मि० गा० की माना में उष्णोदक से प्रयोग किया जा सकता है।

२१ पथ्य-चातहर औषध-सिद्ध जल मे पकायी गयी पेया, विलेपी, मण्ड, यवागू, मूग का यूप, शाक या यूप, वार्ली, किसिमश, मुनवका आदि सूक्षे फल या अनार, मुसम्मी बादि का रस, साबूदाना वा लाजमण्ड, इन्हें सुविधानुसार सेवन करना चाहिए।

पित्तज्वर का निदान

१ कटुरस द्रव्य, २ अम्लद्रव्य, ३ उष्णद्रव्य, ४ विदाही द्रव्य, ५ लवणाति-योग, ६ तीक्ष्ण द्रव्य, ७ क्षारीय द्रव्य, ८ सरसो का तेल, ९ तिल तैल, १०. तीसी का तेल, ११ तिलकुट, १२ दही, १३ सुरा, १४ सिरका, १५ काञ्जी, १६ अजीर्ण मे भोजन एव १७ आहार-विधि के विपरीत प्रकार से भोजन करने आदि मिथ्याहार से पित्त प्रकृपित हो जाता है।

इसी प्रकार के मिथ्याहार के साथ-साथ—१. तीक्ष्ण धूप लगना, २ अग्नि की ज्वाला के पास रहना, ३. अधिक श्रम, ४. क्रोध करना, ५ उपवास करना, ६ स्त्री-समागम, ७ भयग्रस्त होना, ८ भोजन का पाचनकाल, ९ शरद् ऋतु, १० मध्याह्न, ११ अर्धरात्रि आदि के मिथ्या विहार से पित्त प्रकुपित होकर ज्वर उत्पन्न करता है।

पित्तन्वर की सम्प्राप्ति^र

पूर्वोक्त कारणो से प्रकुरित पित्त आमाशय से ऊष्मा को साथ लेकर आहार के परिणामस्वरूप उत्पन्न आद्य रस नामक धातु से मिलकर एव स्वेदवहस्रोतो को

तीसटाचार्य, मधुकोप० निदान० ५

१ (क) उपणाम्ङलवणक्षार्कदुकाजीर्णभोजनेभ्योऽतिमेवितेभ्यस्तथाऽतितीक्ष्णातपाग्निसन्ताप अमक्रोपविषमाहारेभ्यस्र पित्ते प्रकोषमापद्यते । च० नि० १।२२

⁽ प) कट्वम्लोप्णविदाहितीक्ष्णलवणकोधोपवासातप-स्त्रीसम्पर्कातिलातसीदधिसुराशुक्तारनालादिभि । सुक्ते जीयति भोजने च श्वरिट ग्रीष्मे सित प्राणिना मध्याहे च तथाऽर्घरात्रिसमये पित्तं प्रकोप मजेत ॥

२. तद्यदा प्रकुषितमामाञ्चयादृष्माणमुपस्रज्याद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रस

बन्दकर, द्रव होने के नाते अग्नि को उपहल कर, पुनः पच्यमानाशय से अग्नि को बाहर निकालकर पीडा उत्पन्न करते हुए, सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है और ज्वर उत्पन्न करता है।

पित्तज्वर के लक्षण

१, तीक्ष्णवेगीज्वर, २. अतिसार, ३ निद्राल्पता, ४ वमन, ५ कण्ठपाक, ६ ओष्ठपाक, ७ मुखपाक, ८ नासापाक, ९ स्वेद, १० प्रलाप, ११. कटुमुखता, १२. मूच्छा, १३ दाह, १४ मद, १५ तृष्णा, १६. भ्रम, १७. पीतमूत्रता, १८ पीतविट्कता, १९ पीतनेत्रता, २०. तालुपाक, २१ आहारपचनकाल, मध्याह्न, अर्घरात्र एव शरद ऋतु मे ज्वर की वृद्धि, २२ अरुचि, २३. अगमदं, २४ रक्त चकत्ते होना, २५. नखपीतता, २६ वदनपीतता, २७ स्वचा का हारिखं, २८. शीत-प्रायंना, २९ अरित, ३० निष्ठीवन, ३१ अम्लक, ३२. निश्वासदौगंन्ध्य, ३३ निदान सेवन से हानि और ३४ निदान विपरीत पदार्थों से लाभ होना, ये पित्तज्वर के लक्षण हैं।

पित्तज्वर में उपचार

१. ज्वर आमाशयोत्थ न्याधि है एव पित्त द्रव धातु है, जिसके कारण उसमें लघन के प्रति सहिष्णुता है तथा पित्तज्वर मे आम का भी सम्बन्ध होता है, आमाशयोत्थ रोग^२ की दृष्टि से, पित्त की दृष्टि से तथा आमपाचन की दृष्टि से पित्तज्वर में लघन कराना चाहिए। लघन से आम का पाचन होता है एव दोष का शमन होता है।

- २. आमपाचनाथं दीपन-पाचन औषघों का सेवन करावे।
- ३ पित्तज्वर मे ज्वर का वेग लगातार उच्च तापक्रम मे रहता है, अत तापशमनार्थं पूर्वोक्त बाह्य उपचारों का प्रयोग करे।
- ४ पित्तज्वर में ऐसी औषघो तथा आहार पदार्थों को देना चाहिए, जो कथाय-तिक्त एव मधुर रसयुक्त हो तथा शीतवीय हो। ('त मधुरितक्तकपायशीतैरपक्रमै-रुपक्रमेत'। च० सू० २०।१९)

स्वेदवहानि स्रोतासि पिधाय द्रवत्वाद्गिनमुपहत्य पिक्तस्थानादृष्माणं विहर्निरस्य प्रपीडयत् केवर्णं दारीरमनुष्रपद्यते, तदा क्वरमिमिनवर्तयैयतीति । च० नि० १।२७

१ (क) च० नि० १।२८

⁽ रा) वेगस्तीक्ष्गोऽनिसारश्च निद्राल्पत्व तथा विम । कण्ठीष्ठमुखनासाना पाक स्वेदश्च जायते ॥ , प्रलापो वक्त्रकद्धता मूच्छां दाहो मदस्तृपा । पीनविण्मूत्रनेत्रत्व पैतिके श्रम एव च ॥ सु० उ० ३९

⁽ग) अ० ह० नि०२।

२. शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां छङ्गनितया। एवरस्यैकस्य साध्येका शान्तिर्हतनस्थ्यते॥ च० नि० दाइप

- ५ तृष्णा शमनार्थं पडञ्जपानीय वार-वार पिलाते रहे।
- ६ ज्वर के आदि में लघन, मध्य में पाचन, ज्वरान्त में औषध तथा ज्वर मुक्त होने पर विरेचन देना हितकर है। द
- ७ पित्तज्वर मे स्नेह-विरेचन, प्रदेह, परिपेक, अभ्यग, अवगाहन आदि के द्वारा मात्रा और काल का विचार कर चिकित्सा करे।
- ८. पित्तज्वर मे पित्तशमनार्थं विरेचन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ उपचार है, नयोकि विरेचन सर्वप्रयम आमाशय मे जाकर विकृत मूलभूत पित्त का नाश करता है, फिर आमाशय के विकृत पित्त के नाश से रारीर के अन्य भागो के पित्तज उपद्रव स्वय-मेव शान्त हो जाते हैं।
- ९ तृष्णा एवं ज्वरदाहशमनार्थं शकेरी मिश्रित दुरालभादि नवाय पिलाना चाहिए। योग--- १ धमासा २. पित्तपापड़ा ३ फूलप्रियगु ४ चिरायता ५ अस्स ६ कुटको और ७ हरें। अथवा---
- १० द्वाक्षादि ववाय पिलावे । योग-- १ काला मुनवका २. हरें ३. नागरमोथा ४ कुटकी ५ वमलतास का गूदा ६. पित्तपापडा । अथवा--
- १९ किरातादि क्वाय का सेवन करावे। योग--- १ चिरायता, २ गुरुच, ३ धनिया, ४. रक्तचन्दन, ५ खदा, ६. पित्तपापडा और ७ पद्मकाठ। अथवा---
 - १२. केवल पित्तपापडा का यवाय दे । अथवा--
- १३ पर्पटादि क्त्राय का प्रयोग करे। योग---१. पित्तपापडा २ सुगन्धवाला ३ लालचन्दन और ४. सोठ समभाग मे। अथवा---
 - १४. पटोलादि क्वाय अथवा--
 - १५. गुड्च्यादि क्वाय का प्रयोग करना हितकर है।
 - १६ वाह्य लेपायं-वेर या नीम के पत्ते को महीन पीमकर किसी पात्र मे

१ मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरै । श्तनीत जल दद्यात पिपामाज्यरद्यान्तये॥ च० चि० ३।१४५

ज्वरादी लहुनं प्रोक्त ज्वरमध्ये तु पाचनम्।
 ज्वरान्ते भेषज द्याज्ज्वरमुक्ते विरेचनम्॥

३ स्नेहिनरेकप्रदेहपरिपेकाम्यद्गादिभि पित्तहरेर्मात्रा कालं च प्रमाणीकृत्य । च० स्० २०।१९

४ विरेचनं तु सर्वोपक्रमेश्यः पित्ते प्रधानतम मन्यन्ते भिपज , तद्भयादित ण्वामाशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक पित्तमूलमपक्रपंति । तन्नाऽबजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गता पित्तविकारा प्रशान्तिमाः पद्यन्ते, यथाग्नी व्यपोढे केवलमग्निग्रह शीती भवति तद्भतः । च० स्० २०।१९

५ दुरालमापपैटकप्रियइ गुभूनिम्बनासाकडरोहिणीनाम् ।
क्वाथ पिवेच्छकं ग्याऽयगाढ तृष्णास्त्रपत्तिच्चरदाहयुक्त ॥ यो० र०

६ द्रास्त्रामयापर्पटमाध्यतिक्ताक्वाथं मञम्याकफलं विद्ध्यात । प्रलापमून्द्रभिमदाइजीयतृपान्विते पित्तभवे ज्वरे च॥ यो० र०

ण्य पर्यटक श्रेष्ठ पित्तज्वरविनाशन । कि पुनर्यटि युज्येत चन्दनोशीरधान्यके ॥ यो० र० रैका० द्वि०

थोडा पानी डालकर खूत्र मसले, जिससे उममे झाग पैदा हो जावे, उस झाग का सर्वाङ्ग मे लेग लगाने से ताप का शमन होता है।

१७. रसीषध योग---

१. सवेरे शाम

ज्वरकेसरी वटी २४० एम० जी०

योग २ मात्रा

चीनी मिले नारियल के जल से या मधु से।

अथवा र्-३-३ घण्टे पर ४ बार-

२ गोदन्ती भस्म १ ग्राम जहरमोहरा पिष्टी दे ग्राम रसादि वटी दे ग्राम योग ४ मात्रा

पित्तपापडा के या धनिया के क्वाथ से।

अथवा ---३--३ घण्टे पर ४ वार---

३ गोदन्ती भस्म ९ ग्राम प्रवाल भस्म 🗦 ग्राम गुडूची सत्त्र २ ग्राम

योग ४ मात्रा

१८ ताप, तृष्णा, दाह की अधिकता मे चन्द्रकला रस, सूतकेखर, लीलाविलाम, रसादि वटी की प्रयोग चन्दनोदक, धान्योदक, नारिकेलोदक या पित्तपापडा के क्याय के साथ करना चाहिए।

पथ्य---

१९ पेय पदार्थ-- १ परवरु के पत्ते या फरु के साथ बनाये गये जी के क्याय में मधु का प्रक्षेप-देकर पिलाने से ज्वर का ताप एव दाह शान्त हो जाने है। २ मुद्ग यूष या ३ लाजमण्ड पिलाना चाहिए।

२० आहार—मधुर-तिक्त या कपायरसप्रधान द्रव्यो का आहार निर्माण कर रिच के अनुमार देना चाहिए, जो मुपाच्य, हलका और अनुष्ण हो। मुनक्का, किसमिन, आलूबुखारा आदि चूसने के लिए देवे।

कफज्वर का निदान

१ मधुर पदार्थों का अतियोग, २ अम्लातियोग, ३ लवणातियोग, ४ स्निग्धाति-

(ख) च० नि० र।र६

१ ('क) गुरुमधुररमातिस्निग्धदुर्भेक्षमक्ष्यद्रवद्धिदिननिद्राऽऽपूपमर्पिष्प्रपूरे । तुह्निपननकाले क्लष्मण मम्प्रकोपो प्रभवति दिवसादी मुक्तमात्रे वसन्ते ॥ चि० क० ३१

योग, ५ गुरुद्रव्य का अतियोग, ६ पिच्छिलातियोग, ७ शीतद्रव्यातियोग, ८ अभिष्यन्दी द्रव्यातियोग, ९ दुग्धातियोग, १० द्रवातियोग, ११ दिधसेनम, १२ आपूप (पूजा) का अतियोग, १३ धृतपक्दातियोग आदि आहार के मिथ्यायोग तथा १४ दिवास्वाप, १५ अतिप्रसन्नता, १६ परिश्रम न करना आदि मिथ्या विहार करने से कफ प्रकुपित हो जाता है।

फंफज्वर की सम्प्राप्ति⁹

उपर्युक्त कारणो से प्रकुषित हुआ कफ आमाशय में जाकर तत्रस्थ ऊष्मा के साथ मिलकर आहार परिणाम जन्य प्रथम रसधातु से सगत होकर, रसवह एव स्वेदवह स्रोतो को बन्दकर, अग्नि को मन्द कर, पाचन-सस्थान से अग्नि को बाहर निकालकर, पीडा उत्पन्न करता हुआ सम्पूर्ण शरीर में फैलता है, तब ज्वर को उत्पन्न करता है।

कफज्बरं के लक्षण

१ शरीर गीले वस्त्र से ढँका जैसा प्रतीत होना, २ वेग (ताप) मन्द रहना, ३ आलस्य मालूम होना, ४ मुख का स्वाद मीठा मालूम होना, ५ मल-मूत्र का वर्ण क्वेत होना, ६ अगो में जकडापन होना, ७ अन्न मे अक्चि होना या विना खाये पेट भरा मालूम होना, ८ शरीर मे भारीपन, ९ ठडक लगना, १०, वमन की प्रवृत्ति होना, ११ रोमाञ्च होना, १२ अधिक नीद आना, १३ स्रोतो मे अवरोध, १४ शरीर मे हलकी पीडा, १५ लार टपकना, १६ मुख का स्वाद नमकीन होना, १७ अपचन, १८ खाँसी आना और १९ नेत्रक्वेतता, ये कफज्वर के लक्षण हैं।

चिकित्सासूत्र

9 कफज ज्वर में कफदोष के द्रवत्व, गुरुत्व, शीतत्व, स्निग्धत्व, माधुर्य, स्थैर्य, पैंच्छित्य आदि गुणयुक्त होने के कारण पूर्वोक्त विकार होते हैं। इन विकृतियों को दूर करने के लिए कटु, तिक्तं, कषाय रस युक्त औषध एवं आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए।

- २ तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष गुण विशिष्ट द्रव्यो का प्रयोग हितकर है।
- ३ स्वेदन, वमन, शिरोविरेचन आदि कफनाशक उपचारो द्वारा मात्रा तथा काल का विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए।
 - ४ कफज विकारों में वमन श्रेष्ठतम उपाय है, क्यों कि यह कफ के मूलस्थान

१ च० नि० १,२६

१ (क) स्तैमित्य नितिमितो वेग आलस्य मधुरास्यता। शुक्लमूत्रपुरीषत्व स्तम्भस्तृप्तिरथाऽपि च॥ । गौरव शीतमुल्लेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता। प्रतिश्यायोऽरुचि कास कफ्जेऽक्ष्णोश्च शुक्लता॥ मा० नि०

⁽ख) च० नि० श२७।

आमाशय में जाकर पुन वक्ष-स्थल के कफ को वाहर निकाल देता है। एवं कफ के नष्ट हो जाने से शरीर में फैले कफ के विकार स्वय शान्त हो जाते हैं।

५ कफ के द्रव होने से तथा ज्वर में सामता अधिक होने के कारण कफज्वर में लघन बर्दास्त करने की क्षमता भी अधिक होती है, अत आगदोप के पाचनार्थ लंघन कराना चाहिए।

६. कफज्वर के उपचार मे लघन या अपतर्पण का विशेष महत्त्व है। रूक्ष स्वेदन तथा आमपाचनार्थ दीपन-पाचन ओपघो का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सोठ, मरिच, पीपर का प्रयोग करना समुचित है।

७ पेयजल या यवागू वनाने में तिक्त या कपायरस युक्त द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए।

चिकित्सा

नवाथ—८ निम्बादि ववाथ ५० एम० एल० प्रात -साय विलाना चाहिए। योग—नीम की नीली छाल, सोठ, गुरुच, देवदार, चिरायता, छोटी पीपर, पुष्करमूल और वही कटेरी समभाग।

९ मरिचावि क्वाय उपद्रव युक्त कफज्वर को नष्ट करता है। योग—मरिच, पिपरामूल, सोठ, मगरैला, चित्रक, कायफल, कूठ, सुगन्धवाला, वच, हर्रे, कण्टकारी-मूल, काकडासिंगी, अजवायन, नीम की छाल, सभी समभाग मे।

१०. कटुत्रिकादि क्वाय का सेवन करायें। योग—सोठ, मरिच, पीपर, नागकेसर, हलदी, कुटकी तथा इन्द्रजी सभी समभाग मे।

99 त्रिफलादि स्वाथ में मधु का प्रक्षेप डालकर पिलावे। योग—आवला, हरें, बहेडा, परवल के पत्ते या फल, अरुसपत्ती, गुरुच, कुटकी, पिपरामूल सब समभाग।

१२. इसी प्रकार निम्नलिखित क्वायों का प्रयोग करे—१ सप्तच्छादि क्वाय, २. पिप्पल्यादिगण क्वाय, ३ निम्बादि क्वाय, ४ मुस्तादि क्वाय, ५. वासादि क्वाय, ६. हरिद्रादि क्वाय।

१३ पिप्पली चूर्ण १ ग्राम मे २ ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ४ बार देने से कास-श्वास, प्लीहा वृद्धि एव कफज्वर नष्ट होते हैं।

१४. चातुर्भद्रावलेहिका--कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंगी और पिप्पली के समभाग चूर्ण को १ ग्राम लेकर दूना मधु मिलाकर दिन मे ४ बार देना चाहिए।

१५ व्यवस्थापत्र---

१. ३-३ घण्टे पर ४ बार—
 त्रिभुवनकीतिरस ५ डेसी ग्राम
 घुद्ध टकण ५ डेसी ग्राम

४ मात्रा

१. च० स्० २०१९।

आर्द्रक स्वरस और मधु के साथ।

अथवा

२ ज्वरसहार

५ हेसी ग्राम

श्वृग भस्म

५ हेसी ग्राम

शुद्ध नरसार

५ हेसी ग्राम

४ मात्रा

३-३ घण्टे पर ४ बार उष्णोदक से।

३ ४-४ घण्टे पर ३ बार--

मृत्युञ्जय रस

५ डेसी ग्राम

३ मात्रा

आद्रंकस्वरस तथा मधु से।

४. ३-३ घण्टे पर ४ बार

कफकेतु रस

५ डेसी ग्राम

शुद्ध टकण

५ डेसी ग्राम

४ मात्रा

आर्द्धेक स्वरस और मधु से या उष्णोदक से।

अन्य रसयोगो मे कफ्कुठार रस, आनन्दभैरव, अश्वकञ्चुकी, तालभस्म और जयन्ती वटी देय है।

१६ पथ्य—कफज्वर अपतपंण साध्य रोग है, इसिलए इसमे पथ्य देने मे अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए। दोष एवं आम का पाचन ठीक से हो जाना चाहिए। पथावश्यक सशोधन भी कर लेना चाहिए। तदनन्तर लघु, सुपच मुद्गयूष, परवर का जूस या अन्य कटु, तिक्त या कपायरसप्रधान आहार द्रव्य की योजना करनी चाहिए। पीने के लिए उष्णोदक देना चाहिए।

प्रतिश्याय युक्त कफ ज्वर

३-३ घण्टे पर ४ बार---

त्रिभूवनकीतिरस ५ डेसी ग्राम

श्वृग भस्म

५ हेसी ग्राम

शुद्ध नरसार

५ डेसी ग्राम

४ मात्रा

'उष्णोदक से ।

२. २-२ घण्टे पर १-१ गोली व्योषादिवटी चूसना ।

३. सवेरे-शाम प्रयिश्यायहर कषाय ५० एम० एंल०

१ मात्रा

योग—उन्नाव ५ नग, लिसोडा बीज ५ नग, वनप्सा, खसखस, मुलहठी, गावजवां और सौक ३-३ ग्राम, तुरगबीन ६ ग्राम, मिश्री १५ ग्राम । सबको कूटकर २५० मि॰ ली॰ जल मे अर्धावशिष्ट पकावे और छानकर प्रात पान करे। पुन शाम को इसी तरह पकाकर पान करे।

४ तुलस्यादि फाण्ट मबेरे-शाम ५० एम० एल० पीना चाहिए।

थोग—तुलसी की पत्ती १० नग, काली मरिच ५ दाना, अदरक ३ ग्राम और लौग ३ नग लेकर, सबको कूटकर १ कप पानी मे ५ मिनट औटायें, फिर छानकर थोडी चीनी और दूध मिलाकर चाय की तरह गरम गरम पीना चाहिए।

द्वन्द्वज और त्रिदोषज ज्वरो के निदान

विषम (कभी कम, कभी अधिक, कभी समय से पूर्व कभी वाद एवं विधिविरुद्ध) भोजन, उपवास, खाद्यान्न परिवर्तन, ऋतुओं का अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग, अपने प्रतिकूल गन्ध का सेवन, विप-दूपित जल का उपयोग, कृत्रिम विष का सेवन, उपत्यका (पर्वतीय क्षेत्र) निवास, असम्यक् रूप से स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन-आस्थापन-अनुवासन और शिरोविरेचन का प्रयोग करना, सशोधन के वाद नियमानुसार पथ्य न लेना, स्त्रियों का अस्वाभाविक प्रसव होना, प्रसव के बाद प्रसूता का समुचित आहार-विहार न होना और पूर्वकथित वातज्वर, पितज्वर या कफज्वर में से किन्हीं दो दोषों के कारणों का ससर्ग होना अथवा तीनो दोषों के प्रकोपक कारणों का सन्त्रिपात जुट जाना, इन कारणों के अनुक्रम एव अनुपात के अनुसार दो दोषों या तीनो दोषों के प्रकोप से तदनुसार सम्प्राप्ति के होने से द्वन्द्वज या सन्निपात जवर होते हैं।

तीन द्वन्द्वज (१ वातिपत्तज २ वातकफज एव ३ पित्तकफज) ज्वरो मे मिलें हुए दो दोषो के लक्षण होते हैं, जो पूर्व मे कहे गये है। एव त्रिदोप के प्रकोप से तीनो प्रकार के ज्वरो के लक्षणो को देखकर सिन्नपातज्वर जानना चाहिए ।

चरक-चिकित्सास्थान अध्याय ३ मे कहा गया है—'निदानस्थान के ज्वर-वर्णन मे अलग-अलग दोषों से होनेवाले तीन प्रकार के ज्वरों के लक्षण कहे गये हैं, उसी आधार पर द्वन्द्वज ज्वरों के तीन प्रकार तथा सिन्नपात ज्वर के भी लक्षण कह दिये गये हैं।'र

ये लक्षण प्रकृतिसमसमवायारच्य द्वन्द्वज या सन्निपात ज्वर के है।

१ च० नि० १।२८।

निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथग्जन्वराष्ट्रित ।
 मसर्गसित्रिपाताना तथा चोक्त स्वलक्षणम् ॥ च० चि० ३।१११

वात-पित्त ज्वर के लक्षण

्प्यास, मूच्छा, भ्रम, दाह, निद्रानाश, शिर मे पीडा, कण्ठ और गले का सूखना, वमन, रोगटे खडे होना, भौजन मे अरुचि, आँखो के सामने अँघेरा छा जाना, सन्धियों मे पीडा और जभाई/आना, ये सभी वातिपत्त ज्वर के लक्षण हैं।

वात-इलेब्स ज्वर के लक्षण

शरीर का गीले कपडे से ढका होने जैसा प्रतीत होना, सन्धियों मे पीडा होना, नीद अधिक आना, शरीर मे भारीपन, शिर में जकडाहट, सर्दी-जुकाम होना, साँखी, पसीना अधिक आना और शरीर में जबर के तापमान का मध्यम वेगयुक्त होना, ये सब वातक्लेब्स जबर के लक्षण हैं। र

इलेब्स-पित्त ज्वर के लक्षण

मुख के भीतर कफ का लेप लगाया हुआ-सा जान-पडना, मुख का स्वाद तीता रहना, तन्द्रा, मूर्च्छा, खाँसी, अरुचि, प्यास का बना रहना, कभी शीत और कभी दाह का मालूम होना, ये सब दलेष्मिपत्तिज्वर के लक्षण है। 3

वक्तव्य--इन उपर्युक्त द्वन्द्वज ज्वरों के लक्षणों को विकृतिविषमसमवायार्व्य समझना चाहिए, क्योंकि इनमें जो लक्षण हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लक्षण है, जो ज्वर के आरम्भक दोव के नहीं हैं, जैसे—वातपैतिक ज्वर में अरुचि और रोमहर्ष, ये दोनों न तो वात के लक्षण हैं, न पित्त के। इसी प्रकार वातश्लैष्मिक ज्वर में स्वेद-

१ (क) तृष्णा मूर्च्छा अमी दाह स्वप्तनाशः शिरोरुजा।
कण्ठास्यशोपो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तम॥
पर्वमेदश्च जुम्मा च वातिपत्तच्चराकृति। सु० च० ३९

⁽ख) रोमहर्षस दाहस पर्वमेद शिरोरुजा।
कण्ठास्यशोषो वमथुस्तृष्णा मूर्च्छा अमोऽरति॥
स्वप्ननाशोऽतिवाग् जृम्मा वातिपत्तज्वराकृति। च० चि० ३

२ (क) स्नैमित्य पर्वणा भेदी निद्रागीरवमेव च॥ शिरोग्रह प्रतिज्याम कास स्वेदाप्रवर्तनम्। सन्तापी मध्यवेगश्च वातद्रलेष्मज्वगक्कृति॥ सु० उ० ३९

⁽ख) शीतकी गौरव तन्द्रा स्तैमित्यं पर्वणा च रुक्। शिरोग्रह प्रतिस्थाय कास स्वेदाप्रवर्तनम् मन्तापी मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृति ॥ च० चि० ३

३ (क) लिप्ततिक्तास्युता तन्द्रा मोह कासीऽरुचिस्तृषा। मुहुर्दाहो सुहु ज्ञीत चलेष्मपिक्तज्वराकृति॥

⁽य) मुहुर्दाहो मुहु शीत स्वेद न्तम्मो मुहुर्मुहु । मोह कामोऽरुचिस्तुष्णा श्लेष्मिपत्तप्रवर्तनम् ॥ लिप्ततिक्तास्यना तन्द्रा श्लेष्मिपत्तज्वराकृति । च० चि० ३

प्रवृत्ति और सन्ताप, ये दोनो न वात के लक्षण हैं, न तो कफ के । एव पित्तवलेष्मज ज्वर मे अनवस्थित शीत तथा दाह का होना विकृतिविषमसमवायारव्य लक्षण है।

सित्रपातज्वर मे आँखों में मिलनता, अश्रुपूर्णता, शिर को इधर-उधर फेंकना आदि लक्षण अपने प्रकुपित समवेत दोप के कारण उत्पन्न हुए नहीं प्रतीत होते हैं। अत उन्हें विकृतिविषमसमवायजन्य लक्षण कहा जाता है।

प्रकृतिसमसमवाय—'प्रकृत्या हेतुभूतया सम कारणानुरूप समवाय प्रकृतिसम-समवाय' अर्थात् कारण के अनुरूप कार्यं का होना प्रकृतिसमसमवाय कहलाता है, जैसे—श्वेत तन्तुओं से बना हुआ वस्त्र श्वेत ही होता है। इसी प्रकार कफिपत्तज ज्वर मे मुख का कफ्युक्त तथा तीता होना (लिप्ततिक्तास्यता) कारण के अनुरूप लक्षण होने से प्रकृतिसमसमवाय लक्षण है।

विकृतिविषमसमवाय—विकृति के कारण विषम अर्थात् कारण के विषरीत कार्य का होना, विकृतिधिषमसमवाय कहलाता है, जैसे—पीले रग की हल्दी और सफेंद्र चूने के सयोग से विषम लाल रग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार वातिषत्त ज्वर के लक्षणों में अरुचि तथा रोमहर्ष, ये दोनो विषम लक्षण हैं। 'विकृत्या हेतुभूतया विषम कारणाननुरूप समवायो विकृतिविषमसमवाय'।

द्वन्द्वज ज्वरो का चिकित्सासूत्रे

१ दो दोपो से उत्पन्न ज्वरो मे कौन दोप अधिक वढा है? किस दोष की प्रधानता या उग्रता है? किस दोप के लक्षण अधिक गम्भीर हैं? यह देख-समझकर प्रधान दोप के प्रतिकार के लिए अधिक सावधान होकर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करे। साथ ही महचर दोप का भी उपचार करे। पूर्व मे अलग-अलग दोपो से होनेवाले ज्वरो मे जो चिकित्सा वतलायी गयी है, उसका प्रयोग करना चाहिए।

२ जब द्वन्द्वज जबरोत्पादक दोनो दोष सम अवस्था मे प्रकुपित हो, तो उन दोनो की ममान रूप से चिकित्सा-व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे—वात-पित्त ज्वर में वान और पित्त की, वातक्लेष्मज ज्वर में वात और कफ की, पित्तक्लेष्मज ज्वर में पिन और कफ की चिकित्सा करनी चाहिए।

३ विकृतिविषमममवायारव्य ज्वरों में ज्वरारम्भक दोषजन्य लक्षणों से विषरीत भी कुछ जदाण होते हैं, अत ऐसी स्थिति में विशिष्ट चिकित्सा करनी चाहिए।

वातिपत्तज्वर चिकित्सा

9 दुग्धपान—वातिपत्त ज्वर के रोगी को जलन हो रही हो और प्यास अधिक हो तथा ज्वर निराम हो, तो उसे वातिपत्तनाशक औषिधयो से सिद्ध किया हुआ दूध पिलाना चाहिए अथवा वातिपत्तज्वर के रोगी को मलावरोष्ठ हो तो गाय का

१ संसुष्टान् सन्निपतितान् बुद्ध्वा तरतमे समे । ज्वरान् दोणक्रमापेक्षी यथोक्तरीवर्षेजयेत् ॥ च० चि० ३।२८५

दूध पिलावे तथा अधिक दस्त हो रहा हो, तो वकरी का दूध पिलाना चाहिए। गाय का दूध मलनिस्सारक और वकरी का दूध सग्राही होता है।

भाचार्य चरक ने इस ज्वर मे धारोष्ण दूध का प्रयोग कहा है।^र

- २. घृतपान—जब वातिपत्त ज्वर में कफ मन्द हो और १० दिन बीत जाने के बाद दोष पक गये हो, तो दोषानुसार औषिष्टियों से सिद्ध किये हुए घृत का पान कराना चाहिए, जो अमृत के समान लाभप्रद होता है। 3
- ३ नवाङ्गक्षाय—सोठ, गुरुच, नागरमोथा, चिरायता, शालिपणीं, पृष्णिपणीं, गोखरू, छोटी और वडी कटेरी का क्वाथ प्रात -सार्थ पिलावे।
- ४ किरातादि क्वाय चिरायता, गुरुच, मुनक्का, आँवला और कचूर, इनके क्वाय में गुड डालकर पिलाना चाहिए।
- ५ मुस्तादि क्वाथ-नागरमोथा, पित्तपापडा, नीलकमल, चिरायता, खस और लालचन्दन के क्वाथ मे चीनी मिलाकर प्रात -सायं देवे।
- ६. अनार तथा आँवले का स्वरस पिलाना और मूँग का यूप देना--वात-पित्त-ज्वर को शान्त करता है।
- ७ भारग्यादि क्वाय —भारगी के मूल की छाल, गुरुच, नागरमोथा, देवदारु, बडी कटेरी, सोठ, पीपर और पोहकरमूल का क्वाय, ज्वर तथा श्वास रोग मे लाभकर है। यह क्षुघा को प्रदीप्त करता है तथा रुचि को बढाता है।

८. रसप्रयोग--

(१) मृत्युञ्जय रस ५ डेसीग्राम रसादि वटी <u>५ डे</u>सीग्राम योग४ मात्रा ३-३ घण्टे पर४ बार मद्यु से । अथवा—

(२) त्रिभुवनकीर्ति रस ५ डेसीग्राम गोदन्तीभस्म <u>१</u>ग्राम

४ मात्रा

३-३ घण्टे पर् मधु से ।

वात-कफज्वर-चिकित्सा

१ रूक्षस्वेदन करना चाहिए। स्वेद संपूर्ण शरीर के स्रोतो को मृदु बनाता है

१ (क) दाहृतृष्णापरीतस्य वातिपत्तोत्तरं न्वरम् ।

बद्धप्रच्युतदोप वा निराम पयसा नयेत् ॥ च० चि० ३।१६७
(ख) पुरीषे प्रथिते पथ्य वातिपत्तिविकारिणाम् । च० स० १।११३

२ भरोष्ण वा पय सद्यो वातपित्तच्वर जयेत्॥

रे अत कर्ध्वे कफे मन्दे वातिपत्तीत्तर ज्वरे। परिपक्वेषु दोषेपुं सर्पिष्पानं यथाऽमृतम्॥ च० चि० ३।१६४

और अग्नि को स्वस्थान में लाकर वातकफजन्य दोय और मल-मूत्र की स्तव्यता को दूर कर ज्वर को हटाता है।

- २ आग पर तपाये हुए वालू की पोटली बनाकर उसे उष्ण काञ्जी मे भिगोकर सहन योग्य होने पर उस पोटली से स्वेदन करे।
- ३ पचकोल क्वाथ—पीपर, पिपरामूल, चाभ, चीता और सोठ के समभाग का क्वाथ बनाकर सबेरे-शाम पिलावे।
 - ४ प्यास लगने पर गरम जल पिलाना चाहिए।
- ५ आरग्वधादि क्वाय अमलतास, पिपरामूल, नागरमोथा, कुटकी और हरें, इनका क्वाय आम एव शूल युक्त वातकफज्वर मे लाभकर है। यह क्वाय अग्नि-प्रदीपक तथा आमनाशक है।

इसे 'गिरिमालाप चक' नाम से भी कहा जाता है। इसमे अन्य द्रव्यो का क्वाय बनाकर वाद मे अमलतास का गूदा मिलावे, अन्यथा अमलतास का क्वाथ करने से गुणहानि होती है।

- ६. वृहत्विप्पल्यादि क्वाय-(भावप्र०) का प्रयोग बहुत उपयोगी है।
- ७, बचादि ववाथ—मीठा वच, कुटकी, पाठा, आरग्वध और इन्द्रजी का नवाथ वातकफज्वर को शान्त करता है।

८. रसप्रयोग--

(२) ज्वरसहार रस ५ डेसीग्राम
प्रागभस्म ५ डेसीग्राम
गोदन्तोभस्म १ ग्राम
४ मात्रा

३--३ घण्टे पर ४ वार मधु से।

अथवा

(३) नारदीय लक्ष्मीविलास रस <u>५ डेमीग्रा</u>म ४ मात्रा

दिन मे ४ वार---तुलसी स्वरम और मधु से।

(८) वातश्लेष्मान्तक रस <u>५ डे</u>सीग्राम ४ मात्रा

३-३ घण्टे पर ४ वार पान के रम और मधु मे।

श्लेष्म-पित्तज्वर-चिकित्सासूत्र

१. कफ-पित्त के सशोधन के लिए विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे— पित्त या कफ-पित्त या पित्ताशयगत दोप हो, तो विरेचन औपध के प्रयोग से इन सवका शोधन हो जाता है। यदि वात-पित्त-कफ पक्वाशयगत हो, तो निरूहवस्ति का प्रयोग करना चाहिए।

२ यदि ज्वर पुराना हो, रोगी की जठराग्नि तीक्ष्ण हो, जसके कफ-पित्त क्षीण पहो और उक्कका मल रूक्ष तथा विवन्धयुक्त हो, तो उसे अनुवासनवस्ति देनी चाहिए।

३ साम कफिपत्तज्वर मे लघन और पाचन का प्रयोग करना चाहिए।3

४ जव कफिपत्तप्रधान ज्वर हो, तो यवागू नही देनी चाहिए। उसे जागल जीवो का मासरस तथा अम्लीकृत या अनम्ल यूप देना चाहिए।

चिकित्सा

५ अमृताष्टक क्वाथ - गुरुच, इन्द्रजी, नीम की छाल, परवल के पत्ते, कुटकी, सीठ, लालचन्दन, नागरमोथा, इनका क्याथ तैयार कर, उसमे आधा ग्राम पीपर का चूर्ण हालकर सवेरे-शाम पिलावे।

६ पटोलादि ववाय — पटोलपत्र, नीम की छाल, हर्रे, बहेडा, आंवला, मुलहठी और वरिकार का क्वाथ प्रात -साय पिलावे।

- ७. प॰वितक्त मनाय-छोटी कटेरी, गुरुच, सोठ, पोहकरमूल और चिरायता का मनाय कफिपत्तज्वर तथा खाँसी एव श्वाम मे भी हितकर है।
- ८ फट्रोहिणी चूर्ण-कुटकी का चूर्ण २ ग्राम तथा चीनी २ ग्राम सबेरे-शाम जल से खिलाना चाहिए। भ
 - ९ रसप्रयोग---३-३ घण्टे पर ४ वार
 - शिभुवन कीर्ति रस ५ डेमीग्राम
 गोदन्तीभस्म , १ ग्राम
 शुद्ध टंकण ५ डेसीग्राम
 ४ मात्रा

आर्द्रकस्वरस और मधु से।

२ ज्वरे पुराणे सङ्क्षीणे कफिपत्ते दृढाग्नये। रूश्वद्धपूरीपाय प्रदद्धादनुवामनम्॥ च० चि० ३।१७२

३ सामा ये ये च कफना कफिएतज्वराश्च ये। लड्डनं रङ्गनीयोक्त तेषु कार्यं प्रति प्रति॥ च०चि० ३

४. मदात्यये गधनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिके। कर्म्यो रक्तपित्ते च यवागूने हिता ज्वरे॥ च० चि० ३।१५४

७. मशर्करा तु शाणैका कडकामुष्णवारिणा। पीत्वा द्वर जयेजन्तु कपित्तममुक्रवम्॥ नै० र० द्वर०

१ पित्तं वा कफपित्तं वा पत्त्वाशयगतं हरेता। सम्बन, त्रीन् मलान् वन्तिहरेत् पत्रवाशयरिथनान् ॥ च० चि० ३।१७१

२ ३-३ घण्टे पर ४ बार
ज्वरसहार रस <u>५ डे</u>सीग्राम
४ मात्रा

तुलसी पत्र रस और मधु से।

लक्ष्मीविलास रस, मृत्युञ्जय तथा अश्वकञ्चुकी रस का भी प्रयोग करना उचित है। इस क्लेब्मिपत्त ज्वर की विशिष्ट औषध 'कस्तूरीभैरव रस' है, किन्तु वह सर्वसुलभ नहीं है। अत यथालाभ इनमें से प्रयोग करना चाहिए।

तृतीय अध्याय

सन्निपात ज्वर

निदान और सम्प्राप्ति

वात-ित्त-कफ प्रकीपक मिथ्या आहार-विहार के एक साथ जुट जाने से तीनो दोषों का एक साथ ही प्रकोप हो जाता है और वे पूर्वोक्त ज्वरों की तरह स्वकारणों से प्रकुपित होकर 'रस' नामक घातु में अनुगमन कर पाचकाग्नि को उसके स्थान से निकाल कर शरीर की कल्मा को बढा देते हैं। एव देहोज्मा के वढ जाने से सपूर्ण शरीर उज्ण हो जाता है और इस शरीर की उज्जाता या सताप की वृद्धि को ही ज्वर कहते हैं।

इस ज्वर के उत्पादक कारणों में तीनों दोषों के प्रकोपक कारणों का समावेश होता है, इमिलए इसमें तीनों दोषों के मिले-जुले लक्षण होते हैं। अतएव यह त्रिदोषज ज्वर या सिन्नपात ज्वर कहलाता है।

सन्निपात ज्वर के जनक कुछ विशिष्ट निदान

- १. प्रसव, मूढगर्भ या गर्भपात के बाद स्त्री का शीत उपचार करना।
- २. भोजन, शयन, जागरण एव नित्यकर्मों की विषमता।
- ३ चिन्ता, ईर्ष्या आदि मनोविकारो का होना।
- ४ जिह्वा की छोलुपता, दूषित दुग्धपान और विरुद्ध आहार।
- ५ उपवास, अध्यशन, विषमाशन एव अजीर्णाशन ।
- ६. सहसा पथ्य परिवर्तेन एव ऋतु-परिवर्तेन ।
- ७ विष-दूषित वायु तथा जल का सेवन, गरविषसयोग।
- ८ अनम्यस्त पर्वतीय या उपत्यका (पर्वत समीप भूमि) निवास ।
- ९ स्नेहन-स्वेदन आदि पूर्वकर्मी का मिथ्यायोग ।
- १० पञ्चकर्मी का हीन, भिच्या या अतियोग होना ।
 - ये सभी कारण है, जिनसे तीनो दोयो का प्रकोप होकर सिन्नपातज्वर होता है।

सन्निपातज्वर का द्विचा आरम्भ

उक्त ज्वरारम्भक कारण-दोषो को प्रकृपित करके दो प्रकार से सिन्नपातज्वर का आरम्भ करते हैं—

9 जब वातज आदि जबरो के मिले-जुले गम्मीर लक्षणों के साथ जबर का आरम्भ होता है, तो उसमें जो लक्षण होते हैं, वे त्रिदोपज होते हैं, अत उम जबर को प्रकृतिसम-समबायार बध कहते हैं।

१ काश्यपसंहिता-विशेषकल्पाच्याय के आधार पर।

२ जब स्वप्रकोपक कारणो से कुपित दोष वातज आदि ज्वरो के लक्षणों से मिन्न विशिष्ट लक्षणों वाले सिन्नपातज्वर को उत्पन्न करते हैं, तो उस ज्वर को विकृति-विषम-समवायारब्य कहते हैं।

दोनों में सामान्य अन्तर यह है कि प्रकृतिसम-समवाय में तो कारण के अनुरूप जैसा-जैसा दोपप्रकोप का स्वरूप होगा, तदनुसार लक्षण होते हैं, किन्तु विकृति-विपम-समवाय में कोई नियम नहीं हैं (विकृती नियमों नास्ति), अत उसमें ऐसे भी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको किमी दोप में जायमान नहीं कहा जा सकता। अत वे लक्षण दोपज लक्षणों से विशिष्ट लक्षण होते हैं।

सन्निपातज्वर की साध्यासाध्यता

१ दोप तथा मलो की प्रवृत्ति न होना, २ जठराग्नि का नाश होना तथा
 ३ सभी लक्षणो का उत्पन्न होना असाध्यता के लक्षण हैं।

जब उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण हो, तो सन्निपात जबर कृच्छ्रसाध्य होता है। यह किसी भी स्थिति में सुखसाध्य नहीं होता है।

सन्निपातज्वर दुख्यिकित्स्य है।

आचार्य चरक ने इसे मवये वडा दुश्चिकित्स्य कहा है। (सिन्नपातो दुश्चि-कित्स्यानाम् —च० सू०२५)। आचार्य भालुकि ने सिन्नपातज्वर की चिकित्सा करने को मृत्यु के साथ युद्ध करना वत्तलाया है। व

सन्निपातज्वर की मर्यादा³

- ा वातप्रधान सन्तिपातज्वर सातवे दिन वढकर उतर जाता है या मार डालता है।
- २ पित्तप्रधान ,, दसर्वे दिन
- ३ तक्प्रधान ,, बारहवें दिन ,, ै,

अन्य मत से ४ ७, ९, ११, १४, १८ तथा २२ दिनो की मर्यादा कही गयी है। स्वानुमव—प्राय १०, १४, २२ तथा २८वे दिन ज्वर उतर जाता है। कदाचित् समुचित उपचार के अभाव मे ज्वर का पुनरावर्तन हो जाता है और २८वें दिन के बाद १-१ सप्ताह की अविधि वढने से ३५, ४२, ४९ या ५६ दिन तक ज्वर चलता रह जाता है।

वक्तव्य-सिन्नपातज्वर की उक्त मर्यादा में रोगी का जीवन या मरण दो बातो

१ दोपे विवद्धे नष्टेऽग्नो सर्वमम्पूर्णलक्षण । मन्निपातन्वरोऽमाध्य कृच्यमाध्यम्ततोऽन्यया ॥ च० चि० ३।१०९

२ मृत्युना मह योद्धाय भनिषात चिकित्यता। भालुकि वचन्

३ मप्तमे दिवमे प्राप्ते दशमे डादगेऽपि वा। पुनर्घोरनरो भत्वा प्रशमं याति हन्ति वा॥ सु० छ० ३९

४ मप्तमी द्विगुणा चैव नवस्ये आदशी तथा। एषा त्रिदोपमर्थादा मोक्षाय च वधाय रच।। मा० नि०

पर निर्मर है -- (१) यदि मलपाक होता है तो रोगी वन जाता है और (२) धातपाक रहोने पर रोगी मर जाता है।

समसर्वदोषोल्वण, विकृतिविषमसमवेत सन्निपात ज्वर के लक्षण

- १ क्षण में दाह होना और क्षण में शीत का अनुभव होना।
- २ अस्वियो की मन्धियों में तथा शिर में पीडा होना।
- ३ नेत्र का अशुपूर्ण, मलिन, रक्त तथा अध्युला दीख पडना ।
- ४ कानो मे आवाज होते रहना और कणेशूल होना ।
- ५ कण्ठ मे यव घूक (टूड) के घरें होने जैसा लगना।
- ६ तन्द्रा (नीद जाने जैसा लगना), मूच्छी और प्रलाप होना ।
- ७. काम, भ्वाम, अरुचि और भम होना।
- जीभ जली हुई-सी और पुरदरी मालूम होना ।
 - ९ अग अग मे शिथिलता और यंगावट का अनुभव होना ।
 - १० कफ के साथ रक्त तथा पित्त मिश्रित यूक का निकलना ।
- ११, रोगी शिर को इधर-उधर घुमाता रहता है और उसे प्यास लगती रहती है।
 - १२ नीद नहीं आती है और हृदय-प्रदेश में पीड़ा होती है।
 - १३ स्वेद, मूत्र तथा मल का विलम्ब से और योडा योडा निकरना।
 - १४ शरीर का अनिकृश न हीना और कण्ड से फहरने की आवाज आना।
 - 9५ दारीर में दगाम या रक्त वर्ण के चकले निकलना।
 - १६ वोलने मे अनमयंता और मुख नाफ-गृद प्रादि स्रोतों का पकना ।
- १७ ज्दर मे भारीपन और दोपों का पाक विलम्ब से होना-में सब सन्निपात-ज्बर के लक्षण हैंडै।

सन्निपात ज्वर के भेद

चरक तथा काश्यप के १३ प्रकार

- १ वातोल्वण
- २ पित्तोल्बण
- ३ वफोल्वण
- ४ वात पिनोल्बण मन्दकफ
- ५ वात-रलेप्मोल्यण-मन्दिपत्त

- ६. पित्त-क्रकोल्वण-मन्दवात

- ७. हीनपात-मध्यिपत्त-श्लेण्माधिक ८ हीनवात मध्यकफ-पित्ताधिक ९ हीनिपत्त-मध्यकफ-वाताधिक १०. हीनिपत्त-मध्यवात-कफाधिक
- १ पित्तवाफानिलवृद्धना दशदिवसदादशाहमप्ताहार । हन्ति विमुखनि वादा त्रिटोपनो धातुमलपाकात् ॥ तन्त्रान्तर
- २ मम्बाध्यमानो हृदि नाभिदेशे गान्नेपु वा पाकरजान्यितेषु । पक्वेषु या नेषु कजाज्वराने म धातुषाक्री कथिनी भिषरिभ ॥ नन्त्रान्तर
- ३ च० न्त्रि० द्।१०३-१०९।

११. हीनकफ-मध्यपित्त-वाताधिक

१२. हीनकफ-मध्यवात-पित्ताधिक

१३ समसर्वदोषोल्वण

भालुकितन्त्रोक्त १३ प्रकार

- १ वातोल्बण विस्फुरक
- २ पित्तोल्बण आशुकारी
- ३. कफोल्बण कम्फण
- ४. वातिपत्तोल्वण विभू
- ५ पित्तक्लेष्मोल्बण फल्गु
- ६ वातश्लेष्मोत्वण मकरी
- ७. हीनवात-मध्यपित्त-कफोल्वण-वैदारिक
- ८ मध्यवात-हीनपित्त-कफोल्बण-कर्कोटक

- अधिकवात-मध्यपित्त-हीनकफ--सम्मोह
- १० हीनवात-अधिकपित्त-मध्यकफ-याम्यक
- १९ मध्यवात-अधिकिपत्त-होनकफ-क्रकच
- १२ अधिकवात-हीनपित्त-मध्यकफ-पाकल
- १३ प्रवृद्ध त्रिदोप-कूटपाकल

तन्त्रान्तरीय १३ प्रकार

- १. कुम्भीपाक
- २ प्रोर्णुनाव
- ३ प्रलापि
- ४. अन्तर्दाह
- ५ दण्डपात
- ६. अन्तक
- ७ एणीदाह

- ८ हारिद्रक
- ९ अजघोष
- १० भूतहास
- ११. यन्त्रापीड
- ५२. सन्यास
- १३ सशोव

तन्त्रान्तरोक्त १३ प्रकार

- १ शीताङ्ग
- २. तन्द्रिक
- ३ प्रलापक
- ४ रक्तष्टीवी
- ५ भुग्ननेत्र
- ६ अभिन्यास
- ७ जिह्नक

- ८ सन्धिक
- ९ अन्तव
- ५०. रुग्दाह
- ११ चित्तावभ्रम
- १२ कर्णग्रह
- १३. कण्डक्ञ

प्रथम और द्वितीय भेदों के लक्षण

(१) वातोल्बण साम्नपातज्वर के लक्षणी

सन्धियो, अस्थियो और शिर मे वेदना होना, प्रलाप, शरीर मे भारीपन, शिर में

१ (क) च० चि० अ९४।

⁽ख) आयु० वि०।

चनकर होना, प्यास लगना, कण्ठ तथा मुख का सूखना, ये वातोल्वण सिन्नपात के लक्षण होते हैं।

वक्तन्य—तन्त्रान्तर मे इसे विस्फारक कहा गया है और कास, श्वास, मूच्छी, कम्पन, पार्श्ववेदना, जूम्भा और कपायमुखता—ये विशेष लक्षण कहे गये है।

(२) पित्तोल्बण सम्निपातज्वर के लक्षण

इसमे रोगी का मल एव मूत्र सरक्त होना, दाह, स्वेद, प्याम, बल का ह्रास और मूर्च्छा, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य—तन्त्रान्तर मे इसे आशुकारी नाम से कहा गया है तथा अतिमार, भ्रम, मुखपाक, शरीर मे लाल दाने निकलना और तीव्र दाह होना, ये विशेष लक्षण कहे गये हैं।

(३) कफोल्बण सिन्नपातज्वर के लक्षण^२

आलस्य, अरुचि, जी मिचलाना, दाह, यमन, वेचैनी, शिर मे चक्कर आना, तन्द्रा और खाँसी होना, ये कफोल्वण सिन्नपातज्वर के लक्षण हैं।

वक्तव्य-अन्यत्र इसे कम्पन कहा गया है और जडता, वाणी का अस्पष्ट निकलना, रात्रि मे अधिक नीद आना, नेत्रो मे अफडन होना और मुख का स्वाद मीठा वना रहना, ये विशेष लक्षण कहे गये हैं।

(४) वातिपत्तोत्वण मन्दकफज सिन्नपात व्य के लक्षण³

इसमें शिर में चक्कर आना, प्यास, दाह, शरीर में भारीपन होना और शिर में भयन्तूर पीडा होना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य--अन्यत्र इसे बभ्रु नाम से कहा गया है। इसमे मद, मुखकोप, आँखो का न जुनना, आध्मान, अरुचि, तन्द्रा, कास, श्वास, श्रम और थकावट होना, ये विशेष लक्षण कहे गये हैं।

(५) वातश्लेष्मोल्बण मन्दिपत्त सन्निपातज्वर के लक्षण ४

इम ज्वर के साथ शरीर मे शीत लगना, कास, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, दाह, देह मे पीडा और व्यथा होना, ये लक्षण होते हैं।

१ (क) च० चि० ३१९५।

⁽स) आ० वि०।

२ (क) च० चि० अ९६।

⁽ख) आ० वि०।

३ (क) च० चि० ३।९१।

⁽प) आ० वि०।

४ (क) च० चि० ३।९२।

⁽ख) आ० वि०।

४ का० वि०

वक्तव्य-अन्यत्र इसे शीझकारी कहा गया है और शीत लगना, मूचर्जा, शुधा लगना, पार्श्वपीडा, शूल, पसीना न आना तथा श्वास, ये विशेष लक्षण कहे गये हैं।

(६) पित्तकफोल्बण मन्दवात सिन्नपात ज्वर के लक्षण

इस ज्वर मे वमन, शरीर मे शीत लगना, बार-बार दाह होना, नृष्णा, मूर्च्छा और हिंडुयो मे व्यथा होना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य-अन्यत्र इसे मत्लु नाम दिया गया है और अन्तर्दाह तथा वहि शीत लगना, प्यास, थूकते रहना, दक्षिण पार्श्व में सुई चुभाने जैसी वेदना, वक्ष स्थल, शिर एवं कण्ठ में जकडन, कफ या पित्त का कठिनाई से निकलना, चकत्ते निकलना, पत्तले दस्त लगना, श्वास, हिचकी और आंख न खुलना, ये विशेष लक्षण होते हैं।

(७) हीनवात-मध्यपित्त-श्लेष्माधिक सन्निपातच्वर के लक्षण

इस ज्वर मे प्रतिश्याय, वमन, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि और अग्निमान्द्रा ये छसण होते हैं।

वक्तव्य-अन्यत्र इसका नाम वैदारिक रखा गया है। इसमे बल्पाश मे शूल, किंद्रप्रदेश में सुई चुभाने जैसी पीडा, शरीर के मध्य भाग में दाह, पीडा, चक्कर, इन्द्रियों में अकर्मण्यता, शिर शूल, वस्तिशूल, हृदयशूल, वोलने में कष्ट होना, प्रमीलक, श्वास, कास, हिक्का, जडता और सज्ञानाश होना ये विशेष लक्षण हैं।

(८) होनवात-मध्यकफ-पित्ताधिक सन्निपातज्वर के लक्षण³

इस ज्वर मे हलदी के वर्ण का पीला मूत्र निकलना, आँखो मे पीलापन, दाह, तृष्णा, भ्रम और अरुचि, ये लक्षण होते हैं।

वक्तन्य--अन्यत्र इसे याम्य नाम दिया गया है। इसमे हृदय मे दाह, यकृत्-प्लीहा-अन्त्र और फुप्फुस का पाक होना तथा ऊपर के मुखमार्ग से तथा नीचे के गुदामार्ग से पूय तथा शोणित का निर्गमन होना, ये लक्षण होते हैं।

इससे आक्रान्त रोगी के दाँत सड जाते हैं और रोगी कवलित हो जाता है।

(९) हीनपित्त-मध्यकफ-चाताधिक सन्निपातज्वर के लक्षण^४

इस सन्निपानज्वर मे शिर शूल, कम्पन, श्वास, प्रलाप, वमन और अरुचि ये लक्षण होते है।

वक्तव्य—अन्यत्र इसे ऋकच सिन्नपात के नाम से कहा गया है। इसमे धकावट, मूर्च्छा, वेचैनी और चक्कर आना, ये विशेष लक्षण होते है। इसमे मन्यास्तम्भ का होना मारक लक्षण है।

१ (क) च० चि० ३ तथा (ख) आ० वि०

२ (क) च० चि० ३ तथा (ख) आ० वि०

३ (क्र) च० चि० ३ तथा (ख) आ० वि०

४ (क) च० चि० ३ तथा (ख) आ० वि०

(१०) हीनिपत्त-मध्यवात-कफाधिक सिन्नपातज्वर के लक्षण

ं इसे ज्वर मे शीत अधिक लगना, शरीर में भारीपन, तन्द्रा, प्रलाप, अस्थियों में पीड़ा और शिर शुल होना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य—अन्यत्र इसे कर्कटक सिश्चपात कहा गया है। इसमे अकथनीय अन्तर्दाह होना, बोलने मे असमर्थता, चेहरे का लाल सुर्ख होना, पित्त से आकृष्ट कफ का छाती से न निकल पाना, बाणिवद्ध जैमा पार्श्वश्चल होना, हृद्य उत्पादित होने जैसा प्रतीत होना, प्रमीलक, श्वास तथा हिक्का का प्रतिदिन बढते जाना, जिह्वा का दग्धवत् और खरस्पर्शवती होना, गले का शूको से आवृत प्रतीत होना, जबर का अविसर्गी हृप बना रहेना, रोगी का कबूतर की बोली जैसा कहरते रहना, छाती मे कफ का भरा होना, ओठ तथा तालु का सूखना, तन्द्रा होना, निद्रा की अधिकता, वाणी का अववद्ध होना, प्रभा का क्षीण हो जाना, सदा वेचैनी का बना रहना, अपथ्य आहार-विहार की इचिन होना, अगो का फैलना और थूक मे थोडा-थोडा रक्त आना, ये विशेष लक्षण, होते हैं।

(११) हीनकफ-मध्यपित्त-वाताधिक सन्निपातज्वर के लक्षण^२

इस ज्वर मे श्वास, कास, प्रतिश्याय, मुखशोष और पाश्वं-मे अधिक पीडा का होना, ये लक्षण होते हैं।

्र वक्तव्य—अन्यत्र इसे सम्मोहक सिन्नपातज्वर कहा गया है। इसमे प्रलाप, थकावट, वेहोशी, कम्पन, मूर्च्छा, अरित और चनकर आना, ये विशेष लक्षण होते हैं। इस सिन्नपात से आकान्त रोगी पक्षाघात का शिकार हो जाता है।

(१२) हीनकफ-मध्यवात-पित्ताधिक सन्निपात ज्वर के लक्षण³

् इसमे पतला शौच होना, अग्निमान्द्य, तृष्णा, दाह, अरुचि और भ्रम होना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य — अन्यत्र इसे पालक सिन्नपात कहा गया है। इसमे मोह, प्रलाप, मूर्च्छा, मन्यास्तम्भ, शिरोग्रह, कास, श्वास, तन्द्रा, सज्ञानाश, हृदय में व्यथा, रक्तस्राव और आँखो का लाल एव स्तब्ध होना, ये लक्षण होते हैं।

(१३) समसर्वदोषोल्बण सिन्नपात ज्वर के लक्षण र

इसके लक्षण पूर्व मे कहे जा चुके हैं।

वत्तव्य — अन्य तन्त्रों में इसे कूटपालक सिन्नपात कहा गया है। इसके लक्षणों में अध्वैश्वाम, अगों की जकडन और आँखों की निश्चलता, ये विशेष लक्षण कहे गये हैं। यह अन्य रोगों की अपेक्षा वडा ही दारुण होता है, जैमे — वज्जपात, शस्त्राघात या

१ (क) च० चि० ३ नथा (स) आ० वि०

२ (वा) च० चि० ३ तथा (ख) मा० वि०

३ न० चि० ३ तथा (ग) आ० वि०

४ चं वि० ३ नया मु उ उ ३९

अग्निदाह होना। यह तीन दिन मे रोगी को यमराज के यहाँ पहुँचा देता है। इसके भयक्कर लक्षणों को देखकर लोग यह कहने लगते हैं, कि यह रोगी किसी प्रेतात्मा द्वारा गृहीत है। यह किसी कुलदेवता के अपमान के कारण हुआ रोग है या इसकी प्रहदशा खराव है या इसने कृत्रिम विप खा लिया है आदि आदि।

तृतीय भेद: तन्त्रान्तर-पठित सन्निपात के रुक्षण

(१) कुम्भीपाक सन्निपात ज्वर का लक्षण

जिस सिन्नपात ज्वर मे रोगी की नाक से काला, लाल एव गाढा रक्त निकलता हो और वह अपने शिर की चारो ओर घुमाता-पटकता रहता हो, उसे कुम्मीपाक सिन्नपात कहते हैं।

(२) प्रोर्णुनाव के लक्षण^२

जिस ज्वर मे रोगी अपने अगो को ऊपर उठाकर नीचे फेंकता रहता हो और लगातार ऊपर की बोर श्वास लेता हो, इस विचित्र कष्टप्रद अवस्था को प्रोणुंनाव सिप्तपात कहते हैं।

(३) प्रलापी के लक्षण

जिस प्रलाप करनेवाले मित्रपात ज्वर के रोगी को पसीना आना, चनकर मालूम होना, अग टून्ना, काँपते रहना, नेत्र आदि मे जलन, कण्ठ मे पीडा और शरीर मे भारीपन हो, उमे प्रलापी सिन्नपात जानना चाहिए।

(४) अन्तर्दाहसिन्नपात के लक्षण^४

जिम ज्वर मे रोगी के शारीर मे अन्दर से दाह हो और ऊपर में सर्दी लग रही हो, शोय, वेचैनी और श्वास हो तथा अग जन्ते हुए प्रतीत हो रहे हो उसे अन्तर्दाह सिन्नप्तत जानना चाहिए।

वक्तव्य-यह 'अन्तर्वेगी ज्वर" के समान है।

घोणाविवग्झरद् बहुञोणासिनलोहितं सान्द्रम् ।
 विछठन् मस्नकमभिन कुम्मोपाकेन पीटितं विद्यात् ॥ आ० वि०

उत्किप्य य स्वमङ्गं क्षिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छ्वसिति ।
 त प्रोणुनावजुष्टं विचित्रकष्ट विजानीयात् ॥ आ० वि०

३ स्वेदभ्रमाङ्गमेदा कम्भे दवशुर्वमिर्व्यथा कण्ठे। गात्रज्ञ गुर्वेनीव प्रलापिजुष्टस्य जायते लिङ्गम्॥ भा० वि०

४ अन्तर्दाह गैत्य बहि श्रयशुररतिरति तथा श्रास । अङ्गमपि दग्धग्रल्प मोऽन्तर्दाहादित कथित ॥ आ० वि०

५ अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलाप श्वमनं भ्रम । सन्ध्यस्थिशुल्मस्त्रेटो दोपवर्चोविनिम्रह ॥ अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत् । च० चि० ३

(५) दण्डपात सम्निपात ज्वर के लक्षण

जिस ज्वर मे रोगी को न दिन मे, न रात मे नीद आती हो, वह भ्रमवश आकाश से कोई वस्तु (जो होती नही है) पकड़ने की चेष्टा करता है और उठकर जैसे कोई लाठी अचानक नीच गिर जाय, वैसे गिर पडता है तथा भ्रम से व्याकुल होकर चारो ओर घूमता रहता है, उसे 'दण्डपात' सिन्नपात कहते है।

(६) अन्तक सिन्नपात ज्वर के लक्षण^२

इस ज्वर मे रोगी के समस्त शरीर मे गाँठे निकल आना एव उदर मे वायु भर जाना तथा निरन्तर दम फूलना और वेहोश हो जाना, ये लक्षण होते हैं।

(७) एणीवाह सिंत्रपात ज्वर के लक्षण³

रोगी के शरीर मे अतिशय पीडा होना, शरीर पर सर्प, पक्षी या हरिणो के समूह के दौडने जैसा अनुभव होना, शरीर मे दाह तथा कम्पन होना, ये 'एणीदाह' सिल्निपात के लक्षण हैं।

(८) हारिद्रक सम्निपात ज्वर के लक्षण^४

जिस ज्वर मे रोगी का शरीर अत्यन्त पीला हो गया हो, आँखें और भी अधिक पीली हो और उनसे भी अधिक पीलापन मल मे हो गया हो, शरीर के भीतर दाह और वाहर ठडक लग रही ही, तो उसे 'हारिद्रक' सिश्नपात जानना चाहिए।

(९) अज्ञेघोष सम्निपात ज्वर के लक्षण

इस ज्वर मे रोगी के नेत्र ताम्रवत् लाल हो जाना, शरीर से बकरे के समान गन्ध आना, कन्धों में पीडा और गलावरोध होना, ये लक्षण होते हैं।

(१०) भूतहास सिन्नपात ज्वर के लक्षण

इस ज्वर मे रोगी की ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र-स्वक्-चक्षु-जिह्वा घ्राण) अपने-अपने विषयो (क्रमश शब्द-स्पर्श-रूप रस-गन्ध) को नही ग्रहण कर पाती हैं और रोगी वे-वजह हँसता रहता है और प्रलाप करता रहता है।

- १ नक्तिवा न निद्रामुपैति गृह्णाति मूहधीनैयस । उत्थाय दण्डपाती भ्रमातुर सर्वती भ्रमति॥ भा० वि०
- २ सम्पूर्वते शरीर प्रन्थिभिरभितस्तथोदर मरुता। श्वामातुरस्य रानत विन्वेतनम्यान्तकार्तस्य॥ आ० वि०
- ३ परिधानतीव गात्रे रुग् गात्रे सुजगपतङ्गहरिणगण । नेपशुमत सदाहस्यैणीदाहरूनरार्तस्य ॥ आ० वि०
- ४ यग्यानिपीतमङ्ग नयने सुतरा मल्स्ततोऽप्यधिकम् । दाहोऽतिशीतता बहिरस्य स हारिद्रको श्रेय ॥ आ० वि०
- ५ छगलकसमानगन्ध स्कन्धरुजावान् निरुद्धगलरन्ध । अज्ञघोपसिंद्रपातादाताम्राक्ष पुमान् भवति ॥ आ० वि०
- ६ शब्दादीनिधगच्छिति न स्वान् विषयान् यदिन्द्रियमामै । इसति प्रखपति पुरुष स श्रेयो भूतद्दामार्त् ॥ आ० वि०

(११) यन्त्रापीड सम्निपात ज्वर के स्थण

जिस ज्वर मे रोगी को अपना शरीर वार-वार ज्वर के वेग से कोल्हू मे पेरने के समान पीडित होता हो और रक्तसहित पित्त को वमन होता हो, उसे 'यन्त्रापीड' सिलपात ग्रस्त समझना चाहिए।

(१२) संन्यास सिन्नपात ज्वर के लक्षण^२

सन्यास सिन्नपात मे अतीसार और वमन होता है। रोगी अन्यक्त शब्द करता है, बहुत देर तक अपने अगो को इधर-उधर फेंकता रहता है, प्रलाप करता है तथा उसका नेत्रमण्डल देखने मे उग्र हो जाता है।

(१३) संशोषी सन्निपात ज्वर के लक्षण³

इस ज्वर मे रोगो को दस्त अधिक लगने से शरीर काला पड जाता है और नेत्र-मण्डल भी काला पड जाता है तथा शरीर मे सफेंद फुन्सियों के घेरे वन जाते हैं।

चतुर्थं भेदवाले तन्त्रान्तरीय सुन्निपात के लक्षण

(१) घीताङ्ग सित्रपात ज्वर के लक्षण

जिस सिन्नपात ज्वर मे रोगी का शरीर वर्फ के समान शीतल हो तथा श्वास, कास, हिचकी, मोह, कम्पन, प्रलाप, यकावट के साथ कफस्राव एव वातप्रकीप, दाह, वमन, अगो मे पीडा और स्वरविकृति हो, उसे 'शीताक्त्र' सिन्नपात जानें।

(२) तन्द्रिक सिश्रपात ज्वर के लक्षण

जिस ज्वर मे रोगी को अधिक तन्द्रा, प्यास, अतिसार, श्वास, खाँसी, कारीर में उष्णता, गले में सूजन तथा खुजली एवं कफ हो, जीभ काली हो, थकावट, कानों सें कम सुनाई देना और दाह हो, उसे वैद्य लोग त्रिदोषज 'तन्द्रिक' सित्रपात ज्वर कहते हैं।

१ येन मुहुर्ज्वरवेगाद् यन्त्रेणेवावपीडश्वते गात्रम् । रक्त पित्त च वमेद् यन्त्रापीड स विश्वेयः॥ आ० वि०

२ अतिसरित वमित कूर्जित गा गण्यभितश्चिर नर क्षिपित । सन्याससिक्षपति प्ररूपत्युत्राक्षिमण्डलो भवति ॥ आ० वि०

३ मचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मलोत्सर्गात् । सशोपिणि सिनपिटकामण्डलयुक्तो ज्वरे नरो मवति ॥ मा० वि०

४ हिमशिशिरशरीर सन्निपातज्वरी य, श्रसनकसनिहत्तामोहकम्पप्रलापे । वलमबहुकफवातैर्दाहवम्यद्गपीडास्वरविकृतिभिरातै शीतगात्र स उक्त ॥ आ० वि०

५ तन्द्राऽनीव ततस्त्याऽतिसरणं श्रासोऽधिक कासरुक् सन्तप्ताऽतिननुगलेश्वयथुना सार्धकञ्च कण्द्व क्षेक् । सुरयामा रशना कलम श्रवणयोर्मान्बञ्च दाहस्तथा यत्र स्यात् म हि तन्द्रिको निगदितो दोषत्रयोत्थो ज्वर ॥ आ० वि०

(३) प्रलापक सम्निपात ज्वर के लक्षण

जिस ज्वर मे तीनो दोपो के अतिप्रकुपित होने से रोगी अधिक प्रलाप करता हो, सहसा वरीर मे कम्पन, पीडा, उठने मे लडमडाकर गिरना, दाह और अत्यन्त वेहोशी होना, ये सब लक्षण हो तो उसे इस भूमण्डल मे 'प्रलापक' सन्निपात कहते हैं।

(४) रक्तव्ठीवी सम्निपात च्यर के लक्षण^२

घूक्ने पर रक्त निकलना, घारीर में लाल काले चकत्ते निकलना, आंखों में लॉली, अधिक प्यास, अरुचि, वमन, श्वास, अतिमार, भ्राग, उदर में वायु भरना, वेहोशी, उठने में गिर पडना, हिचकी, अगों में अतिशय पीडा होना, ये 'रक्तप्ठीवी' सिन्नपात ज्वर के लक्षण हैं।

(५) मुग्ननेत्र सन्निपात ज्वर के सन्नण³

जिस मित्रपात ज्यर में रोगी के नेत्रों में देखायन हो एवं श्वास, साँसी, तन्द्रा, अधिक प्रलाप, मद, कम्पन, बहरापन तथा मोह हो, उसे 'मुग्ननेत्र' कहते हैं।

(६) अभिन्यास सम्निपात क्वर के लक्षण

जिस सिन्नियात ज्वर में वातादि तीनो दोप अत्यन्त प्रग्नुपित तथा वलवान् हो एवं रोगी में अधिक मोह, निक्षेण्टता, म्हाम, मूकता, दाह, मुख पर चिकनाहट, अग्निमान्छ एवं निर्वलता, ये लक्षण हो, उसे 'अभिन्यास' सिन्नियात कहते हैं।

(७) बिह्नक सम्निपात उवर के सम्राण

जिस सिन्नपात ज्वर में रोगी की जिह्वा मे अत्यन्त कठिन कांटे पड जायें तथा

यत्र च्यरे निखिलदोपनिनान्तरोपजाते प्रकापबहुला सहसोरिथताथ ।
 कम्पन्यथापननदाहिनसपता स्युनाम्ना प्रकापक इति प्रथित पृथिन्याम् ॥ आ० दि०

निष्ठोवो मधिरस्य रक्तमदृदां कृष्णं तनी मण्डलं
 नीदित्य नयने तृपाऽरिचविमधासानिमारभ्रमा ।
 आध्मानं च विसंशता च पतनं दिक्काऽद्वपीटा मृशं
 रक्तष्ठीविनि मनिपात तनिते लिक्कं ज्वरे जायते ॥ आ० वि०

मृश नयनवकता श्रमनकामतन्द्रा भृशं प्रमापमदवेपशुश्रवणहानिमोहास्तथा । पुरा निज्ञित्रोपने भवति यत्र लिङ्गं ज्वरे पुरातनचिकित्सके स इह गुरननेहो मत ॥ आ० वि०

दोप न्तीव्रतरा भवन्ति बिलन सर्वेऽपि यत्र ज्वरे
 मोहोऽनीव वित्रेष्टनो विकलता श्रासो मृश मूकता ।
 वाहशिक्षणमाननज दहनो मन्दो वलस्य क्षय सोऽभिन्थास इति प्रकोर्तित इह प्रावर्धिपरिम पुरा ॥

त्रिदोपजनिते ज्वरे भवति यत्र जिह्ना भृश
 षृत्ता कठिनमण्टकस्तदनु निर्मरं मूकता ।
 श्रुतिश्चतिवरक्षनित्रसनकाससन्तप्तता
 पुरातनिभपग्वरास्तिमह जिह्नकं चक्षते ॥ आ० वि०

उसकी जवान बन्द हो जाय, वह बहरा हो जाय, वलहीन हो जाय, श्वास, खाँसी तथा शरीर में तापाधिक्य हो, तो उसे 'जिह्नक' सम्निपात कहते हैं।

(८) सन्धिग सम्निपात ज्वर के लक्षणी

जिस ज्वर में सिन्धयों में अतिशय पीडा और शोथ हो, मुख में कफाधिक्य हो जाता हो, नीद न आती हो तथा खाँसी आती रहती हो, उसे 'सिन्ध्या' सिन्नपात कहते हैं।

(९) अन्तक सम्निपात ज्वर के लक्षण

जिस ज्वर में रोगी लगातार शिर हिलाता रहे, सर्वाङ्ग में पीडा हो, खाँसी, हिचकी, श्वास, दाह, मोह देह में अत्यन्त सन्ताप, विकलता और व्यर्थ बोलते रहना, ये सब लक्षण हो, उसे 'अन्तक' सिन्नपात कहते हैं।

(१०) रुग्दाह सिन्नपात ज्वर के लक्षण³

जिस सिन्नपात ज्वर मे रोगी को अधिक दाह तथा प्यास हो एव श्वास, प्रलाप, विपरीत रुचि, भ्रम, मोह, अंगो मे पीडा, मन्या तथा हुन मे अधिक वेदना, कण्ठ मे पीडा, थकावट, ये सब लक्षण हो- रहे हो, उसे राबाह सिन्नपात ज्वर जानना चाहिए। (११) चित्तविभ्रम सिन्नपात ज्वर के लक्षण

जिस ज्वर मे रोगी गाना गाता है, नाचता है, हँसता है, प्रलाप करता है, विकृत ढग से देखता है, दाह, पीडा तथा भय से व्याकुल होकर मूज्लित हो जाता है, उसे 'चित्तविश्रम' सिक्षपात जानना चाहिए।

(१२) कणिक सिमपात ख्वर के लक्षण

जिस त्रिदोषज ज्वर मे कर्णमूल मे शोथ और पीडा हो, कण्ठ मे अवरोध, श्वास, प्रलाप, अधिक पसीना निकलना, मोह तथा दाह होता हो, तो उसे 'कणिक' सिन्नपात कहते हैं।

१ व्यथाऽतिशयिता भवेच्छ्वययुसयुना सन्धिषु प्रभूनकफता मुखे विगतनिद्रता कासरुक्। समस्तमिति कीर्तिन भवति रुक्ष्म यत्र व्वरे त्रिदोपजनिते बुधे स हि निग्यते सन्धिगः॥ आ० वि०

२ यस्मिँ ह्रक्षणमेनदस्ति सक्तेवैर्षेषे रूदीते ज्वरे-ऽनस्र मूर्धविधूनन सकसन सर्वाद्गपीडाऽधिका। हिकाकाममदाहमोहसहिना देहेऽतिमन्तप्तता वैकल्यञ्च षृथा वचामि, सुनिभि सङ्गीतित. सोऽन्तक ॥ आ० वि०

३ दाहोऽभिको भवति यत्र तृषा च तीवा श्वासप्रकापविरुचिन्नममोहपीदा.। मन्याहेनुन्यथनकण्ठरुज श्रमश्च रुग्दाहस्त्र उदितक्षिमवो ज्वरोऽयम्॥ आ० वि०

४ गायति नृत्यित इसिन प्रलपति विकृतं निरीक्षते मुझेतः । टाइच्यथाभयातौ नरस्तु चित्तभ्रमे च्वरे भवति ॥ आ० वि०

५. दोषत्रयेण जनित किल कर्णमूले तीवा ज्वरे भवति तु श्वयुर्व्या च । कण्ठमहो विधरता श्वसन प्रलाप. प्रस्वेदमोहदहनानि च कर्णिकाल्ये ॥ आ० वि०

(१३) कण्ठकुरज सन्निपात ज्वर के लक्षण

जिस ज्वर मे रोगी का कण्ठ सैंकडो धान आदि के शूको (दूडो) से आदृत जैसा प्रतीत होता हो तथा अधिक श्वास, प्रलाप, अरुचि, दाह, शरीर मे पीडा, प्यास, हनुस्तम्भ, शिर शूल, मोह और कम्पन होना, ये सब लक्षण हो, उसे कण्ठकुटज सिन्नपात कहते हैं।

सन्निपात ज्वरो का सापेक्ष निदान

विभेदक लक्षण


- १ वातोल्वण (विस्फारक) मे १ पार्ववेदना २ जृम्भा ३ कपायास्यता।
- २ पित्तोत्वण (आश्कारी) मे १ मुखपाक २ लाल दाने निकलना ३ दाह ।
- ३ वफोल्बण (कम्पन) मे १ टूटी याणी २ राप्त्रि निद्रा ३ मुखमाधूर्य।
- ४ वातिपत्तीत्वण (वभ्रु) मे १. मुलशोप २ आध्मान ३ भ्रम ।
- ५ वातकफोल्वण (धों घ्रकारी) मे १ शीतज्वर २ दवथु ३ पार्श्वग्रह ४. अस्वेद।
- ६ पित्तकफोल्वण (भल्लु) मे १ दक्षिण पादवंशूल २ उरोग्रह ३ गलग्रह ४. कफपित्त निर्गम कुच्छूता ।
 - ७. हीनवात-मध्यपित्त-कफाधिक (वैदारिक) मे उछ्वास की अधिकता।
 - ८ हीनवात-मध्यकफ-पित्ताधिक (याम्य) मे पक्षाघात ।
- ९ हीनपित्त-मध्यकफ-चानाधिक (क्रकच) मे १ रक्तनेत्रता २ स्तब्धनेत्रता ३. शरीर-छिद्रो से रक्तनिर्गम ।
- १० हीनपित्त-मध्यवात-कफाधिक (ककंटक) मे १ हृद्दाह २ यकृत् प्लीहा पाक ३ अर्ज्ञा रक्तार्यनिगंग ४ शीणंदन्तता ।
 - ११. हीनकफ-मध्यपित्त वाताधिक (सम्मोहक) मे १ मोह २. मूर्च्छा ।
- १२. हीनकफ-मध्यवात-पित्ताधिक (पालक) में १ मुख मे रक्ताभा २ वक्ष मे कफग्रस्तता।
- १३ सर्वदोपोल्यण (कूटपालक) मे क्षण मे दाह, क्षण मे शीत आदि पचीसो लक्षण पूर्वकथित के अनुसार।

सन्निपात ज्वर-चिकित्सा

चिकित्सासूत्र

सित्रपात ज्वर दो प्रकार का होता है--- १ विषम सित्रपातज्वर और २. सम- सित्रपातज्वर।

रै. कण्ठ शूकशतावरुद्धवदितिश्वास प्रलापोऽकचि-दोंहो देहकजा तृपाऽपि च हनुस्तम्भ शिरोऽर्तिस्तथा । मोहो वेपशुना सहेति सकलं लिङ्गं त्रिदोपज्नरे यत्र स्यात् स हि कण्ठकुष्ण उदितः प्राच्येश्विकित्मावुषे ॥ गा० वि०



(१) विषम सम्निपात ज्वर का चिकित्सा-सूत्र

यह विषम रूप से बढे हुए दोषों से होता है। जैसे—हीन, मध्य तथा अधिक और दृढ, दृढतर एव दृढतम दोष ज्वर की उत्पन्न करते हैं।

ऐसे विषमसित्रपातारव्य ज्वर मे, एक दीष की वढाना और वृद्धतर तथा वृद्धतम दो दोषो को घटाना चाहिए। इसमें दोषो की उत्वर्णता के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जो दोप हीन हो, उसे वढाकर तथा जो दोष वढा हो, उसे घटाकर दोषो को एक समान स्थिति में लाकर चिकित्सा करनी चाहिए। वयोकि दोषो के समान भाव में हो जाने पर ज्वरनाशक औषधो का प्रभाव ठीक होता है। जैसे—

- (१) सिन्नपात ज्वर में, जब वात बृद्धतम, पित्त बृद्धतर और कफ बृद्ध हो, तो वात पित्त को घटाकर एवं कफ को बढ़ांकर, तीनो दोषों को सम अनुपात में लाना चाहिए और तब सिन्नपात ज्वर की समुचित चिकित्सा करनी चाहिए। इस स्थिति में स्निग्ध-शीत मधुर ज्वरनाशक औषध का सेवन करने पर बृद्धतम वात की कमी होगी, पित्त का प्रशमन होगा और कफ की कुछ अंश में बृद्धि होगी, जिससे तीनों दोष समान स्थिति में हो जायेंगे और तब फिर सिन्नपातज्वरघन औषध का प्रयोग ज्वर को शान्त करने में सफल होगा।
- (२) इसी तरह वातहीन, पित्तमध्य, कफवृद्ध सिन्नपात ज्वर में, शीत-रूक्ष एव लघु गुणयुक्त औपद्य द्रव्यो का जव प्रयोग किया जाता है, तब वात की वृद्धि होकर, पित्त तथा कफ का क्षय होकर, दोपो की समान अवस्था हो जाने पर ज्वरध्न औषद्यो का समुचित प्रभाव होता है।
- (३) पित्तहीन, वातमध्य, कशब्द्ध सिन्नपात ज्वर मे तीक्ष्ण-उष्ण-कदु रसंयुक्ति ज्वरघ्न द्रव्यों के प्रयोग से पित्त की वृद्धि एवं वात तथा कफ का ह्रास करके चिकित्सा करनी चाहिए।

इम बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए, कि जब तक दोष समान मान मे नहीं होगे, तब तक ज्वरनाशक औषधो का ठीक़-ठीक झसर नही होगा।

(२) सम सम्निपातज्वर,का चिकित्सा-सूत्र

9 यह वात-पित्त-कफ के समान रूप से प्रकुपित होने से होता, है। इमिलए इसकी चिकित्सा मे ऐसी औषधो का प्रयोग करना चाहिए, जो सभी दोपो को शान्त करने मे समान रूप से कार्यकारी हो।

२. समदृद्ध दोषो से होने वाले सिन्नपात ज्वर में कफम्यानानुपूर्वी विकित्सा

१ वर्धनेन महोपस्य क्षाणेनो च्छतस्य च। चरकं विव

करनी चाहिए अर्थात् कफदोप तथा ज्यण्जनक स्थान आमाशय के अनुसार (जिससे कफ एव आमाशय इन दोनो का शोधन हो जाये ऐसी) चिकित्सा करनी चाहिए।

३. आचार्य भेल के अनुसार सम सिन्नपात ज्वर में पहले बाम और कफ, इन दोनों को नष्ट करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिए। कफ तथा आगदीय के क्षीण हो जाने पर पित्त तथा वायु का शमन करना चाहिए।

४. अन्यत्र भी समनृद्ध सन्निपात ज्यर मे प्रथमत कफ की ही चिकित्मा करने का निर्देश है—'क्लेप्मनिग्रहमेत्रादी कुर्याद् ज्याधी त्रिदोयजे'।

५ आचार्य सुश्रुन ने उक्त मत से भिन्न मत प्रकट किया है, कि 'सिन्नपात ज्वर मे सबसे पहले पित्त का धमन करना चाहिए, विधोक ज्वर से सपीडित रोगी के पित्त का शमन करना कठिनतर होता है।'

सुश्रुत के इम कथन के समर्थन में कितपय विद्वान् चरक के 'कफस्थानानुपूर्व्या वा' का अर्थ इम प्रकार करते हैं --- 'कफस्य म्यान स्यान यस्य तस्य आनुपूर्व्या' अर्थात् कफ का स्थान (आमाशय) जिनका स्यान है, ऐसे पित्त की पहले चिकित्सा करनी चाहिए ?"

६. इस प्रकार चरक के अनुगार प्रथम कफ और आमाशय की चिकित्सा तथा सुश्रुत के अनुमार प्रथम पित्त की चिकित्मा का मिद्धान्त, पृथक् पृथक् दृष्टिकोण से अपनाया गया प्रतीत होता है। एवश्व सुश्रुत का मत्र जीगंसिय्रपात ज्वर की चिकित्सा से है और चरक का मत नवीन सिप्तपात ज्वर की चिकित्सा से है।

७. सिन्नपात ज्वर मे जब अस्यधिक सताप हो, तो मारसे पहले सताप को शान्स करने का उपचार करना चाहिए। ज्वर की ही तरह अतिसार की उग्रावस्था मे भी पित्त के शमन का ही उपदेश दिया गया है। "

समसन्निपात ज्वरो में चिकित्साक्रम

समित्रदोपज सित्रपात ज्वरों में सबसे पहले आम तथा कफ से सम्बद्ध विकारो

१. कफस्थानानुपूर्व्या वा सत्रिपातज्वरं जयेत् । च० नि० ३।२८७

सित्रपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफापहम्।
 पश्चाच्य्लेष्मणि महस्राणे झमयेत् पित्तमारती॥

३ शमयेत् पित्तमेवादी जीरणु समवायिषु । दुनिवारतरं निक्ष चदरानीषु विशेषत ॥ सु० नि० स० ३९

४ चरक चि० अ० ३।२८७

५ अन्ये तु कफाग्धानमामाश्यस्प म्याने यस्य नत् कफाम्थानं पित्तिनि पश्चात्यद्रलीपादुष्ट्र-सुरावद् बहुवीहि वदन्ति, तनश्च पित्तानुपूर्व्या जयेन्द्रियर्थं । घ० चि० ३१२८७ पर चक्रपाणि ।

६ सुश्रुत्यचर्नं हि जाणित्रदोषाभिषायेण श्रेयम्, ज्तच्न प्रथमीत्पन्नमित्रपातस्वरचितित्सत कफस्यानानुपूर्व्या श्रेयन् । "च० नि० ३।०८७ पर चक्रपाणि ।

७ समनाये तु दापाणां पृत्तं पित्तमुपाचरेत् । न्वरे नैवानिमारे च मर्वत्रान्यत्र मारतम् ॥

को दूर करने के लिए—१ लघन, २ वालुकास्वेद, ३. नस्य, ४. निष्ठीवन ५ अवलेह और ६ अजन का यथोचित रूप से प्रयोग करना चाहिए।

9 ज्वर मे आमदोप के कारण स्रोतो में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, अत सर्वप्रथम लघन कराना चाहिए, जिससे आम न बने और शरीरस्थ आम का पाचन हो जावे।

२ आमराचनार्थं स्रोठ-मरिच-पीपर के समभाग का चूर्णं खिलाना चाहिए।

३ यदि कफ के जमने से वक्ष स्थल में जकडाहट हो, तो हल्का सेंक करना चाहिए।

४. शिर मे भारीयन और स्तव्धता हो, तो नस्य देना चाहिए।

५ यदि कण्ठ मे कफ जकडा हो, तो ऐसी औपध देवे, जिससे बार-बार थूकने की प्रवृत्ति हो और कफ ढीला होकर निकल जावे।

४ यदि कफ सूख गया हो, तो उसे ढीला करके निकालने के लिए अवलेह या चटनी जैसी चीज चढाना चाहिए।

७. यदि रोगी की चेतना लुप्त हो जाती हो और उसे वेहोशी होती हो, तो उसके नेत्रो मे अजन लगाना चाहिए, जिससे उसकी वेहोशी या तन्द्रा दूर हो जाय।

(१) लघन

लघन शब्द के दो अर्थ लिये जाते हैं—१. उपवास और २ लघुभोजन । लघन की अविध दोपानुसार होती है । र जैसे —

वाताधिक सन्तिपात ज्वर मे ३ दिन उपवास करावे।

पित्ताधिक ,, ५ दिन ७,,

कफाधिक ,, १० दिन ,, ।

अथवा--जब तक आम का पाचन न हो जाय, तब तक लघन करावे।

(२) स्वेदन

- १ स्वेदन से शरीर के रसवहस्रोत और स्वेदवहस्रोत खुल जाते हैं।
- २ ,, ,, शरीर मे पसीना होता है और कफ क्षीण हो जाता है।
- ३ ,, ,, शरीर के भीतरी विष पसीने द्वारा वाहर निकल जाते है।
- ४ ,, ,, शरीर का ताप कम हो जाता है एव शरीर हलका हो जाता है।
- ५ उक्त लाम की दृष्टि से पुन स्वेदन करना चाहिए।
- ६ कफोल्वण या वातकफोल्बण सिन्नपात मे स्वेदनकमं विशेष लाभप्रद होता है।

१ लङ्कन वालुकास्वेदो नस्य निष्ठीवनं तथा। अवलहोऽअन त्रवे प्राक् प्रयोख्यं त्रिदोपने॥ मै० र्०

२ चिरात्र पन्नरात्रं वा दशरात्रमथाऽपि वा। छङ्कम मन्त्रपातेषु कुर्यादारोग्यदर्शनात्॥ आ० वि०

स्वेदन के प्रकार -

9. बालुकारवेर—मूज लोग जिम बालू में भूता भूतने हैं, यह बालू देशव कपड़े में रसकर गोलाकार पोरसी गा के और उमे नाक्की में दुवोकर तमे पर मरम कर उनने मुनोब्ज नेक करें। विविष्ण के मनिव स्पानी म स्वेयन करें।

हरव-प्रदेश तमा बन स्थल पर मृतु स्रोटन करे।

- संन्यव स्वेद—नेवानमक को नारीक पीएकर पोटकी चनाकर समे पर गरम का उसमें स्वेटन परे।
- ३ किनाट रवेश--गोवा की पोटली बनाकर छममे जरण्यक सपा पार्थ का स्वेश्न गरे।

४. युत का अभ्यत्त पुराने भी में सेंधानमक और मनूर निलाकर नक्ष तथा दानी पार्श्वी में मान्सि परे।

(३) नस्म

ताला, प्रचार, पूर्णों और शिर के भागीन में शिरा परवों या प्रमीन करें- -

- १. मोठ मन्त्रिनीर का नागेक पूर्व बतारर मन्य प्रतीन परे।
- २ वहपन वी छान ने महीन फरन्छन पूर्व का नन्य है।
- ३ 'म्हातरहार पर्य अपधा 'तुप्तानु रस' ने मुख्य पूर्ण था नस्य है।
- र विश्वीना नीत् पौर लार्क में ग्यापी हण्या गरम करते छलारे मेशानमक, काण्यनपर और मोश्यासक का पूर्ण मिलाकर नरम दे।

(८) निष्ठीवन

बन साची तथा चान की योग हो, यहे म साधी में कप, जगा हा, विद में पूरता तथा स्वाधारों, तो विद्धार का प्रयोग की । विदे---

ी सोठ-१रिव तीवर तथा नेधायमस्त पूर्व की भारता के रस में मिलावर मुख में संबल अध्य की भीर पुन्त में क्रम भारते पर भूगता रहे। ऐसा आयहब-कतानुसार अनेर पार ग्रम्मा वाहिए।

२ कालोगियों के पूर्ण में द्वा गुण्या भीनी मिलाकर शीभी में रस के और जनमें वे कीटा पोंं के किर गृत में पूरा रहा अब मुख में अक गर जाये, तो इस पूर्ण के भीण कर निकालता रहा।

(५) अवनेह

अब राम न रिक्त रहा हो, गर्ने में भरधराहट हो, गामी याती हो और कण्ठ में अपरोध नामूम हो, तो योगी योगी देर पर आधा नम्मप अध्याङ्गाउलेहिका चाटना नाहिए।

योग-नद्धार, पुटकरपूल, चोठ, मरिच, पीपर, पाकरागिमी, नवाया और जीरा के पमभाग चूर्ण में ची ह्वा मध् मिटाये।

इमे बार-बार चाटने से जाम होता है।

(६) अञ्जन

जब रोगी को तन्द्रा, बेहोशी या मूर्च्छा आती हो, तो नेत्रो मे शिरीषाञ्जन का प्रयोग करना चाहिए।

योग—शिरीप का बीज, पीपर, कालीमिर्च, सेघानमक, छिलका रहित लहसुन, शुद्ध मैनिंगल और वन, इनको समान भाग मे लेकर पीसकर जब के आकार की वर्ती बनावे तथा आवश्यक होने पर पानी में घिन्नकर आँखों में लगावे।

सन्निपात ज्वर मे निषिद्ध-

१ कॉपते हुए तथा प्रकाप करते हुए मंज्ञिपात ज्वर के रोगी की घृत अयवा मास आदि वृहण द्रव्य नहीं देना चाहिए।

२ सित्रपात जार के रोगी को यदि दाह मालूम हो रहा हो और प्यास की अधिकता हो, तब भी उसे शीतल जल नहीं देना चाहिए।

आवस्थिक चिकित्सा

(१) शिरोगौरव

दस वर्ष का पुराना घी (या जितने वर्ष का पुराना मिल मके) लेकर उसमें कपूर मिलाकर शिर और ललाट पर लगाना चाहिए।

(२) शिर'शूल

हिमाशु या हिमसागर या पड्विन्दु तेल शिर पर तथा हाथ-पैर के नलवे पर लगाना चाहिए।

(३) प्रलाप मे

अण्डे की जर्दी का शिर पर लेप करना चाहिए।

(४) कास-श्वास और पार्श्वशूल मे

१ विधिवत् बनाये हुए दशम्ल क्वाथ मे पीपर का चूर्ण १-२ ग्राम मिलाकर, पिलाना चाहिए। अथवा —

२ दशपूरा की दस औषधों के साथ चिरायता, नार्यरमोया, गुरुच और सीठ, समभाग मिलाकर क्वाथ बनाकर उचित मात्रा में पिलावे। या—

३ यदि रोगी को विवन्ध भी हो, तो उक्त क्वाय मे निशोध का चूर्ण ३-४ प्राम मिलाकर पिलाना चाहिए। यह चतुर्देशाङ्गक्वाय (भै० र०) है। या—

४ दशमूर के दस द्रव्य, कचूर, काकड़ार्मिगी, पुष्करमूल, यवामा, भारगी, इन्द्रजी, पराल के पत्ते और कुटकी, इन १८ द्रव्यो को सम भाग मे लेकर क्वाय कर

१ मित्रपाते प्रकारपन्त प्ररूपन्त न वृह्येत्। तृष्णादाद्याभभृतेषु न दचात् शीनलं जलम् ॥ गै० र०

५० मि० छो० की मात्रा में आवश्यकतानुमार पिलावे । यह गांगी, श्वास, पराणी के दर्द और विवाध की उत्तम औषध है । यह अध्टावशाङ्गववाप (भी० र०) है ।

(५) तन्द्रा, प्रलाप और कात मे

विरायता, देखार, मोठ, नागरमोधा, मुटाँ, धनिया, इन्द्रजी, गजधीपर और दशमूच के उस द्रायों का नवाय बताकर मोर्ने शाम विरावे । यह भूनिम्बादि बच्टादशासु नवाम (भैं रु.) है।

(६) वातोत्वण सम्निपात मे

प्रत्य पत्तमूल (सेल्यो हाल, मिया मी हाल, पाठण मी हाल गरमार मी हाल और मीनापाठा मी हाल) या नवाय बवानर ५० मि० मी० मी मापा में दिय में के बाल पिलावे । नोगी के सल के अपनार इसे अपि उटण या मुगोल्य या यम या अधिक मावा में देवा चाहित्।

रसप्रयोग---

दिन मे ४ यार, ३-३ पण्टे पर
वेताण रम ५०० मि० ग्रा०
प्रश्वानिक्तामण ५०० मि० ग्रा०
मोग ८ मात्रा
आर्थक रवस्य और मधु ने ।

नाडीशैपित्य और प्रकाय मे-

दिन में ६ नार

मृहपु गम्तूरीनैरम ५०० मि० प्राठ गोगेन्त्र रम ५०० मि० प्राठ गरणनपुर्मुन ५०० मि० प्राठ गोगे ४ मात्रा

मीठा पर पूर्ण १ याम और मधुन ।

(७) विलोत्यण मित्रवात मे

१ वावपत्यन युराया, विन्तवावया, राम, मुगन्यप्राला, नागरमोधा, कम्छ रे फूल, कमण्यक्य, मौक, धनिया, वयाम और अविले के समनाम का नपाय ५० मि० लो० की मात्रा पे दिन के २ बार दे । अथवा ---

२ फाउमा के फल या पत्ते, ऑवजा, हर्रे, यहेगा, देवदार मा बुरावा, कायफल, लाज्यन्दन धूरा, पद्मकाठ, मुटकी और पिठान के समभाग का क्वाय, रोगी के बकानुमार उचित मात्रा में विलान से दाहज्वर मान्त हो जाता है। तथा— दिन मे ४ वार—
सौभाग्य वटी १ ग्राम
मुक्तापिष्टी २५० मि० ग्रा०
प्रवालपिष्टी ५०० मि० ग्रा०
योग ४ मात्रा

वडी लायची के २५० मि० ग्रा० चूर्ण और मधु से।

आवश्यकतानुमार प्रवालभस्म, प्रवालपचामृत, अकीकिपिष्टी, जहरमोहरा पिष्टी, गूडूची सत्त्व और गोदन्ती भस्म का यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए।

(८) कफोल्वण सन्निपात मे

छोटी कटेरी, वडी कटेरी, पुष्करमूल, भारगी, कचूर, काकडासिंगी, दुरालभा (यवासा), इन्द्रजी, परवल की पत्ती और कुटकी का क्वाय सन्निपात ज्वर के कास, श्वास, पाक्वंशूल, हृद्ग्रह आदि उपद्रवी का शमन करता है। यह वृहत्यादि क्वाय (भै० र०) है।

दिन में ४ वार—
महालक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्रा०
मकरञ्ज ५०० मि० ग्रा०
शुद्ध टकण १ ग्राम
योग ४ मात्रा
आईक स्वरम तथा मधु से।
अथवा—

दिन में ४ वार—

ग्रुगाराभ्र २५० मि० ग्रा०

शुद्ध टकण ५०० मि० ग्रा०

त्रिभुत्रनकीति ५०० मि० ग्रा०

कफकेतु रस ५०० मि० ग्रा०

योग ४ मात्रा

काकडानिगी के १ ग्राम चूर्ण और मधु मे।

(९) वातिपत्तील्बण सिन्नपात मे

१ सरिवन, पिठवन, छोटी कटेरी और गोलह का क्वाथ, दिन मे ३ बीर ५० मि० ली० की मात्रा मे पिलाना चाहिए। यह वाताधिक्य मे उपयोगी है।

२ पित्ताधिक्य मे गुरुच, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और नोठ, इनका क्वाथ ५० मि० ली० की मात्रा मे दिन ३ वार पिलावे।

(१०) वित्तरलेब्मोहबण सन्निवात मे

१ पित्तपापडा, लालचन्दन बुरादा, सुगन्धवाला और सोठ का ५० मि० ग्रा॰ क्वाथ दिन मे ३ वार पिलावे । यह पर्पटादि क्वाथ है । अथवा— २. गुरुव, इन्द्रवी, नीम की साम, पराल के पत्ते, बुटरी, सीठ, लालपादन बुरारा और नागरमीया का चवाय ५० जि० सी० दिन में ३ बार, पीपर का है प्राप नुर्ग जिलाहर दिलाना पाहिए। यह समृताब्दक क्वाय (भै० ४०) है।

यह चर्चि, समन, विवनी और दाह का समन करता है।

(११) बातककीन्त्रम मज़ियात जबर

हमने पैदों ने निकित्या का रिवान नहीं किया है, क्योंकि मह अमार्ग एक - पीछकारी होता है।

(१२) त्रिरीवीत्वम संधिपात मे

१. मोठ, एनिया, भारेगी, पंचनार राज्यारा गूरा, प्रमण मी पती, मीम मी सान, शीमरा, हरी, क्षेत्रा, मुल्ली, क्षित्रार नी जब, नहनी, नागरमोधा, बन्तोपर, समन्त्राम, विरापना, गूल्य, दशमूल ने सभी इच्छ और वर्डनारी मी जा मानवाम ५० विरुक्तीत मी माला, दिन में दे दार पिलास महिए।

पर योगरात्र बताय (फेंट रंट) नितीय-मधान गतियाय कार को नम्ट बार्ने की विक्तिः श्रीपात है।

निडमीग--

न, दिन में ४ बार

नप्तरप्रीधेरा या ५०० मि० वाल यद्मायपूर्वेग या ५०० मि० वाल तिभूदनशीति ५०० मिल वाल मोदरभी भग्म १ दाम द्भाद दक्षण १ वाल

योग ४ मापा

खाईब राग्या तथा छत्। मे ।

(१३) निद्रानाश मे

त्रात न्याव

प्रकारित विशेष विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य व

मधु मे ।

शिवरसा मान्ति। विमेर्गतस्थिनोहबणे न्यरे ।
 नोधकारितया गण्यागाध्यायग्येव दर्जनाय ॥ भै० ०० (ज्यर०),
 ५ म० प्र०

२ रात मे ९ वजे

निद्रोदय रस १२० मि० ग्रा०

सर्पगन्धा वटी ५०० मि० ग्रा०

9 मात्रा

मधु से।

(१४) हृदयसरक्षणार्थ

दिन में ४ बार
हृदयाणंव रस ५०० मि० ग्रा०

मधु से। योग ४ मात्रा
या—

दिन मे ४ बार
महालक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्रा०

मधु से। योग ४ मात्रा

अष्टादशाङ्ग नवाय, चिन्तामणि रस, अकीक भस्म और जवाहरमोहरा का यथोचित प्रयोग करना चाहिए।

(१५) मूर्च्छा मे

दिन मे ३ वार
मूच्छन्तिक रस ३७५ मि० ग्रा०
मधु से। योग ३ मात्रा
या—
हेमगर्भपोट्टली रस २५० मि० ग्रा०
योग २ मात्रा

प्रात -साय मधु से दे।

तस्यार्थ—कट्फल की छाल का चूर्ण, बडी पीपर का चूर्ण या श्वासकुठार रस के नस्य से बेहोशी दूर हो जाती है।

(१६) फफवृद्धि, हिक्का तथा वमन मे

अष्टाङ्गावलेहिका, हिक्कान्तक रस और सूतशेखर रस का यथायोग्य प्रयोग करे। (१७) पार्श्व मे लीन और विष्टब्ध कफ मे

जब वायु या पित्त कफ को सुखा देते हैं, तो वह पार्श्वों मे शल्य के समान पीडा देने लगता है, अत उसे तीक्ष्ण नस्य, कवल-धारण या स्वेद से ढीला कर निकालना चाहिए। इसके लिए कट्फल की छाल के चूर्ण का या सेंघानमक-पागानमक-कालानमक मिधित आईक स्वरम या अथवा सीठ मन्त्रि-पीपर के पूर्ण की आईक स्वरम में विनाक्तर कवन धारण कराना चाहिए। जब तक कफ निकलार साफ न हो जाये, तब तक रम प्रयोग को करते रहता पाहिए।

(१८) ककाधिक शक्तिपात च्वर मे प्याम का उपनार

वप के मृग जाने में बार्यों गति प्रतिलोग हो जाती है और रोगी का मुग, बच्छ, पटा और तालू बादि मृगता रहता है, जियमें जन दार प्राय प्याय प्याती रहती है।

इसरे लिए क्या अनुनायक एवं दीवन वेय इन्यों का प्रयोग करना माहिए। इसे पीर पीर पीर पुन पाध-पीना गेड माधाग हा कर प्रधान हुआ है दिलाना पाहिए। इसे मुखीला ही जिलाने, का कि मिदियान मंदीकल के पीना निवाद है। इस के किला पाने पर प्रधानु की गति अनुनोग ही लाइ पर पिन का बन्ह भी क्या हो साथा है और इस हकार मिलाइ कर को विकास सामान हो जाती है।

उपद्रवयुक्त मिलपात ज्यर की चिक्तिसा

१ शीना द्व मनियात व्यव

इसने धरीर प चत्त अधिक पनीना निश्वना है, जिसते कारण धरीर का नापमान स्वाधारिक से भी समाही काता है और रोगी का जीवन समाम होने की स्थिति मुखा जाता है। धरीर एक इस उद्यापत आपा है, ऐंडल, मृन्छी, सामी और खार की वीदना हो जाती है।

उनके शमत के कित उद्या रशाय विकास और सूरत उपदेश तमाता कल्याणकर होता है। खेम--

- 9. माम्यःमृत्यदि ववाच (भै० रह) मदार की जर की छाल, औरा, मोठ, मन्चि, पीपर, भारकी १९८१ गी, चीठ और पुरत्तरमूठ, इनकी वमात्र भाग छेत्तर उज्ञय बनाकर, वीमुध मिलाकर विश्वता चालिए। इनके प्रयोग में सीनाङ्ग होना, क्या की वृद्धि नथा पूर्णों आदि उपप्रव साम्ब हो जाने हैं।
- २ स्वेबरोधक सबटा--शतवावन, वन, माठ, पीवर और मगरैगा वा महीन वपटणन नुमंबनागर शरीर में रगटना पातिए।

au 71 —

- नै भुनी हुई गुल्घी के चूर्ण का या अरहर में सत्तू का उबटन लगाना चाहिए। अथवा---
- ४. कट्फर का नुर्ण हाध-पैर के तलवों में मलना चाहिए।
- ५ चटइर कं मूर का नूणं, गुरुशी, पीपर, वच, फट्फल, स्याहजीरा, चिरायता, चीता, मुगन्यवाला और हरें का ममभाग चूणं शरीर पर उवटन की तरह मलने शे बीताङ्गता में लाभ होता है।

२ तन्द्रिक सन्निपात ज्वर

इसमे निम्न क्वाथ, नस्य तथा अञ्जन का प्रयोग करना चाहिए-

१ क्वाथ-छोटी कटेरी, गुरुच, पुष्करमूल, सोठ और हरें को समभाग लेकर क्वाथ कर पिलाना चाहिए।

२ नस्य--सोठ-मरिच-पीपर के चूर्ण मे अगस्त के फूल के स्वरस की भावना देकर शीशी मे रख ले और इसको सुँघने के लिए प्रयोग करे।

३ अञ्जन सेंधानमक, क्पूर, पीपर, मधु और घोडे की लार समभाग लेकर, सूक्ष्म बारीक पीसकर अञ्जन बनाकर सुरक्षित रख ले। इसके लगाने से तन्द्रा दूर होती है।

३ प्रलापक सन्निपात ज्वर

तीव्र सिन्नपात ज्वर के वेग मे रोगी असम्बद्ध बोलता है, अनाप-शनाप बकता है, चिल्लाता है और बिस्तर से भागता है। इस स्थिति मे तगरादि क्याय शीघ्र लाभकारी एवं प्रभावशाली औषध है।

योग—तगर, पित्तपापडा, अमलतास, नागरमोथा, कुटकी, लामज्जक (खश), असगन्ध, ब्राह्मी, मुनक्का, स्वेतचन्दन, शखपुष्पी और दशमूल की १० औषधे, इन्हें समभाग लेकर क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिए।

रस-प्रयोग----

विन मे ४ बार
सौमाग्य वटी ५०० मि० ग्रा०
योगेन्द्ररस २५० मि० ग्रा०
मुक्तापिष्टी २५० मि० ग्रा०
चतुर्भुज २५० मि० ग्रा०
योग ४ मात्रा

वाह्यी स्वरस और मधु से।

४ रक्तष्ठीवी सन्निपात ज्वर

जब यूक और खाँसी मे रक्त आता हो तो निम्न औषघो का प्रयोग करे-

१ रोहिषादि क्वाय—रोहिप घास, अरुस, पित्तपापडा, फूलप्रियगु और कुटकी, समभाग का क्वाथ चीनी मिलाकर, दिन मे ३ बार ५० मि० ली० की मात्रा मे दे। अथवा—

२ पद्मकादि क्वाय--पद्मकाठ, लालचन्दन बुरादा, पित्तपापडा, नागरमोत्रा, चमेली के फूल, जीवक, सफेद चन्दन, गुगन्धवाला, मुलहठी और नीम की पत्ती के सम भाग का क्वाय ५० मि० ग्रा० की मात्रा में दिन में ३ बार पिलाना चाहिए।

३ शमन प्रयोग---

दिन मे चार बार
रक्तपित्तकुलकण्डन ५०० मि० गा०
शुद्ध स्वर्णेगैरिक १ ग्राम
बोलपर्पटी १ ग्राम
लाक्षा चूर्ण २ ग्राम

योग ४ मात्रा-वासा स्वरस और मधु से । ५ भग्ननेत्र सन्निपात ज्वर

इसमें रोगी के नेत्र आधे खुले रहते हैं और वह बेहोश पडा रहता है। उसे होश में लाने के लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

अध्यग्नधादि नस्य—असगन्ध, सेधानमक, वच, काली मरिच, पीपर, सोठ और लहसुन को महुए की शराब तथा वकरे के मूत्र के साथ पीसकर कपडें की पोटली में रखकर नाक में टपकाना चाहिए।

६ अभिन्यास सन्निपात ज्वर

इनमे कारन्यादि क्वाथ तथा श्रुग्यादि क्वाथ का प्रयोग उत्तम लाभकर होता है।
 १ कारन्यादि क्वाथ—कलोंजी (मगरैला), पुष्करमूल, एरण्ड का मूल, त्राय-माणा, सोठ, गुरुच और दशमूल के १० द्रन्य, कचूर, काकडासिंगी, यवासा, भारगी, और गदहपुर्ना, इन सबको समभाग लेकर, विधिवत् क्वाथ वनाकर दिन मे ३ वार पिलावे।

२ श्रायादि क्वाथ--काकडासिंगी, भारगी, हर्रे, स्याहजीरा, चिरायता, पित्त-पापडा, देवदारु, वच, कूठ, जवासा, कायफल, वायविडग, हल्दी, दारुहल्दी और अजवायन, इन सबको समभाग लेकर क्वाथ कर प्रयोग करे।

७ जिह्नक सन्निपात ज्वर

इसमे विषमयता के कारण रोगी की जिह्ना की पेशियाँ स्तब्ध हो जाती हैं। रोगी जीभ को बाहर नही निकाल पाता और कुछ भी निगल नही पाता है।

इसमे किरातादि क्वाथ का कवल घारण करना चाहिए।

Ĩ

ঘ

1

l

१ योग—चिरायता, कुटकी, पीपर, कुरैया की छाल, कण्टकारीमूल, कचूर, वहेडा, देवदारु, मरिच, कायफल, अतीस, नागरमोथा, आँवला, पुष्करमूल, चित्रक, काकडासिंगी, अरुस और सोठ के क्वाथ को मुख में धारण करना चाहिए।

२ विश्वादि क्वाय—सोठ, गनियार, गम्भार, सोनापाठा और पाढल की जड़ो की छाल, गुरुच, आंवला और धनियां, इनके समभाग का क्वाय पिलाना चाहिए।

३ शुद्रादि क्वाथ—छोटी कटेरी, गुरुच, सीठ और पुष्करमूल का क्वाथ पिलाना लाभन्नद है।

८ सन्धिक सन्निपात ज्वर

इसमे सिन्धयों में तीन पीडा, जाँधों में जडता, मन्यास्तम्भ आदि उपद्रव हो हो जाते हैं। इसमें बचादि क्वाय का प्रयोग हितकारक होता है।

वचादि क्वाथ—वच, पित्तपापड़ा, यवासा, सैरेयक (कटसरैया), गुरुच, अतीस, देवदारु, नागरमोथा, सोठ, विधारा, रास्ना, गुग्गुलु, वडी दन्ती, एरण्डमूल की छाल और शतावर का क्वाथ पिलाने से सन्धिक सिन्नपात ज्वर तब्ट होता है।

९ अन्तक सन्निपात ज्वर

यह सिषपातज्वर प्राणनाशक होता है, अत इसमें कोई चिकित्सा लाभप्रद नहीं होती । इसमे भगवदाराधन का ही सहारा है—

भेषज जाह्नवीतीय वैद्यो नारायणो हरि ।

१०. रुग्दाह सन्निपात ज्वर

इसमे पडङ्गपानीय पिलाना, लेप करना तथा शीत जलावगाह्न लाभप्रद होता है।

षडङ्गपानीय—खस, लालचन्दन बुरादा, सुगन्धवाला, मुनक्का, आँवला और पित्तपापडा के मोटे चूर्ण को लेकर ३ लीटर पानी मे औटायें, जब आधा वच जाय तो छानकर पिलाना चाहिए।

लेप-१ वेर की पत्तियाँ दही के साथ पीसकर ललाट और हाथ-पैर के तलवी पर लेप करे। अथवा--

२ कपूर, सफेद चन्दन धूरा और नीम की पत्तियाँ मट्ठे मे पीसकर लेप करे। अथवा—

३ नीम की पत्तियों को किसी पात्र में (भगीना, परात या कठवत में) रखकर थोड़ा पानी डालकर दोनो हाथों से मले और उसमें जो फेन उठे, उसको ललाट, हाथ-पैर आदि में लेप करने से दाह शान्त हो जाता है।

११. चित्तविभ्रम सन्निपात ज्वर

इसमे रोगी की चेतना लुप्त हो जाती है, वह पूर्वपरिचित जनो को नहीं पहचानता है, शिर शूल, स्मृतिनाश और नेत्र-पीडा से व्याकुल रहता है। उसे वेहोशी और चक्कर आता है।

इसमे अञ्जन लगाने से लाभ होता है।

प्रचेता नाम गुटिका—पीपर, कालीमरिच, वच, सेंधानमक, करञ्जवीज, धतूरे का फल, आंवला, हर्रा, वहेडा, सरसो, हींग और सोठ, इनके समभाग चूर्ण की लेकर, वकरी के मूत्र मे पीसकर, यत्र के आकार की गुटिका बनावे। इसके अञ्जन से रोगी की बेहोशी दूर होकर चेतना आ जाती है।

१२ कर्णग्रह (कणिक) सन्निपात ज्वर

इसमे कान के मूल मे शोथ हो जाना विशेष लक्षण है। इसमे सिक्षपात ज्वर की आभ्यन्तर औषधो के प्रयोग के साथ ही शोथ स्थल पर लेप आवि लगाकर ग्रन्थि का भेदन करे और उसके बाद व्रण की तरह उपचार करे।

- 9 कुलत्थादि लेप—कुलथी, कट्फल, सोठ और मगरैला को समभाग लेकर, पीसकर, दिन मे ३ बार सुखोष्ण लेप करे। इससे शोध फट जाता है। अथवा—
- 2. हिंग्वादि लेप—हीग, हल्दी, दारुहल्दी, इन्द्रायण की जड, सेंधानमक, देवदार का बुरादा, कूठ और मदार का दूध सभी एक साथ पीसकर, गरम कर, शोथ पर लेप करना चाहिए। या—
- ३ अर्कादि लेप--मदार का दूध, भिलावा, चित्रक की जह, गुह, दन्ती की जह, कूठ, हीराकसीस, इन्हें पीसकर लेप करे। अथवा--
- ४ दशाङ्ग लेप—सिरस की छाल, मुलहठी, तगर, लालचन्दन, छोटी इलायची, जटामासी, हल्दी, दारुदल्दी, कूठ, नेत्रवाला तथा खश, समभाग लेकर चूर्णंकर सुखोष्ण कर लेप लगावे।
- ५ अतस्यादि लेव—तीसी को पीसकर, गरमं कर सुखोष्ण लेप लगाने से शोथ पर्काकर वण बन जाता है, तब वण की तरह उसका उपचार करना चाहिए। या—
- ६ जलौका प्रयोग -- कान के मूल मे शोथ के स्थान पर जोक लगाकर रक्त को निकाल देने से शोथ का शमन हो जाता है।

१३ कण्ठकुब्ज सन्निपात ज्वर

इसमें रोगी मूक हो जाता है। इसमे फलत्रिकादि क्वाय पिलाना लाभप्रद है।

- १ फलिश्रकादि क्वाथ—आंवला, हर्रा, बहेडा, सोठ, मरिच, पीपर, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजी, अहस और हल्दी, इनके समभाग का, क्वाथ प्रात -साय पिलाना चाहिए।
- २ अष्टाङ्गावलेहिका (भै०र०) आदी के रस और मधु के साथ बार-बार चटाना चाहिए।

सिन्नपात ज्वर मे उपयोगी प्रमुख औषधें

- शीताङ्ग सिन्नपात ज्वर महामृत्युञ्जय रस, सूतराज रस, मल्लिसिन्दूर,
 कालकूट रस, अचिन्त्य शक्ति रस।
- २. तन्द्रिक ,, सूचिकाभरण, हेमगर्भपोट्टली रस, श्वासकुठार ।
- ३ प्रलापक ,, कस्तूरीभैरव रस, निद्रोदय रस, ब्राह्मी वटी, महा-वातविष्वसन रस, तगरादि कषाय ।
- ४ रक्तष्ठीवी सन्निपात ज्वर सूतशेखर, कामदुघा रस, प्रवालपचामृत, प्रवालपिष्टी, स्फुटिका भस्म, शुद्ध गैरिक, अरुसपत्र स्वरस, लाक्षाचूर्ण।

ч.	भुग्ननेत्र सरि	न्नेपात ज्वर	प्रचेता गुटिका का अजन, पूर्ण चन्द्रोदय, प्रवालिपच्टी,
	_		तगरादि कषाय।
₹.	अभिन्यास	"	हेमगर्भपोट्टली रस, चतुर्भुज, रसराज रस, महालक्ष्मी-
			विलास, कारव्यादि क्वाथ तथा शृह्यादि क्वाथ।
v.	जिह्नक	11	किरातादि नवाथ या विश्वादि नवाथ का कवलधारण।
			कस्तूरीभूषण रस, मृतसजीवन रस।
۷.	सन्धिक	,,	महावातविष्वसन, कालकूट रस, वचादि क्वाथ या
			मुस्तादि क्वाथ ।
9	अन्तक	11	यह असाध्य घोषित है। भगवान् मृत्युञ्जय का
			स्मरण एव चिन्तन करे।
90	रुग्दाह	11	षडञ्जपानीय, चन्द्रकला रस, प्रवालिपच्टी, शतधौत
	-		घृत का अभ्यग, लाजतर्पण, शीतल पुष्पशय्या, बदरी-
			पल्लवोत्य फेन लेप।
99.	चित्तविश्रम		सम्निपातभैरव, लक्ष्मीविलास, तगरादि कषाय,
•			प्रवालपिष्टी, द्राक्षादि क्वाथ, प्रचेता गुटिका ।
92.	कर्णग्रह	11	कट्फलादि क्वाय, भारंग्यादि क्वाय, कुलत्यादि लेप,
	-		अतस्यादि लेप, जलीकावचारण ।
93	कण्ठकुब्ज	"	अष्टाङ्गावलेह, कट्फलादि क्वाथ, किरातादि क्वाथ,
•	•		समीरपन्नग रस, चन्द्रामृत रस, शुद्ध टकण, श्वासकुठार
			रस ।

चतुर्थ अध्याय

आगन्तुक ज्वर, नव ज्वर, जीर्ण ज्वर तथा पुनरावर्तवः ज्वर अगन्तुक ज्वर

निवान-सूत्र रूप मे आगन्तुक ज्वर के चार कारण या निवान कहे गये है१. अभिघात, २ अभिचारकमं, ३. अभिशाप और ४ अभिपद्म ।

(१) अभिघात ज्वर

जब किगी दास्त्र से, लाठी-छण्डे से, पत्यर की चाट मे, गिरने से या किसी वसात्म्य वस्तु के शरीर में प्रवेश करने में शरीर में विपाक्तता हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ज्वर हो जाता है, जमें अभियात जनर कहते है।

उपचार-अभिघात, चोट-मोच या प्रहार के स्वरूप क अनुसार घीत या उप्ण र्षेक या मालिश या बन्धन लगावे। शाकाहारी व्यक्ति को दूध-घी मे वने पक्तवान बीर मूखे मेवे खिलावे तथा मासार्थी को त्रिय मानरसपुक्त आहार दे। यदि आघातजन्य वृष हो, तो उसका व्रणवत् उपचार करना चाहिए।

(२) अभिचार ज्वर

तन्त्र तथा मन्त्रों के प्रयोग, लोहे में बने न्यूषा में हवन आदि या अनिष्टकारक मारण-उच्चाटन आदि के द्वारा जब किसी व्यक्ति के प्रतिकूल अनुष्ठान किया जाता है, तब लक्ष्यभूत व्यक्ति ज्वराक्रान्त हो जाता है, तो उस ज्वर को अभिचार ज्वर कहते हैं। इस ज्वर में भयदूर अति दुसह घोर पीडा एव मिन्नपात ज्वर जैसे लक्षण हो जाते हैं। चित्त में चन्दालता तथा विवलता होती है।

जपचार—इस प्रकार के जार में दैवव्यपाश्रय चिकित्मा ही श्रेष्ठ जपचार है। होम-नियम व्रत-जप-मणिधारण-दान-मगलपाठ सादि से यह जबर निवृत्त होता है।

(३) अभिशाप ज्वर

ब्राह्मण, पितव्रता स्त्री, गुरु, वृद्ध, सिद्ध एव तपस्वी जनो का अपमान करने से वे शाप दे देते हैं, जिससे ज्वर हो जाता है, उस ज्वर को अभिशाप ज्वर कहते है।

उपचार—इसमें यदि सभव हो, तो उस शाप देने वाले व्यक्ति से अनुनय-विनय एव प्रार्थना कर शाप से मुक्ति करावें और उनका आशीर्वाद लें। सात्त्विक आचरण अपनावे तथा दैवव्यपाश्रय चिकित्सा—होम-जप दान आदि करें।

(४) अभिषद्भ ज्वर

इसमे कारण के अनुरूप लक्षण होते हैं और इसके निम्न भेद होते हैं—

र अभिषाताऽभिचाराभ्यामभिद्यापाभिषद्गत । आगन्तुर्गायते दोपैर्यथास्व त विभावयेत ॥

(१) कामाणियङ्ग ज्वर

इसमे चित्तविश्रण, तन्द्रा, आलस्य, भोजन मे अनिच्छा, हृदय मे वेदना और मुख सुखना आदि लक्षण होते हैं।

उपचार—क्रोधजनक कारणो के सेवन से काम ज्वर का शमन होता है। इसमें सुगन्धवाला-चन्दन-खस-धिनया-जटामासी आदि पित्तशामक द्रव्यो का क्वाथ पिलाना लाभप्रद है।

(२) शोकाभिपङ्ग ज्वर

इसमे नेत्रो से अश्रुप्रवाह, प्रलाप और अतिसार आदि लक्षण होते हैं। उपचार—काम और क्रोधजनक भावो की जागृत कर शोकजन्य ज्वर को शान्त करना चाहिए।

(३) भयाभिवङ्ग ज्वर

इसमे रोगी के नेत्र लाल होते है, भोजन में अहि होती है, रोगी चिन्ता में दूबा रहता है और कांपता रहता है।

उपचार—भयजनक कारणो को दूर कर धैर्य, आश्वासन और ढाढस वधाना चाहिए तथा काम या क्रोध को जागृत करना चाहिए।

(४) क्रोधामिपङ्ग ज्वर

इसमें आखें लाल होती हैं, मुखमण्डल तमतमाया होता है और भीहें एवं बोठ तथा सर्वोद्ध कांपता रहता है।

उपचार—मनोवाञ्छित प्रिय वस्तु की प्राप्ति करानी चाहिए, असन्तोप की भावना को दूरकर प्रसन्नताजनक वातावरण बनाना चाहिए। कामवासना जागृत होने से क्रोधज्वर भान्त हो जाता है।

(५) मृतामिपङ्ग ज्वर

इसमे रोगी मे विलक्षण ज्ञान, मानवोत्तर (दैनी या आसुरी) वाणी, पराक्रम, उद्देग, अकस्मात् हास्य एव रोदन, अगो मे कम्पन तथा आक्रामक भूत के अनुसार लक्षण होते हैं।

जपचार — इसमे आक्रामक भूत के अनुसार दैवव्यपाश्रयचिकित्सा — होम-यज्ञ-नियम-दान-स्वस्त्ययन आदि तथा वन्धन, ताडन, आश्वासन, इष्टवस्तु-लाभ कराकर यथोचित चिकित्सा करनी चाहिए।

(६) विषामिषड्ग ज्वर

इसमे रोगी के मुख का वर्ण नीला पड जाता है। रुग्ण व्यक्ति अतिसार, अर्थेच तथा प्यास से पीडित रहता है तथा शरीर मे सुई चुभाने जैसी वेदना होती है और मुच्छों भी आती है।

उपचार—रोगी की मूर्च्छा को दूर करने के लिए नस्य और अञ्जन का प्रयोग करे तथा विप के अनुसार उपचार करे।

(७) ओषधिगन्धाभिषङ्ग ज्यर

बोपिष के गन्ध ने होने वाले ज्वर मे मूर्च्छा होना, शिर मे पीडा, वमन होना और छीक बाना, ये सब लक्षण होते हैं।


उपचार—इसमे लक्षणों के अनुमार चिकित्सा करे। मूच्छों मे प्रचेता गुटिका का अञ्जन छगावे। शिर शूल मे हिमाशु तेल को शिर मे लगावे। रुग्ण के आवास मे गुग्गुलु, धूप, राल, नीम की पत्ती और माहेश्वर धूप आदि जलावे।

रस-प्रयोग---

४-४ घण्टे पर दिन मे ३ वार

वृहत्कस्तूरीभैरव रस	४०० मि० ग्रा०
स्मृतिगागर	४०० मि० ग्रा०
ब्राह्मीवटी	४०० मि० ग्रा०
प्रवालपिष्टी	४०० मि० गा०
गुडूची सत्त्व	१ ग्राम
मधु से ।	योग ३ मात्रा ।

विशेष निर्देष--आगन्तुक ज्वरो मे लघन नही कराना चाहिए।



आमज्बर

इसका लक्षण प्रथम अध्याय मे द्रप्टन्य है।

उपचार

9 आमज्बर में आम का पाचन कराना प्रथम कर्तव्य है। लघन अर्थात् उपवास कराने से आम का पाचन हो जाता है। यदि रोगी वालक, वृद्ध, दुवंल या गिमणी स्त्री हो, तो उपवाम न कराकर लघु आहार देना चाहिए।

- २. उपवास से बढ़े हुए दोप कम होते हैं, ज्वर का विग घटता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में हलकापन होता है और भोजन की इच्छा जागृत होती है।
 - ३ रोगी के वल के अनुसार जितनी सहनशक्ति हो उतना ही उपवास करावे।
- ४ आमपाचनाथं दीपन-पाचन अपिधो का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-सोठ-मरिच-पीपर-चाभ और चित्रक का क्वाथ पिलाना हितकर है।
- ५ स्वेदन, तिक्तरसवाली भीपधो के क्वाथ के पीने से तथा यवागू के प्रयोग से दोषो का पाचन हो जाता है।
 - ६ आम को निकालने के लिए वमन का प्रयोग किया जाता है।
- ७ तृष्णा की अधिकता मे नागरमोथा, पित्तपापडा, खश, लाल चन्दन, सुगन्ध-बाला और सोठ का मिलित चूर्ण २० ग्राम १ लीटर जल मे पकाकर आधा बचने पर छानकर थोडा थोडा पिलाना चाहिए।
- ८. दोषो के अनुसार लक्षणों की उपस्थित होने पर दोवानुसार चिकित्सा करनी चाहिए।
- ९ ज्वर के रोगी के देश काल आदि का विचार कर गरम जल पिलाना चाहिए। गरम जल पीने से वायु का अनुलोमन होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है और थोडा ही जल पीने से तृष्णा शान्त हो जाती है।
- १० उच्च जलपान तृष्णा का शमन एव कफ का विलयन करता है, क्के हुए स्वेद, कफं, मल-मूत्र एव वायु को प्रवृत्त करता है तथा तन्द्रा, जहता और अरुचि को नष्ट करता है।
- ११ उष्ण जल वासी हो जाने पर प्रयोग न करे। प्राप्त काल का वनाया हुआ जल दिन भर और सायकाल का वर्नाया हुआ जल रात भर प्रयोग किया जाना चाहिए।

नवज्वर या तरुणज्वर

ज्वर की चिकित्सा में सर्वेप्रथम विचारणीय विषय यह होना चाहिए, कि ज्वर नव है या जीर्ण ? ज्वर कव से हैं ? उसकी अविध से यह निर्णय किया जा सकता है। जैमे—ज्वर के जन्म दिन से सात दिन का समय तरुण या नवज्वर का है। सात से बारह दिन तक मध्यमज्वर माना जाता है, उसके वाद पुराणज्वर कहा जाता है एव तीन सप्ताह के बाद भी बने रहनेवाले ज्वर को जीर्णज्वर कहते हैं।

१ आमप्तरात्र तरुण ज्वरमाहुमैनीपिण । मध्य द्वादशरात्र तु पुराणमत उत्तरम् ॥ त्रिसप्ताहे न्यतीते तु ज्वरो यस्तनुता गतः ।

उपचार

१ निषेध — नवज्वर में कषायरस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कषायरम स्तम्मक (रोकनेवाला) होता है, जिससे दोप आकुल होकर विषमज्वर जनक हो जाते हैं।

२ दिन में सोना, स्नान करना, अभ्यग करना, अन्न खाना, मैथुन करना, क्रोध करना, वायु के प्रवाह में रहना और व्यायाम करना निषिद्ध है।

३. नवज्वरी के शिर पर जल की धारा गिराना (परिषेक), तैलमर्दन, अनुलेपन, वमन विरेचन आदि शोधन, शीत जलपान, गुरु एव स्निग्ध पदार्थों का भोजन करना निपिद्ध है। इनके सेवन से शोप, वमन, मद, मूच्छी, भ्राम, अरुचि तथा तृष्णा आदि उपद्रव होते हैं।

४ कर्तव्य-नवज्वर मे- १ लघन, २ स्वेदन, ३ काल अर्थात् ७-८ दिनो तक ज्वर उतरने की प्रतीक्षा, ४ यवागू देना, ५ तिक्तरसयुक्त औषघ सेवन और ६. पाचन द्रव्यो का प्रयोग विचार-विमर्श कर औचित्य के आधार पर करना चाहिए।

५. राजयक्ष्माज्वर, वातज या धातुक्षयज ज्वर, भय-शोक-काम क्रोध-श्रमज ज्वर तथा अभिचातज्वर मे लघन नही कराना चाहिए।

६ दोषानुमार वात-िपत्त-कफज़ ज्वर मे क्रमश एक, तीन या छह रात तक लघन कराना चाहिए।

७ स्वेदन-विशेपकर अस्थि-जघा एव सिन्धम्थलो मे वेदनायुक्त ज्वरो मे तथा आमवातज्वर, वातज ज्वर एव कफज्वर मे स्वेदन उपयुक्त है।

स्वेदनायं—उष्ण जल पिलाना, शीन से बचाना, भारी ऊनी वस्त्र से ढके रखना तथा स्वेदकारक अोपघो का वाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयोग करना चाहिए।

स्वेदन से शरीर से पमीने का निर्गमन होता है, जिससे स्रोतो की शुद्धि होती है। 'पडन्नपानीप' पिलाना उत्तम एव लाभप्रद है। उष्ण जल पिलाना उत्तम स्वेदन प्रकार है।

१ नवःवरे दिवास्त्रप्नस्नानाभ्यद्वाश्वमेथुनम् ।

क्रोधप्रवानन्यायामकपार्याश्च विवर्णयेत् ॥ च० चि० ३।१३८
स्नानं निरेक् सुरत कपाय न्यायाममभ्यजनमिह निद्राम् ।
दुन्ध पृतं वैदलमामिषं च तक सुरा स्वादु गुरु द्रवश्च ॥
अन्न प्रवानं भ्रमणं रुपाञ्च त्यजेत् प्रयत्नात् तरुणज्वरातं ॥

२ ल्ह्नुनं स्वेदन कालो यवाग्वस्तिक्तको रस । पाचनान्यविपनवाना दोषाणा तरुणज्वरे ॥ च० चि० ३।१४२

३ मुस्तपपैटकोशीरचन्दनोटीच्यनागरे । शतशीत जल दद्यात पिपासाज्वरशान्तये ॥ च० चि० ३।१४५

४ ज्वरी ह्यामाशयसमुत्थ प्रायो मेपजानि चामाशयममुत्थाना विकाराणा पाचनवमनाप तपणानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयमुष्णं, नम्मादेतज्ज्वरार्तेभ्य प्रयम्छन्ति भिषजो भृयिष्ठम्। च० वि० ३

_ उष्ण जल मे नवसादर, कलमीसोरा और यवक्षार मिलाकर पिलाना अथवा क्वेतपर्पटी डालकर पिलाना अधिक उपयोगी है, इससे ज्वर और प्यास दोनो का शमनं होता है तथा खुलकर पेशाव होता है।

८. काल-नवज्वर मे ज्वर साम रहता है और प्राय एक सप्ताह मे आम का पाचन हो जाने से ज्वर निराम हो जाता है, जिससे अपने आप दोप का पाचन हो जाता है, अत एक सप्ताह तक ज्वर के निराम होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

९ यवागू-प्रयोग — यवागू शब्द से लाजमण्ड (धान के लावा का बना माड), बार्ली अथवा इसी तरह के पेय लिये जाते है। यह अग्निप्रदीपक होती है तथा इससे मल-मूत्र एव वायु की सम्यक् प्रवृत्ति होती है, यह स्वेद लाती है, प्याम शान्त करती है और वल देती है। यह ज्वरहर एव लघुता कारक है।

१० तिक्तरस—ितक्तरस ज्वरनाशक तथा पाचन होता है, इसलिए गुडूची, चिरायता, कुटकी आदि से सिद्ध किये हुए जल मे पेया, यवागू आदि का निर्माण कर नवज्वरी को पिलाना चाहिए।

५९ व्याथ—(क) गुड्रूच्यादि व्याथ—गुरुच, पुरानी धनिया, नीम की छाल, लालचन्दन बुरादा, पद्मकाठ, यह सब मिलाकर २५ ग्राम लेकर ४०० मि० ली० जल मे चतुर्थाशाविषाव्य क्वाथ वनाकर प्रात काल पिलाना चाहिए।

(ख) पञ्चितिक्त क्वाय—भटकटैया की जड, गुरुच, सोठ, पोहकरमूल, चिरायता इन सबको समभाग लेकर विधिवत् क्वाथ वनाकर पिलाना चाहिए।

(ग) धान्यपटोल ववाथ—धिनया और परवल की पत्ती का क्वाथ प्रात काल पिलाना चाहिए।

१२ नवज्वर मे आहार-विधि—नवज्वरी को आहार देना इष्ट हो, तो उसे दिन मे एक ही बार अपराह्म मे भोजन देना चाहिए। प्रात काल भोजन, अभिष्यन्दी भोजन, रात्रि भोजन और गुरु भोजन निपिद्ध है।

१३. व्यवस्थापत्र---

प्रात , साय, मध्याह्न ज्वरधूमकेतु ५०० मि० ग्रा० योग ३ मात्रा

मधु से ।

वाद मे---गुडूच्यादि स्वाथ ५० मि० ग्रा० पीना
प्रात , साय
अथवा---वैद्यनाथ वटी ४०० मि० ग्रा०
योग २ माना

मध्र से।

अथवा—दिन मे ३ वार
प्रतापमार्तण्ड ३०० मि० ग्रा०
योग ३ मात्रा

अथवा---प्रात, साय, मध्याह्न नवज्वरेभाकुश ३०० मि० ग्रा० योग ३ माना

अथवा-सवेरे शाम

ज्वरकेशरी

३०० मि० ग्रा०

जल से।

योग २ मात्रा

अथवा--दिन मे ३ वार

पर्णंखण्डेश्वर

१२० मि० ग्रा०

योग ३ मात्रा

लगाये हुए पान मे खिलावे।

जीर्णक्वर

लक्षण

- १ २१ दिनो तक वने रहने के बाद आगे भी ज्वर वना रहना।
- २ ज्वर का तापमान मन्द होना।
- ३. प्लीहा की वृद्धि होना।
- ४ जठराग्नि का मन्द होना ।

उपचार

9. बुग्धपान—जीर्णंज्वर में कफ के क्षीण हो जाने पर दुग्ध का प्रयोग अमृत के समान जीवन-रक्षक होता है। दोपानुसार औपधो को डालकर पकाये हुए दूध को उष्ण या शीत कर आवश्यकतानुसार पिलाना चाहिए।

दुग्धपाक--२० ग्राम औपधचूर्ण, १६० ग्राम दूध और ६४० ग्राम जल डालकर, , दुग्धावशेष पाक करे और छानकर पिलावे ।

२ वस्ति-प्रयोग — जब जीर्णज्वर मे कफ एव पित्त क्षीण हो गये हो, अग्नि भवल हो, रोगी का मल गाँठदार हो, तो अनुवासनवस्ति का प्रयोग करे।

पनवाशयगत दोप मे निरूहवस्ति देनी, चाहिए, इससे ज्वर कम होता है, वल एवं अग्नि की वृद्धि होती है और अन्न में रुचि उत्पन्न होती है। र

१ जीर्णञ्बराणां सर्वेषां पय प्रशमन शतम्। पेय तदुष्णं शीतं वा यथास्व भेषजै शृतम्॥ च० चि० ३।२३९

२ (क) प्रयोजयेक्क्चरहराक्षिरूहान् सानुवासनान् । पक्षाशयगते दोपे ॥ च० चि० ३।२४०

३ जीवन्त्यादि वस्ति—जीनन्ती, मदनफल, मेदा, पीपर, मुलह्ठी, वच, ऋद्वि, रास्ना, बरियार, वेलसोठ, सौंफ श्रीर शतावर, सबको समनाग लेकर पीमकर, दूध-जल तथा तेल-घी मिला ले।

इसमे दूध ४ भाग, जल ४ भाग, घी और तेल १-१ भाग तया औपध द्रव्यो का करूक आधा भाग होना चाहिए। इसकी गुदामार्ग से बस्ति दे।

४ मलाधिक्य होने पर निम्ह्यस्ति देनी चाहिए। एतदर्थ-पटोलादि निस्ह-वस्ति, आरम्बादि निम्ह्यस्ति अयया गुहूच्यादि निम्ह्वस्ति का प्रयोग करना चाहिए।

५ घ्राप्रयोग निज्यां की रूक्षता में शरीर में भी रूक्षता हो जाती है। दूसरी वात यह है, कि कफ तथा रम-रक्तादि धानुओं की क्षीणता होने पर बायू की वृद्धि हो जाती है, उसमें भी रूक्षता हो जाती है, अत उम रक्षता के ह्याम के लिए रोगी को छन का मेवन करना चाहिए।

ज्यरनाशक मधुकादि कपाय, वृहद् भारग्यादि कपाय, दास्यादि क्वाय एव दार्व्यादि क्वाय आदि मे छत मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे ज्यर का शमन, जठराग्नि की वृद्धि तथा गरीर मे सवलता आती है।

६. दाह मे शतधीत एव महस्रधीत एत का अभ्यञ्ज करना चाहिए। चन्दनादि तैल या हिमाशु तैल का अभ्यञ्ज करना दाहगामक है।

७ ज्यरघ्न भीपधो के गयाय मे पिष्पत्यादि या गुदूच्यादि छत २० गाम की मात्रा मे मिलाकर पिलाना दाहशामक है।

८ अभ्यञ्ग — श्रीपधिमद्ध तैन्) का आवश्यकतानुमार शीत या उष्ण अभ्यञ्ज या आलेपन करना चाहिए। इसमे— १ त्वचागत जार का शमन, २. शरीराङ्गों को सूव तथा या एव ३ त्वचा की स्थाता या विश्व का नाश होता है।

९ तैल-प्रयोग--जीर्णज्यरों में लाक्षादि तैन, महानाक्षादि तैन, चन्दनादि तैन, अगुर्जादि तैन एव चन्दन-यलालाक्षादि तैल का उपयोगिता की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए।

⁽ रा) निर्मा विमारिन न विज्वरस्य मुद रुचिम् । परिपारीयु होषेषु प्रयुक्त शीममानदेत् ॥ न० चि० ३।१७०

⁽ग) ज्वरे पुराणे सप्धाणे कफिपत्ते दृढाग्नयं। स्क्षवद्धपुरीपाय प्रद्यादनुवामनम्॥ न० नि० ३।१७२

श्वरा कपायेर्वमनैर्ले हुनैर्लंगुभोजने ।
स्थ्रस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषण्जिनम् ॥
स्थ्र तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च ।
य म्यादनुबलो धातु स्नेहबध्य स चानिल ॥
कपाया मर्व प्वेते सर्पिषा मह योजिता ।
प्रयोज्या जवरशान्त्यर्थमग्निसन्ध्रक्षणा शिवाः ॥ च० वि० ३।२१६ २१८

२ सभ्यताँक्ष प्रदेशाँश्च परिपेकाँश्च कारयेत । यथाभिन्नाय झीतोग्णं विभक्त्य त्रिविधं ज्वरम् ॥ च० चि० शर५६

शीत लग रही हो, तो अङ्गारक तैल या अगुर्वादि तैल का अभ्यञ्ज करे और उष्णता प्रतीत हो तो चन्दनादि तैल लगाना चाहिए।

१०. धूपन—धूपन के प्रयोग से पसीना आकर त्वचागत ज्वर उतर जाता है। पसीने को सुखे वस्त्र से पोछ देवे और रोगी को ठडी हवा से वचावे।

११ अञ्जन — यदि दुग्ध, छत, अभ्यङ्ग, धूपन आदि के प्रयोग से ज्वर न शान्त हो, तो रोगी को अञ्जनभैरव रस का अञ्जन लगाना चाहिए। इससे ज्वर शान्त हो जाता है।

१२ शिरोगौरव, कफाधिक्य एव तन्द्रा मे --शिरोविरेचन नर्य का प्रयोग करना चाहिए। इससे शिर का भारीपन एव कफज विकार दूर होते है, अन्न मे रुचि उत्पन्न होती है और इन्द्रियों में चेतनता आती है।

१३ विरेचन निषेध — ज्वर से क्षीण व्यक्ति के वल का नाश हो जाता है, इसलिएं उसे वमन या विरेचन नहीं करना चाहिए। रोगी को कुछ अधिक सात्रा में मुनवका बीर दूध देने से पेट साफ हो जाता है। यदि फिर भी कब्ज रहे, तो ग्लिस्रीन की वत्ती लगावे या पिचकारी से गुदा में २ औंस ग्लिसरीन चढावे या साबुन का पानी चढावे अथवा अमलतास की गुद्दी का घोल उचित मात्रा में पिलाकर मलापहरण करे।

१४ व्यवस्था-पत्र---

४-४ घण्टे पर दिन मे ३ वार

१ स्वर्णवसन्तमालती ३०० मि० ग्रा० वृहत्सवंज्वरहर लौहं । ३०० मि० ग्रा० ४०० मि० ग्रा० श्रृग भस्म ४०० मि० ग्रा० प्रवाल भस्म गुडूचीसत्त्व १ ग्राम सितोपलादि चूर्णं २ ग्राम मधु से। योग ३ मात्रा २ भोजनोत्तर २ वार अमृतारिष्ट २० मि० ग्रा०

्9 मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

१ भूपनाङ्गनयोगैश्र यान्ति जीणज्वरा शार्मम्। च० चि० शश्७६

 [ो]रवे शिग्स शूले निवद्धेष्विन्द्रियेषु च।
 जीर्णक्वरे रुचिकरं दद्यान्मूर्धविरेचनम्॥ च० चि० ३।४७३

३ ज्वरक्षीणस्य न हित वमनं न विरेचनम् ।
कामं तु पयसा तस्य निरूहैर्वा इरेन्मणम् ।। जन निरु ३।८६९
६ कार दिरु

३. अभ्यङ्ग—
महालाक्षादि तैल की मालिश करना।
४ शिर पर—

हिमाशु तैल की मालिश करना।

१५. यकृत्प्लीहावृद्धि सह जीर्णज्वर मे—

दिन मे ३ बार

१ यक्तत्स्लीहारि लौह ३६० मि० ग्रा० लोकनाथ रस ३६० मि० ग्रा० मुक्ताशुक्ति ३ ग्राम शरपुंखां क्षार १ ग्राम

मधु से।

योग ३ मात्रा

२ भोजनोत्तर २ बार कुमार्यासन २० मि० ग्रा० समान जल मिलाकर पीना ।

१६. शोथयुक्त जीर्णंज्वर मे---

१. दिन मे ३ बार

पुनर्नवामण्डूर १ ग्राम पुटपक्व विषमज्वरान्तक ३६० मि० ग्रा० लोकनाथ रस ३६० मि० ग्रा० मुक्ताशुक्ति ३६० मि० ग्रा०

पुनर्नवास्वरस मधु से। योग ३ मात्रा

२ भोजनोत्तर २ वार पुनर्नेवासव २० मि० ग्रा०

१ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

३ रात्रि मे—

आरोग्यवधिनी ५०० मि० ग्रा०

जल से। १ मात्रा

```
१७. हृदयदीर्वेल्य सह जीर्णज्वर मे-
                 दिन मे ३ बार
              १ सर्वज्वरहर लौह
                                    ३६० मि० ग्रा० /
                                    ३६० मि० ग्रा०
                 हृदयार्णव
                 अर्जुनत्वक् चूर्ण
                                       ३ ग्राम
                                     योग ३ मात्रा
                  मधु से।
              २. भोजनत्तर २ वार
                 अर्जुनारिष्ट
                                     २० मि० ग्रा०
                                      १ मात्रा
                  समान जल मिलाकर पीना।
               ३ रात्रि मे---
                  चन्द्रप्रभावटी
                                      १ गोली।
                  दूध से।
                                      १ मात्रा
 १८. ज्वर की भयकरता मे---
                  दिन मे ४ वार
                  जयमगल रस
                                     ५०० मि० ली०
                  मधु से।
                                      ४ मात्रा
                       ज्वर का चिकित्सासूत्र
```

ज्वरे लङ्घनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात् । क्षयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमोद्भवात् ॥

मुस्तपर्पेटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरै । श्रुतशीत जल देद्यात् पिपासाज्वरशान्तये ॥

नवज्वरे दिवास्वप्नस्नानाभ्यङ्गान्नमैथुनम् । क्रोधप्रवातव्यायामान् कषायार्श्व विवर्णयेद् ॥

लच्चन स्वेदन कालो यवाग्वस्तिक्तको रस । पाचनान्यविपनवाना दोपाणा तरुणे ज्वरे ॥ ज्वरक्षीणस्य न हित वमन वा विरेचनम् । काम तु पयसा तस्य निरूहेर्वा हरेन्मलान् ॥ अम्य इश्चि प्रदेहाँ प्रविकावगाहने । विभज्य शीतोष्णकृत कुर्याज्जीणें ज्वरे भिषक् ॥ जीर्णज्वराणा सर्वेषा पय प्रश्नमन मतम् पेय तदुष्ण शीत वा यथास्व भेपजै श्रृतम् ॥ वर्धनेनैकदोषस्य क्षपणेनोि छ्वतस्य च । कफस्यानानुपूर्व्या वा सित्रपातज्वर जयेत् ॥ व्यायाम च व्यवाय च स्नान चड्क्रमणानि च । ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान् भवेत् । असञ्जातवलो यस्तु ज्वरमुक्तो निपेवते । वर्ज्यमेतन्नरस्यास्य पुनरावतंते ज्वर ॥ मुद्गान्मसूरान् चणकान् कुलत्यान् समकुष्ठकान् । यूषार्थे यूपसात्म्याना ज्वरिताना प्रदापयेत् ॥ देहो लघुर्व्यपगतवलममोहताप

पाको मुखे करणसौष्ठवमव्ययत्वम् । स्वेद क्षव प्रकृतियोगिमनोऽन्नलिप्सा कण्डुश्च मूघ्नि विगतज्वरलक्षणानि ॥

पुनरावर्तंक ज्वर

(Relapsing Fever)

निदान

ज्वर के छूट जाने पर जब तक शरीर मे पूरा वल नही आ जाता, तव तक ही जो व्यक्ति न्यायाम, मैथुन, स्नान, घूमना-िफरना और मनमाना भोजन करने लग जाता है या सही ढग से दोषों का संशोधन न हुआ हो और शरीर में कुछ दोष शेष रह गये हो, किन्तु रोगी अपने को शुद्ध समझ कर अपय्य आहार-िवहार का सेवन करने लग जाता है, तो रोगी की थोडी सी बदपरहेजी में ज्वर लीट आता है, उसे ही पुनरावर्तकज्वर कहते हैं।

एवन्स शरीर मे शेप रहे दोप यद्यपि पुनरावर्तं क ज्वर न उत्पन्न करते हीं, फिर भी वे गम्भीर मज्जा बादि धातु मे प्रविष्ट होने से शरीर का अपकार तो करते ही हैं और दीनता, शोथ, ग्लानि, पाण्डु, भोजन मे अरुचि, कण्डू, कोठ, पिडका और मन्दाग्नि उत्पन्न करते हैं।

लक्षण

लौट-लौट कर शीत, कम्पन, शिर शूल, अस्थि-सिन्धशूल और नमन की प्रवृत्ति के साथ तीव वेग (१०४ डिग्री तक) युक्त ज्वर का आक्रमण होना, इमका प्रधान लक्षण है। कदाचित् प्लीहा की वृद्धि, पाण्डु, कामला, शोथ आदि लक्षण भी हो जाते हैं। ज्वर का वेग पसीना आकर उत्तर जाता है और रोगी स्वस्थता का अनुभव करता है, किन्तु सप्ताह बोतते-बोतते पुन शीत, कम्प आदि के साथ ज्वर आने लगता है।

१ च० चि० ३।३३३-३३४, ३३६-३३७। ~

असाध्य लक्षण

जब पुन-पुन लौटकर आनेवाला ज्वर अधिक दिनो से पीडित किसी रोगी को शरीर और मन दोनो से तोड़ देता है, तो रुग्ण का शरीर दुवेंल, निस्तेज तथा हीन मनोबल का हो जाता है एव कुछ ही दिनो मे वह ज्वर रोगी के प्राण का हरण कर लेता है।

विकित्सासूत्र

१ रोगी के ज्वर की गाम-निराम अवस्था, रोग एव रोगी के वल और उसकें मनोवल का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार शोधन या शमन उपचार करना चाहिए।

२ सामान्य ज्वर मे जो-जो शोषधियाँ विभिन्न अवस्थाओं मे वतलायी गयी हैं या जो उपचार वतलाये गये हैं, पुनरावर्तंक ज्वर मे भी उन-उन अवस्थाओं मे उन सवका प्रयोग करना चाहिए। र

३ ज्वर के पुनरावर्तन की दशा में मृदु शोधन द्वारा दोषो की शुद्धि, यापन विस्तियो का प्रयोग (चरक-सिद्धिस्थान मे कथित), भोजन मे हलका यूप और जाड़्जल पशु-पक्षियो का मासरस देना चाहिए। 3

४ अभ्यङ्ग, उबटन, स्नान, धूपन एव अञ्जन का प्रयोग तथा तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत सेवन करना लाभदायक है। ४

५ यदि गुरु, अभिष्यन्दी और असात्म्य आहार-विहार के सेवन करते से पुनरा-वर्तक ज्वर पुन आ गया हो, तो सामान्य ज्वर के समान ही लघन एव उज्ज चिकित्मा करनी चाहिए।

६ किरातितक्तादि क्वाय — १ चिरायता, २ कुटकी, ३ नागरमोथा, ४ पित-पापडा और ५ गुरुच, इनके समभाग का क्वाथ ५० मि० ली० की मात्रा मे लगातार दो सप्ताह तक पीने से पुनरावर्तक ज्वर शान्त हो जाता है। दीर्घकाल तक वने रहने वाले अन्य ज्वरों में भी यह लाभप्रद होते देखा गया है।

१ चिरकारूपरिक्टिष्ट दुर्वल हीनतेजसम् । अचिरेणैव कालेन स हन्ति पुनरागत ॥ च० चि० ३।२३५

२ निष्टेंतेऽपि क्वरे तस्माद् यथावस्यं यथावलम् । यथाप्राण हरेद् दोप प्रयोगैर्वा शम नयेत् ॥ च० चि० ३।३३९

३ मृदुभि शोधने शुद्धिर्यापना वस्तयो हिता । हिताश्च रुपनो यूपा जाङ्गरुभिषजा रसा ॥ च० चि० ३।३४०

४ अभ्यङ्गोद्धर्तनस्नानधूपनान्यक्षनानि च। हितानि पुनरावृत्ते ज्वरे तिक्तघृतानि च॥ च० चि० ३।३४१


⁴ गुर्वभिष्यन्यसात्म्याना भीजनाय पुनरागते। ल्ह्वनोष्णोपचारादि क्रम कार्यश्च पूर्ववत्॥ च० चि० ३।३४२

६ किरानिक्तिक तिका मुस्तं पर्यटकोऽमृता । ध्निनेत पीतानि चाभ्यासार पुनरावतैकं ज्वरन् ॥

कायचिकित्सा

७ घूत-पिप्पल्यादि घृत, वासादि घृत और वलादि घृत का केवल अथवा ज्वरघ्न औषधो के क्वाथ में प्रयोग करना चाहिए।

वेग के अनुसार ज्वर के भेद



पुनरावर्तक ज्वर मे व्यवस्थापत्र-

४-४ घण्टे पर दिन में ३ बार

- १. सर्वेज्वरहरलीह दे डेसीग्राम
 पुटपक्वविषमज्वरान्तक दे डेसीग्राम
 त्रिभुवनकीर्ति दे डेसीग्राम
 गोदन्तीभस्म प्राम
 मधु से। योग ३ मात्रा
- २ प्रात साय--पुनरावर्तेक क्वाथ १०० मि० छी०
 पीना। २ मात्रा
- ३ भोजनोत्तर २ बार लोहासव<u>२५</u> मि० ली० १ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

४. रात में सोते समय सुदर्शन चूर्ण ३ ग्राम १ मात्रा गरम जल से।

तस्या तस्यामवस्यायां ज्वरितानां विचक्षणः। ज्वरिक्रयाक्रमापेक्षी कुर्यात्तत्तिचिकिस्सितम्॥ च० चि० ३।३४३-३४४

पश्चम अध्याय

विषम ज्वर

परिचय

विग प्यर के लाने और टाने का मनय रियम (अनियत) हो, अर्थात् परने-इतरने का मनय रिश्चित महो, को कभी तो भीत के माय और कभी गर्भी के नाथ एउट होता है, चीर विगवा नेग रियम (कभी तीय मन्तापयुक्त, कभी चार नन्ताप्रक्ति) हो, उने विषय क्यर महोते हैं।

आपारं बाग्मदों ने बहा है। ति जिनका श्रारम्म, विभवी विचा स्रोत विमका कान विषय हो, यह 'दिवसकार' करणाता है।

१ दिवसा आरम्ब सभी निर्देश, सभी पृत्त ने, सभी वाला में, सभी मध्यमप्रा ने होता है।

२ िउसी किया विषय होती है -स्पर्व की कभी शीत के साथ और यभी धर्म के बाद होता है।

े जिनका आक्षानाकात और भोगवान विषय तथा है, जैने --यदि उत्तर के पति का मगय ने बने दिन पता है, तो पन यदि दिन या ५ वज दान हो जाता है। इसे पता पदि वा ६ वजे दान को एतर जाता था, तो मगय यदन कर पतने ही ४ वजे दिन या यद में ९ वजे जाता में एतरता है, तो आज मनवान और भोगकान में विषयता होने में ऐसा उत्तर कि सम्बद्धान के दिवसता होने में ऐसा उत्तर कि सम्बद्धान के स्वास्त्र के दिवसता होने में ऐसा उत्तर कि सम्बद्धान के स्वास्त्र के स्वास के स्वास्त्र के स्वास के स्वास्त्र के स्वास के स्

विवम ज्वर का मुक्तानुबन्धित्व

होद-होदसर पुन होने पाला जार 'विषयनपर' महाजाता है। इसे मुक्तापुर्वनिवस्य पहिते हैं। बस्तुत जब उपर का वेग उसर होता है, को जार के मुक्त होते की प्रतिति होती है, बिन्तु उपर होत्या नहीं है, अपितृ धानुत्री में लीत हो जाता है, हिए जाता है, फिर वेग पाल म उमला जनुवाध हो जाता है। इस प्रकार मुक्त करके पुन हो जाने ने ऐसे विषयनपर को मुक्तापुर्वकों। यहाँ है। विजयरिक्त ने मुक्तापुर्वकित्व का विषयत्व माता है।

विषमज्वर मभी भी रोगी के दारीर को नहीं छोडता, मयोकि एक व्यक्ति क्लानि, भारीपन, प्रदाता ने प्रस्त रहता है। उत्तर में जबर चला गया, ऐसा आभास

१ य स्यादनियनाम् मामात् शामाणाः मा गरीव च ।

नेगनक्षापि विषम्। चपुर. स विषम रमृत ॥ सिद्धान्तनि० पर्०

र विषमी विषमारम्भक्रियाकागीऽन्पद्धया र । अष्टाह्न नि० राद०

र स्फार्निभरन विषयस्यन् । मा० नि० ज्यर्० १५ पर मधुनीप टीका

भले ही होता है, परन्तु घातुओं में लीन रहने तथा सूक्ष्मरूप में होने से परिलक्षित नहीं होता।

विषम ज्वर का निदान

9 जो मनुष्य ज्वर से ग्रस्त हो या जिसे ज्वर छोड रहा हो अथवा जिसे ज्वर अभी-अभी छोडा हो, वह मनुष्य यदि व्यायाम करने लगता है या भारी असात्म्य (अहितकर) भोजन करने लगता है तथा अधिकाशत जलीय पदार्थ, खीर, खिचडी, उडद का बडा, मास, ताजी दही, तिलकुट आदि भोज्य पदार्थ, ग्राम्य और आनूप मास आदि गुरु पदार्थों का सेवन करता है, दिन मे सोता है, अजीर्ण रहने पर भोजन करता है, तो उसका ज्वर वढ जाता है अथवा शीघ्र ही विषमज्वर का रूप धारण कर लेता है।

२ कितपय विद्वानो ने विषमज्तर का कारण भूताभिषड्ग³ माना है। आचार्यं गणनाथ सेन ने भूताभिषङ्ग शब्द की व्याख्या मे भूत शब्द से सूक्ष्म जीवाणुओ का ग्रहण किया है।^४

३. सुश्रुत ने विषमज्वर मे आगन्तुक को कारण माना है। वे आगन्तुक नेत्रो से अदृश्य रक्तगत जीवाणु ही हो सकते हैं।

ये जीवाणु भिन्न आकृति के तथा समान जाति के होते हैं। ये मण्डलाकार पादादि रहित और ताम्रवर्ण के होते हैं। '

४ सुश्रुताचार्यं ने दो कारणो का उल्लेख किया है — १ 'पर' और २. स्वभाव। पर शब्द से 'ढल्हण' ने भूत (ज्वरजनक जीवाणु) अर्थ लिया है, जो कि आगन्तुक कारण है। स्वभाव शब्द निज (दोष') कारण के अर्थ मे है।

१ स चापि विषमो देहं न कदापि विमुद्धति । ग्लानिगौरनकादर्येभ्य स यस्मात्र प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समतिकान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । वेगे तु समानिकान्ते गतोऽयमिति लज्यते । धात्वन्तरस्यो लीनत्वात्र सौक्ष्म्यादुपलभ्यते ॥ सु८ ठ० ३९।६४-६५

२ ज्वरितो मुच्यमानो वा मुक्तमात्रश्च यो नरः।

व्यायामगुर्वसात्म्यान्नमतिमात्रमथो जलम् ॥

पायस क्रशर पिष्ट पलल दिधमन्दकम् ।

पिण्याकमापिकृतीर्ग्राम्यानूप तथाऽऽमिषम् ॥

एवंविधानि चान्यानि विरुद्धानि गुरूणि च ।

सेवते च दिवास्वप्नमजीर्णाध्यश्चनानि च ॥

ज्वरोऽभिवर्षते तस्य विषमो वाऽऽशु जायते ॥ काश्यप० खिल० १

इ केचिद् भूताभिषद्गीत्य मुवते विपमज्वरम्। सु० ७० ३९।६८

र भूताभिषद्गो नाम भूतानां स्क्ष्मप्राणिनां नीव।णूनामभिषद्ग इति न्याचक्षीरन् नन्या । सिद्धान्तनि० ख० १११७८ की टीका

५ आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमन्वरे । सु० च० ३९।५६

६ परो हेतु स्वभावो वा विषमे कैश्चिदीरित । इ० ७० ३९।५६

इस प्रकार सुश्रुत ने निज तथा आगन्तुज कारण-भेद से दो प्रकार का विषमज्वर गाना है।

निज-विषम ज्वर की सम्प्राप्ति

१ जो दोष प्रारम्भ से ही अल्पबलवाला हो अथवा ज्वर के छूट जाने के बाद ारीर मे अविशिष्ट अल्पदोप, मिथ्या आहार-विहार के सेवन से पुनः प्रकुपित होकर, म-रक्तादि धातुओं मे से किसी को आश्रय बनाकर विषमज्वर को उत्पन्न करता है।

३. सभी दोष या कोई दो दोष विषम रूप मे रसवाहिनी धमनियो मे पहुँचकर वेण्मज्वरो को उत्पन्न करते है।

४ ज्वर का रोगी जब ज्वर की तरुणावस्था मे ही कपाय का सेवन करता है अथवा लोलुपतावश मनेहपान, दुग्धपान या सन्तर्पण पदार्थों का सेवन करता है तथा जो व्यक्ति देवता का प्रकोप का पात्र या किसी ग्रह द्वारा गृहीत होता है अथवा वमन-विरेचन-स्नेहपान या अनुवागन वस्ति का प्रयोग करने के बाद शीझ ही शीतोपचार या गुरू अन का सेवन तथा मैंथुन करता है, उस व्यक्ति की अस्थियों की मज्जा के भीतर प्रकृपित वायु के प्रविष्ट हो जाने मे कफ और पित्त का भी प्रकोप हो जाता है, जिमके परिणामस्वरूप धातुओं मे विषमता उत्पन्न हो जाने पर परिस्थिति के अनुसार विषमज्वर का नोई प्रकार उत्पन्न होता है और वह विषमज्वर छोड-छोडकर वार-बार हो जाया करता है। यह अपने नियत समय पर शान्त हो जाता है और फिर अपने नियत समय पर प्रकट हो जाता है।

विषमज्वर अनुपङ्गी (लगाव स्थापित रखनेवाले) स्वभाव के होते है, अत ये शान्त होकर पुन पुन प्रकट हो जाते हैं।

१ दोषोऽरुगोऽहितंसम्भृतो न्त्ररोत्सृष्टस्य वा पुन । धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमन्त्ररम् ॥ सु० उ० ३९।६६

र अधिशेते यथा मूर्मि बीर्ज काले च रोहति। अधिशेते तथा धातु दोप काले च कुप्यति॥ च० चि० ३।६८


३ समस्तो द्वन्द्वशो वाऽपि धमनी रसवाहिनी । दोपा प्रपन्ना कुर्वन्ति विषमा विषमन्वरान् ॥ का० सिल्० १ ,

४ कास्यप० खिल० अ० १।१६--२०

५ शमप्रकोपयो काल न चायमतिवर्तते । का० खि० १

६. न च स्वभावोपशमं गच्छत्यनुशयात्मक । नहि स्वभावशान्ताना भावानामस्ति सम्भव ॥ का० खि• १

विषमज्वर निदान-सम्प्राप्ति सारणी



विषम ज्वर के भेद

दो भेव

9 आचार्य दाख्वाह ने—9 तृतीयक और २. चतुर्थक, इन्ही दोनो को विवमज्वर माना है, क्योकि इनमे सूक्ष्मतम और दूरतर धातुएँ दूषित होती हैं। तृनीयक मे दोष मेदोगत होता है तथा चतुर्थक मे दोष अस्य एव मज्जागत होता है।

२ आचार्य सुश्रुत ने कारण-भेद से द्विविध विषमज्वर माना है-

- (क) निज अर्थात् घातुवैषम्यकृत ।
- (ख) आगन्तुक^२ (जीवाणुद्वारा उत्पन्न)।

चार भेव

आचार्य खरनाद³ ने (सन्ततक को छोडकर)—१. सततक, २ अन्येद्युष्क, ३ तृतीयक और ४ चतुर्थक, इन चारो को विषमज्वर माना है।

च० चि० ३।७४ चक्रपाणि-टीका

२. परो हेतु स्वभावो वा विषमे कैश्रिदीरित । परो भूतादि कारणम् । (डल्हण)

सु० उ० ३९।५६

३ अन्ये तु गन्तत परित्यज्य सततकादीश्चतुरी विषमज्वरानिच्छन्ति, यन सन्तते कालवैषन्यं तादृश नास्नि, उक्त च खग्नादेन—'ज्वरा पूर्वे मयोक्ता ये पद्म सन्ततकादय । चत्वार सन्ततं हित्वा श्रेयान्ते विषमज्वरा ।' च० चि० ३।७४ पर चक्रपाणि टीका

१ भन्ये तु तृतीयक्षचतुर्यकावेव विषमी, विषमाणा चिरेण चोत्पादात, यदाह दाखाह — सहमस्थमतरान्येषु दूरद्रतरेषु च। दोषो रक्षादिमार्गेषु अनेरन्प चिरेण यत्॥ याति देह न वाऽशेष मृथिष्ठ प्रतिपचते। क्रमोऽयं तेन विच्छिन्नसन्ताषो लक्ष्यते ज्वरे।

छह भेव

१. चरकाचार्य ने—१ सन्तत, २ सतत, ३ सन्येद्युष्क, ४. तृतीयक, ५. चतुर्यंक और ६. चतुर्यंक विषयंय, इन छहो को विषयज्वर कहा है।

२. वाग्भट^२ ने भी चरकोक्त छह प्रकार के विपमज्वरों का ही उल्लेख किया है।

३. माधवकर³ ने भी चरकोक्त छह प्रकार माना है।

सात भेद

काश्यप के अनुसार-- १ सन्तत, २. सतत, ३ अन्येद्युष्क, ४. तृतीयक, ५ चतुर्थक, ६. प्रेतज्वर और ७ ग्रहोत्य ज्वर के रूप मे ७ प्रकार के विषमज्वर होते हैं।

दश भेद

बाचार्य गणनाथ सेन ने पाँच विषमज्वरों के साथ—१ वातवलासक, २. प्रलेपक, ३ क्लैपदिक, ४ औपद्रियक और ५ जीण सततक भेद कालज्वर, इन पाँचों को भी विषमज्वर कहा है। इस प्रकार विषमज्वर की सख्या १० हो जाती है।

वारह भेद

आचार्य मृश्रुत ने—१ सन्तत, २. सतत, ३ अन्येद्युष्क, ४ तृतीयक, ५ चतुर्थंक, ६ अन्येद्युष्कविषयंय, ७ तृतीयकविषयंय, ८ चतुर्थंकविषयंय, ९ बौपत्यक, १० मद्योत्य, ११ प्रलेपक और १२ वातवलासक, इन वारह भेदो को विषमन्त्रर माना है।

१ विषमन्तर ण्वान्यश्चतुर्थंकविषयंय । च० चि० ३।७३

२ अप्टाप्तह० निदान० २।६८-७३

३ मा० नि० ज्वर० ३४-३९

४ का० स० गिल० १।

५ सन्ततः सनतान्येषुम्तृनीयग्रन्ततुर्थवा ।
यश्च वातवलासाख्यः क्षयिणाज प्रलेपक ॥
दर्शादिष्वपरो दृष्टो नश्च र्थपदिको ज्वर ।
यश्चीपद्रविक दृष्ट प्रायञो जीर्णरोगिणाम् ।
धातुम्या सर्व एवैते विद्येया विषमज्वरा ॥ मि० नि० स्र० १।१८३-१८५

६ कप्रन्थानेषु वा दोपस्तिष्ठन् दित्रिचतुर्पुं वा । विपर्ययाग्यान् कुरुते विषमान् कुच्छूसाधनान् ॥ सु० ७० ३९।५५

७ नानाधिकत्वात् प्रवदन्ति नज्ञाम्मृनीयकद्यापि चतुर्थकद्य । भीपत्यके मद्यममुद्भने च हेतु ज्वरे पित्तकृतं वदन्ति ॥ प्रलपक नानवलामकद्य कफाधिकत्वेन वदन्ति रज्जा । मुच्योज्जुवन्धा निपमज्वमा ये प्रायेण ने इन्द्रसमुध्यिनाम्नु ॥ सु० उ० ३।५७-५८

निष्कर्ष

१ सः	तत	9	अन्येद्युष्क विपर्यय	93.	वातबलासक ज्वर
२ स	त्रत	C	तृतीयंक विपर्यंय	98	रलैपदिक ज्वर
३. स	तत-भेद कालज्वर	٠, ٩	चतुर्थंक विपर्यंय	94.	बौपद्रविक ज्वर
४ अ	न्येद्युष्क	90	प्रेतज्बर	१६	औपत्यिक ज्वर
५ तृत	तीय क	99	ग्रहोत्थज्वर	ঀ७	म द्यसमुद्भव
६. च	तुर्थंक	97.	प्रलेपकज्वर		
ये सभी विषमज्वर माने गये हैं।					

विषयज्वर-सारणी

दो भेद निज माग-तुज एव तृतीयक चतुर्यका	 चार मेद मततक अन्येचुष्क तृतीयक चतुर्थक	हिंद भेद सन्तत सतत अन्येषुष्क तृतीयक चतुर्थंक चतुर्थंक विषयंैय	सात मेद सन्तत मतत अन्येषुष्क चतुर्थंक चतुर्थंक प्रतास्वर ग्रहोत्थल्वर	दस भेद सन्तत सतत सतत काल्ज्वर अन्येधुण्क वृतीयक चतुर्थक चातवलासक प्रलेपक दलीपक	बारह भेद सन्तन सतत अन्येषुष्क चृतीयक चृतीयक चृतीयक विपर्यय चृत्रुर्थक विपर्यय चृत्रुर्थक विपर्यय अन्येषुष्क विपर्यय प्रलेपक वातवलासक कीपत्ययिक
					मधसमुद्भव

विषमज्वर के वेगों के अन्तर में युक्ति

ज्वर की सम्प्राप्ति में यह कहां गया है कि 'अपने कारणो से कुपित हुए दोप आमाशय मे पहुँचकर वहां की ऊष्मा के साथ मिलकर 'रस' घातु के साथ सम्पृक्त होकर रसवाहक एव स्वेदवाहक स्रोतो के मार्ग अवरुद्ध कर तथा जठराग्नि को मन्द कर उसे सपूर्ण शरीर मे फैलाकर अपने समय मे ज्वर को उत्पन्न करते हैं।'

इस कथन से यह प्रकट है, कि दोप रसधातु के साथ मिलकर ही ज्वर उत्पन्न करते हैं। यह वात विपमज्वर के सम्बन्ध मे ध्यान देने योग्य है—

१ दुष्य स्वहेतुभिद्रीपा प्राप्यामाश्यम्ष्मणा । सिहता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम् ॥ स्रोतसां मार्गमाषृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम् । निरस्य वहिरूष्माण पिक्तस्थानाच केवलम् ॥ शरीर समभिन्याप्य स्वकालेषु ज्वरागमम् । जनयन्ति । सु० उ० ३०।१६ १८

वात गह है, कि रक्त आदि उत्तरोत्तर घातुओं के स्रोत सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और मूक्ष्मतम गुप्तदाले होते हैं तथा वे स्रोत दूर, दूरतर एव दूरतग होते हैं, इसलिए रक्त-माम-मेद अस्यि या मज्जा में रहे हुए दोष को रसधातु में पहुँचने में उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत अधिकाधिक समय लगता है। यही कारण है कि ज्वर के सतत, अन्ये- चूक्क, तृनीयक और चतुषंक ज्वरों के वेगागम काल में अन्तर या जिलम्ब हो जाता है।

विषमज्वर के आश्रय घातु

- १ रम धातु में आश्रित दोप सन्ततज्वर को,
- २ रक्त धातु में आश्रित दोप सनतज्यर को,
- ३. माम घातु मे बाश्रित दोप अन्येणुष्क को.
- ४ भेद धातु मे आश्रित दोष तृतीयक और
- ५. अन्य और गज्जा में आखित दोग चतुर्यंगज्वर को उत्पन्न करते है। र

दोषगति के अनुसार विषमज्वरो को भिन्नता

- 9 दोप आमाशयस्य होने पर सततज्ञर को उत्पन करता है और यह ज्वर बहोरात्र में दो बार आता है।
- २ उर प्रदेश में स्थित दीप एक नहीरात्र में उर प्रदेश में आमाश्य में आते हैं तथा दूसरे अहोरात्र में अन्येजुष्यज्वर को उत्पन्न करते हैं।
- ३ इमी प्रकार कण्ठप्रदेश में स्थित दोष एक अहीरात में उर प्रदेश में आते हैं बौर दूसरे जहोरात्र में आमाश्य में शांते हैं तथा तीमरे दिन तृतीयक ज्वर उत्पन्न करते हैं।
- ४ शिर प्रदेश में स्थित दोप कण्ठ, उर और आमाशय में तीन दिन में पहुँचकर चौथे दिन चतुर्थक्रवर उत्पन्न करते हैं।
 - ५ आमागय आदि में स्थित दीप प्रतिदिन प्रलेपकज्वर को उत्पन्न फरते हैं।

२ सन्तन रसरक्तम्य सोऽन्येषु पिशिताथित ।

च० चि० ३।७४ पर चक्रपाणि

मेदोगतरतृत्वायेऽहि चतुर्षेऽहि चतुर्थकः । दुर्याच्यतुर्थंकं घोरमन्तकं रोगसद्वरम् ॥ मा० नि० ज्वर०

३ सततान्येषुष्कत्याख्यचातुर्यंकान् सप्रलेपकान् ।
कपम्यानविमागेन यथामङ्ख्य करीति हि ॥
अहोरात्रादहोरात्रात् स्थानात् रयान प्रपत्ते ।
ततश्चामाश्चयं प्राप्य दोप कुर्याज्यर नृणाम् ॥
कपस्यानेषु वा दोपन्तिष्ठन् विश्वचतुर्पं वा ।
विषयंयाख्यान् कुरुते विगमान् कुच्छ्ताधनान् ॥ स० उ० वेषापर-५३,५५

१ पृथ्ममृष्यमगरास्येषु दूरदूरतरेषु च। दोषो रक्तादिमार्गेषु शनरन्षं भिरेण यस्॥ यानि देए न वाऽदोषं भृथिष्ठ प्रतिषयते। क्रमोऽय नेन विच्छित्रमन्ताषो लक्ष्यते ज्वरे॥ दाख्वाद वचन।

- ६ वक्ष स्थल और आमाशय में स्थित दोप अन्येद्युष्क विपर्ययज्वर उत्पन्न करते हैं।
- ७. कण्ठ, हृदय और आमाशय में स्थित दोप तृतीयक विपर्यय ज्वर को उत्पन्न करते हैं।
- ८ शिर, कण्ठ, उर और आमाशय में स्थित दोप चतुर्थंक विपर्यंय ज्वर उत्पन्न करते हैं।

विषमज्वरो की विभिन्नता मे कारण

वर्षा आदि ऋतु, दिन-रात, दोष और मन मे वलवान् या निर्वल होने से तथा अर्थ (पूर्वजन्मकृत कर्म) के कारण सन्तत आदि ज्वर अपने-अपने काल पर भिन्न-भिन्न रूपों मे हुआ करते हैं।

विषमज्वर का वेग ज्वार-भाटा की तरह

जिस तरह वायु के झोको से उत्पन्न हुई लहरों से सागर भर जाता है और वायु के वेग के चले जाने पर सागर का जल पुन अपनी सीमा में आ जाता है, उसी तरह वायु से प्रेरित हुए दोष अनेक प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न करते हैं। जैसे वेग के आने पर समुद्र की तरङ्गें वढकर समुद्र में तूफान उत्पन्न कर देती हैं और वेग के चले जाने पर वह पानी का तूफान वही विलीन हो जाता है, उसी तरह दोषवेग के उत्पन्न होने से मनुष्य में ज्वर चढता है तथा दोषवेग के शान्त हो जाने पर ज्वरवेग शान्त हो जाता है।

सन्तत ज्वर

जो ज्वर विना उत्तरे हुए लगातार सात दिन तक, दस दिन तक या वारह दिन तक वना रहता है, उसे सन्तत ज्वर कहते हैं।

जब दोप अल्प होते हैं, तो ज्वर उक्त अविध मे शान्त हो जाता है और जब दोष प्रवल होते हैं, तो उक्त अविध में रोगी को यमलोक पहुँचा देते हैं।

सन्तत ज्वर की दोषानुसार अवधि

सन्ततज्वर की सप्ताह आदि की अविध दोषभेद से की गयी है, जैसे-वातप्रधान

१. श्रत्वहोरात्रदोपाणा मनसश्च वलावलात् । कालमर्थवशाच्चैव ज्वरम्त त प्रपद्यते ॥ च० चि० ३/७५

२ वातेनोद्ध्यमानस्तुः यथापूर्येत सागर ।
वातेनोदीरितास्तद्भद्दोषा कुर्वन्ति ने ज्वरान् ॥
यथा वेगागमे वेला छाटथिरा महोद्धे ।
वेगहानी तदेवाम्भम्नत्रवान्तिनिश्चते ॥
दोष्पंगोद्वये तद्भदुदीर्थन ज्वरोऽम्य वै ।
वेगहानी प्रशास्येत यथाऽम्म सागरे तथा ॥ गु० उ० ३९।७२ ७४

३ सप्ताहं वा दशह वा द्वादशहमयापि वा। सन्तत्या योऽत्रिमगी स्थान् भन्नन म निगवते॥ मा० नि०

ान्ततज्वर सात दिन मे, पित्तप्रधान दस दिन मे और कफप्रधान सन्ततज्वर प्राय गरह दिन में उतर जाता है। कभी-कभी जब उक्त अवधि मे ज्वर शान्त नही होता तो दीर्घकाल तक वना रह जाता है।

सन्तत ज्वर की असहनीयता


यह ज्वर सदा दोग के अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। जैंगे---

- (१) वसन्तमातु में (काल) मेद धातु के दूरित होने पर (दूष्य) कफ कित के मनुष्य में (प्रकृति) कफ से ज्वर होता है।
- (२) दारद्श्यतु मे रक्त के दूषित होने पर पित्त प्रकृति के मनुष्य मे पित्त से वर होता है।
- (३) वर्षाऋतु मे अस्यिष्ठातु के दूषित होने पर वात प्रकृति के मनुष्य मे गत से ज्वर होता है।

यह मन्तत ज्वर त्रिदोपज होता है, फिर भी जो दोप तीनो दोपो मे प्रधान होता है, वह अपने अनुकूल ऋतु, प्रकृति एव दूष्य के अनुमार ज्वरोत्पादक होता है। इस प्रकार काल दूष्य-प्रकृति के अनुकूल होने से यह निष्प्रत्यनीक (विरोध-एहित) होता है, अतएव वह अत्यधिक दु मह होता है।

सन्तत ज्यर के वारह आश्रय

सन्ततज्वर मे जिम प्रकार वात-पित्त-मक ये तीन दोप दूषित होकर रस-रक्तादि सात धातुओं को दूषित करते हैं, उसी प्रकार मूत्र और पुरीप को भी दूषित करते हैं। इस प्रकार तीनों दोप, सात धातुएँ और मूत्र एव पुरीप ये सभी दूषित होने हैं। अत इसके ३ + ७ + २ = वारह आश्रय होते हैं।



जव गन्तत ज्वर मे रस-रक्त आदि दूष्य पूर्णरूप से शुद्ध नही होते अथवा कुछ

१ कालदृष्यप्रकृतिभिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततम् । निष्यत्यनीक कुम्त तरमाज्येय सुदु मह ॥ च० चि० ३।५५

[,]२ यथा धार्त्रेम्नथा मूत्रं पुरीप चानिलादय । युगपच्चानुपद्यन्त नियमात् मन्तते व्वरे ॥ द्वादशैते समुद्दिष्टा सन्ततस्याश्रयास्तदा । च० चि० ३।५६,६९

बुद्ध और कुछ अबुद्ध होते हैं, तो यह वारहवें दिन छोड देता है, किन्तु इसका अन्यक्त लक्षण वना रहता है। फिर वह १३वें दिन प्रकट हो जाता है, तब इसका शमन कठिन हो जाता है और यह दीर्घकाल (१४,१८,२२,२८,४४ दिन) तक वना रह जाता है।

सन्तत ज्वर की विषमता

यह सन्देह किया जाता है, कि सन्तत ज्वर एक अविसर्गी (लगातार बना रहनेवाला) ज्वर है, तो फिर इसे क्योकर विषमज्वर माना जा सकता है ? क्योकि जो ज्वर मुक्तानुबन्धी (छोड-छोड कर होनेवाला) होता है, उसे ही विषमज्वर कहा जाता है तथा खरनाद ने इसे विषमज्वर नहीं माना है।

समाधान — वस्तुत सन्ततज्वर भी वारहवें दिन अपने लक्षणों को छोड देता है और उसके लक्षण अव्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अव्यक्त लक्षण रूपी विसर्ग या मुक्तानुबन्धित्व लक्षण सन्तत में भी प्राप्त होता है, यह वारहवें दिन छोड तो देता है, किन्तु फिर तेरहवें दिन प्रकट हो जाता है। अत मुक्तानुबन्धी होने से इसे विपमज्वर मानना युक्तिसङ्गत है। "

सन्तत ज्वर को सम्प्राप्ति

बढे हुए दोप सम्पूर्ण शरीर मे फैले हुए रमवाही स्नोतो मे फैल जाते हैं, जिससे स्तब्धता हो जाती है और वे सन्ततज्वर उत्पन्न करते हैं। ⁹

सन्तत ज्वर की चिकित्सा

कलिङ्गादि क्वाथ

इन्द्रजी १० ग्राम २०० मिलीलीटर जल मे परवल का मूल १० ग्राम भकावे, चौथाई शेप बचे ती कुटकी ५ ग्राम छानकर प्रात काल पिलावे।

वातप्रधान सन्तत ज्वर मे

३-३ घण्टे पर ४ बार
सौभाग्य वटी ५०० मि० ग्रा०
वृहद् वातचिन्तामणि २५० मि० ग्रा०
योग ४ मात्रा
आर्द्रेक स्वरस 🕽 चम्मच और मधु से।

१ विसर्गे द्वादशे कृत्वा दिवसेऽन्यक्तलक्षण । दुर्लभोपञम काल दीर्घमप्यनुवर्तते । च० चि० ३।५९--६०

२ स्रोनोभिविसना देहा गुरवो रसवाहिभि । सर्वदेहानुगा स्नब्धा ज्वर कुर्वन्ति मन्ततम् ॥ च० चि० ३।५३-५४

३ यह मलेरियल रेमीटेण्ट फीनर (Malerial remitent fever) के साथ मामधस्य रंग्वता है।

पिलप्रधान ज्वर मे

३-३ घण्टे पर ४ वार सीभाग्य वटी ५०० मि० ग्रा० मुक्ताशुक्ति ५०० मि० ग्रा० योग ४ मात्रा भुनी वही इलायची चूर्ण २५० मि० ग्रा० और मधु से। कफुप्रधान ज्वर में

ŧ

३-३ घण्टे पर ४ वार सौभाग्यवटी ५०० मि० ग्रा० २५० मि० ग्रा० रससिन्द्रर

> योग ४ मात्रा भुनी लींग का चूर्ण १२५ मि० ग्रा० और मधु से। सतत ज्वर को सम्प्राप्ति

जब कुपित दोग रक्तघातु मे आश्रित होता है, तब वह काल-प्रकृति-दूष्य के विरोधी होने से क्षय तथा वृद्धि के स्वभाववाले सततक ज्वर को उत्पन्न करता है। वह सततकज्वर दिन-रात मे २ वार उत्पन्न होता है।

वक्तव्य-भग्नकोष र टीका में कहा गया है, कि चाहे दिन में २ वार या रात में २ वार अथवा दिन मे १ वार और रात मे १ वार ज्वर होता है। गणनाथ सेन जी ने इसे कृच्छसाध्य कहा है।

आधुनिक डवल क्वाटिडियन (Double quatidion) के साथ इनका साम्य है। जब दोप के विपरीत काल होता है, तो ज्वर का क्षय हो जाता है और जब दोप के अनुकूल काल होता है, तो ज्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे-

- 9 वातप्रधान ज्वर दिन के अन्तिम भाग और रात्रि के अन्तिम भाग मे बढ जाता है।
 - २ पित्तप्रधान ज्वर दिन के मध्याह्म और रात्रि के मध्य मे बढ जाता है।
 - ३. कफप्रधान ज्वर दिन तथा रात्रि के प्रथम भाग मे वढ जाता है।

र रक्तभात्वाश्रय प्रायो दोप सनतकं ज्वरम्॥ सप्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धिक्षयारमकम्। महोरात्रे सततको दी कालावनुवर्तते॥ च० चि० शहर ६२

२ अहि ही काली रामी ही काली या, सहि एककाल रामानेककाल या, ही कालानितीशान देव । मा० नि० ज्वर० १५ (मधुकोप टीका)

रै. अहोरान्ने सततको दी कालावनुवर्तते। स कृष्युसाध्यो (जीर्णस्तु स कालकार उच्यते) ॥ सि० नि० स० १।१८९ ও কা০ দ্বি০

सततक ज्वर की चिकित्सा

पटोलावि बवाध

परवल की पत्ती या मूल ५ ग्राम अनन्तमूल की जह ५ ग्राम नागरमोथा ५ ग्राम पाठा ५ ग्राम कूटकी ५ ग्राम

उक्त सभी दवायें भूसा की तरह कूट कर २५० मि० ली० जल मे चतुर्थांशाविषट क्वाथ बनाकर प्रात काल पिलावे ।

३-३ घण्टे पर.४ बार
ज्वराइकुश २५० मि० ग्रा०
वेताल रस २५० मि० ग्रा०
चन्द्रोदय <u>१२५</u> मि० ग्रा०
योग ४ मात्रा

हर्रासगार और तुलसी के पत्र स्वरस मिलित १ चम्मच और मघु से । अथवा ३-३ घण्टे पर ४ बार ज्वरक्रुञ्जरपारीन्द्र २५० मि० ग्रा०

योग ४ मात्रा

पान की पत्ती के है चम्मच रस और मधु से।

सततक भेद: कालज्वर

जव सततक ज्वर पुराना हो जाता है, तव उसे कालज्वर या कालाजार कहा जाता है। यह सततक विधमज्वर धातुओं में अन्तर्लीन होकर रहता है और समय-समय पर प्रकट होता है। रोगी की अग्नि मन्द हो जाती है, ध्रारीर बलहीन एव क्षीण होता है। धरीर पीला पड जाता है, घोथ, विवर्णता और प्लीहोदर हो जाता है। यह दुख्रिकित्स्य होता है। इसमें उपद्रव स्वरूप अतिसार हो जाता है, कदाविष् नासिका या मसूडों से रक्तम्राव होने लगता है। रोगी के कपोल का मास गलने लगता है। इसे लिसमैनिएसिस या काला-अजार कहते हैं।

सुश्रुत ने इसे लाघरक नाम से कहा है, जिसका वर्णन पाण्डुरोग के अन्तर्गत किया है। इसे अलसक या पानकी भी कहते हैं।

१ सि० नि० ख० १।१९०-१९४

२ (क) सकामलापानिकपाण्डुरोग कुम्भाद्ययो लाघरकोऽलसाख्य ।

⁽ ख) ज्वराङ्गमर्बभ्रममादतन्द्राक्षयान्वितो लाधरकोऽलसाख्य ॥ सु० उ० ४४।६, १३

⁽ग) सन्तापो भिन्नवर्चस्त्वं विहरन्तक्ष पीतता । पाण्डता नेत्रयोर्थस्य पानकी रुक्षणं भवेद ॥ च० चि० स० १६

कालज्वर की चिकित्सा

सुश्रुत का प्रवालमुक्तादि योग कालज्वर की उत्तम औपध है।

प्रवालमुक्तादि योग

३-३ घण्टे पर ४ बार

प्रवालमस्म २५० मि० ग्रा०
मुक्ताभस्म २५० मि० ग्रा०
शुद्ध नीलाञ्जन २५० मि० ग्रा०
शासमस्म २५० मि० ग्रा०
शुद्ध स्वर्णगैरिक ५०० मि० ग्रा०
योग ४ मान्रा

कालमेघ की पत्ती के रस तथा हर्रीसगार की पत्ती के रस मिलित १ चम्मच बीर मधु से।

ज्वर की विशेषता मे

(पूर्वोक्त) प्रवालमुक्तादि योग ५०० मि० ग्रा० ज्यरकुञ्जरपारीन्द्र ४०० मि० ग्रा०

३-३ घण्टे पर ४ बार हरसिंगार की पत्ती के रस और मधु से।

अथवा---३-३ घण्टे पर ३ बार

पुटपक्व विषमज्वरान्तक ४०० मि० ग्रा०

प्रवालभस्म

४०० मि० ग्रा०

शखभस्म

४०० मि० ग्रा०

योग ४ मात्रा

हरसिंगार के रस और मधु से।

नीलाञ्जन (एण्टोमनी) का एक विशिष्ट योग, इस रोग की वहुश परीक्षित औप है— यूरिया स्टेबेमीन। इसका आविष्कार डॉ॰ ब्रह्मचारी ने किया और वह कालज्वर की रामवाण औषघ है।

अन्येद्युष्क ज्वर

चौवीम घण्टे मे एक बार आनेवाला ज्वर अन्येद्युष्क कहलाता है। चुश्रुत के अनुसार इसका आश्रय मासघातु है—'सोऽन्येद्यु पिशिताश्रित'—सु० उ० ३९।६७। चरक के अनुसार मेदघातु अन्येद्युष्क का आश्रय है—'अन्येद्युष्क ज्वर दोषो रुद्ध्वा मेदोवहा सिरा'। च० चि० ३।६३।

१ प्रवालमुक्ताञ्जनशङ्खचूर्णे लिखात्तया काञ्चनगैरिकोत्यम् । सु० उ० ४४।२४

२ अन्येषुष्कस्त्वहोरात्रादेककालं प्रवर्तते । सु० उ० ३९।७०

सुश्रुत ने अहोरात्र मे एक बार ज्वर आने का कारण यह वतलाया है, कि कफ का स्थान हृदय भी होता है एव जब कुपित दोष हृदय में होते हैं, तो वहाँ से २४ घण्टे मे आमाशय मे आते हैं और आमाशय मे आकर ही ज़बर उत्पन्न करते हैं।

अन्येद्युष्क ज्वर की सम्प्राप्ति

काल, प्रकृति, दूष्य, इनमे से किसी एक का वल प्राप्त कर सप्रत्यनीक (अर्थात् काल, प्रकृति, दूष्य इनमे से कोई भी एक या दो जिसके प्रतिकृत या विरोधी हो ऐसा) दोष मेदोवहा सिराओं में अवरोध उत्पन्न कर दिन-रात में एक वार ज्वर उत्पन्न करता है। इस ज्वर के आने का कोई निश्चित समय नही होता है। किन्तु २४ घण्टे मे किसी एक समय प्रकट हो जाता है । आधुनिक क्वाटिडियन फीवर से इसकी समता है।

अन्येद्युष्क ज्वर की चिकित्सा

निम्बादि क्वाथ

परवल की पत्ती ५ ग्राम नीम की छाल ५ ग्राम निर्वीज आवला ५ ग्राम हर्रा ५ ग्राम बहेहा ५ ग्राम नागरमोथा ५ ग्राम इन्द्रजी ५ ग्राम

चौगूने जल मे चतुर्थाशावशिष्ट क्वाय बनाकर प्रात काल पिलाना।

३-३ घण्टे पर ४ वार

महाज्वराड्कुश ५०० मि० ग्रा० गोदन्तीभस्म १ ग्राम

योग ४ मात्रा

तुलसीपत्र-स्वरस तथा मधु से।

अथवा --- ३--३ घण्टे पर ४ बार

ज्वरकुञ्जरपारीन्द्र ५०० मि० ग्रा० १ ग्राम

गोदन्तीभस्म

योग ४ मात्रा

तुलसीपत्र-स्वरस और मधु से।

१. कालप्रकृतिदूष्याणा प्राप्येवान्यतमाद्बलम् । अन्येषुष्कं ज्वरं दोषो रुद्ध्वा मेदोवहा सिरा-। जनयत्येनकालमहानिशि ॥ च० चि० शद् सप्रत्यनीको

तृतोयक ज्वर

यह जार जिस दिन आता है, उसके दूसरे दिन नही आता है, फिर तीसरे दिन आ जाता है। इस प्रकार बीच मे एक दिन छोड़कर तीसरे दिन पुन होनेवाले ज्वर को तृतीयक ज्वर कर्ते हैं। सुश्रुत ने इस ज्वर मे दोप को मेदधातु के आश्रित कहा है। चरक ने अस्थि के आश्रित दोप को इस ज्वर का जनक माना है। आधुनिकों के अनुसार यह टिंग्यन फीवर (Tertian fiver) है।


डत्हण³ ने कण्ठम्थ दोष को तृतीयक का जनक कहा है। कण्ठदेश में स्थित दोष एक बहोरात्र में वक्ष स्थल में तथा दूसरे बहोरात्र में क्षामाशय में आकर अपने प्रकोप काल में तीसरे दिन तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है।

तृतीयकज्वर की सम्प्राप्ति

अस्थिगत सप्रत्यनीक (विरोधी सहित) दोष, काल, प्रशृति, दूष्य, इनमे से किमी एक से वल प्राप्त कर अपने प्रकोषकाल मे, तीसरे दिन तृतीयक ज्वर उत्पन्न करता है।

तृतीयक के तीन प्रकार

- (१) कफ और पित्तप्रधान विदोप से होनेवाला तृतीयक ज्वर पहले विक-प्रदेश (कगर) में जकडन तथा दर्द उत्पन्न करता है।
- (२) वात और कफ प्रधान त्रिदाय से होनेवाला तृतीयक ज्वर पहले पीठ में वेदना उत्पन्न करता है।
- (२) वात और पित्तंप्रधान त्रिदोप से होनेवाना तृतीयक ज्वर पहले शिर मे वेदना उत्पन्न कर तव फिर समस्त शरीर को प्रभावित करता है।



तृतीयक ज्वर की चिकित्सा

तृतीयक ज्वर को साधारण कर्म नष्ट करता है। " साधारण शब्द से दैवव्यपाश्रय

१ मेटोगतरतृतीयेऽद्धि । सु० उ० ३९ ।

२. दोषोऽस्थिमञ्जग कुर्यात्त्तीयकचतुर्थकौ । च० चि० ३।६४

३ कण्ठस्थरत्नीयकम् । डल्हण

४ कफपित्तात् त्रिकग्राही पृष्ठाद् वातकफात्मक । वान्पित्ताच्छिरोग्राही त्रिविध स्यात् तृनीयक ॥ च० चि० ३।७१

५ वर्म साधारण ज्ञान्तियकचतुर्यकी । च० चि० ३।०९२

और युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा का ग्रहण किया जाना चाहिए। अर्थात् दोष के ससर्ग के अनुसार क्वाथ, चूर्ण, आसव-अरिष्ट आदि का यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए।

विषमज्वर मे आगन्तुक (भूत-प्रेत या जीवाणु) का भी अनुबन्ध होता है, अतः जीवाणुनाशक होम-नियम-बल्लि-मगलाचार आदि दैवव्यपाश्रय विकित्सा भी करनी चाहिए।

किरातादि क्वाथ

चिरायता ५ ग्राम गुरुच ५ ग्राम लालचन्दन ५ ग्राम सोठ ५ ग्राम

सभी का मोटा चूर्ण बनाकर २०० मि० ली० जल मे चतुर्थांविशिष्ट क्वाय बनाकर प्रात काल पिलाना चाहिए।

ज्वर के वेग के समय से ६ घण्टा पूर्व से २-२ घण्टे पर ३ बार

गोदन्ती भस्म १ ग्राम
रसिसन्दूर ३०० मि० ग्रा०
भुना करजबीज चूर्ण ३ ग्राम
योग ३ मात्रा

चिचिडी के पत्ते के १ चम्मच रस और मधु से।

अथवा---

ज्वर आने के ६ घण्टा पूर्व से २-२ घण्टे पर त्र्याहकारि रस ५०० मि० ग्रा० भुना अतीस चूर्ण <u>१३</u> ग्राम योग ३ मात्रा मधु से।

चतुर्थकज्वर

जो ज्वर बीच मे २ दिंन छोडकर पुन: चौथे दिन का जाता है, उसे चतुर्थंक ज्वर कहते हैं।

सम्प्राप्ति

काल, दूष्य तथा प्रकृति, इनमे से किसी एक के या दो के वल को प्राप्त कर

१ आगन्तरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे । च०/चि० शर९३

२. शापाभिचाराद् भूतानामनुषङ्गाच यो ज्वरः । देवव्यपाश्रयं तत्र सर्वमीषधमिष्यते ॥ च० चि० ३।३१७-३१८


३ दिनद्वयं यों विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः। च० चि० श६७

सप्रत्यनीक (काल-प्रकृति-दूष्य में से किसी एक या दो के प्रतिकूल रहने पर) दोष, वीच में २ दिन छोडकर अपने प्रकोपकाल में चौथे दिन चतुर्थंक ज्वर को उत्पन्न करता है। इसका जनक दोष मज्जाधातु के आश्रित रहता है।

काश्यप के अनुसार चतुर्यंक जनक दोप शिर स्थ होता है। वह शिर मे स्थित दोष दूसरे दिन कण्ठ मे, तीसरे दिन वक्ष मे और चौथे दिन आमाशय मे आकर अपने प्रकोपकाल मे चतुर्यंक ज्वर को उत्पन्न करता है।

प्रभाव भेद से चतुर्थंक के दो भेद

चतुर्यंक ज्वर प्रभाव भेद से दो प्रकार से पीडा करता है। जब वह कफप्रधान होता है, तो वह प्रथम जघाओं की पिण्डलियों में पीडा उत्पन्न कर समस्त शरीर को प्रभावित करता है और यदि वह वातप्रधान होता है, तो पहले शिर में पीडा उत्पन्न कर तब शरीर को पीडित करता है।



चतुर्थंक ज्वर की चिकित्सा

गुडूच्यामलकादि क्वाय

गुरुच १० ग्राम निर्वीज औवला १० ग्राम नागरमोथा १० ग्राम

विधिवत् क्वाध वनाकर सवेरे शाम पिलाना ।

ज्वर आने के ६ घण्टा पूर्व से २-२ घण्टे पर ३ बार

हरिताल भस्म ३०० मि० ग्रा०

योग ३ माना

तुलसीपत्र-स्वरस तथा मधु से।

अथवा---

ज्वर आने के ६ घण्टा पूर्व से २-२ घण्टे पर ३ बार चतुर्थंकारि रस ५०० मि० ग्रा० योग ३ मात्रा

१ काइयप० खिल० १

२. चतुर्यको दर्शयति प्रभाव द्विविध ज्वर । जद्वास्यां इलैप्मिक पूर्वे शिरस्तोऽनिलसम्मव ॥ च० चि० ३।७२

मघु और हरसिंगार की पत्ती के रस से। अधवा----

ज्वर आने के ६ घण्टा पूर्व से २-२ घण्टे पर ज्वरकुञ्जरपारीन्द्र ५०० मि० ग्रा० भूना करजबीज चूर्ण ३ ग्राम योग ३ मात्रा पान की पत्ती के रस और मधु से।

विपर्यंय ज्वर

चतुर्थंक विपर्यय जवर

जब दोष अस्थि और मज्जा दोनो में अवस्थित होते हैं, तब 'चतुर्थंकविपर्यय' नामक विषमज्वर उत्पन्न होता है। इसमें मध्य में दो दिन लगातार ज्वर रहता है और इन दो दिनो के पूर्व और प्रखात् १-१ दिन ज्वर नहीं रहता है।

कतिपय विद्वान् चतुर्यंक विपर्यय की तरह तृतीयक, अन्येद्युष्क तथा सततक का भी विपर्यय मानते हैं।

वृतीयक विपर्यय

जो विपयंय आदि और अन्त के दिनो को छोडकर मध्य में एक दिन चढता है, जसे 'तृतीयकविपयंय' कहते हैं।

अन्येद्युष्क विपर्यय

दिन-रात के किसी एक समय को छोडकर शेष सब समय मे बने रहनेवाले ज्वर को 'अन्येड्ड्किविपर्यंय' कहते हैं।

सततक विपर्यय

दिन-रात के किसी दो समय को छोडकर शेष सब समय मे ज्वर के वेग का बना रहना 'सततकविपर्यय' है।

इन विपयंथो का कारण नाना प्रकार की दोष विकृतियाँ ही हैं।

वक्तव्य — आचार्य चरक ने केवल चतुर्थक विपर्यय ज्वर का वर्णन किया है, और कहा कि दोष अस्थि और यज्जा इन दो घातुओं में स्थित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करता है, वह 'चतुर्थक विपर्यय' होता है।

१. विषमज्वर प्वान्यश्रतुर्थकविषयैय । त्रिविधो धातुरेकैको द्विधातुस्य करोति यम् ॥ च० चि० ३।७३


२. कफस्थानेषु वा दोपस्तिष्ठन् दित्रिचतुर्षु वा। विपर्ययाख्यान् कुरुते विषमान् कुच्छ्साधनान् ॥ सु• उ० ३९।५५

बाचार्य सुश्रुत ने कहा है, कि कफ के स्थान हृदय, बागाशय आदि में स्थित दोष दूसरे और चौथे दिनों में विपर्यय सज्ञक क्रच्छ्रसाध्य विषमज्वरों को उत्पन्न करते हैं। बाचार्य सुश्रुत के इस कथन की व्याख्या करते हुए आचार्य जेज्जट ने बन्येचुक, तृतीयक और चतुर्थक, इन सनके विषयय ज्वरों का वर्णन किया है। जैसे—

- (१) आमाशय तथा हृदय दोनो मे दोप के स्थित होने से 'अन्येद्युष्क विपर्यय' ज्वर होता है।
- (२) आमाराय, हृदय तथा कण्ठस्थित दोप से 'तृतीयक विपर्यय' ज्वर होता है। जिस दिन हृदयस्य दोप आमाराय मे पहुँचकर ज्वर उत्पन्न करता है, उसी दिन कण्ठस्थित दोप सृदय मे आ जाता है और दूसरे दिन वही आमाराय मे पहुँचकर पुन ज्वरवेग प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार दो दिन ज्वर होकर एक दिन नहीं होता। इसको ही तृतीयक विपर्यंय ज्वर कहते हैं।
- (३) आमाशय, हृदय, कण्ठ और शिर मे स्थित दोप से 'चतुर्यकविपर्यय ज्वर' होता है।
- (क) प्रथम दिन हृदयस्य दोव आमाशय मे पहुँचकर ज्वर उत्पन्न करता है। उसी दिन कण्ठस्य दोव हृदय मे और शिर स्य दोव कण्ठ मे आजाता है।
- (ख) हितीय दिन पुन. ह्दयस्य दोप आगाशय मे पहुँचकर ज्वरवेग प्रारम्भ करता है और उगी दिन कण्ठस्य दोप हृदय मे पहुँच जाता है। इम प्रकार—
- (ग) तीसरे दिन भी हृदयस्य दोप आमाशय मे पहुँचकर ज्वर को उत्पन्न करता है।

उक्त क्रम से तीन दिनो तक लगातार ज्वर वना रहता है और एक दिन के लिए रोगी ज्वरमुक्त हो जाता है। इसे जेज्जटाचार्य ने 'चतुर्यक्रज्वर' कहा है।

ये पूर्वोक्त सभी विषयज्वर के प्रकार ऋषियो द्वारा वर्णित और मान्य हैं। यद्यपि इनके वर्णन में मतभेद है, किन्तु सभी पक्ष स्वीकार्य है। विषयज्वर के अनेकानेक प्रकार है, जो वर्णित प्रकारों से मिलते-जुलते हैं।



१ अहोरात्रादहोरात्रात् स्थानात् स्थांन प्रपथते । ततस्थामाद्ययं प्राप्य करोति विषमञ्चरम् ॥ कफस्थानविभागेन यथासङ्ख्यं करोति हि । सततान्येयुष्तञ्याख्यचतुर्थकान् सप्रञेषकान् ॥ सु० ७० १९।५१, ५५

२ माधवनि० ज्वर० ३९ पर मधुकोष-न्याख्या।

चिकित्सा

ें उन-उन विषमज्वरों की जो चिकित्सा कही गयी है, वही चिकित्सा उसके विषयंय विषमज्वरों की भी करनी चाहिए।

मलेरिया

परिचय

विषमज्वर के वर्णन के प्रसङ्ग में आचार्य सुश्रुत में विषमज्वर में आगन्तुक का अनुबन्ध होना बतलाया है और आचार्य चरक ने अभिषङ्ग ज्वर के कथन में भूताभिषङ्ग ज्वर का उल्लेख किया है। 'आगन्तुक' और 'भूत' शब्द से सूक्ष्म जीवाणु अर्थ ग्रहण करने से मलेरियाज्वर का विषमज्वर के साथ सामञ्जस्य वैठ जाता है, क्यों जिसे विषमज्वर के कारण आगन्तुक तथा भूत हैं, उसी प्रकार मलेरिया के भी कारण सूक्ष्म जीवाणु हैं और दोनों के लक्षण एक समान होते हैं।

कोप-प्रन्थों में भूत शब्द का अर्थ पिशाच और क्षुद्र जन्तु किया गया है। उ पिशाच मासभक्षी क्षुद्र जन्तुओं को कहते हं— 'पिशित मासमाचामित इति पिशाच।' इस प्रकार भूत शब्द जीवाणु वाचक है और वह विषमज्वर का कारण कहा गया है।

विशेष जाति के जीवाणु से होनेवाला मलेरियाज्वर अधिकाश विद्वज्जनों के मत मे विषमज्वर ही है।

यह शीतपूर्वक या दाहपूर्वक, शिर शूल, वमनेच्छा, सर्वाङ्गव्यथा आदि तीय लक्षणों के साथ उत्पन्न होनेवाला ज्वर है, जो वार-वार आक्रमण करता है। इसके आफ्रमण का काल कभी शीघ्र और कभी विलम्ब से होता है। इसके भोग का काल भी कभी अल्प और कभी अधिक होता है। वेग कभी मृदु और कभी तीक्ष्ण होता है। कभी जाडा लगता है और कभी सन्ताप के साथ शुरू होता है। इसमें विषम आरम्भ, विषम क्रिया और विषम काल, ये विषमज्वर के सभी लक्षण मिलते हैं।

मलेरिया का कारण

मलेरिया को उत्पन्न करनेवाले विशेष जाति के जीवाणु होते हैं, जिनका सवर्धन और प्रसार पच्छरों के द्वारा होता है। अत. मच्छर-बहुल स्थानों में मलेरिया का प्रकोप अधिक देखा जाता है। आनूप देशो, जलाशयो, मिलन, गन्दी व अन्धकारपूर्ण वस्तियों और तराई वाले इलाकों के आवासों में रहनेवाले लोग अधिकाश मलेरिया- ग्रस्त होते है। मच्छरों की वृद्धिवाले मौसम में मलेरिया अधिक फैलता है।

मलेरिया का प्रधान कारण प्लाज्मोडियम जाति का जीवाणु है, जिसका

१ आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमन्बरे । स्० ७० ३९।५६

२ कामशोकमयक्रीभैरभिपक्तस्य यो ज्वर । सोऽभिषक्षज्वरो शेयो यश्च भूताभिषक्षज ॥ च० चि० ३।११५

३. भूतं ह्मादी पिशाचादी जन्ती क्लीये त्रिपूचिते । मेदिनीकीप

४ विषमी विषमारम्भिकयाकालोऽनुषह्मवान् । अ० ह० नि० शह९

संवहन, प्रसार तथा मनुष्यो मे जपसर्ग एनापलीज जाति के मच्छरो द्वारा होता है। प्लाजमोडियम की चार जातियां मलेरिया उत्पन्न करती हैं। जैसे-

१ प्लाजमोडियम वाईवैवस मे **त**तीयकज्वर (Plasmodium vivax Benign tertian) चतुर्थंकज्वर २ प्लाजमोडियम मलेरिया से

(Plasmodiam Malaria Quartan)

घातक तृतीयकज्वर ३. प्लाजमोहियम फैल्सीफेरम से

(Plasmodium Falcisarum — Malignant tertian)

सामान्य तृतीयक के समान ४ प्लाजमोहिम आवेल से

Benign tertian) (Plasmodium Ovale —

इन जीवाणुओ के जीवन के दो विभाग होते है--- १ मच्छर के शरीर मे जीर २ मानव शरीर मे।

चिकित्सा की दृष्टि से जीवाणुओ की निम्नलिखित अवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण हीती हैं---

१ मशकदश द्वारा मानव-शरीर मे प्रविष्ट अशकेत (स्पोरोजोआ) रक्त मे जाकर, कुछ समय तक वृद्धि करके, यकृत् कीपाओं में सचित होकर एक सप्ताह में पर्याप्त वृद्धि कर रेते है।

२ यकृत कीपाओं के विदीर्ण हो जाने पर अशकेत (स्पोरोजोआ) रक्त प्रवाह मे पहुँचकर रुधिरकायाणू का भेदन कर अन्त प्रविष्ट होकर वृद्धि करते हैं। इस समय तक रोग का सचयकाल होता है—रोग का विशेष लक्षण प्रकट नही होता। जब रक्तकण विदीणं होता है और जीवाणु वाहर आ जाते हैं, तब घीतपूर्वक ज्वर होता है।

३ कुछ समय वाद जव जीवाणु विभाजन पद्धति से वृद्धि नही कर सकता, तव अशकेत का परिवर्तन व्यवाय कायाणु मे होता है, जो मशक शरीर मे बिना प्रविष्ट हए रोगोत्पत्ति-सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता।

घातक मलेरिया

(Malignant Malaria) .

घातक मलेरिया ज्वर का आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। उसमे बाहर से अल्प मात्रा मे सन्ताप होने पर भी तीव्र शिर शूल, वमन, दाह, सर्वाङ्ग वेदना, प्रलाप, मूच्छी इत्यादि गम्भीर लक्षण होते हैं। ज्वर का अनुवन्ध कई दिनो तक वना रहता है। पैतिक लक्षणो की उत्पत्ति होना, तृष्णा, दाह, शिर शूल, प्रवाहिका, कामला, प्लीहबृद्धि आदि के आधार पर इसका अनुमान किया जाता है।

मलेरिया का प्रभाव

मलेरिया के जीवाणु रक्तकणो का भक्षण कर बढते हैं, इस कारण दुर्वलता और रक्ताल्पता वढती है। मलेरिया मे अधिक सख्या मे रक्ताणु नर्व्हें होते हैं और इन

विनष्ट हुए रक्तकणों का भक्षण करना प्लीहा का काम है तथा प्लीहा का काम जब वह जाता है, तब वह स्वय वह जाती है। जीवाणु रक्तकणों के साथ प्लीहा में प्रविष्ट हो जाते हैं और प्र्लीहा में पहुँचकर उसके कोशाओं को दूषित कर देते हैं। अधिक दिनों तक जब यही क्रम चलता रहता है, तब प्लीहा में सूत्रमय तन्तुओं को रचना हो जाती हैं, जिससे वह कठोर हो जाती है और स्थिर रूप से वह जाती है। मलेरिया के जीवाणु यक्रत में जाकर उसके कोपाओं को विक्षुच्छ कर देते हैं, जिससे उसमें सूत्रमय तन्तु वह जाते हैं और यक्रत की वृद्धि हो जाती है। रक्तकणों के अधिक विनप्ट रोने से रक्तरञ्जक अधिक विमुक्त होकर रञ्जक पित्त को बढाते हैं एवं रञ्जक पित्त अधिक मात्रा में तैयार होता है। यक्रत उम सपूर्ण पित्त को निर्माण कार्य में लगाने में असमर्थ होता है, इसलिए वह रक्त में मिलकर कामला के तुल्य लक्षण उत्पन्न कर देता है। जो रक्तरञ्जक काम में नही आते, जनसे कृष्ण-रञ्जक-प्रभृति बनकर मूत्र में आकर उसे काला और लाल कर देते हैं अधवा नेत्रों के नीचे कपोल पर बैठ जाते हैं, जिससे कपोलों पर काले दाग मालूम होते हैं। रक्तकणों के अधिक विनष्ट हो जाने पर प्रोटीन के अधिक विमुक्त होने से यूरिया बन जाता है, इससे मूत्र गाढा हो जाता है।

मलेरिया ज्वर मे क्वेतकण भी अल्प हो जाते हैं। जब मलेरिया के जीवाणु पक्वाशय, अन्त्र और क्लैंप्मिककलाओं मे पहुँच जाते हैं, तब विसूचिका के लक्षण प्रकंट होते हैं और जब मस्तिष्क की कैशिक रक्त-प्रणाली मे पहुँचते हैं, तब उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं।

मलेरिया ज्वर की तीन अवस्थाएँ

प्रथम अवस्था—प्रथमावस्था आधे घण्टे से एक घण्टे तक रहती है। रोगी बेर्चन और उदास रहता है, शरीर शिथिल होता है, मन्धियों में दर्द होता है, शरीर काँपने लगता है तथा रोगी चारपाई पर उछलने लगता है और दाँत किटकिटाता है। अगुलियों का अग्रभाग नीला पड जाता है, फिर ताप बढ़ने लगता है, जिससे वेचैती बढ जाती है, जी मिचलाने लगता है, नाडों की गित तीव्र हो जाती है, मुखमण्डल लाल हो जाता है और हाथ-पैर या जोडों में ऐंठन मालूम होने लगती है।

दितीय अवस्था—रोगी के शरीर का ताप बढ जाता है और रोगी गर्मी महने में बसमय होता है। शरीर का तापमान १०३ से १०६ डिग्री तक वढ जाता है, जिससे रोगी प्रलाप करने लग जाता है। यह अवस्था-१ से ६ घण्टे तक रहती है।

तृतीय अवस्था—इसमे रोगी के मस्तक तथा चेहरे पर पसीने की वृंदें निकलने लगती हैं, फिर पूरे शरीर मे पसीना निकलने लगता है। पसीना होने से बेचैनी कम होती है, जबर शीझता से उतरने लगता है, रोगी को कमजोरी महसूस होने लगती है और प्राय नीद नहीं आती। यदि अधिक दिनो तक जबर का क्रम चलता रहता है, तो रोगी क्षीण तथा दुर्बल हो जाना है, रक्ताल्पता हो जाती है और उसका मनोवल गिर जाता है। यक्तनण्लीहा के यह जाने पर रोगी अधिक दिनो तक इस रोग की यन्त्रणा में पटा रह जाता है।

मलेरिया की जीवाणुजन्य सम्प्राप्ति

मलेरिया ने रीगी के दारीर में मलेरिया जनक जीवाणुओं का प्रवेश एनाफिलीज जाति के मच्छर के पाटने में होता है, जब कि वह मच्छर रवय मलेरिया के जीवाणु से उपमृष्ट होता है। मनुष्य के रक्तधानु में प्रशिष्ट मलेरिया के जीवाणु लालकणों को दिदीण करके बाहर जा जाने हैं, नो भीत राष्पपूर्वक करर का वेग प्रारम्भ होता है। ये जीवाणु निभिन्न प्रकार के होते हैं। उनके रनकण में बाहर जाने का काल भी भिन्न होता है जत मलेरिया करर के वेग भी अन्य-भटन समयों पर होते हैं।

इन जीवाणुओं के जीवन है निम्नितियत थी प्रक्र है-

(१) अभैयुनीचक्र

महारद्य के प्रवाद् मान्य रक्त में विषमज्यर के जिन जीवाणुओं का प्रवेश होता है, वे शिमाना के द्वारा अपनी कृष्टि मार्ग है—र्मी-पुरुषक्रयाय सायाणु (Male and female princiocyst) की आवश्याना नहीं होती, इमलिए इने अमैचुनीच्य करते हैं। प्रारम्भ के रक्त में प्रवेग के गमय के मुद्ध देर बाद ये यहत कोगाओं में सिवत होते हैं। वहाँ पर्याम मृद्धि होकर अधुनेती (Merozoiter) में स्पान्तर होता है। इसमें ६ में १२ दिन लगते हैं। यहत ने फुछ जीवाणु रक्तकायाणु के भीतर प्रविद्ध होकर मृद्धि मरते हैं। इन्हें एप्रिय कागाणुगत (Erythrocitic) कहते हैं। जीवाणु एक्पिरकायाणु के भीतर मर्जावत होने पर उनका विदारण करके लगीका में आते हैं। विदारण के समय रिवरकायाणु के भीतर गनित विजातीय प्रोमूजिन-यम विष पृषक् होकर रक्तरम में भिण्या है, जिसकी प्रतिक्रिया रूप में शीतपूर्वक जनराय मण् होता है।

- (१) प्लाजमोहियम याईनिस रा जीवन-चक्र ४८ घण्टे मे पूर्ण होता है, अत. रक्तरण में प्रिविष्ट हुए सपूर्ण अधुकेन ४८ घण्टे के प्रशास रक्तरण को विदीर्ण करके वाहर आते है। इस जाति के जीवाणुओं का उपमर्ग होने पर प्रति तीमरे दिन ज्वर का वेग आया करता है। अत प्राचीनों ने इसे तृतीयक ज्वर नाम दिया है।
- (२) प्लाजमोडियम मठेरिया नामक उपजाति के जीवाणु का जीवनचक्र ७२ घण्टे में पूर्ण होता है। अत रक्तकणों में लीन अशुकेत ७२ घण्टे पर रक्तकण की विदीषं कर बाहर आ जाते हैं, जिमसे मध्य में दो दिन छोडकर चौथे दिन ज्वर का वेग आ जाता है। इसे चत्र्यंक ज्वर कहते हैं।
- (३) प्लाच्मोहियम वादवंनम के दो स्प्रतन्त्र वश-विस्तार लगातार दो दिन होने से अन्येद्युष्क ज्वर होता है। यह २४ घण्टे मे एक वार आता है और पूर्ण विसर्गी स्वरूप का होता है, इसे तृतीयक विपयंग (Double tertian) भी कह सकते "। लाग्ययं यह कि किसी व्यक्ति को तृतीयक जीवाणु का उपसर्ग १ तारील को हुआ आद २ तारील को भी हुआ, जो जीवाणु १ तारील को स्रीर मे पहुँचे, वे १५ दिन

के सचयकाल (Incubation period) के पश्चात् १५, १७, १९ आदि तारीखों मे ज्वर उत्पन्न करेंगे। इसके अतिरिक्त २ तारीख को हुए उपसर्ग के फलस्वरूप १६, १८, २० आदि तारीखों में भी ज्वर होगा। इस प्रकार का वेग प्रतिदिन आयेगा। अत यह प्रतिदिन आनेवाला ज्वर अन्येद्युष्क ज्वर कहलाता है।

इसी प्रकार चतुर्थंक ज्वर जनक जीवाणु के पृथक्-पृथक् लगातार दो उपसगं होने से दूसरे प्रकार का ज्वर उत्पन्न होता है, जिसे चतुर्थंकविपर्यंय कहते हैं। चतुर्थंकविपर्यंय का चक्र तीन दिन का होता है, इसमे १ दिन छोडकर २ दिन लगातार ज्वर वना रहता है। चतुर्थंक ज्वर जनक जीवाणु के लगातार २ दिन उपसर्गे होने से चतुर्थंक विपर्यय ज्वर होता है।

जो जीवाणु १ तारीख को शरीर मे पहुँचे, वे २० दिन के सचयकाल के प्रश्नात्, २०, २३, २६, २९ आदि तारीखों में ज्वर उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार जो जीवाणु २ तारीख को प्रविष्ट हुए, उनके कारण २१, २४, २७ आदि तारीखों में ज्वर का वेग आयेगा। अत चतुर्यंक जनक जीवाणु के ही दो उपसर्ग से दो सज्वर दिन और एक ज्वररहित दिन होगा। इसे चतुर्यंक विपर्यंय कहते हैं।

(२) मैथुनी चक्र

रुषिरकायाणु के भीतर प्रवेश तथा जीवाणुओं की वृद्धि कुछ समय तक चक्रवत् होती रहती हैं। कुछ समय वाद विभाजन के द्वारा वृद्धि नहीं हो सकती, तब इसका रूपान्तर व्यवाय कायाणुओं में होता है। व्यवाय कायाणुओं की उत्पत्ति तृतीयक में प्रारम्भ से, घातक विषमज्वर में, एक सप्ताह में तथा चतुर्थक में ४ सप्ताह वाद होती है। इनकी वृद्धि तथा इनका रुधिर कायाणु प्रवेश न हो सकने के कारण रोगोत्पत्ति नहीं हो सकती। मशक्रदश के साथ इनका पुन मशक शरीर में प्रवेश होने पर वहीं स्त्री-पुरुष व्यवाय कायाणुओं का सम्मिलन होकर पूर्ववन् क्रियाशक्ति प्राप्त होती है। मशक शरीर में पोषित-वृद्धित होनेवाले चक्र को मैथुनीचक्र कहते हैं।

शीत विषमज्वर

जब कफ और वात दोष कुपित होकर त्वचा में ठहरते हैं, तो पहले शीत लगकर ज्वर चढता है। कुछ समय के बाद जब इनका प्रकोग कम होता है, तब पित्त कुपित होकर दाह आदि अपने लक्षण प्रकट करता है, इसको शीत विषमज्वर कहते हैं।

दाह विषमज्वर

जब पित्त प्रकुपित होकर त्वचा में ठहरता है, तो पहले दाह को उत्पन्न करके जबर उत्पन्न करता है, इसके बाद पित्त के शान्त होने पर जाडा लगता है। यह जबर अत्यन्त कष्टसाध्य होता है। २

१ त्वक्स्थी इलेष्मानिली शीतमादी जनयतो ज्वरे । तंयो प्रशान्तो पित्तमन्ते दाह करोति च ॥ सु० उ० ३९।५९

२ करोत्यादी तथा पित्त त्वनस्य दाहमतीव च। तस्मिन् प्रशान्ते त्वितरी कुरुत शीतमन्तत ॥ छ० उ० ३९।६०

विषमज्वर का विशेष प्रकार

जब शरीर में आहार रस, कफ और पित्त दूपित हो जाते हैं, तब क्लेब्मा से आधा देह ठडा और पित्त से आधा शरीर गरम मालूम होता है। इसका दो रूप है—

9 जब कोष्ठ मे दूषित पित्त पहुँचता है, तब शरीर का मध्य भाग गरम रहता है और हाथ-पैर मे कफ के स्थित होने से हाथ-पैर ठंडे रहते हैं।

२ जब कोष्ठ मे दूषित कफ पहुँचता है, तब कोष्ठ या मध्य शरीर मे ठण्डक रहती है एव हाथ-पैर मे दूषित पित्त के रहने से हाथ-पैर में गरमी रहती है।

प्रलेपक ज्वर

दोषों के सिन्धयों में पहुँचने पर प्रलेपक ज्वर की उत्पत्ति होती है। यह ज्वर सदा बना रहता है। प्रांत काल में इसका वेग कम हो जाता है और अपराह्त या सायक्काल में वढ जाता है। इममें बार-बार स्वेद निकलता है तथा रोगी को शरीर में भारीपन तथा शीत का अनुभव होता है। यह प्रलेपक नामक ज्वर है, जो राज-यहमा के रोगियों के लिए विशेष कष्टकारक होता है।

वातवलासक ज्वरे

यह वायु तथा कफ के प्रकोप से होने वाला ज्वर है। इसमे रोगी को प्रतिदिन मन्द-मन्द ज्वर रहता है, शरीर रूक्ष होती है और शोथ पहले हाथ-पर मे, फिर मध्य शरीर मे तया क्रमश धीरे-धीरे पूर्ण शरीर मे फैल जाता है। शरीर मे दुर्बलता हो जाती है और रोगी वेदना से त्रस्त होकर कराहता रहता है। कफ की अधिकता होने पर शीत लगती है और शरीर जकड जाती है। यह ज्वर जहाँ पर अधिक पानी होता है और जहाँ के लोग चावल अधिक खाते हैं, वहाँ विशेषकर होता है । यह चिरकाल तक सताता है और आनूप देश मे सक्रामक रूप से फैलता है।

वक्तव्य—'वातवलासक' शब्द में वात का अर्थ वायु और बलासक का अर्थ कफ है। वातवलासक ज्वर मे वायु और कफ प्रधान दोष हैं और इनके साथ पित्त का भी अनुवन्ध होता है। यह ज्वर मुख या हाथ-पैर मे शोथ उत्पन्न करता है। प्राय निचले अगो से प्रारम्भ होकर शोथ ऊपर की ओर बढता है। दुवंलता तथा वेदना के कारण

१ (क) प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गीरवेण च। मन्दज्वरविलेपी च स शीत स्थात प्रलेपक ॥ अ० म० नि० २

⁽ख) तथा प्रलेपको श्रेय शोषिणा प्राणनाशन । दुश्चिकित्स्यतमो मन्द सुकष्टो धातुशोषकृत् ॥ सु० उ० ३९।५४

⁽ग) प्रातहींनोऽपराक्षे य सायं वाऽपि प्रवर्तते। स्वेदै प्रलिम्पन् गात्राणि मोऽय श्रेय प्रलेपक ॥ सि० नि० ख० १।२०६

२ नित्यं मन्दज्वरो रूक्ष शूनकस्तेन सीदति।

^{&#}x27; स्तब्धाङ्ग इलेब्मभूयिष्ठो नरो वातवलासकी ॥ य० स० नि० २

३ जानूपमूमी वसर्ता स च तण्डुलमोजिनाम् । षृक्करोगवर्ता प्रायो बालानां त्वतिदारुण ॥ सि० नि० ख० १।२०५

अगो के सचालन में कब्ट होता है और अंगो में स्तब्धता होती है। कफ की अधिकता होने से जालासान, शीत, कास तथा श्वास जैसे उपद्रव होते हैं। रोग के बढ़ने पर फुप्फुस में शोथ भी पाया जाता है। वात से प्रेरित कफ से उत्पन्न होने के कारण इसे इलेब्सभूयिष्ठ माना गया है। लक्षणों के अनुसार आधुनिक दृष्टि से इस रोग को जानपदिक शोथ (Ehidemic dropsy) नाम दिया जा सकता है। शोथ, हृदय-दौर्न्ल्य, दृष्टिक्षय, ज्वर तथा कफज लक्षण इसमें विशेष होते हैं। हृदय के प्रभावित होने से हृददव तथा श्वास की मन्दता हो जाती है।

प्रेतोत्य ज्वर और प्रहोत्य ज्वर

देवता, पितृ आदि की अवहेलना या निन्दा करने से अथवा ग्रहो की पूजा-अर्घो का तिरस्कार करने से वे क्रुद्ध होकर विषम ज्वर सदृश ज्वरो को उत्पन्न करते हैं। वालको को जब ग्रहजन्य पीडा होती है, तो उन्हे ज्वर, अतिसार और वमन आदि लक्षण होतें हैं।

जातहारिणी ग्रह से ग्रस्त शिशु को ज्वर, तन्द्रा, प्रमीलक, पाण्डु, कामला, तृष्णा, अतिसार, विकृत स्वर, तालुशोष, मुखपाक, विसर्प आदि लक्षण हो जाते हैं। रेवती ग्रह के १६ प्रकार वतलाये गये हैं, उनमे जातहारिणी एक प्रमुख ग्रह है।

ग्रहोत्थ ज्वर मे रोगी अकस्मात् रोने या हँसने लगता है। ग्रहगृहीत बालको के लक्षण और चिकित्सा का अनेकश वर्णन किया गया है।

चिकित्सा

देवता आदि के क्रोध या ग्रहवाधा के कारण होने वाले ज्वरों में बिल-प्रदान, शान्ति, होम तथा सिद्धमन्त्रों के जप द्वारा पायों को दूर करना चाहिए तथा नील-कण्ठं भगवान् शकर की उपासना करनी चाहिए—

> विलिभ शान्तिहोमैश्च सिद्धैर्मन्त्रपदैस्तथा। पापापहरण चास्य कर्तव्य सिद्धिमिच्छता। भूतेश्वर नीलकण्ठ प्रपद्येत वृपध्वजम्॥

औपद्रविक ज्वर

सभी प्रकार के पुराने रोगो में, विशेषकर ग्रहणी आदि मे तीनो दोषो के प्रकोष से उपद्रवस्वरूप ज्वर की उत्पत्ति होती है। यह ज्वर प्रारम्भ से नहीं होता, किन्तु कालक्रम से उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार बाद में उत्पन्न होने के कारण यह अप-द्रविक ज्वर कहलाता है।

१ (क) काश्यपसंहिता, समस्यान, वेदनाध्याय तथा रेवतीकल्पाध्याय ।

⁽ख) सु० उ० त० ३७। (ग) हा० सं० ३।५५। (घ) मा० नि०, मस्रिका

२ व्याधेरुपरि यो व्याधिभैवत्युत्तरकालजः। छपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते॥ चरक

इस ज्वर के आरम्भ का समय और प्रकार तथा हग विषम होने से एव विषमा-रम्भ, निषम क्रिया और रिषम-काच इन निषम ज्वर-ज्ञाणों के होने से इसे विषम ज्वर माना जाता है। यह किसी रोग में चार में उत्तम होकर किर लगा रहता है और उस रोग की एच्छुमाध्य या असाध्य स्थिति का गोज कराता है।

विवम ज्वरों में सामान्य चिकित्सा-सूत्र

१ मुग्य रच से नृतीयक आर चतुर्वक इन वा निवमज्यमें को विशिष्ट मानकर इनके प्रतिकार के लिए मुन्तिन्त्रपाध्य और दैनव्याध्य , उन दोनो प्रकार के उपचार करने का निवेश तिया गया है। आगन्तुक (भूत प्रेत या जीवाणु ना भी सम्बन्ध होने ने दैनव्यपश्चिय तथा जीवाणु-नामक चिकित्सा या भी प्रयोग करना चाहिए।

२ विषयस्वर प्राय विद्रोगंज होता है, अत विद्रोग शामक चिकित्सा करनी चाहिए।

२ वातप्रधान विषमण्यर में धृतवान, अनुवासवयन्ति, निरुह्वस्ति, स्निग्धं तथा उपा उपचारों ने निहित्सा कवनी चाहिए।

४ पिनप्रधान² नियमजार में विरेचन के द्वारा नित्तनाशक द्रव्यों को डालकर शीरपाज-विधि ने पकाया 'ुआ हूप पिलाक" निक्त न वा सीतवीर्य प्रथ्यों से मिद्ध किये हुए घुनों का प्रयोग कर चिकित्ना करनी चाहिए।

५ वक्तप्रधान विषय करा में वसन करावर, पाचन द्रव्यों का प्रयोग कर, रूक्ष अप्रपान विकास या क्रमन कराकर और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर चिकित्सा करनी चाहिए।

६ विषमजार मे जायस्य हतानुनार पहले यमन और विरेचन कराना चाहिए। " यमनार्य— उत्तम मात्रा में (रोगी के वलानुगार) पट्पल छत पित्राकर यमन करावे या पूर्ण रूप में भोजन कराने के बाद यमन करावे। "कफाधिक में यमन करावे।

 ⁽क) श्रामञ्चलिपामार्ने श्लीण व्यरितिपीटिनम् ।
 विशेषेण नर ग्रहमतीमारो (निवाशनेष्य ॥

⁽य) द्वरारोत्रकदृत्यामच्छित्रतृतावयमायित । पाण्ट्रसेशी त्रिनिर्देषिरस्यान्य क्षीणो एतेन्द्रिय ॥

⁽ग) हत्यार्श्वरूट सन्ते। इक्टडिंग्यन्य रम् ज्यरः । तृत्या गुढ्यय पाक्षः विद्युर्युद्वातुरम् ॥

२ वातप्रधानं मर्पि। विनिधि मानुवासर्गे । स्तिग्धोगीरमधार्मधा अमर्थेद्वियमञ्चरम् ॥ न० वि० ३।२०४

३ विरेचनन पथ्या सर्विषा सम्हान च । विषमं निक्तशीर्त्रश्च ज्वरं यित्तीत्तर अयेन् ॥ च० नि० ३।२९७

४ वमन पाचन सक्षमगपान जिल्ह्या । अपायोष्ण च जिपम स्वरं झस्तं क्षफीसर ॥ न० नि० ३।२०६

५ विषमेषु च्वॅरचारी क्रियां सजीधनी चरेत । आयु० वि०

६ सापपो मा नी मात्रा पीत्वा या छर्दयेत पुन । उपयुज्यात्रपान वा प्रभूतं पुनरुक्तिरोत ॥ च० निर० ३।३०१

८ पा० द्वि

पित्तप्रधान विषमज्वरो मे विरेचनार्थं एरण्ड तैल, निशोथ, हरीतकी चूर्णं अथवा स्वर्ण-क्षीरी के मूल का प्रयोग कराना चाहिए।

७. जो रोगी क्षीण, दुर्बल, वृद्ध या वालक हो, उन्हें विरेचन सह्य नहीं होता, अत उनकी सरामन चिकित्सा करनी चाहिए।

चिकित्सा

- ८ प्रतिदिन प्रात काल लहसुन स्वरस मिलाकर घृतपान कराना चाहिए।
- ९ प्लीहोदर की चिकित्मा मे कथित 'षट्पल घृत' का रोगी के बलानुसार मात्रा मे प्रयोग कराना चाहिए।
- १० मुलहठी, परवल के पत्ते, कुटकी, नागरमोथा और हरें, इनको ५-५ ग्राम लेकर, विधिवत् क्वाथ वनाकर प्रतिदिन पिलाना चाहिए।
- 99 रोगी के बल.के अनुसार उसे प्रतिदिन उचित मात्रा मे घी, दूध, चीनी, मधु और पीपर के चूर्ण का यथायोग्य प्रयोग कराना चाहिए या पीपर का चूर्ण २ ग्राम ५० मि० ली० दशमूल क्वाथ के साथ प्रात -साय पीना चाहिए।
- १२ सुश्रुत० चि० ५।१२ मे कथित 'वर्धमानिष्पली' का प्रयोग करना चाहिए और क्षुधा लगने पर दूध या मासरस का सेवन करना चाहिए। अथवा मुर्गे के मास के साथ उत्तम मद्य का पान करना चाहिए।
- १३ पञ्चकोल घृत, पिप्पल्यादि घृत, गुडूच्यादि घृत, पटोलादि घृत, महाकल्याण घृत और पञ्चगव्य घृत का प्रयोग यथायोग्य करना चाहिए।
- १४. उवाला हुआ शर्करा, दूध, पीपर, मधु और घृत —इन्हे पश्चसार कहते हैं। इन्हे उचित प्रमाण मे लेकर मथकर प्रतिदिन पीने से विपमज्वर नष्ट हो जाता है। "

विषमज्वर मे एक-एक औषघ का प्रयोग

- १ नालाजीरा और गुड का सेवन।
- २ लहसुन डालकर पकाया हुआ तिल-तैल का सेवन।
- ३ त्रिफला चूर्ण तथा गुड का प्रयोग।
- ४ हरीतकी चूर्णं और मधु का मेवन।
- ५ गरम दूध मे तिल तैल मिलाकर सेवन।
- ६ हरसिंगार की पत्ती का रस और मधु।

१ प्रात प्रात समर्पिष्क रसोन मुपयो जयेत । सु० उ० ३९।२१३

२ सु० उ० ३९।२१४-२१५

३ पिप्पलीवर्षमान वा पिवेत् क्षीररसाशन । ताम्रचूटस्य मामेन पिवेद् वा मधमुत्तमम् ॥ सु० उ० ३९।२१७

४ मु० उ० इरार्१८, २१९ २२३, २२७ २२९, २३५ २३९, २४०-२४१।

५ श्नम्पय शकरा च पिष्पल्यो मधुसर्पिपी । पञ्चमारमिदं पेय भियन विषमन्त्ररे ॥ क्षतक्षाणे क्षये श्वामे हृद्रागे चनदिष्यते ॥ द्व० उ० ३९।२५७

- ७ नीम की छाल का क्वाथ पीना।
- ८. काली तुलसी का क्वाथ पीना।
- ९. द्रोणपुष्पी (गूमा) का स्वरस पीना ।
- १० चम्पाके फूल कारस पीना।
- १९ अपामार्ग की जट को लाल डोरे में बाँधकर रिववार को कमर में बाँधने से रोज आनेवाला ज्वर नहीं आता है।
- १२ जयन्ती की जड भी वांधने से लाभ होता है।
- १३. मकोय की जड कान मे वाँधने से रात्रि मे ज्वर नही होता है।
- १४ काकजघा (ककहिया) को लाल डोरे मे दाहिने हाथ मे बाँधे।
- १५ परिशार के मूल को लाल डोरे मे दाहिने हाथ मे वाँघे।
- १६ भारगी मूल दाहिने हाथ मे लाल डोरे से बाँघे।
- १७ लज्जावन्ती (लजैनी) लाल डोरे मे वाँह मे वाँघे।
- १८ भृगराज का मूल लाल डोरे मे वाँह मे वाँघे।
- १९. सफेद मदार की जड की छाल २ रत्ती तण्डुलोदक से सेवन करे।
- २० सफेंद कनेर के मूल की छाल २ रत्ती तण्डुलोदक से सेवन करे।
- २१ कुटकी के मूल को मदार के दूध की भावना देकर सेवन करे।
- २२ वनप्सा का अर्क पिलाना हितकर है।
- २३ व्वेत अपराजिता के पत्ते हाथ मे मलकर कपडे मे बाँधकर पोटली बनाकर सुँघे।
- २४ सिरस के फूलो के रस मे हल्दी और दारुहल्दी का चूर्ण घृत के साथ मिलाकर नस्य देने से चतुर्थक 'ज्वर नहीं आता।
- २५ समालू के पत्तो के रस का नस्य विषमज्वर-नाशक है।
- २६ सहदेवी का स्वरम काली मिर्च के साथ पीना चाहिए।
- २७ कालमेघ की पत्ती मरिच के साथ पिलाना चाहिए।
- २८ करञ्जवीज चूर्ण है ग्राम पीपर के २ रत्ती चूर्ण के साथ खिलावे।
- २९ सप्तपर्ण की छाल का चूर्ण ३ ग्राम दिन मे ३ वार देना चाहिए।

विषमज्वर की चिकित्सा के दो भाग

विषमज्वर की चिकित्सा वेग की दृष्टि से दो प्रकार की होती है--

- १ वेगकालीन चिकित्सा ।
- २ वेग-प्रतिपेधक चिकित्सा।

(१) वेगकालीन चिकित्सा

विषमज्यर के उत्पन्न हो जाने के समय उससे होनेवाले कम्प, शीत, अन्नमदंया दाह आदि के निराकरण के लिए जो चिकिन्सा की जाती है, उसे वेगकालीन चिकित्सा कहते हैं।

- (१०) ज्यर की प्रथमावस्था मे रोगी ठडक की तीव्रता से विस्तर पर उछलने त्रगता है, कंपकंपी की भयकरता से रोगी यस्त रहता है, उस समय सबसे वडी आवश्यकता होती है, उसे शीत से बचाना। इसलिए भारी रजाई या मोटा कम्बल ओडावे तथा निर्वात सुरक्षित स्थान मे रोगी को सुलावे।
- (२) द्वितीयावस्था मे ज्वर का वेग तीव हो जाता है और रोगी असह्य सन्ताप का अनुभव करता है। उस समय ताप को घटाना चाहिए। एतदर्थ—

३-३ घण्टे पर ४ बार

गोदन्ती भस्म १ ग्राम
जहरमोहरा पिष्टी ५०० मि० ग्रा०
रसादि वटी ५०० मि० ग्रा०
योग ४ मात्रा

पित्तपापडा के अर्क या पडझपानीय से दे।

इसके प्रयोग से सताप, दाह, तृष्णा और शिरोवेदना का शमन होता है। विवन्ध होने पर-विश्वतापहरण या अश्वकचुकी रस उपयुक्त अनुपान से

देना चाहिए। प्रलाप होने पर---वृ० कस्तूरीभैरव रम ५०० मि० ग्रा०

> ४ मात्रा लवग, ब्राह्मी, जटामासी, तगर और श्रखपुष्पी के क्वाथ से ४ बार ३–३ घण्टे पर देवे ।

तृष्णा की अधिकता मे----

३-३ घण्टे पर ४ बार

रसादि वटी ५०० मि० ग्रा० प्रवालपिष्टी ५०० मि० ग्रा० गुहूचीसत्त्व १ ग्राम षडगुपानीय से । ४ मात्रा

विषमज्वरघ्न औषधो मे कतिपय प्रमुख औषधें

विपमज्वरान्तक वटी
करजादि वटी
जया-जयन्ती वटी
महाज्वराड्कुश
मलेग्या वटी
कासीस गोदन्ती भस्म
लक्ष्मीनारायण रम
अमरसुन्दरी वटी

रात्रिज्वर में
विद्वेश्वर रस
शीतप्रधान ज्वर में
हरताल भस्म
मल्लभस्म
शीतमञ्जी रम
ज्वरकुञ्जरपारीन्द्र
नारायणज्वराकुश

ज्वरमहार रस मल्लादि वटी
विभुवनकीर्ति रस भूतभैरव रस
पचितक्त घन वटी ज्वरमुरारि वटी
त्र्याहकारि रस सप्तपं वटी
चतुथकारि रस बृहत् सर्वज्वरहर लौह

ं आधुनिक चिकित्सा में मलेरिया की निश्चित औषध के रूप में क्यिनीन का प्रयोग किया जाता है। यह सिनकोना नामक औषध वृक्ष की छाल के सत्त्व से बनती है। इसका चूर्ण, वटी या सूचीवेध के रूप में रोग और रोगी की दशा के अनुमार प्रयोग होता है।

विषमज्वर मे प्रयुक्त होनेवाली आधुनिक औषधें —

- (9) क्विनीन तथा मिनकोना (Quining and Cinchona)
- (२) क्लोरोक्वीन ग्रूप--
 - १ कैमाक्वीन (Camaquin)
 - २ रेमाचीन (Resochin)
 - ३ निवाक्वीन (Nevaquin)
 - ४ एवलोक्लोर (Avloclor)
- (३) पैल्युड्डीन (Paludrın)
- (४) एटेब्रिन (Atebrin)
- (५) मेपाक्रीन (Mapachrine)
- (६) पामाववीन (Pamaquin)
- (७) पेण्टाक्वीन (Pentaquin)
- (८) आयमो पेण्टाक्त्रीन (Isopentaquin)

वक्तव्य-विवनीन के अनेक यौगिक होते है।

- (१) मुख द्वारा प्राय विवनीन सल्फेट का व्यवहार होता है। इसकी १ माना लगभग ४०० मि० ग्राम की होनी चाहिए।
- (२) क्विनीन का प्रयोग प्राय ज्वराक्रमण के ४ घण्टा पूर्व से किया जाना है । एक व्यावहारिक योग—

Quinin sulph gr 5
Acid sulphdil mg 19
Glycerine mg 19
Aqua menthpip oz 1
9 मात्रा

प्रति ४ घण्टे पर दिन मे ३ वार।

(३) ज्वर की तीवावस्था में क्लोरोक्बीन वर्ग की औपधियों का पूर्ण माता में प्रयोग करना उत्तम है।

कायचिकित्सा

(४) ज्वर मुक्ति के वाद भी जीवाणुओं का पूर्णरूप से निर्मूलन नहीं होता। विवनीन एव पामाक्वीन का एक सप्ताह तक संयुक्त रूप से प्रयोग करने से स्थायी लाभ तथा रोग-प्रसार-प्रतिषेध दोनों ही कार्य पूर्ण होते हैं।

Quinin sulph grs 3
Pamaqvin gr रू
Yest tal 1
मात्रा 9

दिन मे ३ वार तीन दिन तक, २ बार तीन दिन तक और एक वार तीन दिन तक।

(५) पुराने विषमज्वर मे पैल्युड्रिन और पामाक्वीन का मिश्रण अधिक उपयुक्त है—

Paludrine gr 1
Pamaquin gr 2
9 Hist

दिन मे ३ बार पाँच दिन तक।

(६) तृतीयक ज्वर मे विश्व-स्वास्थ्य-सगठन (W H O) ने निम्नलिखित योग सर्वोत्तम बतलाया है—-

Totaquin grs 5
Paludrine gm 0 1
Yest gm 0 5
9 मात्रा

दिन मे ३ वार नीवू के शर्वत के माथ, एक सप्ताह तक।

(७) चतुर्थंक ज्वर मे क्लोरोक्वीन या कैमाक्वीन का प्रयोग १२५ मि॰ ग्रा॰ की मात्रा मे, दिन मे ३ वार एक सप्ताह तक करना चाहिए।

(२) वेग प्रतिषेधक चिकित्सा

सामान्य उपचार

मच्छरों को प्रश्रय देनेवाले स्थानों की पूणंत शुद्धि, पोखरे, तालाव, वावली, गड्ढे, नाली आदि की सफाई, डी॰ डी॰ टी॰, मिट्टी के तेल, पोटास, फामॅलीन आदि का प्रयोग कर मच्छरों का निवारण करना चाहिए। शरद ऋतु और वसन्त ऋतु में मच्छरों की अधिक वृद्धि होती है, अत इन ऋतुओं में पहले ही सावधानी के साथ घरों और आस-पास के स्थानों की सफाई करें।

मच्च्छर रात मे ही आक्रमण करते हैं, अते बाहर निकलने के काम दिन में ही निपटा लेना चाहिए। सोते समय रात में मच्छरदानी लगानी चाहिए। मोते समय

कहवा तेल लगाने से मक्टर नहीं गाटते। परे की ह्या में भी मच्छरों के आक्रमण से बचा जा सकता है।

विशिष्ट उपचार

- 9. धूपन—गुग्गुनु, नीम की पत्ती, घोड्यच, कडवा पूठ, हरें, पीली सरमो, जी और घी, इन सबकी फूटकर एक में मिलार आग में डालकर धुआ करने से विषमज्वर के बेग नहीं होने।
- २ अञ्जन-मेधानगर, पीपर और पुद्र भैनिमिन गमभाग लेकर तिए के तेल में वारीक पीनकर अञ्जन बनाकर करते के अन्यमत में पूर्व अञ्जत जगाना चाहिए।
- र. नस्य बाप भी न शी. मेधानम ह और शीन. सबको समान माना में स्वतंत्र वीतर र नस्य जैना चाहिए। अग्रता निर्देशी पूरी, पुराना पी और मेधानमक समान माना में पीमकर जब कि नेत ना का पूर्व नाम लेना चाहिए।
- ४ मण्यान-- रार पा येग आने के सनय अप माते के साथ प्रयोग मात्रा में मठपान का शया परना पातिए।
- ५. आस्यापनवस्ति कार के चेग के अने के समय ती आस्पापन का यान-वस्ति का प्रयोग नार्दे (प्रस्तिवा का प्रणात काक विश्व काल में किया गया है)।
- ६. लाल फिटबरी को तबे पर भूतकर गाया बना है और उनकी १ ग्राम की मात्रा बनावें में रापकर इवर के वैग के तमय के १ फण्टा पहले खिला थे, तो जबर नहीं जाना।
- अ चातुर्वेद इवर में नम्य-१ शिशिय के पूज के स्वरम में हत्यी और यायहत्यी मा चूर्ण और पून मिलाकर स्वरम में पीनाक नस्य कि में लाभ होता है। अ अगस्त्य-पत्र का स्वरम और शीम घीट कर नैयार नस्य का प्रतीम लाभकर है। अ मंबल अगस्वपत्र-स्वरम का नस्य भी लाभकर होता है।
- ८ रोगी के जानुमार हरतार भाग २५ में ५० मि० ग्राम तक की मात्रा में स्वेत वहा वाकी स्थेना मी के दूध में देना चाहिए। विशाद के दिन इमका प्रयोग बरे।
- ९ महाज्यराज्युम रम तथा चतृथकारि रम आदि का मथीनित प्रयोग करने मे चतुर्यक ज्यर में छुटकारा मिक्र जाता है।

देवव्यपाश्रय चिकित्सा

- १ पद्मराग आदि मणियो, नहुदेवी, अरामाग आदि औषधो, मागितक-मूगा, रद्राक्ष बादि द्रव्यो, वियो और अगद (विवच्न) प्रयो के धारण में विवमज्वर से मुक्ति मिन जानी है।
- े पार्नती, नन्दी आदि अनुचर तथा ब्राह्मी आदि अ र मातृगण के गाय भगवान् विव की सावधानी में पूजा करने में शीझ ही विवमण्यर में छुटकारा हो जाता है।
 - ^{३ विष्णु-नहस्रनाम का पाठ करने से तथा सहस्र दिारवाले, चर-अचर के}

स्वामी, व्याप्क भगवान् विष्णु की उपासवा करने से सभी प्रकार के ज्वर छूट जाते है।

४ नह्मा, अश्विनी मुमार, इन्द्र, अग्नि, हिमालय, गगा, मरुद्गण आदि को यज्ञा-हृति देने से ज्वर छूट जाना है।

भाता-िपता और गुरुजनो की भिक्तिपूर्वक पूजा करने से, ब्रह्मचर्य रहने से, तपस्या करने स, यत्य वोलने से, नियम पूर्वक रहने से, जप और होम करने से, दान करने से, वेदों के सुनने से और माधु-सज्जनों के दर्शन से मनुष्य ज्वर-मुक्त हो जाता है।

विषमज्वर मे पथ्य

9 विषमज्वर मे उपवास काना आवश्यक नहीं है। ज्वर के वेगकाल मे उपवास कराना चाहिए और वेग न रहने पर हजका, सुपाच्य एव पुष्टिकर आहार देना चाहिए।

२ मासाहार—जो व्यक्ति मामाहार में रुचि रखते हो, उन्हें पीने के लिए मण्ड के साथ मदिरा और खाने के त्रिए मुर्गा, तीतर तथा मोर का मास देना चाहिए।

३ अन्न-गेहूँ-जो की रोटी, मूग-चने की दाल का यूप, अगहनी चावल या साठी का चावल, बथुआ, करेला, परीता, परवल आदि का साक देना चाहिए।

४ फल दुग्ध-नारगी, सेव, खजूर, अनार, मुनक्का, किसमिम और गो दुग्ध देना चाहिए।

षष्ठ अध्याय

श्लेपदिक, मन्थर या आन्त्रिक, श्वसनक, श्लेष्म ह तथा आक्षेपक ज्वर

इलीपद

(फाइलेरिया · Filaria)

परिचय और निवंचन

१ दम कोग को न स्पाधी दृष्टि ने (जिस कोश में मैं मूजन होने से पैक पत्चर जैना पठोक एक क्यू को अंदर्ध) क-नेपद (शिकानत् पद क्लीपदम्) चहते हैं।

२ हार्या के पैर के समाप जना अस्पैर्म मोटाना हो जाने में उसे हस्तिनाद (एन्फिक्टिएनिस Liephantesis) महने हैं।

ह इन्हें इवाहक नाम्य—पार्केरिय वैजीपटाइ (Filaris Bancrofti) नामक कीलामु के होन ने पार्केरिय कहा है।

४. क्योरेंट कंग भागी के एक्षणों की सामित्र में अधिकतर होता है, जन को क्योपट करा कार्य है।

इलीपद का निदान

९ यह रक्षप्रधाप विद्योदन प्याधि है, इसिंग्यू क्षप्र रो बडाने या विकृत करने यारे मुप्ती आहार-विद्यार इस रोग के पारण हो स्वानं है।

२ उत्तरा प्रचार रागण माइको फर्डिंग्सा रामय जीवाणु है। पूर्ण परिवधित पुरुष-रिम बार्ग के गमार परिके, फीन के समान पर्दे-२ इश्व राग्ने होते है और स्त्री कृषि ३-४ इ-व राग्ने होती है। ये तीरो आपस में मिलकर लसीकावाहिनियों में एकत्र होते हैं एवं रमायनीजाएक, रमायनी और रमकुत्या में रहते हैं। ये पारमामक (Translucent) नया प्रत्यवर्ण है होते हैं। इनके बीन में मुख तथा किर के समीप जननेन्द्रिय होती है। माद्या अनेक वर्षी तक समय पर असरय माइक्रो-फाइलेरिया को उत्तरत्र क्रवंती है।

श्लीपदजनक फृमियो की विशेषतायें---

गुरम गुरमानिन्निच उर्थेक्षभश्य त्रवर्थिदिननिद्रापूपमिषपप्रपूरे ।
 तृहिनपनन ग्रांक क्ष्णमण सम्प्रकोषी प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसनौ ॥

२ सायकाल होते ही ये परिसरीय रक्त मे आना आरम्भ कर देते हैं और मध्य-रात्रि के समय एक बूद रक्त मे जनकी सर्वाधिक सख्या (३०० से ६०० तक) हो जाती है। इसीलिए परीक्षणार्थं क्लीपद रोगी का रक्त मध्यरात्रि मे ही लिया जाता है। सोने के समय मे परिवर्तन कर देने से ये रात्रि के स्थान पर दिन मे भी मिलने लगते हैं।

सहायक निदान

१ जलबहुल सीडनपुत्त स्थान — जहाँ पर पृथ्वी की सतह पर अधिकाश समय पानी जमा रहता है, ऐसे स्थान मे यह रोग प्राय होता है। जहाँ निदयौं अधिक हो, या समुद्री किनाग हो अथवा तालाव, पोखरे आदि हो, ऐसे स्थान को अनूपदेश कहते हैं। आगाम, वगाल, उड़ोसा, त्रावणकोर, कोचीन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले— वस्ती, गोरलपुर, देवरिया, बलिया और वाराणसी आदि इलीपद रोग के गढ हैं।

२ मच्छर—'क्यूलैक्स फेटिजेण्टस' नामक मच्छर इन रोग के कृमि का प्रसार करता है। जब क्लीपद के रोगी को क्यूलैक्स जाति का मच्छर काटता है, तो उसके उदर मे क्लीपद जनक जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं और वे मच्छर के कारीर मे फैल जाते हैं तथा बहुत से मच्छर की शुण्डा के निकट चले जाते हैं। जब वह मच्छर किसी को काटता है, तब वे शुण्डा से निकलकर दष्ट व्यक्ति की त्वचा में पहुँच जाते हैं और लसीका आदि में रहने लग जाते है।

लक्षण

जघाओ, पिण्डलियो और पैर के ऊपरी भाग में शोथ होने पर, उसे श्लीपद कहा जाता है। वक्षण प्रदेश में पीडा के साथ शोध होना और क्रमश पैर तक शोध का फैल जाना, भयकर वेदना होना और जाडा देकर ज्वर होना, ये श्लीपद के प्रमुख लक्षण हैं। हाथ-पैर में और अण्डकोपों में पीडा होती है। कभी-कभी यह हाथ, कान, नेत्र, शिज्न, ओष्ठ, स्तन और वृपण आदि अवयवों में फैल जाता है।

वातज श्लीपद का लक्षण

जो रुलीपद कृष्णवर्ण का हो, रूक्ष हो, फटा हुआ हो, जिसमे दरार पढी हो, जिसमे पीडा की तीवता हो और अकारण ही उग्र व्यथा हो तथा ज्वर सहित हो, उसे वातज रुलीपद जानना चाहिए।

१ (फ) बङ्घासु पिण्डी प्रपदीपरिष्टात् । स्थाच्छ्रलोदद मामकपास्रदीपात् ॥ च० चि० १२।९८

⁽ख) य मज्यरी वड्क्षणनो मृञाति शोथो नृणा पादात क्रमेण। तच्छ्रीपदं स्यत् वारकणनेनक्षिन्नीष्ठनामास्वपि केचिदाहु ॥ मा० नि०

⁽न) त्राक्षामु मुन्त्रयानंऽपि रागशोथरुनाकर । पुत्रान्ते प्रायशो भावी ज्वर इलैपदिक स्मृत ॥ मि० नि० प्र० ख०

वित्तज इलीपद का लक्षण

िन क्लीप्द ने मीय में पीलायन हो, याह हो और मृतुता हो तथा जबर हो, जो पित्तज जानना चाहिए।

कफा इलीपद का लक्षण

जिस स्हीपट में स्थित सोच में द्वेतता हो, चिक्रवादन हो, पाण्युता हो, गुरुता बीर स्थितता हो, हमें दक्षा जापना नाहिए।

संप्राप्ति

बयूलेवन फेन्ना जाति या मरहर इन्हीपर-जनक गृमि का मराहक होता है और अब बह मन्छर बनुष्य में काटना है, तय इस के द्वारा से गिम भाइका फाइ देशा वैक्रोपटाई (Micro Littre Bancroffi) मरुत्य के धरीर में प्रिक्ट हो जाते हैं। धरीर में प्रिक्ट हो उस प्रिक्तावाहितों, रत्रपुत्तम एन हमीका गिन्या में अपनी वृद्धि करके लक्षीका महिनयों में अपरोध जरहान करने हैं। इस प्रकार रथानिय लमीकानवय में इस्टा सूचन प्रावस्थ हो जाती है, जो आने चलकर जिला या पत्थर के समान करोर हो जाती है। संप्रयम उनीर एपिया में सूचन होती है और घोष के परिपानस्वरूप ज्वर हो जाता है, जा प्राय धीत के साथ होता है और घोष के परिपानस्वरूप ज्वर हो जाता है, जा प्राय धीत के साथ होता है और घोष के दिनों वक बना रहता है। जब रोग का दौरा चला जाता है, तो सूचन कम हो जाती है, किन्तु बुछ येथ रह जाती है। रोग मा पुत्र, पुत्र आक्रमण होता रहता है और जोर ज्वर तथा लगीवाधिनयों हा घोष बार बार दोता रहता है। इस पकार कई दौरे हीने के परस्कर आक्रान्य अन-दिश्य मा धीम परवर जैमा करा हो जाता है, जो अधिकालत पर के कपर होने न इस रोग को इतिपर महती है।

क्लीपद का उवंरक देशे

गरैंग आई रहने गाले प्रदेश, जहाँ पुराना पानी जमा रहता है. और जहाँ थोडी-बहुत ठटक मभी ऋतुओं में बनी राजी है, वहाँ गह रोग अधिकाश होता है। यन्दे स्थान और गरान, रागीर की गन्दगी तथा वस्त की गन्दगी, मशहरी का प्रयोग न करता, इस रोग की फीटाने में महायता पहुँचाते हैं।

अमाध्य लक्षग^२

जिन भीतर का शांप पतमी के की नरह शिवर और गाँठों से युक्त हो, एक वर्ष का पुराना हो और तो आकार में बड़ा हो, यह अमाध्य होता है।

जो कफ प्रमृतियारे पुरुष को एफपधंक आहार-विहार के सेवन से उत्पन्न हुआ हो, सावयुक्त हो, बहुन कँचा बढ़ गमा हो, जो मनी दोषों के लक्षणों से युक्त हो,

१ प्राणीहकसृथिष्ठा चर्नतेषु च ज्ञानला । य त्यास्त्रेषु सथन्त इश्रीक्तानि विभेषत ॥ मा० नि०

२ प्राप्तिकार म राम प्रण्टकीरपूर्वीयने । अन्द्रात्मक्त प्रमुक्ति विदेषन ॥ भाव निव

जिसमे खुजली होती हो और जिसमे कफ की अधिकता हो, उसे अमाध्य जानकर छोड देना चाहिए।

चिकित्सा-सूत्र

श्लीपद में मिरावेध करना चाहिए, कफनाशक सपूर्ण चिकित्मा करनी चाहिए तथा श्लीपद-पीडित स्थान पर सरसो का तेल लगाना चाहिए। लघन, आलेपन, स्वेदन और विरेचन का प्रयोग करना चाहिए।

सामान्य चिकित्सा

9 लघन — श्रीपद रोग में कफदीप की प्रधानता होती है, जिसके कारण शोध, भागीपन तथा अवरोध होता है। कफज रोगों में लघन; उपवास कराना श्रेष्ठ उपचार है। इन रोग का दौरा प्राप ए हादकी, अनावास्या और पूर्णिमा तिथियों में होता है, अत इन तिथियों में उपवास कराकर, रोग के दौर से रोगी को बचाया जा सकता है। यदि पूर्ण उपवाप न कर मके, तो दिन में एक बार भोजन करे तथा राजि में बिलकुल भोजन न करे।

इस रोग दा दौरा दिन की अपेक्षा नात्रि में होता है, नाोकि दिन की अपेक्षा रात्रि में कफ की दृद्धि होती है, इमलिए या तो रात्रि में उपवास करावे या एकदम हलका भोजन दे। कफ गर्ध के आहार—चात्रल, दही आदि का सेवन न करे। रोग के आक्रमण काल में पूर्ण लघन कराना चाहिए, किन्तु दौरा समाप्त हो जाने पर सम्भावित तिथियों में उपवास कराना चाहिए। जो रोगी उपवास नहीं सह सकते हो, उन्हें हलका भोजन देना चाहिए, क्योंकि लघु आहार को भी लघन कहा गया है—'लच्चन लघु भोजनम्'।

२ लेप—(क) धुन्तूरादि लेप—पत्रे की पत्ती, रेट के मूल की छाल, सिन्दुवार की पत्ती, गदहपुर्ना की जड, सिहजन की छाल, इन सबको समान भाग लेकर, कांजी मे पीसकर, सरसो का तेल मिलाकर, गरम कर, मोटा लेर लगाने से पुराना श्लीपद भी ठीक हो जाता है।

- (ख) यफेद मदार के मूठ की छाज की काँजी मे पीसकर छेप करे।
- (ग) सदनादि लेप मदनफ न और समुद्रलवण दोनो को १०-१० ग्राम लेकर, १० ग्राम मोम और ३० ग्राम भैंग के घी के साथ मिश्रित कर आग पर गरम कर लेप करने से श्लीपद में त्वचा की विदीर्णता और विवर्णता का नाश होता है।

थच्छ्लेष्मलाहार्गवहारजात पुम प्रकृत्याऽपि कफात्मकस्य ।
 सास्रावमस्युक्तनमर्वालिङ्ग मफण्डर वर्लेष्मयत विवर्ज्यम् ॥ मा० नि०

२ (क) मिराकफण्तश्च विधि ममग्रस्तत्रेष्यते सर्पपलेपन च। च० चि० १२।०८

⁽ख) लहुन।लेपनस्वेदरेचने रक्तमेचने । प्राय क्लेब्सहरेस्टब्बे क्लीपद ममुपाचरेत् ॥

⁽ग) प्रच्छर्दन ल्ह्वनमझगोश्न स्त्रेदो विरेक परिलेपनद्ध । भै० र०

- (घ) मजिष्ठादि लेप--गजीठ, मुलह्ठी, रास्ना और गदहपुर्ना इन सबको समभाग मे लेकर काँजी मे पीसकर लेग करे। यह लेग दाह की अधिकता मे विशेष लाभकर है।
- ३ रेचन समभाग त्रिफला के क्त्राय मे २५ मि० ली० गोमूत्र मिलाकर प्रात -साय पिलाना चाहिए अथवा त्रिफ गचूर्ण, अमलतासे का गूदा, गोमूत्र या एरण्ड तैल का प्रयोग कर कीष्ठशुद्धि कराना चाहिए।

एक-एक औषघ के प्रयोग-

४ छोटी हरें को गोमूत्र मे भिगोकर पुन एरण्डतैल मे भूनकर चूर्ण बनाकर और सेधानमक मिलाकर, गरम जल मे नित्य प्रात -साय ३ ग्राम की मात्रा मे सेवन करने से श्लीपदजन्य अण्डवृद्धि मे लाभ होता है। वृद्धावस्था मे सामान्यत होनेवाली अष्ठीला वृद्धि मे भी हरीतकी चूर्ण ३ गाम और सेंधानमक १ ग्राम मिलाकर खाने से लाभ होता है।

- ५ सरमो का तेल १० ग्राम की मात्रा मे प्रतिदिने सेवन करे।
- ६ पूनिकरन की पत्ती का रस १० ग्राम समान भाग सर्पप तेल से सेवन करे।
- ७ विधारावीज चूर्ण ३ ग्राम गोमूत्र २०० मि० ली० के माथ प्रयोग करे।
- ८ मिहोर की २० ग्राम छाल का क्त्राथ गोमूत्र मिलाकर डेढ से दो माह तक पीने से पुराना श्लीपद भी ठीक हो जाता है। इसमे गरम-गरम घोना भी ठीक रहता है।

९ खैर की छाल का चूर्ण २ ग्राम और समभाग निम्वत्वक् चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन करे।

_	٠
च्	দা

			<i>e</i> .	
90	आंवला निर्वीर	१५ ग्राम	सोठ	२५ ग्राम
	हर्रा "	२५ ,,	मरिच	२५ ,,
	वहेडा ,,	२५ ,,	पीयर '	२५ ,,
	चाभ	२५ ,,	वरूण की छाल	२५ ,,
	गोलस्वीज	२५ ,,	गो≀खमुण्डी	174 ,,
	दारुहल्दी	२५ "	गुरुच	٠, د

विधारा वा दीज ३०० ग्राम लेकर चूर्ण बना ले तथा ४ गाम की मात्रा प्रात - सायं १०० मि० ली० गोमूत्र से दे।

११ पञ्चकोल चूर्ण---

पीपर	पिगरामू र	चाभ
नीता	सोठ	

इन पाँचों के समभाग का चूर्ण बना ले। प्रात -साय २-२ ग्रान गरम जठ से दे।

रस-मस्म

१२. प्रात -साय — पुनर्नवामण्डूर १-१ ग्राम मधु से दे।
१३ दिन मे ३ वार — महायोगराजगुग्गुलु १ ग्राम
मल्लिसिन्टूर ३०० मि० ग्राम
महालक्ष्मीविलास ३०० मि० ग्राम
योग ३ मात्रा

मधु से।

१४ व्यवस्था-पत्र

१. प्रात , साय, मध्याह्म
नित्यानन्द रस ५०० मि० ग्रा०
आरोग्यवधिनी १ ग्राम
योग ३ मात्रा

१ छोटी इलायची के चूर्ण और मधु से।

२ भोजनोत्तर २ बार

लोहामव ३० मि० ली० अमृतारिष्ट <u>३० लि०</u> ली० योग २ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

- ३ लेप--- घुस्तूरादि लेप या दशाङ्गलेप अथवा सिहोर की छाल का लेप लगावे।
- ४ रात मे सोते समय— श्लीपदगजकेशरी <u>२०० मि०</u> ग्रा० योग १ मात्रा

गरम जल से।

विशिष्ट चिकित्सा

शल्यकर्मविद् चिकित्सक द्वारा सिरावेध न राना चाहिए। जैसे—वातज श्लीपद मे, यदि पैर मे हो तो गुल्मसन्धि के ऊपर वाली सिरा का वेध करे।

विस्त मे गुल्फ की अध सिरा का वेश करना चाहिए।

कफज मे, क्षिप्र मर्म को वनाते हुए अगुष्ठ के समीप की सिरा का वेध करना चाहिए।

पश्य

- १ श्रीपद के रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए।
- २ मोते सगय शोयपुक्त अग को तिकया लगाकर ऊँचा रने।

- ३ भोजन मे रूक्ष अञ्चनी, गेहूँ, कुलथी, मूँग, चना और अरहर दे।
- ४ शाको मे कुटु, तिक्त एव दीपन-पाचन द्रव्यो का प्रयोग करे, जैसे परवल, सिहजन, करेला, वयुआ, गदहपुर्ना आदि लाभप्रद हैं।
- ५ शाको को सर्पप तैल मे बनावे, गरम मसाले और लहसुन प्याज का प्रयोग करे।
 - ६ गोमूत्र का सेवन तथा यदा-कदा एरण्डतैल का सेवन उत्तम है।
 - ७ सरमो के तेल का पान और आहार मे प्रयोग करना चाहिए।
 - ८ कफनाशक बाहार-विहार का प्रयोग लामकर होता।

अपथ्य

- १ श्लीपद रोग कफप्रधान होता है, अत कफवर्धक आहार-विहार का परित्याग करना चाहिए।
 - २ सभव हो तो आनूप देश और श्लीपद वाले प्रदेशों में निवास न करे।
 - ३ नया चावल, नया अन्न उडद, तिल आदि नही खायें।
 - ४ दही, गुड, रवडी, मलाई, मिठाई और सट्टे पदार्थ छोड दे।
- ५ कोहडा, वैगन, खटाई, मछली, भारी, चिकने और अभिष्यन्दी पदार्थ नहीं खाना चाहिए।
 - ६. आनूप जीवो का मास, नदी तालाव या पोखरे का जल सेवन न करे।

प्रतिषेघ

9 एकत्र हुए दूपित जल के जमाव को दूर करना और सफाई करना चाहिए।
२ मच्छरों का नाश करने का उपाय करना चाहिए। ३ त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए और कड़वे तेन्न की मालिश करना चाहिए। ४. कभी पहले जिन्हे इलीपद हो चुका हो, उन्हें वर्षा श्रृतु में नित्यानन्द रस अथवा दलीपदगजकेसरी का 9-२ माह तक सेवन करते रहना चाहिए। ५ रोग के शान्त हो जाने के बाद भी ६-८ महीने तक भोजन के साथ नित्य लहमुन का सेवन करना चाहिए। ६ दही, चावल और केला खाने का यदि अभ्याम हो, तो छोड़ देना चाहिए।

ग्रन्थर या आन्त्रिक ज्वर

पर्याय और परिचय-इसे आन्त्रिक ज्वर, मन्यरक ज्वर, मधुरक ज्वर, मौक्तिक ज्वर, मोतीक्षरा, टाइफायह फीवर, एण्टेरिक फीवर (Enteric Fever), सञ्चोपी सिन्नपात ज्वर और मुवारकी आदि नामों से पुकारते हैं।

यह एक विशेष प्रकार का जिदीपज औपसर्गिक ज्वर है। तीनो दोषो के प्रकीप के होने से इसमे तीनो दोषो के लक्षण पाये जाते हैं। जब जिस दोष की प्रबलता

८ (क) पुरातना पष्टिकशालयश्च यता कुल्तर्थं लशुन पटोलम् । एरण्टनेल सुर्गात छ यवा कुल्त्यं लशुन पटोलम् ॥ एतानि पर्यानि भवन्ति पुरा रोग मनि इलापटनामध्ये ॥ या० र०

⁽रा) पिवेत्मर्पपतैलं च इलीपदाना नियुत्तये । में० र०

होती है, तब उसके अनुमार लक्षण प्रकट होते हैं। इममे शरीर मे, विशेषकर ग्रीवा, छाती, उदर और जघाओं में मोती जैमें दाने निकल आते हैं। यह विशिष्ट अविध तक रहनेवाला ज्वर है, जो प्राय तीन या चार सक्षाह तक वना रहता है। इसमें आतिं क्षत हो जाती हैं, क्षुद्रान्त्र के अधोभाग की लमीकाग्रन्थियों में तथा सम्पूर्ण क्षुद्रग्रन्थि समूह (पेयसं पैचेज Payer's patches) में शोथ हो जाता है। प्राय प्लीहा बढ जाती है।

निदान

अधिक मार्ग-गमन, उपवास से उत्पन्न कृशता, दुगन्धयुक्त स्थान मे निवास, मल-मूत्र के ससर्गयुक्त जल का पान, खाद्य-पदार्थों पर मक्षिका आदि का सस्पर्श, इन कारणो से विशेषकर ग्रीष्मऋतु. शरद् ऋतु या वर्षा ऋतु मे आन्त्रिक जबर होता है।

इस ज्वर की उत्पन्ति का प्रधान कारण आन्त्रज्वराणु—वैसिलस टाइफोसिस (Bacillus Typhosis) नामक जीवाणु है। यह सचरणशील जीवाणु है, जो अन्त कोशीय विप का निर्माण करता है। यह आमाशियक अम्लक्षेत्र को पार कर आसानी से क्षारीय क्षेत्र मे पहुँच जाता है और ग्रहणी स्थित पित्त मे बढ़ने लगता है। यह सुद्धान्त्र मे क्षत और शोथ उत्पन्न करता है तथा वहाँ से बृहदन्त्र मे भी पहुँच जाता है। सुद्धान्त्र की भित्ति को पारकर जीवाणु सम्बद्ध लसीकाग्रन्थियो मे पहुँचकर सर्वाधत होते हैं तथा वहाँ से लसीकावाहिनी (Thoracic duct) के द्वारा रक्तवह-सस्थान म पहुँच जाते हैं। यकृत्-प्रीहा, पित्ताशय एव बृहनो मे इनका भलीभाँति सर्वर्धन होता है और अन्त मे क्षुद्र गन्थि समूह मे स्थानसश्रय होता है। अस्थिमज्जा मे भी इन जीवाणुओ का प्रवेश हो जाता है। इनकी बृद्धि होने पर ये आन्त्रिक वृण, मूत्र।शय, पित्ताशय, प्लीहा, रक्त और लसीकाग्रन्थियो मे उपस्थित मिलते हैं। मल, मूत्र तथा स्वेद मे भी पाये जाते है। "

- १ (क) घृताशनात् स्वेदरोधानमन्थरो जायने नृणाम् । ज्वसे दाहो भ्रमो मोहो ह्यतीसारो विमस्तृषा ॥ अनिद्रा च सुख ताछ जिह्वा च परिशुम्यति । सप्ताहाद् द्वादशाहाद् वा स्फोटाश्च मर्पपोपमा ॥ ग्रीवाया परिदृश्यन्ते एकर्विशति (दिने) शाम्यति । एभिस्तु लक्षणीविद्यात् मन्थराख्य ज्वर नृणाम् ॥ निदानदीपिका
 - (ख) अध्वोषवाभविष्ण्याना दुर्गन्थाम्यर्णवामिनाम् । प्रायो भलादिमसृष्टभक्ष्यपानोपयो । ॥ सर्वेष्ट्रतुपु सूम्ना तु ग्रीष्मे शर्गद -वार्षिक । आन्त्रिकाख्यो ज्वर कृष्ट्रां दृश्यते घोरदर्शन ॥ तस्य जीवाणव केष्चिन्मलमृत्रादिसम्भवा । विशिष्टं तुनिदानं रसु ॥ सि० नि० प्र० ख०
 - (ग) कीटाणवो विभिन्न टाइफोलसनामका । दण्डाकारा जनावासा रक्ते मूत्राशये मल ॥ स्वेरे पित्ताशये प्लीह्न पिटकास्वान्त्रिक व्रणे । ननयन्ति नृणा देहे ज्वर प्रोक्त विशेषत ॥ गा० नि० परिशिष्ट

संक्रमण

बैसिलस टाइफोसिस नामक जीवाणु जल, वायु और भोजन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे पहुँचकर रोग उत्पन्न करते हैं। रोगी के मल-मूत्र पर बैठकर वहीं मिसकायें जब भोज्य पदार्थों पर बैठ जाती हैं, तो उनके पैरो में लगे जीवाणु भोजन में चले जाते हैं और उस भोजन के भोक्ता में जीवाणु का सक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार रोगी के सम्पर्क में रहने वाले, रोगी का उच्छिष्ट खाने वाले, रोगी के परिचारक आदि भी रुण हो जाते हैं। रोगी के मल-मूत्रस्य जीवाणु वायु में फैलकर मुख या नाक द्वारा शरीर में चलें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। यें जीवाणु दूध में बढते हैं, इसलिए दूध से भी सक्रमण होता है। यदि रोगी का वस्त्र कुँए पर धोया जाता है, तो ये जीवाणु कुँए के जल में भी पहुँच जाते हैं और उस जल को पीने वाले भी आन्त्रिक ज्वर से आक्रान्त ही जाते हैं।

सम्प्राप्ति

आन्त्रिक ज्वर के जीवाणु का प्रथम आक्रमण क्षुद्रान्त्र की लघु लसीकाग्रन्थियो पर होता है। इस बात का अनुसन्धान सर्वेप्रथम 'पेयर' महोदय ने किया था। इस कारण इसे 'पेयसे पैचेज' (Payer's Patches) की सज्ञा दी गयी। जीवाणु अन्त्रस्थ लसीकाग्रन्थि, प्लीहा तथा कभी-कभी वृहदन्त्र की लसीकाग्रन्थियों में शोथ उत्पन्न करता है, जिससे वे रक्तमय हो जाती हैं। शेषान्त्र और उण्डुक के द्वार पर के पैचेज अधिक प्रभावित होते हैं। ज्वरारम्भ के प्रथम सप्ताहान्त में इन पैचेज का विनाश होने लगता है। दूसरे सप्ताह में, त्रण हो जाते हैं और प्रण के ऊपर के श्लैष्टिमककला के दुकडे झडने लगते हैं। तीमरे सप्ताह में उस पर वीजाड्कुर-सदृश मृदु धातु की कला (Granulation tissue) आ जाती है। कदाचित् जब व्रणो की झिल्ली झडने लगती हैं, तब किसी धमनी के खुल जाने से रक्तस्राव होने लगता है। तीसरे सप्ताह के अन्त मे व्रणो का उपशमन हो जाता है और अन्त्र अपनी स्थिति में आ जाते हैं।

प्राय वृहदन्त्र मे वृहद् त्रण होता है, जिसके फलस्वरू अतिसार होते देखा जाता है। प्लीहा मृदु, शोथयुक्त तथा रक्तपूर्ण होती है। पित्ताशय मे असख्य आन्त्र जीवाणु निवाम करते है। रोगी के मल मे उनका निर्गमन जारी रहता है। रोगी के निरन्तर लेटे रहने से तथा कभी-कभी आन्त्र जीवाणुओं के पहुँच जाने से फुप्फुमों मे उपस्थायी (Hypostatic) पाक (न्युमोनिया) हो जाता है।

१० विश्वान्त्राष्ट्रियास्य ते ।

रसं रक्तञ्च दोपाँश्च कोपयंन्त्यचिरादिष ॥

क्षिण्वन्ति चान्तिम भागं श्चद्राभ्त्राणां शनै शने ॥

ततोऽन्त्रस्रतसंग्रद्धी स्वचिद्, रक्तस्य नि स्रवः ।

भित्रान्त्रताऽभवाऽसाध्येरवेष वैक्वतनिश्चयः ॥ सि० नि० प्र० स०

९ का० दि०

रोग के प्रबल होने पर इस ज्वर के कारण निम्नलिखित परिवर्तन होते देखे जाते हैं—

१. जीवाणुओं के परिवर्धन और सल्यावृद्धि के काल में टाइफो-टॉविसन नामक एक प्रकार का रासायनिक विष उत्पन्न हो जाता है और रक्त के साथ मिलकर सब अङ्गों में होने वाले ज्वरीय विकार को उत्पन्न कर देता है। इसी कारण से लसीका-ग्रन्थियों तथा यक्तव्-प्लीहा आदि की वृद्धि हो जाती है।

२ रक्त मे अशुद्धि, पनलापन, श्वेतकण और रजकपित्त (हीमोग्लोविन— Haemoglobin) इन दोनो की न्यूनता होने से शरीर निस्तेज हो जाता है।

३ मास मे नित्यप्रति क्षीणता और स्याववर्णता होती है।

४. नाडी क्षीण होती है और गति डेढ गुना या दो गुना हो जाती है।

५. उदर के दक्षिण कटिपाश्विक प्रदेश में स्पर्शासहिष्णुता, मल दुर्गन्धयुक्त और उदर मे आटोप (गुडगुडाहट) होता है।

६. तृष्णावृद्धि, श्वेतपीत मैली जिह्वा, मलिन दन्तावलि, यक्नत्-प्लीहावृद्धि और उदावर्त होता है।

. ७ उपद्रवस्वरूप न्युमोनिया, श्वासनलिकाशोथ, श्वासोच्छ्वास मे तीव्रता और शुक्क कास होता है।

८ मूत्र, विवर्ण (लाल-पीला) दुर्गन्धयुक्त, थोडा-थोडा एवं वार-वार होता है। मूत्र मे यूरिया और फॉस्फेट अधिक तथा वलीराइड कम परिमाण मे होता है।

९ शरीर से विशेष प्रकार की तीखी गन्ध निकलती है।

, १० शरीर में गले से छाती, उदर या ऊरु तक क्वेताभ गुलाबी पिडकाओं के निकल आने से इस ज्वर का निष्ट्रय हो जाता है।

११ चनकर आना, निद्रानाश, शिर शूल, वलक्षय, वाधियं आदि लक्षण होते हैं और विचारशक्ति में ह्रास होता है।

१२ रात्रि मे प्रलापाधिक्य होता है।

१३. इस ज्वर मे प्रारम्भिक दिनो मे सायङ्काल थोडा-थोडा करके तापमान वढता है। १०१० फा० हो जाने पर चार दिन प्रश्चात् या द्वितीय सप्ताह मे लाप काँ क्रम स्थिर हो जाता है, अर्थात् प्रात काल १०१० फा० और सायङ्काल १०४० फा० के लगभग रहता है।

१४. सीढी के समान चढता-उतरता तापमान चित्र, शिर शूल, तन्द्रा, जडता, मोती जैसे दाने निकलना और प्लीहावृद्धि से रोग का निष्ठय हो जाता है।

94. प्रयोगशाला मे रोगी का रक्त, मूत्र या मल लेकर यथाविधि परीक्षण करने पर क्षान्त्र जीवाणुओ की उपस्थिति मिलती है।

लक्षण

यह ज्वर धीरे-धीरे बढता है। कभी शीत-कम्प के साथ, कभी तीप्र वेदना के साथ और कभी यो ही सोपानाविल के अनुसार (सीढ़ी चढ़ने के तुल्य) ५-६ दिन

तक क्रमश एक-एक डिग्री बढता जाता है। रुग्ण के श्वास में दुर्गन्ध, कोष्ठबद्धता, अनिद्रा, नाडी की गित मन्द और जिह्वा मिलन होती है। फिर एक सप्ताह में मोती के दाने जैसी पिडकार्यें कण्ठ में और कभी कर प्रदेश में दिखलाई देने लगती हैं। तींग्र शिर:शूल और पेशियों में कमजोरी मालूम होती है। पिडकाओं के निर्गमन के स्पष्ट हो जाने पर रोग प्रकट हो जाता है।

प्रयम सप्ताह के प्रधान लक्षण

नाडी का स्पन्दन ९० से १२० होता है। तापमान की फ्रिंगक वृद्धि होती है, तृष्णा-वृद्धि, रात्रि-प्रलाप, अनिद्रो, जडता तथा नेयनिर्भुग्नता होती है। जबर के आरम्भ में कोष्ठबद्धता, किन्तु सप्ताहान्त में अतिसार हो जाता है। जदर में आध्मान एवं नाभि के नीचे दबाने पर पीडा होती है। प्लीहा बढ जाती है, किन्तु गोमल होती है। पेशियाँ क्षीण होने लगती हैं, मास गलने लगता है और मूत्र थोडा गहरे लाल रग का हो जाता है।

द्वितीय सप्ताह

दूसरे सप्ताह में धीरे-धीरे दानें (पिटकायें) छाती और उदर में निकल आते हैं। ग्रीवा, वस स्थल, उदर और ऊंक प्रदेश तक प्रचुर सस्या में पिडकाओं का घनीभूत होकर निकलना अच्छा लक्षण है। पिडकायें 'मन्यरज्वर' की परिचायक होती हैं। ये पिडकायें स्वेदग्रन्थियों के मुख पर शोथ होने या रक्तधातु ज्वर' होने पर निकलती हैं। प्रलाप, वेचैनी, तन्द्रा, मुखशोप, जडता, कास, दौवंल्य, आध्मान और मानसिक सन्ताप वढ जाता है। ज्वर बढकर स्थिर हो जाता है। ज्वर का वेग प्राय १०३ फा० तक रहता है, जो प्रात काल कुछ कम हो जाता है। नाडी की गित प्रति मिनट ११० से १४० तक होती है। जिल्ला घुष्फ होकर फट जाती है, उसकी किनारी लाल होती है तथा जिल्ला, दांत एव ओठ पर मैल जम जाती है। अन्त्रक्षतों में धमनी के फट जाने से मल के साथ रक्त आने लगता है। कभी कभी खांसी आने लगती है और श्वास भी हो जाता है। मल में रक्त का आना और कास-श्वास होना, ये घातक लक्षण हैं।

तृतीय सप्ताह

तीसरे सप्ताह मे उपयुंक्त लक्षण कम हो जाते हैं। यदि वे लक्षण वढ जायें, तो ज्वर की अविध चार सप्ताह या अधिक की होने की सभावना होती है, तब नाडी का स्पन्दन तेज और विपम होता है। श्वास-कष्ट होता है, अंति स्वेद निगंमन के कारण दुवंलता वढ जाती है, हाथ पैर मे कम्पन तथा जीभ मे भी कम्पन होने लगता है। आन्त्र मे अतिशय ग्रण न होने से अधिक वार मलत्याग होता है और, कदाचित्

१ प्रलाप पिडका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् । च० चि० ३

२ सि० नि० प्र० ख०।

रक्तस्राव भी होने लगता है, जिसका सद्य. फलप्रद उपचार न होने मे रुग्ण का जीवन सन्दिग्ध हो जाता है।

यदि यह ज्वर तीन सप्ताहवाला होता है, तब समुचित चिकित्सा होने पर ठीक इक्कीसर्वे या बाइसर्वे दिन ज्वर उत्तर जाता है।

चतुर्थं सप्ताह

- चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह के लक्षण उपस्थित रहते हैं। प्रलाप, वेहोशी बौर मानसिक असन्तुलन होना अच्छे लक्षण नहीं हैं। योग्य चिकित्सा होने से तृतीय-सप्ताहान्त या चतुर्थ सप्ताह के आरम्भ में तापमान क्रमश घटने लगता है। चौथा सप्ताह समाप्त होते-होते ताप स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। जिह्वा का अग्र भाग और किनारे स्वच्छ हो जाते हैं। रोगी चैतन्य हो जाता है। क्षुष्टा की प्रतीति होती है और रोगी आरोग्योन्मुख हो जाता है।

असाध्य लक्षण

रोग की प्रथमावस्था में रक्तलाव होने से रोग असाव्य हो जाता है। रोगी के अन्त्र में उग्रता, समय-समय पर रक्तलाव, तीव्र नाढी गति, अन्त्रावरेण-प्रवाह, सहसा आध्मान आदि लक्षण मृत्यु का आमन्त्रण देते हैं। उदर में उत्कट वेदना, अतिसार, उदरच्छदपाक, अतिदुर्वेकता, हस्त-पाद कम्प आदि अरिष्ट लक्षण होते हैं। प्रात काल ताप का बढना, समूचे दिन बरावर रहकर रात्रि में बढ जाना असाव्य लक्षण है। ताप की अतिवृद्धि होकर सहसा ताप का लास होना असाव्य लक्षण है। त्रासनलीय प्रदाह, फुट्फुसप्रदाह, विसर्प ज्वर, आन्त्रिक रक्तलाव, स्वरयन्त्रक्षत, अन्त्रविदारणजन्य अन्त्रावरणप्रदाह, अतितीव्र सन्ताप, प्रलाप, आव्यान, वृदकशोय आदि उपद्रवों का होना असाव्यता का सूचक है।

चपदव

आन्त्रिकण्वर मे वे सभी उपद्रव हो सकते हैं, जो सिन्नपातज्वर में होते हैं। किसी-िकसी को ज्वर उतर जाने पर भी १-२ सप्ताह तक प्रलाप बना रहता है। विद्याता या मूकता ब्रादि उपद्रव हो जाते हैं। लघु अन्त्र के अन्तिम भाग मे विशेष विकृति होती है। यकुत्प्लीहा, पक्वाशय, ग्रहणी आदि पित्तस्थान दूषित हो जाते हैं। अतिसार, रक्तस्राव, आध्मान, अन्त्रविदारण, प्लीहावृद्धि, श्वामसस्थान मम्बन्धी रोग, शीषंसीषुम्निक ज्वर, वृक्कशोय आदि उपद्रवो की सभावना होती है। गिंभणी स्त्री को इस ज्वर के होने पर गर्भपात हो जाता है। स्मृति-विश्रम, मूढ चित्तता, सिन्धशोय और खालित्य होते देखा जाता है।

सामान्य चिकित्सा

१ आन्त्रिक ज्वर में जो उपद्रव सम्भावित होते हैं, उनसे बचने के लिए समुचित पथ्य की व्यवस्था, शरीर की नियमित सफाई और उत्तम परिचर्या का प्रबन्ध करना चाहिए।

पस्य

- २. आमदोप के पाचन के लिए कम से कम १ सप्ताह तक लघन अवश्य कराना चाहिए।
 - ३ तुष्णा या दाह होने पर षडङ्गयानीय पिलाना चाहिए।
- ४. आहमान या उदरशूल होने पर—नागरमोथा, नायविद्या, पित्तपापटा और लींग १०-१० ग्राम क्टूटकर १ लीटर जल मे उवालकर, आधा वचने पर छानकर, थोडा-घोडा पिलाते रहे।
 - ५ अतिसार होने पर सौंफ का अके पिलावें।
- ६ लाजमण्ड—धान का लावा १० ग्राम १५० मि० ली० जल मे अर्धाविशिष्ट पकाकर, मिश्री तथा-छोटी लाइची का चूर्ण मिलाकर २-३ बार पिलाना चाहिए।
- ७ यव की पेया (वार्ली) लाजमण्ड की तरह पेया बनाकर उसकी ४-४ चम्मच ३-४ वार पिलार्वे।
- ८. प्यास और जलन की अधिकता में मुसम्मी का रस पोडा-पोडा पिलाना चाहिए।
- ९ विवन्ध होने पर--- मुनवके का बीज निकाल कर, तवे पर हलका भूनकर जीरा-नमक लपेट कर १०--१२ दाना खाने को देते रहें।
- १०. दूसरे सप्ताह मे ज्वर का तापमान और विषमयता वढ जाती है। अत इनके शमनार्थ पढंगपानीय अथवा नारिकेल जल ४-६ चम्मच कई बार पिलाना चाहिए।
 - ११. पैतिक लक्षणो की तीवता मे-

ब्राह्मी की पत्ती	३ ग्राम
घनिया	₹"
नागरमोथा	₹"
सुगन्घवाला	₹,,
सारिवा (अनन्तमूल)	₹,,

आद्या लीटर जल मे पकाकर २५ ग्राम मिश्री मिलाकर रख दें। इस जल को ४-४ चम्मच ४-५ बार पिलाते रहें।

- १२. रोगी की परिस्थिति के अनुसार लाजमण्ड और पेया देते रहें।
- १२ तृतीय सप्ताह में पञ्चकोल सिद्ध दूध पीने को दे। मीठा सन्तरा, मुसम्मी, सेव, इनमें से किसी का भी रस १--२ वार पिलाया जा सकता है।
- १४ चौथे सप्ताह मे यदि ज्वर हो तो पूर्ववत् दूध एव फलो का रस देते रहे। यदि ज्वर का वेग मृदु हो और रोगी की क्षीणता प्रतीत हो, तो धान का लावा, सावूदाना, हॉलिक्स आदि पथ्य देना चाहिए।
- १५ ज्वरमुक्त होने पर मबसे पहले २-३ भोजन वेला मे परवल देना चाहिए। परवल का छिलका और कडा बीज निकालकर, पतला चीरकर, हलदी, धनिया.

जीरा, मरिच, लोंग और इलायची के महीन मसाले डालकर रस्सेदार सब्जी बनाकर नीवू निचोडकर खाने को दें।

यदि न जैंचे या न मिले, तो मूँग की दाल का यूष या धान का लावा थोडी मात्रा मे दें। २-३ वक्त के बाद मुलायम रोटी का छिलका और मूँग की दाल तथा। परवल दें। आदी और नीवू का प्रयोग रुचिवर्धक है।

परिचर्या

9 शयन-व्यवस्था—आन्त्रिक ज्वर के रोगी को कई सप्ताह तक विस्तरे पर पडकर समय विताना पडता है, इसलिए चारपाई कसी हुई होनी चाहिए। उस पर मुलायम गहा और सफेद चादर तथा तिकया होना चाहिए। कठोर विस्तर दु खदायी होता है और उससे अङ्गो के छिलने का भय रहता है।

चादर बदलते रहना चाहिए। आकस्मिक रूप से मल-मूत्र आदि के कारण गन्दी चादर तुरन्त हटानी चाहिए।

२. यदि रोगी अचेत-सा पडा रहता हो, तो उसे सहारा देकर जव-तव करवट वदलवा देना चाहिए।

स्वच्छता

- १ प्रतिदिन प्रात काल मुखोज्ण जल मे कपडा भिगोकर समस्त शरीर को पोछ लेना चाहिए या केवल सूखे कपडे से हलके हाथ से समस्त शरीर की सफाई कर देनी चाहिए। मञ्जन से दांतो की और दातौन फाडकर जिह्ना की सफाई की जानी चाहिए। पहनने और ओढने के वस्त्र या कम्बल आदि की भी सफाई रखनी चाहिए।
- २. रोगी को स्वच्छ हवादार कमरे मे रखना चाहिए, जिससे कि वायु सीघे शरीर पर न लगे।
 - ३. शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पूर्ण आराम देना चाहिए।

आवस्थिक चिकित्सा

सामदोष के पाचनार्थ-

सौभाग्य वटी ४०० मि० ग्रा० आनन्दभैरव रस ४०० मि० ग्रा० योग ३ मात्रा

४-४ घण्टे पर ३ बार भुना जीरा रै ग्राम और मधु से।

आन्त्रिक ज्वर मे तीव्र ज्वरघ्न उपचार न कर, रोगी की सुश्रूषा और पथ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कोई उपद्रव न हो और अपने समय पर ज्वर छूट जाय। इस दृष्टि से आरम्भ से अन्तिम समय तक उसे निम्नाङ्कित योग देना उपयुक्त है—

३-३ घण्टे पर ४ वार

अभ्रक भस्म २५० मि० ग्रा०

शुक्ति भस्म २५० मि० ग्रा०

शुद्ध टंकण २५० मि० ग्रा०

शुक्ता भस्म १२५ मि० ग्रा०

रससिन्दूर १२५ मि० ग्रा०

४ मात्रा

जावनी प्रत्येक के २५० मि० ग्रा॰ चूर्ण और मधु से। लवग

दानों के शीघ्र तथा पूर्ण निकलने के लिए-

र्लीग ७ वदद जायफल २ ग्राम सोठ २ ग्राम ब्राह्मी की पत्ती १ ग्राम

२० मि० ली० पानी के साथ पीसकर किसी चम्मच आदि को गरम कर उससे छोंगकर मधु मिलाकर प्रात साथ पिलावे।

द्वितीय सप्ताह मे---

प्राय वात-पैत्तिक लक्षणो की वृद्धि हो जाती है, ऐमी स्थिति मे घनी रोगी को निम्नाङ्कित योग देने से सभी सम्भावित उपद्रव पान्त हो जाते हैं—

४-४ घण्टे पर ३ बार

मुक्ता मस्म २५० मि० ग्रा० योगेन्द्र रस ३७५ मि० ग्रा० सौमाग्यवटी ३७५ मि० ग्रा० त्रैलोक्यचिन्तामणि ३०० मि० ग्रा०

योग ३ मात्रा

२५० मि० गा० भूनी वडी लाइची के चूण और मधु से। अल्प सपन्न रोगी को उक्त योग की जगह निम्न योग देवे—

४-४ घण्टे पर ३ वार

प्राह्मी वटी ४०० मि० ग्रा० प्रवाल भस्म २०० मि० ग्रा० मुक्ता धुक्ति २०० मि० ग्रा० आनन्दभैरव ४०० मि० ग्रा० ज्वरारि अभ्र ४०० मि० ग्रा०

योग ३ मात्रा

मूना जीरा और मधु से।

उग्र सन्ताप शमनार्थ--

४-४ घण्टे पर

सूतशेखर ३०० मि० ग्राठ वसन्तमालती २०० मि० ग्रा० गुडूचीसत्त्व १ ग्राम शिलाजत्वादि लौह ३०० मि० ग्रा०

योग ३ मात्रा

मिश्री मिले हुए शतपुष्पार्क या पर्पटार्क के साथ। चतुर्थ सप्ताह मे---

ज्वरानुबन्ध रहने पर---

पुटपक्व विषमज्वरान्तक लौह ३०० मि० ग्रा० ३०० मि० ग्रा०

वसन्तमालती प्रवालप चामृत

३०० मि० ग्रा०

सितोपलादि चूर्ण

३ ग्राम

योग---३ मात्रा

मधु से।

बाद में सुदर्शनचूर्ण ४ ग्राम लेकर चाय की तरह वनाकर पीना।

हृदयदौर्बत्य में---

चतुर्भुज १२५ मि० ग्रा० विश्वेश्वर १२५ मि० ग्रा० मुक्ताभस्म १२५ मि० ग्रा०

योग---३ मात्रा

४-४ घण्टे पर मधु से ।

हृदयातिपात मे---

४-४ घण्टे पर ३ बार

बृहत् कस्तूरीभैरव ३७५ मि० ग्रा० सिद्धमकरघ्वज

३७५ मि० ग्रा०

चिन्तामणि चतुर्मुख

३७५ मि० ग्रा०

योय---३ मात्रा

पान से रस और मधु से।

लाक्षणिक चिकित्सा

कासानुबन्ध मे-

३-३ घण्टे पर ४ वार

चन्द्रामृत १ ग्राम े चन्द्रगदि लोह दे ग्राम तालीसादि ४ ग्राम

योग-४ माना

अदूने के रम तथा मधु से।

विबन्ध मे---

िलसरीन प्रव १ औस सिरिञ्ज से गुदा में वस्ति हारा देने से मलशोधन होता है। मुनक्का खिलाना चाहिए या फटे दूध का पानी पिलाना चाहिए। ईसबगोल की भूसी ४ से ६ ग्राम सुखोष्ण दूध से देना चाहिए।

अतिसार मे-

कोरया की छाल ६ ग्राम
वेल का गूदा ६ ग्राम
मोचरन ६ ग्राम
नागरमोथा ६ ग्राम
धनिया ६ ग्राम

५०० मि० ली० जल में अप्टमाशावशिष्ट गवाय बनावे। दिन मे ३ वार १०-१० मि० ली० मधु मिलाकर पिलावे।

२ ३-३ घण्टे पर ४ बार

सिद्धप्राणेश्वर ३ ग्राम कर्पूर रस ३ ग्राम आनन्दर्भरव ३ ग्राम रामवाण १ ग्राम महागन्धक १ ग्राम योग—४ मात्रा

९ ग्राम भुना जीरा चूर्ण और मधु से । सज्ञानाज्ञ और प्रलाप मे—

३-३ घण्टे पर ४ बार

योगेन्द्र रस २०० मि० ग्रा० चतुर्भुज २०० मि० ग्रा० चहत् कस्तूरीभैरव २०० मि० ग्रा० योग—४ मात्रा

ब्राह्मी स्वरस और मधु से।

कायचिकित्सा

अनिद्रा में---

अपराह्म से अर्घरात्रि तक ३-३ घण्टे पर ४ वार

सर्पंगन्धा चूर्ण ३०० मि० आ० जल से १ मात्रा

भान्त्रगत रक्तस्राव

दूसरे-तीसरे सप्ताह में ही ज्वर की शान्ति, नाडी की क्षीणता एव गति तीव्रता, प्रलाप एव दुवेंलता आदि लक्षणों की आकस्मिक वृद्धि होने पर आन्तरिक रक्तस्राव का अनुमान किया जाता है।

ति जामुन के रग का या तारकोल के समान वर्ण का दुर्गन्धयुक्त मल होने पर अथवा प्रत्यक्षत मलद्वार से रक्त के निर्गमन का निश्चय हो जाता है।

ऐसी स्थित में रोगी को शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से पूरा विश्राम देना चाहिए। शान्त कमरे में सुलाना तथा वहाँ केवल परिचारक को जाने देना चाहिए। करवट बदलाने, मल-मूत्र कराने और त्वचा की सफाई कराने में रोगी को हिलने न दें। पेट पर वर्फ की थैली रखना चाहिए। पैरो को मोडकर, घुटने से नीचे तिकया रखकर उदर को शिथिल रखना चाहिए। पैर की ओर चारपाई के पाये के नीचे १-१ इँट ऊँचा करना चाहिए।

२-२ घण्टे पर ५ बार

कर्ष्ररस ३ ग्राम
रामदाण ३ ग्राम
रक्तिपत्तकुलकण्डनः ३ ग्राम
शुद्ध स्वणंगैरिक १ ग्राम
बोलपपंटी १ ग्राम

असली नागकेशर और खूबकला के समभाग के १ ग्राम चूर्ण व मधु के साथ।

दिन मे ३ वार चन्दनिकरातादि क्वाथ २५ मि० ली० पीने को दे।

चन्दनकिरातादि क्वाथ

रक्तचन्दन चिरायता जवासा सोठ इन्द्रजी कोरया की छाल खस ः अनार फलत्वक् दारुहत्दी नीम की छाल लज्जावन्ती बतीस और रसौत—इन सभी का समभाग में क्वाथ बनावे।

वाताधिषय मे

३-३ घण्टे पर ४ बार

वृहद्वातचिन्तामणि ४०० मि० प्रा०

रसराज

४०० मि० ग्रा०

सीभाग्यवटी

५०० मि० ग्रा०

योग ४ मात्रा

आद्रंक तथा ताम्यूल स्वरस और मधु से।

वित्ताधिषय मे 🤸

३-३ घण्टे पर ४ बार

मुक्तापिप्टी ३०० गि० ग्रा०

प्रवालिपटी

५०० मि० ग्राट

वनकभस्म

५०० मि० ग्रा०

गुडूचीमत्व

१ ग्राम

योग ४ माना

भुनी वडी इलायची चूर्ण 🞝 ग्राम बीर मधु से ।

कफाधिबय मे

३-३ घण्टे पर ४ बार

चन्द्रामृत रस ५०० मि० प्रा०

वृहत्यम्तूरीमैरय ३०० मि० ग्रा०

सीमाग्यवटी

१ ग्राम

घुढ टकण

योग ४ मात्रा

आद्रंक स्वरस और मधु से। ज्वरमुक्ति के बाद बलप्रद प्रयोग

१ प्रात सायं

त्राव साय नवायस लीह

वाघा ग्राम

वसन्तमाली

चौषाई ग्राम

मुक्ताशुक्ति

वाघा ग्राम

सिरोपलादि चूणं

एक ग्राम

योग २ मात्रा

मधु से।

२ भोजन के पूर्व-

यवानीपाडव चूणं ६ ग्राम

२ मात्रा

विना अनुमान के।

३. भोजन के बाद २ बार
लोहासव २५ मि० ली०
द्राक्षारिष्ट २५ मि० ली०
योग २ मात्रा
समान जल मिलाकर पीना ।
श्वसनकज्वर (Pneumonia)

पर्याय और परिचय

इसे फुप्फुसपाक, फुप्फुसप्रदाहक; कर्कोटक सिन्नपात, फुप्फुससिन्नपात, रक्तष्टीवी सिन्नपात, श्वसनक ज्वर तथा न्यूमीनिया आदि नामो से जाना जाता है।

न्यूमो (Pneumo) शब्द का अर्थ है - वायु, एव न्युमोनिया का शब्दार्थ है - श्वासयन्त्र मे होनेवाली व्याधि, क्यों कि श्वास और वायु का नित्य सम्बन्ध है।

साविस्थ ने इसका नाम कर्कटक सित्तपात रखा है। कर्क का अर्थ है— कर्कोटक, केकडा या कर्कराशि या जलकुम्भी, ये सभी नाम इस रोग मे चिरतार्थ हैं। इसमे तीव्र ज्वर के साथ फुप्फुसो मे पाक होता है। विशेषकर फुप्फुसो के खण्डों और वायुकोपो मे शोथ होता है। थूक के साथ लाक्षा रग के सदृश रक्त निकलता है। वहा स्थल मे वेदना होती है। रोगी कास और श्वास से पीडित होता है।

इस ज्वर मे दो प्रकार का प्रदाह होता है-

१ फुप्फुससण्ड प्रदाह ।

२ श्वासप्रणाली प्रदाह।

इनमें फुट्फुसखण्ड प्रदाह विशेष घातक है। नाडी वेगवती होती है। स्टेथिस्कोप से परीक्षा करने पर फुट्फुसों से बुद्-बुद् की ध्विन सुदाई देती है। यदि फुट्फुसों पर अगुलिताडन परीक्षा की जावे, तो ५त्थर पर आघात होने के सदृश घन शब्द सुनाई देता है। ये लक्षण फुट्फुस के वायुकोषों का अवरोध होने पर बणशोथ होने के कारण होते हैं। दुवंलता, पाश्वंशूल, शिर शूल तथा अन्य अनेक आमियक अवस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं।

१ लाक्षारसामं य ष्ठीवेत् रक्त श्वासन्वरादित । स्त्योनफुन्फुसमूलस्य तस्य श्वसनको ज्वरः॥ सि० नि० प्र० ख०

२ इपुणेवाहत पार्श्व तुष्यते खन्यते हृदि ।

प्रमीलक श्वासहिक्के प्रवर्धते दिने दिने ॥

जिह्या दग्धा खरस्पर्शा गल श्रुकौरिवाहत ।

विसर्ग नामिजानाति कृजेचापि कपौतवत् ॥

अतीव खेन्मणा पूर्ण झुम्कवक्त्रोष्ठतालुकः ।

तन्द्रानिद्रातियोगार्तो हत वाड्निहतपुति ॥

न र्रात लभते किच्चिद् विपरोतानि चेच्छति ।

भायम्यते च वहुशो रक्त छोवति चास्पश्च ॥

एष कर्षटको नाम्ना सिन्नपात सुद्रारुण । भावप्र० पू० ज्वर०

फुस्फुस**लण्ड प्रदाह** (Lobar Pneumonia)

निदान

दुवंलता, निधंनता, योक, वस्त्राच्छादन विहीनता, सहसा घीत लग जाना, वर्षा होने पर नग्न शरीर मे बाद्रं तथा शीतल वायु का स्पर्शं होना, घूलियुक्त दूषित यायु मे रहना, अति परिश्रम करना, वहा स्थल मे आधात लगना, अनियमित आहार-विहार करना तथा इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का निकट मम्पर्कं होना, इत्यादि कारणो से यह रोग होता है। वर्ण, शिविर और वमन्त श्राप्तु मे इसके होने की अधिक सभावना होती है। सामान्यत किसी भी ऋतु मे यह रोग हो राकता है।

इस रोग की उत्पत्ति—१ न्यूगो होबास (Pneumococcus), २ वैसिलस न्यूमोनिया (Bacillus Pneumonia), ३ म्टेफिलो होबबाम (Staphylococcus) एव ४ म्ट्रेप्टोकोवकस (Streptococcus) इन जीवाणुओ से होती है। इम रोग के स्थान और लक्षण-भेद से निम्नलिखित आठ प्रकार होते हैं—

- १. उभय फुजुसब्राही (Double Pneumonia)
- २. परिचामक अर्थात् स्यान-परिवर्तन करनेयाना (Wandering Pneumonia)
- ३ केन्द्रक अर्थात् फुप्फुमो के मध्य भाग को दूषित करनेवाला (Central)
- ४ घातक प्रलापादि उपद्रवयुक्त (Cerebral Pneumonia)
- ५ श्वामप्रणाली का प्रदाह प्रतिज्यायसह (Lobular)
- ६ फुप्फुमावरण दाहसह (Pleuritic)
- ७. फिरञ्जरोगसह (Syphilitic)
- ८ आन्त्रिक ज्वरसह (Typhoid Pneumonia)

संक्रमण

इस रोग के जीवाणु चार प्रकार से फुप्फुसो मे जाकर रोग उत्पन्न करते हैं—

- १ श्वास में गृहीत वायु से श्वास प्रणाली में ।
- २ प्रवाहित रक्त से।
- ३ लमीका के द्वारा।
- ४ फुप्फुम के गमीपस्य अवयवी के रोगाक्रान्त होने से।

न्युमोितयाणु रोगी के थूक द्वारा वाहर निकलते हैं और सूखकर धूलिकण में या वायु में मिल जाते हैं। वायु में उडते हुए जोवाणु, स्वस्य व्यक्ति के श्वास_द्वारा फुप्फुमों में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं। कभी-कभी रोगी के कफ से या दूषित वस्त्रादि से भी इस रोग का सक्रमण होता है। किसी भी तरह् ये जीवाणु नासिका और मुख में पहुँचकर रोग उत्पन्न करते हैं। इनके सक्रमण का प्रधान माध्यम वायु है।

सम्प्राप्ति

इस उबर के, जीवाणु गले या मुझ से फुप्फुसों मे पहुँचकर फुप्फुसप्रवाह उत्पन्न

करते हैं। फुप्फुसंकोशाओं में शोथ होने से वह स्थान ठोस हो जाता है, जिससे श्वासोच्छ्वास में कठिनाई होती है। जबर का वेग वढ जाता है और विष का प्रभाव अधिक हो जाता है, जिससे हृदय, मस्तिष्क और नाडी-सस्थान भी प्रभावित होते हैं। विष का प्रभाव अतितीव होने से रोग असाध्य हो जाता है। यदि ३,५ या ७ दिन में फुप्फुसशोथ आदि छक्षण दूर हो जाते हैं, तो रोग मृदु हो जाता और रोग के साध्य होने की आशा बलवती हो जाती है।

न्यूमोनिया के कारण फुप्फुसप्रदाह होने पर सामान्यत' चार प्रकार की सप्राप्ति की अवस्थायें होती हैं—१ रक्ताधिक्य २ रक्तघनीभवन ३ असितधनीभवन और ४- प्रकृतिभाव।

(१) रक्ताधिक्य (Hyperamia)

इस अवस्था मे वायुकोष्ठो की रक्त-प्रणालियाँ रक्त से परिपूर्ण होकर फैल जाती हैं। फुप्फुस अत्यन्त भारी हो जाता है। रोगी को बेचैनी, शीत तथा कम्प के साथ खाँसी आने लगती है। श्वास-प्रश्वास प्रति मिनट ५०-६० बार और नाडी की गति १२०-१३० तक हो जाती है। तापमान १०३०-१०४० फा० तक हो जाता है।

(२) रक्तघनीभवन (Red Heptization)

इसमे फुप्फुस का आक्रान्त भाग ५ से २४ घण्टे के भीतर ठोस हो जाता है। 'फुप्फुस खण्ड के सभी सूक्ष्म छिद्र लसीकास्नाव से भर जाते हैं। फुप्फुस लाल पाषाण के समान हो जाता है। यह अवस्था ३ से १० दिन तक रहती है। साध्या-वस्था मे प्राय एक सप्ताह के पश्चात् फुप्फुस मृदु होकर यथास्थिति में आने लगता है।

(३) असित घनीभवन

इस अवस्था मे फुप्फुस मे मृदुता आ जाती है। यह पूय-सञ्चयावस्था होती है। फुप्फुस का वर्ण काला हो जाता है। रक्ताणुओ मे से रक्तरजक द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। रक्ताभिसरण-क्रिया मे प्रतिवन्घ आ जाता है। पूर्याधिक्य होने पर रोग असाध्य हो जाता है।

(४) प्रकृतिभाव (Resolution)

रोग के उन्शमन होने पर यह अवस्था होती है। जब दूषित मल कफ के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है और स्नाव का कुछ अश शनै शनै रक्त मे लीन होता रहता है, तब प्राकृतिक स्थिति आती है।

इस रोग का परिणाम फुप्फुस के शोथ पर निर्भर है। दोनो फुप्फुसो में न्युमोनिया होने पर तरल कफ अथवा लाल कफ निकलने पर अनेक बार रोग विषमावस्था धारण कर लेता है। अति तीव्र ताप, हृदय का कार्यावरोध, निद्रानाश,

१ सहत्यास्टर्मूलत फुप्फुसस्याऽसन्ये पार्थे सन्यतो वा द्वयोर्गा । जिघांसन्ति श्वासयन्त्रं विषोत्था दोषास्तस्माच्छ्वासकष्ट च्वरश्च ॥ सि० नि० प्र० ख०

प्रलाप, कम्प, सज्ञानाश या चृतकविकार होने पर रोगी का जीवन सन्दिग्ध हो जाता है।

पूर्वरूप

इस रोग के पूर्वरूप मे पार्श्वशूल, कास, श्वास, कम्प, फुप्फुसावरण मे जल-संचय, क्षुधानाश, निवंलता, वेचैनी होने के साथ-साथ नाडी की गति तीग्र होती है,।

लक्षण

ज्वर प्राय शीत के साथ प्रारम्भ होता है। शुरु से ही ज्वर तीयवेगी होता है। व्यक्ति, तृष्णा, पाश्वेशूल, कास तथा श्वास की वृद्धि, रक्तिमिश्रित चिकना एव दुर्गेन्ध-युक्त कफ निकलना, श्वासवेग के समय नासिका तथा उर पर्श्काओ मे कम्पन होना, स्वेदाधिक्य, सर्पेप सद्श पिड़काओ का निकलना, दुवंलता, प्रलाप और गले मे घरघराहट होती है। जिह्ना कठोर, मैली तथा शुष्क होती है। नाडी की गति प्रति मिनट १०१ से १०३ तक होती है। ज्वर १०३ से १०४ फा० तक होता।

ताप के चले जाने पर भी कभी कभी फुप्फुसावरण से दाह, फुप्फुस-विद्रिधि या जीर्णकास आदि लक्षण शेव रह जाते हैं, और फुप्फुस वर्षों तक दुवंल रह जाता है, जिससे शीत या वर्षों का थोडा-सा भी आधात होने पर यह रोग पुन आक्रमण कर देता है।

श्वासप्रणालिका-प्रदाह

- (Broncho Pneumonia)

परिचय

फुप्फुसो से सम्बद्ध वायुकोषो मे जाती हुई सूक्ष्म श्वाम-निलकाओ मे दाह-शोय का होना इसका प्रधान स्वरूप है। यह उपद्रवात्मक होता है। रोमान्तिका, काली खाँसी, कण्ठरोहिणी या वातश्लेष्मज्वर आदि विषसंसर्गी रोगो के अन्त मे यह उपद्रव स्वरूप होता है। यदि अन्न या अन्य पदार्थ श्वासनिलका मे चला जाता है, तब भी यह रोग हो जाता है।

निदान

यह रोग पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चो, क्षीण मनुष्य और वृद्धों को अस्थिक्षय, अतिसार आदि शारीरक्षयकारक रोगों के अन्त में प्राय हो जाता है। सामान्य कास रोग के अन्त में, क्षय रोग में और तेज वायु के श्वासपथे में चले जाने पर इस रोग की उत्पत्ति होती है। स्तनपायी शिशुओं को होनेवाला यह रोग 'उत्फुल्लिका' (डब्बां) कहा जाता है। माता के अपध्य सेवन से यह बच्चों को हो जाता है। यह रोग तीव सक्रामक होता है।

१ सि॰ नि॰ पू॰्ख॰।

सम्प्राप्ति

इस रोग में सूक्ष्म श्वास-प्रणालियों में शोथ होने के कारण उसका मार्ग सकुचित हो जाता है। फिर दोनों फुप्फुमों के वायुकोष दूषित हो जाते हैं। श्वास निककाओं तथा वायुकोषों में दाह होने से वे लसीकास्नाव से भर जाते हैं। सूक्ष्म श्वासनिककाओं के स्नाव से अवरुद्ध होने पर उनसे सम्बद्ध वायुकोष दूषित होकर सकुचित हो जाते हैं। समीपवर्ती अन्य वायुकोष भी शोथ और दाह से पीडित हो जाते हैं।

लक्षण

शीत लगकर ज्वर हो जाता है और शिर शूल, कास, श्वास आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों में ज्वर का वेग १०२°-१०३° फा॰ तक वह जाता है। जब फुप्फुसगामी श्वास-निलकाओं में एवं वायुकोपों में शोथ की अतिवृद्धि होती है, तब वायुकोप ठोस हो जाते हैं और अगुलिताबन से जड ध्विन निकलती है। वच्चों में कण्ठ में घरघराहट, श्वास की गित तीव और प्रतिक्याय होता है। इस रोग का आक्रमण वकस्मान् होता है। इसमें ज्वर धीरे-धीरे उतरता है। बीच-वीच में कुछ वढ भी जाता है। रोगी की शक्ति क्षीण हो जाती है। वह धीरे-धीरे स्वस्थ होता है। यदि रोगी के बल का अतिशय हास हो जाय, तो कास-श्वास वढ जाते हैं और शल्यज फुप्फुस-प्रदाह होकर रोगी की इहलीला समाप्त हो जाती है। यह रोग फुप्फुसखण्ड-प्रदाह की तरह भयानक नहीं है और इससे मृत्यु कम होती है।

चिकित्सा-सूत्र

- १. श्वनक ज्वर के दोनो प्रकारो (फुप्फुमखण्ड-प्रदाह और श्वासप्रणाली-प्रदाह) मे प्राय एक ही समान कौषि एव पथ्य की व्यवन्था से लाभ होता है। रोगावस्था या आयुभेद से औषधो मे अन्तर हो सकता है। अनुपान आदि परिस्थित के अनुसार परिवर्तित किये जाने चाहिए।
- २ रोग से कारणो का परित्याग करना चाहिए। रोगी का निवास-स्थान आई न हो और वहाँ घूल तथा धुँआ नहीं लगना चाहिए। स्थान स्वच्छ एव विस्तृत हो, जहाँ शीत वायु या वायु का सीधा सपकें न हो। वायु के तीव प्रवाह से रोगी को बचाना चाहिए।
- २. विकृत पार्श्व की ओर अरवट करके शयन करने से रोगी को कष्ट होता है, अत उम ओर का भाग ऊपर रखना चाहिए, जिससे दवाव न पडे। यदि सोने में कष्ट हो, तो मसनद लगाकर रोगी को अर्ध लेटी हुई मुद्रा में रखें। ऐसा करने से खाँसी और श्वास में राहत मिलती है।
- ३ रोगी के शरीर को गरम कपडे से ढँका रखें, मुँह खुला हो और ओढना बहुत वजनदार न हो, नहीं तो श्वांस लेने मे कठिनाई हो जाती है। कमरे का वातावरण गरम रखना चाहिए।
 - ४. रोगी को पूर्ण विश्वाम देवे। मल-मूत्र स्थाग के लए, धूकने, जल पीने, दना

खाने और पथ्य लेने आदि कार्यं के लिए परिचारक की सहायता के बिना नहीं उठना बैठना चाहिए।

५. कमरे की खिडकियाँ खुली हो, जिससे स्वच्छ वायु तथा प्रकाश आने मे व्यवधान न हो।

६ ज्वर के आक्रमण के समय रोगी को वहुत जाडा लगता है, इसलिए उस समय ओढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था करे और कमरे को गरम रखने का यत्न करे। जगले खुले रखकर कमरे में धुँमा रहित अगीठी आदि रखनी चाहिए।

७. आरम्भ के दिनों में लघन कराना चाहिए और ३ दिन तक अर्धाविशिष्ट उवाला हुआ जल मिश्री, ग्लूकोज या मुनक्का खिलाकर ३ लीटर तक प्रतिदिन पिलाना चाहिए। मुनक्के का बीज निकालकर कालीमरिच और सेंधानमक बुरक कर तवे पर गरम करके रखे और १५-२० दाने तक प्रतिदिन देवे।

८. प्राय एक सप्ताह या ८-१० दिन मे रोग का शमन होने तक लघन कराना उचित है। तत्पश्चात् रुचि होने पर पहले परवल का यूप, लाजमण्ड, मूग का यूप, मखाना, धान का लावा, मीठा सन्तरा, मुसम्मी, किसमिस आदि देना चाहिए।

औषधोपचार

यह वातश्लेष्मोल्वण सन्निपात है। इसमे कफनाशक, ह्या, सन्तापहर, कफ- / नि सारक, कफ-विलयनकारक औपधो का प्रयोग कराना चाहिए। एतदर्थ---

व्यवस्थापत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४-५ बार
 त्रिभुवनकीर्ति ५०० मि० ग्राम
 महालक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्राम
 मृगाराष्ट्र २५० मि० ग्राम
 भूग भस्म ५०० मि० ग्राम
 शुद्ध नरसार १ ग्राम
 रससिन्दूर २५० मि० ग्राम
 योग ५ मात्रा

ताम्बूलपत्र स्वरस और मधु से।

- २. प्रात -साय २ वार अष्टादशाग¹ क्वाथ ५० मि० ली० पीना ।
- रे. ९ बजे, २ बजे दिन और ९ बजे रात्रि में श्रुग्यादि चूर्ण ६ ग्राम

१ दशमूल, कचूर, काकडासिंगी, पुष्करमूल, जवामा, सींठ, इन्द्रजी, परवरल की पत्ती और कुटकी, प्रस्पेक सममाग लेकर २० ग्राम का क्वाथ बनाकर पीना ।

৭০ কাত ক্রিত

कायचिकितसा

धुद्ध टक्कण आधा ग्राम अर्थेन्त्रयण आधा ग्राम योग ३ मात्रा

सुसोष्ण जल से।

वदा.स्परः पर सुसोव्य अभागार्य---पंचगुणतैल

या

पुराणएत में मपूर-सैन्धय मिन्नागर प्रयोग करे।

वावस्यिक चिकित्सा भासकृष्ट्या में

४-४ मण्टे पर ३ बार

श्वानकामिकारा २५० मि० ग्रा० महालहमीविलारा २५० मि० ग्रा० बृहद्वातिचित्तामिका २५० मि० ग्रा० श्रृंगाराञ्च २५० मि० ग्रा० युद्ध टक्कण १ ग्राम

योग ३ मात्रा

काकटासियी चूणं १ ग्राम और मधु मे।

शुष्ककास, बाह और व्ययता मे

३-३ मण्टे पर ४ बार

कासकतेरी ५०० मि० ग्रा० धुद्ध टकण १ ग्राम प्रवालपिष्टी ५०० मि० ग्रा० मधुपष्टी चूर्ण ५ ग्राम योग ४ मात्रा

मधु से । तत्प्रधात् लिसोटा का शर्वत पिलाना ।

बच्चो में कफ ढीला होकर मुख से नही निकलता, इसलिए उन्हें वमन औ रेषनकारक औषध देनी चाहिए।

> ककुष्ठ (उदाारे रेवन्द) १२५ मि० ग्रा० अतीस चूर्ण <u>२५० मि० ग्रा०</u> योग १ मात्रा

> > मधु से चटाना।

कायचिकित्सा

ज्वरान्तवीर्बस्यनिवारणार्थं

१ नवायस लौह ५०० मि० ग्रा०
 भ्रुग भस्म ५०० मि० ग्रा०
 प्रवाल भस्म २५० मि० ग्रा०
 स्वर्णवसन्तमालती २५० मि० ग्रा०
 अभ्रक भस्म २०० मि० ग्रा०
 सितोपलादि ३ ग्राम
 योग २ मात्रा

प्रातः-साय मघु से, तदनन्तर च्यवनप्राश १५ ग्राम दूध से।

२ भोजनोत्तर दोनो समय—
द्राक्षासव २५ मि० ली०
१ मात्रा
समान जल मिलाकर पीना ।

पध्य

- 9 रुग्ण को सुखद, स्वच्छ, शान्त और असकीणं स्थान एव विस्तर पर सुलाना चाहिए।
 - २ पीने के लिए सुखोष्ण जल देना चाहिए।
 - ३. वकरी का दूध उत्तम है, न मिलने पर गाय का दूध दे।
 - ४ आहार मे मण्ड, पेया, विलेपी का सुखोब्ण प्रयोग करे।
 - ५ धान का लावा या मखाना जीरा नमक डालकर भूनकर खाने को दे।
 - ६ परवल की रस्सेदार सब्जी या भुर्ता मे जीरा-नमक डालकर दे।
 - ७ मूँग का यूष, पपीता या करेला रुचि के अनुसार दे।
 - ८ मुनक्का, किसमिस और अगूर भी देना चाहिए।
 - ९ भोजन सुपाच्य तथा पौष्टिक होना चाहिए।
 - १०. अनार और मीठी मुसम्मी देना उत्तम है।
 - १९ परवल की सब्जी, मूग की दाल और रोटी खाने मे देना चाहिए।

श्लेष्मकज्वर (Influenza) पर्याय और परिचय

इलेडमकज्वर, वातश्लेडमकज्वर, प्रतिश्यायज्वर, पलू, जनपद व्यापक प्रतिश्याय भीर इन्पल्एञ्जा, इन नामी से यह जाना जाता है।

१. प्रादु पन्तीह यत् प्राय ६लेज्मजोपद्रवा मृशम् । क्वचिकानपदोद्ध्वंसी ज्वरोऽसी इलेज्मक स्मृतः ॥ सि० नि० पू० ख०

यह जनपदच्यापक जार है, जो तीय, आधुकारी और राफ्रामक है। इसमे कफज विकारों की अधिकता प्रतीत होती है, अत एवं इसे क्लेंट्सज्बर की सजा थी गयी है। यह रोग सबसे पहले सन् १७४१ ई० में इटली में हुआ था। सन् १९२१-३२ में महामारी के लग में यह भारतवर्ष में प्रकट हुआ। सन् १९१८-१९ ई० में इसका विश्वव्यापी प्रसार हुआ। सन् १९५७ में इसका इतना इवाक आफ्राक हो गये थे। मारतवर्ष के नगरों और इटली के प्राय मगस्त नगर इससे आफ्राक हो गये थे। मारतवर्ष के नगरों और गाँवों के अनेकानेक परिचार इस महामारी से नगरस और पीटित देशे गये। लेसक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मुक्यालय देवरिया नगर में उन दिनों चिकित्माकार्य कर रहा था और उने यह स्मरण है कि नथूणें नगर तथा सभी परिवार के अधिकाश गदस्य इम पलू की महामारी की पकट में आ गये थे। किमी-किसी परिचार के तो सभी के सभी सदस्य बच्चे यूढ़े-जवान इस जबर से आफ्रान्त देशे गये।

निदान'

इस रोग को उत्पन्न करनेवाला कीटाणु हीमोफाइलम वैक्टीरिया (Haemophilus Bacteria) या वैसिलम इन्यनुष्ट्या (Bacillus Influenza) कहा जाता है। इस रोग का चयकाल ३-४ दिन है। रोग प्रतिस्थाय से द्रुद होता है। इस रोग का प्रभाव श्वासयन्त्र, अन्नपचन-संस्थान, मस्तिष्क और नाजीतन्त्र पर पहता है। इसमे अतिशय शक्तिक्षीणता हो जाती है।

संक्रमण

इन ज्वर का नक्रमण यायु द्वारा होता है, इसलिए एक साथ एक स्थान में रहनेवाले व्यक्तियों में एक साथ ही फैल जाता है। आई भू-भाग के निवासी, अयुद्ध दूषित वातावरण के सम्प्रक में रहनेवाले, दुवंल व्यक्ति या रोगी, फुप्पुस और ह्वय के रोगी शीघ्र ही इस रोग के शिकार हो जाते हैं। धरद श्रृतु में होनेवाला यह रोग कप्टमाध्य होता है। वगन्त ध्रृतु में भी इस रोग का आफ्रमण होता है। रोगी के दूषित वन्त्रों के स्पर्श में तथा रोगी की सेवा सुश्रूषा करने से या रोगी के सपक में रहने से इस रोग का सक्रमण होता है।

संप्राप्ति

इस रोग के कीटाणुओं का प्रवेश श्वाममागें से होनें के कारण श्वासनिकका और दोनों फुफुम विकृत हो जाते हैं। दाह-शोध होकर श्वासनिककारों कफावृत हो जाती हैं, तब रक्तश्रीवन आदि न्यूमोनिया जैसे छक्षण हो जाते हैं। श्वसनमागें में प्रणशोध हो

१ वायुवाहितजीवाणुविष युगपदक्षमा । छोकेषु प्रसतं प्राय श्वासमार्गेण तं ज्वरम् ॥ विद्धाति व्यचिद् वाऽथ मुक्तमार्गेण सट्क्रम । जनाक्षने च सङ्क्रान्ति श्वसनादिनिमित्तत ॥ सि० नि० पू० ख०

जाता है। उग्र होने पर श्वसनमार्गीय क्लेब्मकला में रक्ताधिनय हो जाता है। क्वचित् उचित चिकित्सा के अभाव मे यह मारक रूप धारण कर लेता है।

अन्नमार्ग से कीटाणुओं का प्रवेश होने पर आमाशय और पक्वाशय मे विकृति होती है और इससे वमन या अतिसार या दोनो की प्रवृत्ति हो जाती है। यदि कीटाणुओं का प्रवेश मस्तिष्क में हो जाता है, तो वहाँ पर भी दाह शोथ आदि विकृति हो जाती है।

लक्षण

इस रोग मे विकृति, विशेषत कफ-वातोल्वण सिन्नपात के समान होती है। कभी-कभी इस रोग के कीटाणु धातुओं को भी दूषित कर देते हैं । रक्त मे क्वेतकणों की सख्या कम हो जाती है। शरीर शक्तिहीन हो जाती है। रोग का आक्रमण सहसा होता है। सर्वाङ्म मे वेदना होने लगती है। शीत अथवा गरमी मालूम होकर नासिका के अन्दर और कण्ठ मे प्रतिक्याय के लक्षण प्रकट होते हैं। खाँसी, गले मे पीडा, शिर शूल, जर शूल, पृष्ठ तथा कटिप्रदेश मे वेदना, कृशता और वल के हास का अनुभव होता है। ताप प्राय. पाँच-सात दिन तक १०३°-१०४° फा० रहता है। नाडी की गित तीन्न होती है। मित्तिष्क मे भारीपन, नासिका मे वोझ और अप्रता तथा नेत्रो मे लालिमा एव अश्रुपूर्णता होती है। छीकें आती हैं। कभी-कभी नासिका से रक्त निकलने लगता है। गले मे वेदना, स्वरभेद या स्वरावरोध हो जाता है। रोग के बढने पर कफवृद्धि के भी लक्षण बढ जाते हैं। फुप्फुसो मे रोग का आक्रमण होने पर श्वासकुच्छ्रता और श्वासावरोध बादि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। श्वासनिलका मे शोध होने पर दीर्घकालिक कास हो जाता है।

पचनसस्थान के विकृत हो जाने पर अग्निमान्द्य, उदरशूल, वमन या अतिसार अथवा दोनो होने लगते हैं। नेत्र और शिर में अतितीन्न वेदना होती है। ग्रीवा तथा मस्तिष्क में वेदनाधिक्य का अर्जुभव होने लगता है। सामान्यत यह ज्वर तीसरे दिन बहुत बढ जाता है। प्राय: पाँचवें-छठे दिन ज्वर उत्तर जाता है। रोग के उपद्रवयुक्त होने पर इसकी अवधि चार सप्ताह तक हो जाती है। कभी-कभी १०-१२ दिन के बाद अन्त्र में दुबंलता एव स्वेदाधिक्य होता है तथा मल-मूत्र अधिक मात्रा में निकलने लगता है।

१. प्रायश्वास्य विकारा स्यु श्वासयन्त्रे क्वचित् पुनः। अञ्चमार्गे समग्रेऽपि क्वापि वा सर्वधातुषु॥ सि० नि० पू० ख०

२. कप्तवातोस्वणं तन्त्र सिन्नपातसुदीरयदः। विषं धातून विकुरते स्तोकेनातिबळेन वा॥ सि० नि० पू० ख०

^{&#}x27; ३. प्रतिदयाय. शिर श्र्लं शीतकम्पौ च कुत्रचित्। अङ्गमर्दं. कटीपृष्ठोर्सां तीवाश्च वेदना॥ कासो ज्वरोऽवसादश्च कार्यञ्चाल्पदिनैमृ शम्। अस्यर्थवलद्दानिश्च लिङ्गानि दलेष्मके ज्वरे॥

इस रोग की तीव्रता मे तीन प्रकार के विशेष विकार होते हैं-

१. दोनो फुप्फुसो मे विकृति होने पर फुप्फुसप्रदाह, यूक मे रक्त आना, प्रलाप, कास, श्वास आदि लक्षण न्युगोनिया जैसे हो जाते हैं। कभी-कभी फुप्फुसावरण मे दाह होकर रक्त या पूय भर जाता है।

२ अन्नमार्ग बाक्रान्त होने पर खुद्यानाश, वमन, अतिसार, उदरशूल आदि

विषभक्षण-सद्श लक्षण होने लगते हैं।

३ कभी मस्तिष्क और नाडीतन्त्र पर रोग का तीम्र प्रभाव देखा जाता है, तव मूच्छी, वातविकार, अङ्गमर्द, हृदय की गतिमन्दता और वेदना, निद्रानाश और प्रलाप आदि सिन्नपात-सद्श लक्षण होते हैं।

साध्यासाध्यता

जपद्रवरिहत रोग साध्य होता है। सौम्य प्रकार के विकार मे विना औषध-प्रयोग के भी रोग शान्त हो जाता है। फुप्फुसदाह होने पर दृद्ध रोगी की मृत्यु हो जाती है। इन्पलुएञ्जा वाले रोगी में कोई भी जीण रोग पुन तीय हो जाते हैं।

चिकित्सा-सूत्र

 रोगी को विश्राम कराना चाहिए और उसे स्वच्छ, प्रान्त व वहे कमरे तथा हवादार स्थान मे रखे।

२ रोगी को शीत से और ठडी वायु से बचावे। कमरे को निर्धूम अग्नि के अलाव से गरम रखना चाहिए।

३ रोगी के मुख-दन्त आदि को मञ्जन से घोष्टित करा देना चाहिए और शरीर को सुखोष्ण जल में भिगोई तौलिया से प्रतिदिन पोछ देना चाहिए।

४ पीने के लिए अर्घाविशिष्ट उष्णोदक या पडड्गपानीय या पित्तपापटे का अर्क देना चाहिए। तुलसी की पत्ती और कालीमरिच डालकर बनायी चाय पिलानी चाहिए।

५ दिन में २-३ बार गोजिह्वादि फाण्ट पिलाना चाहिए। इससे खाँसी और श्वास में जमा हुआ कफ सरलता से निकल जाने से क्लेब्सच्यर में आराम मिलता है।

गोजिह्वादि फाण्ट-गावजवान, मुलहठी, सींफ, मुनवका, अजीर, उन्नाव, अरुस के पत्ते, जूफा, सीपस्तीन, खूवकला, हसराज, गुलवनप्सा और काली मिर्च, प्रत्येक

सामान्यतो विश्वेषातु फुप्फुमाक्रमणे सति।
सरक्त ष्टीवनं प्राय प्रष्ठाप श्रसनं तथा॥
अथान्नमार्गे त्वाकान्ते वन्यतीसारयोद्देयो।
पकस्य वा प्रवृत्तिः स्याच्छूल ववापि च कामला॥
अत्यर्थविषयोगेन सर्वेषातुषदूषणात्।
अभिन्याससमं क्वापि रूप तस्मान्न मुच्यते॥
नैरुज्यं स्वरुपदोपस्य शीघं यद्यपि जायते।
बल्हानिश्चिराय स्यात् कुच्छा तु बहुदोषता॥ सि० नि० पू० ख०

समभाग लेकर, भूसा की तरह कूटकर रख ले। इसमें से १५ ग्राम दवा को २०० मि० ली० जल में अर्घाविशिष्ट्र पकाकर छानकर ३ ग्राम चीनी या मधु मिलाकर २-३ बार पिलाना चाहिए।

६ कमरे का धूपन-गुग्गुलु, निम्बपत्र घुष्क, लोहवान, देवदारु, और जटामासी समभाग लेकर कूटकर रख ले और निर्धूम अगारे पर थोडा-थोडा डालकर कमरे को धूपित करे।

औषध-व्यवस्था

श्लैितक मे दोषपाचन, सशोधन तथा सशमनार्थं

प्रति ४-४ घण्टे पर ३ वार

सजीवनी वटी ५०० मि० ग्रा० सीभाग्य वटी ५०० मि० ग्रा० व्यवकञ्चुकी २५० मि० ग्रा० म्हणभस्म ५०० मि० ग्रा० पु० नरसार ५०० मि० ग्रा० योग ३ मात्रा

सुखोष्ण जल से । वाताधिक्य मे—

प्रति ३ घण्टे पर ४ बार

बाह्मीवटी ५०० मि० ग्रा० वृहद्वातिचन्तामणि २५० मि० ग्रा० महालक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्रा० चन्द्रोदय २५० मि० ग्रा० योग ४ मात्रा

सिन्दुवारपत्र-स्वरस और मधु से । सर्वाङ्कवेदना, ज्वर तथा अनिद्रा मे

प्रति ४ घण्टे पर ३ बार

श्रृगभस्म ५०० मि० ग्रा० विताल रस ५०० मि० ग्रा० श्रृगाराभ्र ५०० मि० ग्रा० महाज्वराकुश ५०० मि० ग्रा० योग ४ मात्रा

तुलसीपत्र-स्वरस और मधु से।

प्य

मण्ड, पेया या विलेपी देकर क्षुधा को जागृत करे। हलका, सुपाच्य, रुचिवर्धक एवं पुष्टिकर आहार देना चाहिए। विबन्ध दूर करने के लिए मुनक्का खिलाना, तथा परवल की सब्जी देना चाहिए। सुखोष्ण जल का सभी कामो मे प्रयोग करना चाहिए। सक्रमण-प्रतिषेधार्थ अन्य परिजनो को घूपन आदि उपाय करना चाहिए।

ज्वरान्तदौर्बस्य मे

१ प्रात -साय
 वसन्तमालती २५० मि० ग्रा०
 महालक्ष्मीविलास २५० मि० ग्रा०
 शिलाजत्वादि लौह ५०० मि० ग्रा०
 रसिनदूर २५० मि० ग्रा०
 सितोपलादि २ ग्राम
 मधु से। योग २ मात्रा

२ भोजनोत्तर— द्राक्षारिष्ट <u>२०</u>मि० ली० <u>१</u>मात्रा

समान जल मिलाकर पीना ।

३ रात में सोते समय— चन्द्रप्रभावटी १ गोली दूध से ।

आक्षेपक ज्वर (Cerebro-Spinal Fever)

पर्याय और परिचय

पर्याय—क्रकच सिन्नपात, ग्रीवाभञ्जकज्वर, गर्देनतोड बुखार, सेरिब्री-स्पाइनल फीवर और मेनिञ्जाइटिस आदि इसके पर्याय हैं।

परिचय—इस रोग मे भयद्भर ज्वर, अगो मे आक्षेप, भुग्न-नेत्रता, मन्यास्तम्भ, शरीर की पेशियो मे जकडाहट तथा पीडा और मस्तिष्क एव सुपुम्ना के आवरण मे शोथ आदि लक्षण होते हैं। रोगी प्रलाप करता है, उसे मूर्च्छा, कम्प, वेचैनी और चक्कर मालूम होता है।

निदान

धूल और धुँआ जहाँ ज्याप्त हो, ऐसे सकीर्ण स्थान मे अनेक मनुष्यो के एक साथ रहने से, विशेषकर निर्धंन मनुष्यो को यह रोग होता है। निर्वल बालको और युवा पुरुषो को यह रोग अधिकतर होता है।

इस ज्वर का मुख्य कारण मेनिगोकोक्कस (Meningococcus) नामक

१ माक्षिप्यन्ते यतोऽङ्गानि सङ्गोच यान्ति चाश्रसा । घोरो ज्वरश्च सज्ञाहृत् सोऽयमाक्षेपक स्मृतः ॥ सि० नि० पू० ख०

जीवाणु है, जो सेम के बीज के आकार का होता है। भारतवर्ष मे यह रोग वसन्त और ग्रीष्मऋतु मे प्राय होता है। नासिका के रोग, गले के रोग और प्रतिक्याय इस रोग के सहायक कारण होते हैं। घनी आवादी मे रहनेवाले लोग इससे विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं। यह रोग स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषों मे अधिक होता है। अति परिश्रम, भय, क्रोध और दरिद्रता के कारण यह रोग आक्रमण कर बैठता है।

संप्राप्ति

इस रोग के जनक जीवाणु नासिका और कण्ठमार्ग से प्रवेशकर सुषुम्ना तथा मस्तिष्क के आवरणो मे पहुँचकर वहाँ निवास करते हैं। वे वहाँ दाह तथा शोथ उत्पन्न करते हैं, जिससे मस्तिष्कावरण मोटा हो जाता है एव मस्तिष्क-विवर वडे हो जाते हैं और उनमे पूय तथा गाढी लसीका भर जाती है, तदनन्तर सुषुम्ना और मस्तिष्क की सेलो पर दबाव पडने से चेष्टावह तन्तुओं में उत्तेजना आकर आक्षेप आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। 2

संक्रमण

रोगी व्यक्ति के खाँसने, छीकने और थूकने से स्वस्थ मनुष्यो मे भी जीवाणु का सक्रमण हो जाता है। ये जीवाणु वायु द्वारा मनुष्य के श्वासपथ या मुखमार्ग मे प्रविष्ट हो जाते हैं। सडे-गले पदार्थ तथा कूडा-कचरा, जल-जमाव आदि भी सक्रमण फैलाते हैं।

लक्षण

इस रोग मे चार प्रकार की स्थिति देखने मे आती है, जैसे-

9 तीन प्रकार मे आरम्भ मे ज्वर विषम रूप मे घटना-बढता है, फिर कुछ समय स्थिर होकर चढने लगता है और १०२° से १०४° फा० तक हो जाता है। शिर शूल, वमन, सिन्धशूल, प्रलाप, ग्रीवास्तम्भ और ग्रीवा मे शूल होता है। शिर एक ओर मुड जाता है, व्याकुलता बढ जाती है तथा रोगी को प्रकाश-सत्रास हो जाता है। शरीर पर मोतीझरा जैसे गुलाबी दानें निकल आते हैं। अगो मे सकोच और नेत्रवक्रता के साथ रह-रहकर आक्षेप हो जाता है।

२ अतितीव प्रकार मे रोगी अतिदुर्बल हो जाता है और दानें अधिक निकलते है। तीव शिर, शूल, वमन, कम्प, भयकर सर्वाङ्गशूल के साथ नाडी क्षीण हो जाती है और रोगी १ से ३ दिन मे ही दिवगत हो जाता है। कोई-कोई रोगी तीव लक्षणों से सघर्ष करता हुआ ५ से ७ दिन बाद मरता है।

१ वसता सहकुले देशे रजीभूमाकुले चिरम् । द्ररिद्राणा भवेद् भूम्ना सोऽयं जीवाणुसम्मव ॥ सि० नि० पू० ख०

२ मस्तिष्कमूले परित सुषुम्नाकाण्डं च तच्छादिकलान्तराले। विषं क्रमात् पूयसमां लसीका सहत्य दोषानिखलान् प्रकोप्य।। चेष्टावहानामथ नाटिकानामुत्तेजनादाक्षिपदङ्गकानि। सहीच्य शाखाश्च निहन्ति सधायाम् आक्षेपके दुर्लमजीवितस्य।। मि० नि० पू० ख०

३. मृदु प्रकार मे सिन्धशूल के साथ अन्य लक्षण अधिक उग्र नहीं होते। ये लक्षण कुछ दिन बने रहते हैं और भाग्यशाली रोगी रोगमुक्त हो जाता है।

४. जीर्ण प्रकार में समय-समय पर ज्वर का वेग होना और दानों का निकलना देखा जाता है। यह बालकों में अधिक होता है।

उपद्रव

इस रोग मे सामान्यत फुप्फुस एवं हृदय सम्बन्धी उपद्रव होते हैं, विशेषकर स्वसनकज्वर तथा हृदयावरणीकला का प्रदाह होता है। न्यूमोनिया, बिधरता, अन्धता, शिर शूल, स्थानिक पक्षाधात और वृक्कप्रदाह आदि उपद्रव होते है। प्राय अस्सी प्रतिशत रोगी कालकविलत हो जाते हैं, किन्तु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हारा आविष्कृत जीवनरक्षक औषधों के प्रयोग से कुछ प्रतिशत आरोग्य-प्राप्ति की आशा बलवती हुई है।

चिकित्सा-सूत्र

१ स्वच्छ, अल्पप्रकाश युक्त, शान्त, वायुसन्वार युक्त कमरे मे, मृदुल शय्या पर रोगी को सुलाना चाहिए।

२ प्रथम सप्ताह मे लघन कराना उपयुक्त है। उष्णोदक, षडगपानीय, नारिकेल-जल एव यवपेया दी जानी चाहिए।

३ वमन, शूल शूल आदि विषमयता के लक्षणों के शान्त हो जाने पर धान के लावा का बना मण्ड, मूग का यूष, परवल का यूष अथवा पचकोल डालकर पकाया क्षीरपाक देना चाहिए।

४ ग्रीवा या पृष्ठ मे अधिक वेदना होने पर रवर की थैली मे गरम पानी भरकर उससे सेंकना चाहिए। शरीर को सुखोब्ण जल से दिन मे ३ बार पोछना चाहिए।

५ दिन भर मे ३-४ बार कुल्ला कराकर मुख की सफाई करानी चाहिए। इसके लिए दशनसस्कार चूर्ण का प्रयोग करना उत्तम है।

६ रोगी को ३-४ लीटर जल दिन भर मे अवश्य देना चाहिए, जिससे मूत्रा वरोध का कष्ट न हो। मलशोधनार्थं मुनक्का ५० ग्राम तक दें।

७. यदि रोगी मूर्च्छित अवस्था मे हो, तो उसे हलके हाथो का सहारा देकर करवट बदलवाते रहे। विषमयता दूर करने के लिए समलवण जल और ख्लूकोज मिलाकर सिरा द्वारा देना आवश्यक है।

औषध-व्यवस्था

आक्षेप, मूर्च्छा, प्रलाप आदि मे

३-३ घण्टे पर ४ बार

मूर्च्छान्तक वातकुलान्तक

५०० मि० ग्रा० २५० मि० ग्रन०

१ सि० नि० पू० ख०।

स्वर्णमाक्षिक भस्म ५०० मि० ग्रा० महालक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्रा० योग ४ मात्रा ब्राह्मी स्वरस और मधु से।

वमन या पैतिक लक्षणो की उग्रता में

४-४ घण्टे पर ४ वार

सूतशेखर रस १०० मि० ग्रा०
मयूरिपच्छ भस्म ५०० मि० ग्रा०
कर्चूर चूर्ण १ ग्राम
योग ४ मात्रा

मधु से । बाद मे पर्पटाके मिश्री मिलाकर पिलाना ।

रोग-मुक्ति के बाद भी स्मृतिनाश रहने मे

(१) प्रात -साय

ब्राह्मी वटी २५० मि० ग्रा० स्मृतिसागर २५० मि० ग्रा० चतुर्भुज २५० मि० ग्रा० सप्तामृत लौह <u>१ ग्राम</u> योग २ मात्रा

मधु से । वाद मे जटामासी चूर्ण का फाण्ट ५० मि० ली० पिलाना ।

(२) भोजनोत्तर २ बार

, सारस्वतारिष्ट २० मि० ली० समान जल से पीना १ मात्रा

(३) प्रात — महाचैतसपृत अथवा

सारस्वत घृत या सारस्वत चूर्ण दूघ से।

(४) रात मे सोते समय चन्द्रप्रभा वटी २ गोली दूध से ।

(५) शिर मे मालिश

विष्णु तैल या हिमाशु तैल या बाह्यी तैल।

उपद्रव-शिर शूल, ग्रीवास्तव्धता, प्रलाप, मूर्च्छा, आक्षेप, वमन, रक्तस्राव, हृदयाति-पात, स्मृतिनाश आदि होने पर उनके अनुमार औपद्य एव पथ्य उपचार करना चाहिए।

निर्देश—स्वस्थ व्यक्तियों को रुग्ण के सम्पर्क से बचाना चाहिए। रुग्ण की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी के थूकने तथा खाँसने से भी रोग का प्रसार होता है, अत. उसे छीकने-खाँसने के समय मुख एव नासिका पर रूमाल लगाने का निर्देश देना चाहिए।

सप्तम अध्याय

दण्डक, पीत, कृष्णमेह, मूपिकदंश और कर्णमू लिक ज्वर तथा मस्रिका, लघुमस्रिका एवं रोमान्तिका

दण्डकज्वर

(Dengue Fever)

पर्याय और परिचय

इसे ब्रेकबोन फीवर, डेंग्यू फीवर, हैण्डी फीवर, शूलास्थिण्वर, हड्डीतोड बुखार और दण्डक ज्वर आदि पर्यायो से जाना जाता है।

यह तीय्र, आशुकारी और संक्रामक होता है। रोगी अत्यन्त दुर्बेलता का अनुभव करता है। ज्वर सहसा चढता है और प्राय आठ दिन रहता है। यह वालको और वृद्धों को होता है। इसमें कारीर में दण्ड से मारने के समान पीडा होती है, विसर्प के समान त्वचा लाल हो जाती है और चकत्ते हो जाते हैं, जो तीसरे-चौथे दिन जत्पन्न होते हैं।

यह ससार के विभिन्न देशों में महामारी के रूप में प्रकट होता है। भारतवर्ष, ईरान, श्रीलका, ब्रह्मदेश, इण्डोचीन, मलाया, चीन, फिलीपाइन्स, आस्ट्रेलिया, मिश्र, यूनान, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और पश्चिम द्वीपसमूह में पाया जाता है।

निदान

इसका मुख्य कारण एक विषाणु है, जो मच्छर द्वारा मनुष्य शरीर मे प्रवेश करता है। 'ईहिस इजिप्टी' नामक यह मच्छर इस रोग का प्रधान वाहक माना जाता है। भारतवर्ष मे सन् १८७१ से १८७५ तक और मिश्र मे १९२७ से १९२८ तक इसका भयकर रूप मे प्रसार हुआ था। इस रोग के कारण मनुष्य की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है, कि वह अपना कार्य-व्यापार सुचार रूप से करने मे असमर्थ हो जाता है। इसका सचयकाल ५ से ७ दिन होता है।

लक्षण 🤊

सहसा ज्वर का आक्रमण होता है, जो १०२° से १०५° फा० तक चला जाता

१ अस्थिसन्धिरुजास्तीव्रा दण्टाह् तिकृता इव ।
क्वित् श्चिप्रोदंथलयो विसर्प सर्वेगात्रग ।
ज्वरश्च कण्ठरुग्युक्त पुनरावर्तते गत
सन्धारिणा सञ्चोथेन सन्धिश्लोन लक्षित ।।
प्रतिदया-कासवान् प्रायेणा टाहेन प्रमुच्यते ।
चिरं मन्धिरुगाः सन्ति स श्रेयो दण्डक ज्वरः ।।

है। साधारण आक्रमण होने पर १००° फा० तक रहता है। इसमे आमवात की तरह हाथ-पैर, पीठ, सन्धिस्थल और कटिप्रदेश में चूल होता है। यह अस्थियों को अधिक प्रभावित करना है, जिससे मनुष्य ठींक से चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। पहले एक सन्धि में पीडा होती है, फिर सभी सन्धियों में पीडा होकर तापमान बढ़ जाता है। मुखमण्डल में लालिमा और गले में खरादा होती है। वमन, हुल्लास और विष्टम्भ बना रहता है। ज्वरवेग अधिक होने पर भी नाडी की गति का न्यून बना रहना इस ज्वर की विदीयता है।

ताप उतरने के पश्चात् प्रस्वेद और अतिसार हो जाता है। कभी-कभी नासिका से रक्तस्राव होने रंगता है। यह वातरलेष्म-प्रधान ज्वर है, अत इन्न्जूएञ्जा का सन्देह होता है, किन्तु अन्तर स्पष्ट है, कि इन्पलूएञ्जा में पहले ही प्रतिदयाय हो जाता है और डेंग्यू में पहले प्रतिदयाय नहीं होता। इन्पलूएञ्जा में सन्धियों में अधिक पीडा नहीं होती, जब कि डेंग्यू में सन्धियों में अथकर पीडा होती है।

सामान्य चिकित्सा

- १. रोगी को एक सप्ताह-पर्यन्त शय्या पर विश्राम करावे, निवास-स्यान स्वच्छ, मनोरम, हवादार और आरामदेह होना चाहिए।
 - २. सुखोष्ण जल मे तौलिया भिगोकर देह पोछ देना चाहिए।
- ३. मलशोधनार्थं कुटकी चूणं या यण्टघादि चूणं अथवा सुखविरेचनी वटी का प्रयोग करना चाहिए।
- ४. वमन मालूम पडने पर लॉग-इलायची चूसने को दे और पीने लिए सॉफ या पित्तपापडे का पानी देवे।
- ५ उवरारम्म से २-३ दिन तक उप्णोदक पर्याप्त मात्रा मे पिलाना चाहिए। बाद, फलो का रम, यव की पेया और पानी मे घोलकर ग्लूकोज देते रहना चाहिए।
- ६ आहार की किंच जागृत होने पर मूग का यूप, दूध, साबूदाना और लाजमण्ड आदि सुपाच्य आहार दे।
 - ७ जबर की तीव्रता में शिर पर वरफ की घैली रखे।
- ८ नेत्र-पीडा होने पर वरफ के दुकडे की कपडे मे लपेट कर आँखो के ऊपर रखना चाहिए।

व्यवस्थापत्र

सर्वाङ्गवेदना शमनार्थ

३-३ घण्टे पर ४ बार

वेताल रस ५०० मि० ग्रा० मृत्युङ्जय रस ५०० मि० ग्रा०

प्रायोऽमी जानपदिको वातश्रेष्मप्रकोपन । ्मालानां जरताम्चातिदारुण परिलक्ष्यते ॥ सि० नि० पू० स० कृष्णचतुर्मुख ५०० मि० ग्रा० गुडूचीसत्त्व २ ग्राम योग ४ मात्रा

भूनी अजवायन का १ ग्राम चूर्ण और मधु से। ज्वरान्त दौर्बल्य मे

१ प्रात-साय

नवायस लौह है ग्राम
प्रवाल भस्म २५० मि० ग्रा०
विषाण भस्म २५० मि० ग्रा०
सितोपलादि २ ग्राम
शुद्ध कुपीलु १२५ मि० ग्रा०
योग २ मात्रा
मधु से ।

२ भोजनोत्तर

अश्वगत्वारिष्ट २५ मि० ली० १ मात्रा

समान जल से पीना । ३. अभ्यगार्थं चन्दनवला-लाक्षादि तैल

प्रतिषेधार्थ

धूपनोपयोगी गुग्गुलू, लोहबान, नीम की पत्ती आदि जलाकर मच्छर भगावे या कछूआ या मुर्गा छाप अगरबत्ती जलावे। रोगी को मच्छरदानी के अन्दर सुलावे। स्वस्थ व्यक्ति भी मच्छरदानी लगावें।

पीतज्वर

(Yellow Fever)

इस ज्वर में त्वचा पीली पह जाती है, अत -इसे 'पीतज्वर' कहते हैं। यह एक सक्रामक रोग है, जिसमें उच्च तापमान के साथ उग्न कामला रोग के भी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। रोगी का शरीर एकदम पीला पह जाता है। यह शीत देश की अपेक्षा उष्ण देशों में अधिकाश होता है। अफीका के पश्चिमी तट तथा उष्णकटि-वन्धीय अमेरिका के स्थानों में यह देशव्यापी होकर उत्पन्न होता है।

निदान

इस रोग का कारण एक अतिशय सूक्ष्म जीवाणु है, जो इडिस ईजिप्टी (Aedes aegypti) नामक मच्छर के दश से शरीर,मे प्रविष्ट होता है। इसका सचयकाल ३-६ दिन तक रहता है।

मकान के अगल-वगल सचित मल मूत्र से उत्पन्न विप तथा अनियमित अयुक्ति-युक्त आहार, अपरिमित मद्यपान, अस्वास्थ्यकर जलवायु आदि इसकी उत्पक्ति और प्रसार के सहायक कारण हैं।

लक्षण

शीत लगकर शरीर काँपने लगता है। भ्रूप्रदेश, पृष्ठवश और हाथों में वेदना होती है। पहले कई दिनों तक तापाश १०४०—१०५० फा० तक रहता है। चौथे-पाँचवें दिन ताप कम हो जाता है। रोगी को वमन होता है, शिर शूल होता है, कदाचित् वमन में रक्त था जाता है। नेत्र लाल हो जाते हैं। रोगी कटिवेदना से व्यथित होता है। ज्वर शान्त होने पर पीडा शान्त हो जाती है।

इसके २ प्रकार होते हैं--- १ मृदु तथा २ सामान्य।

9 मृदु प्रकार मे [।]ज्वर चार-पाँच दिन मे उतर जाता है और रोगी का जीवन वच जाता है।

२ सामान्य प्रकार की तीन अवस्थायें होती हैं-

प्रथमावस्था — ज्वर का आरम्भ ठडक और केंपकेंपी के साथ होता है। अगमदें, शिर शूल, कटिशूल, हस्त-पादशूल आदि लक्षण तीव्र होते है। मूत्र का वर्ण पीला हो जाता है। नाडी की गित पहले तीव्र होती है, फिर घीरे-घीरे क्षीण हो जाती है।

द्वितीयावस्था—यह अवस्था तीसरे-चौथे दिन प्रारम्भ होती है। रोगी मे विप-मयता वढ जाती है। आमाशय मे शूल होता है। वमन की प्रवृत्ति होती है और उसमे काला रक्त आता है। मल के साथ भी रक्त आता है। रक्तस्राव की मात्रा घटती वढती रहती है। नेत्र पीले पढ जाते है। रोग उग्र होने पर उग्र कामला रोग हो जाता है। मरणोन्मुख रोगी का शरीर हल्दी जैसा पीला देखा जाता है। मूत्रा-घात होना रोग की भयकरता का सूचक है। द्वितीयावस्था मे लक्षणो की गम्भीरता होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है अथवा सुद्यार होने लगता है।

तृतीयावस्था—रोगी का तापमान घटकर पुन बढने लग जाता है, जिसके कारण एक सिवराम ज्वर उत्पन्न हो जाता है, जो हफ्तो तक बना रहता है। इसमे यक्टद्-वृद्धि या यक्टत्पाक आदि उपद्रव हो जाते हैं। शरीर पीला पड जाता है और अतिसार हो जाता है। मूच्छी या सन्यास की स्थिति मारक है। मूत्राघात होने से भी रोगी की मृत्यु हो सकती है। आयु के शेष रहने पर तृतीयावस्था मे भी रोगी बच जाता है।

आयुर्वेद की दृष्टि से यह पित्तप्रधान व्याधि है। आमाशय मे अम्लता, रक्तमिश्रित वमन, शरीर तथा मूत्र का पीलापन, विषमयता, मूच्छी, सन्यास आदि विकार पित्तजनित होते हैं।

चिकित्सा-सूत्र

% रोगी को पूर्ण विश्वाम की स्थिति मे रखना चाहिए।

- २. स्वच्छ, शान्त, मनोरम, सुखद शय्या युक्त आवास मे रोगी को आवासित करें।
 - ३ अनुरक्त, पवित्र और दक्ष तथा बुद्धिमान् परिचारक रखें।
 - ४. रोगी को यण्टचादि चूणें या निशोथ चूणें देकर मलशोधन करावें।
- ५ मूत्रल औषधो के प्रयोग से या पुनर्नवा जल, शतपुष्पार्क या पित्तपापडे के अर्क को मिलाकर मूत्रकष्ट दूर करें।
 - ६ वमन-निरोधार्थं लौंग-इलायची चूसने को दें।
 - ७ तीव्र सन्ताप शमनायं शिर पर वर्फ की थैली रखें।
- ८ प्रथम ३-४ दिन तक केवल पेय पदार्थ पिलावे, जैसे-- १ लीटर जल मे ४ ग्राम सोडावाईकार्व डालकर उसके साथ नारगी का या मुसंम्मी का रस डालकर पिलावें।
- ९ ज्वर शान्त हो जाने पर बार्ली, लाजमण्ड, मुद्गयूष या परवल आदि का सेवन करावें।
 - १०. उपद्रव होने पर तदनुसार उपचार-व्यवस्था करें।

औषघ-व्यवस्था

४-४ घण्टे पर ४ बार

गोदन्ती भस्म १ ग्राम
प्रवालिपिटी १ ग्राम
लीलाविलास रस १ ग्राम
पुनर्नवामण्डूर १ ग्राम

योग-४ मात्रा

पुनर्नवा-स्वरस और मधु से । बाद मे २५ मि० ली० गोमूत्र पीना । २ २ वजे दिन तथा ९ वजे रात अविपत्तिकर चूर्णं ५ ग्राम

उष्णोदक से।

२ मात्रा

प्रतिषेधक उपाय

- १ मच्छरो का विनाश करने का उपाय करे तथा उनसे बचने के लिए मशहरी लगाने का अभ्यास करना चाहिए।
- २ वायुयानो मे घुसे मच्छर दूरारे देशो मे पहुँचकर रोग फैला देते हैं, अत वायुयान चलाने के पूर्व जमका पूर्णरूप से शोधन आवश्यक है।
- ३ रोगाक्रान्त स्थानो मे जाने वाले यात्रियो को इस रोग का प्रतिरोधक टीका लगवाना चाहिए।
- ४ रोग के प्रसार की आशका होने पर आवास के गली-कूचो की सफाई और मच्छर-विनाशक छिडकाव करना चाहिए।

११ का० दि०

५. मच्छरनाशक सभी समव उपायो का अवलम्बन कर इस रोग की महामारी से बचा जा सकता है।

कुष्णमेहज्बर

(Blackwater Fever)

परिचय—इस ज्वर में मूत्र का वर्ण काला हो जाता है, इसलिए इसे 'कृष्णमेह-ज्वर' कहा जाता है। इस लक्षण से सादृश्य रखने वाला एक पित्तज प्रमेह भी होता है, जिसे कालमेह कहते हैं।

निदान

इस रोग का कारण मलेरिया या विषमज्वर-नाशक निवनीन सदृश औपधो का अधिक सेवन करना बतलाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अतितीव गति से रक्ताल्पता हो जाती है।

लक्षण

यह शीत और सर्वाङ्ग कम्पन के साथ अचानक होने वाला ज्वर है। इसमें उग्र किटविदना और उदरवेदना होती है। रोगी पित्त का वमन करता है और उमका मूत्र गाढा एव रक्तवर्ण का होता है और कुछ समय बाद उसके मूत्र का वर्ण काला हो जाता है। रोगी का रक्तं चाप गिर जाता है। रोगी का रक्तं चाप गिर जाता है और वेचैनी का अनुभव करता है। यकृत और प्लीहा वढ जाते हैं। उग्र रोग होने पर मूत्राघात या मूत्राल्पता हो जाती है। ज्वर का वेग प्राय. ३-४ दिनो मे कम होने लगता है। अधिक समय तक सन्ताप बने रहने पर रोगी की मृत्यु भी सभावित होती है।

सामान्य चिकित्सा

- १ क्रण की परिचर्या व्यवस्था सुचाक रूप से सम्पादित करे।
- २ पीने के लिए अर्धशृत जल में ग्लूकोज या मिश्री मिलाकर देवे। नीवू डाल-कर ग्लूकोज का घोल पिलावे या सोडावाईकार्व मिला मिश्री या ग्लूकोज का शर्वत् पिलावे।
 - ३. शीतवीर्य, मधुर एव तिक्तरस-प्रधान औपघी का प्रयोग करना चाहिए।

ग्यवस्था-पत्र

प्रति ३ घण्टे पर ४ वार

 १ प्रवालपञ्चामृत
 ५०० मि० ग्रा०

 गोदन्ती भस्म
 १ ग्राम

 पृटपक्व विषमज्वरान्तक लीह
 ५०० मि० ग्रा०

 त्रिभुवनकीति रस
 ५७० मि० ग्रा०

 गुडूचीसत्त्व
 २ ग्राम

 मधु से ।
 योग ४ मात्रा

२ पथ्य छेने के पश्चात् २ बार लोहासव २ चम्मच अमृतारिष्ट <u>२ च</u>म्मच <u>१</u> मात्रा

समान जल से पीना।

३९ वजे ३व बजे दिन

क्षारपर्पटी २ ग्राम

२ मात्रा

शतपुष्पाकं से।

४ रात मे सोते समय अविपत्तिकर चूर्ण २ ग्राम सुखोष्ण जल से ।

मूषिकदंशज ज्वर

परिचय—यह ज्वर चूहों के काटने से होता है, अत इसे 'मूषिकदर्श ज्वर' या 'आखुदश ज्वर' कहते हैं। चूहे मासभक्षी जीव हैं, इसलिए कभी-कभी सोये व्यक्ति के किसी अग को काटकर मास एवं रक्त का आस्वादन करते हैं। इनका दश कब्टकारक होता है और काटकर रक्त निकाल देना अधिक कब्टकर होता है। दश के कुछ समय वाद ज्वर होता है। सहिता-ग्रन्थों में भी इसका वर्णन पाया जाता है। इसे दूषीविप मानना उचित है।

निदान

इस ज्वर का प्रधान हेतु स्थायरिल्लम माइनस (Spirillum minus) नामक जीवाणु है। ये जीवाणु कठिन चक्राकार और दण्डीय होते हैं। ये चलनशील (Mobile) होते हैं।

लक्षण

इस रोग के ४ रूप पाये जाते हैं---

- १ सार्वदैहिक लक्षणवाला ज्वर।
- २ स्थानिक लक्षणवाला ज्वर।
- ३ अधिक शूलयुक्त ज्वर।
- ४ अधिक वातज लक्षणवाला ज्वर।

इस रोग का सचयकाल ५ से ४० दिन का तथा औसत १० दिन का होता है। चूहे के काटने के दसनें दिन या और वाद हुल्लास और शिर शूल के साथ ज्वर का

[े] नीर्णे विषव्नीषधिभिर्द्धं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा । स्वभावतो वा ग्रणविप्रद्दीनं विष हि दूर्वाविषतामुपैति ॥ सु० क्रल्प० अ० २

आरम्भ होता है। दश का स्थान फूल जाता है, स्थानिक लमीकाग्रन्थियाँ सूत्र जाती हैं। हाथ-पैर में भी सूजन हो जाती है। जबर १००० से १०२० फा० तक जाता है जो तीसरे दिन १०४० फा० तक हो जाता है। जबर २-३ दिन के बाद उत्तर जाता है। कुछ दिन रोगी को ज्वर नहीं आता, परन्तु वृक्कपाक, सन्धिशूल तथा अग-विशेष में सज्ञानाश हो सकता है। जबर पुन चढता है, किन्तु उसका वेग अधिक तीव्र नहीं होता। इस प्रकार जबर बार-बार आता है।

प्रकार-भेद से लक्षण

दूषीविष चूहे के काटने का लक्षण

दूषीविषवाले चूहे जिस स्थान पर काटते हैं, उस स्थान से पाण्डुवर्ण का रक्त निकलता है। उस स्थान पर चकत्ते हो जाते हैं। रोगी ज्वर, अविच, रोमाञ्च और दाह से पीडित होता है।

प्राणहर चूहे के दश का लक्षण

यदि चूहे के काटने पर मूर्च्छा, अगो मे शोथ, शरीर मे विवर्णता, दश स्थान मे क्लेद, बहरापन, ज्वर, शिर मे भारीपन, लालास्राव और वमन होता हो, तो असाध्य समझना चाहिए।

चूहो के गुक्र के ससर्ग से अत्युग्न लक्षण होते, जैसे—ग्रन्थि, शोथ, तन्तुशोध, भ्रम, शीतज्वर, अतिवेदना, रुदन, कम्प, ग्रन्थिभेद, अगमदं, मूर्च्छा आदि। इस ज्वर मे रक्तविषमयता (Septicaemia) के लक्षण वहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। 2

चिकित्शा-सूत्र

१. सामान्यत ज्वरोपचार करना श्रेयस्कर होता है। दश-स्थान का व्रणवत् उपचार करना चाहिए। मल-शोधनार्थं तथा आम-पाचनार्थं औषधो का प्रयोग करना चाहिए।

दाह, विस्नावण और प्रलेप

२. अग्निसतप्त घृत से दशस्थान को दग्ध करे, फिर पाछकर दश में से रक्त निकाले, फिर दशस्थान पर शिरीप, हलदी, कुष्ठ, केशर और गुरुच को बारीक पीसकर लेप करे।

१. आदशाच्छोणित पाण्डु मण्टलानि ज्वरोऽरुचि । लोमहर्पेश्च दाहश्चाप्यातुरपोविपादिते ॥ च० चि० २३

२ ज्रुक्त प्रति यत्रैपा ज्ञुकदिग्ये. स्पृश्नित वा।
यदस्रमङ्गरनास्रे दृषिते पाण्डुता गते॥
ग्रन्थय श्वयमु कोथो मण्टलानि श्रमोऽक्नि ।
ज्ञातन्वरोऽतिकक् मादो वेपयु पर्यमेदनम्॥
रोमहर्ष स्रुतिमून्द्रां दीर्घकालानुबन्धनम्।

३ दग्ध्वा विस्नावयेद दंश प्रच्छन्न च प्रलेपयेत । सु ० क० ७।३३

३ वमन—(क) कडवी तरोई, शिरीष और अकोठ, इनके क्वाथ से वमन करावे।

(ख) अथवा शिरीष, कडवी तरोई, मदनफल और देवदाली का फल, इन्हें पीसकर दही मिलाकर, पिलाकर वमन करावे। अथवा---

(ग) मदनफल, बच, देवदाली और कूठ, इन्हे गोमूत्र मे पीसकर दही के साथ पिलाकर वमन करावे।

४ विरेचन—निशोथचूर्णं, शुद्ध जयपाल वीज और त्रिफलाचूर्णं क्रमश २ ग्राम तथा १ रत्ती ५ ग्राम मिलाकर प्रयोग करने से विरेचन हो जाता है।

५ नस्य-शिरीषवीज चूर्ण का नस्य मे प्रयोग करना चाहिए।

संशमन योग

- (१) अजन —सोठ-मरिच-पीपर समभाग लेकर गोवर के रस मे घिसकर अजन करना चाहिए।
 - (२) कैथ का स्वरस मधु के साथ पान करे।
 - (३) रसौंत, हलदी, इन्द्रजी और कुटकी का चूर्ण २-२ ग्राम ३ बार मधु से।
 - (४) प्रात काल अतीस का चूर्ण १–२ ग्राम मधु से ।

विशेष उपचार

१ चूहे का विष प्राय मेघो से आकाश के घिर जाने पर कुपित होता है, अत उस समय वमन, विरेचन, नस्य तथा अन्य विषघ्न उपचार करे।

२ न भरनेवाले व्रणो की कर्णिका को चीरकर तथा दोप के अनुसार एव व्रण की अवस्थानुमार चिकित्सा करे। र

व्यवस्थापत्र

१ प्रात -साय

दालचीनी चूर्ण रेग्राम सोठ का चूर्ण रेग्राम गरम जल से।

त्वच च नागर चैव समाश श्रुक्ष्णपेषितम् । पेयमुष्णाम्बुना सर्वमूषिकाणा विषापहम् ॥ च० चि० २३।२०४ २ ४-४ घण्टे पर ३ बार

वाखुविषान्तक रस ३०० मि० ग्रा०

१ मूपिकाणा विष प्राय कुप्यत्यक्रेष्वनिर्दृतम् । तत्राप्येप विधि कार्यो यक्ष दूषीविषापदः ॥ सु० क० ७।४१

२ स्थिराणा रुजना चापि व्रणानां कार्णिका भिषक् । पाटियत्वा यथादोष व्रणवच्चापि शोधयेत् ॥ सु० क० ७।४२

प्रवालिपष्टी ५०० मि० ग्रा० गुडूची सत्त्व १ ग्राम योग ३ मात्रा

३. भोजनोत्तर २ बार
अमृतारिष्ट २५ मि० ली०
प मात्रा
समान जल मिलाकर पीना ।

४ महागद का अथवा अजित अगद का अथवा ताक्ष्यं अगद का अथवा सजीवन अगद का पान, नस्य, अभ्यग, अञ्जन मे प्रयोग करना चाहिए। ५. दशस्थल पर दशाङ्क लेप लगावे।

दशाङ्ग लेप—सिरस की छाल, मुलहठी, तगर, लालचन्दन, छोटी इलायची, जटामासी, हलदी, दारुहलदी, कूठ, नेत्रबाला और खस समभाग के चूर्ण को गोष्टत में मिलाकर लेप करना चाहिए।

कर्णमूलिक ज्वर या पाषाणगर्दभ

(Mumps)

पर्याय और परिचय

यह महामारी के रूप मे फैलनेवाला तीव्र सक्रामक ज्वर है । इसे कर्णमूलिक ज्वर, पाषाणगर्दभ, गलसूजा, कनफेर, मम्प्स तथा पेरोटाइटिस कहते हैं ।

इस रोग में कर्ण की अग्रवर्ती लालाग्रन्थियो (Parotid gland) में शोथ हो जाता है। पापाण (पत्थर) की तरह कठोर होने के कारण इसे पापाणगर्दभ कहा जाता है। सुश्रताचार्य ने कहा है—'कफ-वायु के प्रकीप से हनुसन्धि प्रदेश में उत्पन्न अल्पपीडावाले स्थिर (कठिन) शोथ को पाषाणगर्दभ जानना चाहिए।'

यह रोग मुख्यरूप से बालको या २० वर्ष तक की आयुवाले युवा व्यक्तियों को होता है। इसमें अद्योहन्वी (Sub-maxillary) तथा अद्योजिह्वी (Sub-lingual) प्रन्थियों में भी कभी-कभी शोथ आदि का होना पाया जाता है।

तिबृद्धिशल्ये मधुकं हरिद्रे रक्ता नरेन्द्रो लवणश्च वर्गं ।
 कद्विवर्तं चेव सुचूर्णितानि शृङ्गे निद्ध्यान्मधुसंयुतानि ।।
 एयोऽगदो हन्ति विषं प्रयुक्त पानाजनाम्यअननस्ययोगे ।
 अवार्यवीर्यो विषवेगहन्ता महागदो नाम महाप्रमावः ।। सु० क० ५।६१-६१

२. इनुसन्धौ समुद्रभृतं शोफमल्परुजं स्थिरम् । पाषाणगर्दम विधाद् वलामपवनात्मकम् ॥ सु० नि० १३।१३

निदान

आयुर्वेदीय दृष्टि से इसका कारण कफ और वायु का प्रकोप है। आधुनिक विज्ञान इसका कारण विषाणु (Virus) मानता है। ये विषाणु सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से नहीं दिखलाई पहते। ग्रन्थियों में कोथ के पहले या रोग अच्छा हो जाने के बाद इक्कीस दिनों तक इसके रोगी रोग फैला सकते हैं।

संक्रमण

यह रोगी द्वारा या किसी वाहक द्वारा मनुष्यों में फैलता है। रोगी के दूषित क्ष्माल आदि से भी फैलता है। रोगोत्पादक विषाणु रोगी के लालास्नाव में होता है, जो खाँसते-छीकते लालकणों के साथ उडकर निकट के व्यक्तियों पर आक्रमण करता है। विषाणु का प्रसार मारक के रूप में प्राय शीत एवं वसन्त ऋतु (माघ-फाल्गुन, चैत्र-वैशाख) में बिन्दूरक्षेपों द्वारा होता है।

सम्प्राप्ति

यह रोगजनक विषाणु उपसर्ग के २ से ३ मसाह वाद तक लसीकाग्रन्थियों की प्रणालियों द्वारा लालाग्रन्थियों (Salivary glands) में पहुँचकर शोथ उत्पन्न करता है। शोथ प्राय कर्णमूलस्थित लालाग्रन्थियों में होता है। किसी-किसी रोगी में जिह्वा के अधोभाग और अधोहनु की ग्रन्थियों में शोथ होता है। शोथ प्राय पहले एक कान के पास होता है और १-२ दिन में दूसरे कान पर भी हो जाता है। यह बात-कफज विकार है।

लक्षण

प्रथमत कर्णमूलिक शोथ, तीव्र ज्वर तथा सर्वाङ्ग वेदना के साथ रोग का अक्रमण होता है। शोथ, ज्वर, अङ्गमदं आदि लक्षण दूसरे-तीसरे दिन बढते जाते हैं। तीमरे दिन के बाद प्राय एक पार्वं की आक्रान्त प्रन्थि का शोथ कम होने लगता है, किन्तु दूमरे पार्वं की ग्रन्थि का शोथ प्रारम्भ हो जाता है। दी-तीन दिन मे ज्वर जतर जाता है। कदाचित् ज्वर नहीं भी होता है। शोथ के कारण मुँह को हिलान- दुलाना तथा खाना-पीना कठिन हो जाता है। ये शोथयुक्त ग्रन्थियों कभी-कभी पक भी जाती हैं। न पकने पर पांच-छह दिन मे शोथ दूर हो जाता है।

१ (क) ण्कत कर्णमूलेऽथानुपदञ्चान्यत पुन ।
शोथ सरुग्डनरो यत्र स शेय कर्णमूलिक ॥
पद्मपेस्तु दिनैस्तत्र रुजाशोफौ प्रणश्यत ।
स्याताञ्च कोषयो प्रायो दशाद्याच्च सुखम्मनेत् ॥
स प्रायो जानपदिको वातश्लेम्मकृतो ज्यर ।
यालानामथ यूनाञ्च विशेषेण प्रवर्तते ॥

⁽ख) वातरलेष्मसमुद्भूत्रृश्वययुद्तंतुसन्धिज । स्थिरो मन्दरुज स्निग्धो ग्रेय पाषाणगर्दंभ ॥

उपद्रव

प्राय ज्वराक्रमण के सात दिन बाद वृपणकोथ तथा स्त्रियों के गर्भाशय के पास रहनेवाले दोनों बीजकोषों (Ovaries) पर या कभी स्तनों पर और भगनासा (Clitoris) में कोथ हो जाता है। बीजकोषों में शोथ होने से वक्षण में बहुत वेदना होती है। किसी-किसी को बाधियं या अग्न्याशयशोथ (Pancreatitis), मस्तिष्का-वरणशोथ (Meningo-encephalitis) आदि तथा अदित आदि होने की सभावना रहती है। इन उपद्रवों के कारण नपुसकता, वन्ध्यता, मधुमेह, वाधियं, अगधात आदि विकार भी कदाचित् हो जाते हैं।

चिकित्सा-सूत्र

- १ रोगी को वायु-प्रवेश योग्य वडे कमरे में स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए।
 १० दिन तक पूर्ण विश्राम करावे।
- २ रोगी को स्वतन्त्र कमरे में रखे, जहाँ जनागम न हो। रोग के प्रमार-निरोध के लिए रोगी का प्रथक्करण आवश्यक है।
- ३. रुग्ण के दन्तवेष्ट, मुख, जिह्वा, गला, नासिका खादि अगो की स्वच्छता .सावधानी से होनी चाहिए।
- ४ प्रारम्भ मे प्राय तीन दिन तक रोगी को उपवास कराना चाहिए। आवश्यक समझें तो पेय पदार्थ दें।
- ५. यव की पेया (वार्ली) लाजमण्ड, दूध, फलो का रस, साबूदाना, दिलया आदि हलके तथा सुपच आहार दे।
- ६ कुनकुने जल में तौलिया भिगोकर प्रतिदिन शरीर पोछ लिया करे। है लीटर कुनकुने जल मे १ चम्मच सोडाबाईकार्व मिलाकर कुल्ला कराना चाहिए।
 - ७ मुखशोधनार्थं 'दशनस्स्कार चूणं' का प्रयोग उत्तम है।

स्थानिक उपचार

- १ शोथ को दिन में ३ बार सेंकना चाहिए। सेंकने के लिए भुने बालू की पोटली या नमक चूर्ण की पोटली का प्रयोग करना चाहिए।
- २. धतूरे की पत्ती से या एरण्डपत्र से सेंककर ऊपर से ऊनी मफलर लपेट देना चाहिए।
- ३ रबर की थैली मे गरम पानी भरकर सेंकना भी उत्तम है। गरम पानी में छोटा तौलिया भिगोकर गारकर उससे सेंकना चाहिए।
- ४. जो रोगी पित्तप्रकृति के हो उनके शोथ पर रवर की पैली मे या मोटे कपडे मे लपेटा हुआ बरफ का दुकडा रखना चाहिए। इससे शोथस्थान मे हुई रक्त की अधिकता घट जाती है और वेदना आदि लक्षण घट जाते हैं।
 - ५. उपनाह स्वेद (Poultice)-

सन के बीज
मेथी के बीज
मंगरैल
रास्ना
देवदार बुरादा
कूठ
सरसो
दारुहलदी
हलदी

इन सबको समभाग मे लेकर पीसकर गरम कर सुखोष्ण प्रलेप करना चाहिए।

६ वत्सनाभ, सोठ मृगप्र्य और कुचला को धतूरे के पत्ते के रस मे घिमकर २ रत्ती बफीम मिलाकर गरम कर लेप करना च।हिए।

लाक्षणिक चिकित्सा

१ वायु के अनुलोमन तथा कफ के पाचनार्थ

४ बार ३-३ घण्टे पर

वेताल रम त्रिभुवनकीर्ति ४०० मि० ग्रा० ५०० मि० ग्रा०

शुद्ध टकण

१ ग्राम

४ मात्रा

बाद्रंक-स्वरस तथा मधु से।

२ अंगमर्द तथा ज्वर-शमनार्थ

३-३ घण्टे पर ४ वार

हिंगुलेश्वर

३०० मि० ग्रा०

स्वर्ची

३०० मि० ग्रा०

योग--४ मात्रा

सुखोष्ण जल से।

३ घोषनाशनार्य

आर्चा का लेप

या

दशाङ्ग लेप का सुखोष्ण करके लेप।

४ मुखशोधनार्थ

दशन-संस्कार चूर्ण का गण्डूप धारण करे।

५. मुखशोप मे

कपूर, कत्था सफेद, छोटी लाइची और मिश्री का उचित मात्रा में चूर्ण लेकर मनसन मिलाकर जब-तब चाटने के लिए प्रयोग करे।

६. पूयसचार मे

पकने की स्थिति में उपनाह स्वेद से द्रण को पकाकर उसका पाटन कर, व्रणवत् शोधन, प्रक्षालन तथा रोपण आदि करे।

प्रतिषेध

 रोगाक्रान्त व्यक्ति के सम्पर्क से बचाव करे। रोगी के जलपात्र, भोजनपात्र तथा वस्त्रादि का प्रयोग न करे।

२ रोग-प्रसार के समय प्रतिदिन तुलसीपत्र, कालीमरिच और आदी की चाय का प्रयोग करना चाहिए।

पध्य

तरल द्रव पथ्य दे। पेया, विलेपी, लाजमण्ड आदि देवे। रोगमुक्ति के वाद् वलकारक सुपाच्य तथा पौष्टिक आहार दे। एक सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करावे। स्नान, धूप मे जाना, परिश्रम और स्त्री-सरपर्कं से तव तक बचे, जब तक शरीर मे पूर्ण वल न आ जाय।

मसूरिका (Smallpox)

पर्याय और परिचय

मसूरिका ज्वर, वसन्त, चेचक, शीतला माता, वैरिओला (Variola) और स्मालपाक्स इसके पर्याय हैं।

यह सक्रामक रोग है। इसमे मसूर के आकार की पिडकाये निकलती हैं। ज्वर होने के तीसरे दिन पिडकायें निकलती हैं।

इस रोग का वर्णन सुश्रुतसिहता में 'क्षुद्ररोगो' में और चरकसिहता में 'श्रयणु-चिकित्सा' के अन्तर्गत किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में यह रोग आजकल की तरह भयानक नहीं माना जाता था। यह रोग विशेषकर वसन्त और ग्रीष्म ऋतु में होता है। यह रोग किसी भी अवस्था में हो सकता है, किन्तु विशेषत वाल्यावस्था में स्त्री-पुरुष सभी को हो सकता है।

जिस रोग मे मसूर के समान घन पिडकायें निकलकर समस्त शरीर मे फैल जाती हैं, जिनका पाक होता है और थोड़े दिनों में शमन हो जाता है एव जिस व्याधि में उक्त लक्षण के साथ अन्य उपद्रव और दारुण होते हैं, उसको बड़ी मसूरिका या शीतला कहते हैं। 3

१ दाइन्वररुजावन्तरतामा स्फोटा सपीतका । , गात्रेपु वदने चान्तविश्वेयास्ता मस्ररिका ॥ स्० नि० १३।३७

२ या सर्वगात्रेषु मस्रमात्रा मस्रिका पित्तकफाद प्रदिष्टा । वीसर्पशान्ये विहिता क्रिया या ता तेषु कुष्ठे च हितां विदध्याद ॥ च० चि० १२।९३

३ मस्राकारियङका सान्द्रा गात्रेषु सर्वेत । भवन्ति पाक गच्छन्ति लीयन्ते च द्रुत यत ॥

यह रोग प्राय जीवन मे एक वार होता है। मसूरिका रोग होने के पश्चात् इसका विष या कीटाणु रोगी के घर मे अनेक दिनो तक रह जाता है और वह दूसरो पर आक्रमण करता है। पहले पिडकार्ये लालवर्ण की होती हैं और तरलमय होकर पक जाती है।

निदान

कटु, अम्ल, नमकीन और क्षारयुक्त पदार्थों का अतिसेवन, विरुद्ध पदार्थों (दूध-मछली, दूध-खटाई आदि) का सेवन, भोजन पर भोजन, वात आदि को प्रकृपित करनेवाले सेम, मटर, आलू आदि का अधिक प्रयोग, दुष्ट वायु अथवा दुष्ट जल का सेवन आदि, दोप-प्रकोपक कारणों से कृपित दोप रक्त के साथ मिलकर ममूरिका रोग की उत्पत्ति करते हैं। इस रोग में मसूर जैसी आकृतिवाली पिडकाओं के निकलने से इसे मसूरिका कहा जाता है।

संक्रमण

पृथ्वी, जल और वायु के दूषित होने में होनेवाला यह रोग दूसरे सक्रामक रोगों की तरह देश में सर्वंत्र फैल जाता है। श्वासोच्छ्वास और वस्त्रादि के स्पर्श से दूसरों को हो जाता है। यह कीटाणुजन्य रोग माना जाता है, किन्तु इसके कीटाणु सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र से अदृश्य हैं। यह रोग वसन्त और ग्रीष्म ऋतु में फैलता है। मसूरिका का उपसर्ग श्वासपथ से शरीर में प्रवेश करता है। वाहक या रोगी के खाँसने या छीकने पर विन्दूत्सेपा द्वारा नासिका में इसका ग्रहण हो जाता है, वहाँ से वह सम्पूर्ण शरीर में पहुँच जाता है। इसके विष के रक्त में पहुँचते ही ज्वर आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं।

संप्राप्ति^२

मसूरिका का जीवाणु रक्त मे गमन करता हुआ उपेचमें मे आकर रुक जाता है। जिस स्थान पर वह ठहरना है, उस स्थान पर उपचर्म की कोशायें रक्तमय और

नानीपद्रसंयुक्तो ज्वरो यत्र सुदारुण । यहन्मसरिका नाम शीतला चेति मा स्मृता ॥ सि० नि० प्र० ख०

१ कट्वम्ललवणक्षारिवरद्धाध्यशनाशने ।
दुष्टनिष्पावशाकाणे प्रदुष्टपवनोदके ।।
क्रार्य्यदेशणाचापि देशे दीपा समुद्धता ।
जनयन्ति शरीरेऽस्मिन् दुष्टरक्तेनं सप्तता ॥
मस्राकृतिमस्यानाः पिढकास्ता मस्रिका । भावप्र०

२ वाय्वादिदोपादथवाऽन्यगेगिस्पर्शादयेनत् पिटकात्वचो या। नासागलाचे प्रविद्याद् विपं तद् दोपान्शेपान् विकरोति सद्य ॥ ततो ज्वर स्यादतिघोरलिङ्गो दोपा विप तच्च विद्य क्षिपन्ति। गात्रेपु जाता पिडकास्ततम्ता पक्वा क्षयं यान्ति विपक्षयेण॥ तारतम्येन दोपस्य वा वलावलात्। पृथग्वाऽत्यन्नसान्ता वा सवन्ति ता ॥

, शोथयुक्त हो जाती हैं। त्वचा पर स्पर्श करने से त्वचा के 'अधोभाग मे मसूर के आकार की छोटी-छोटी यन्थियाँ प्रतीत होती हैं, फिर इनमे द्रव भर जाता है। कुछ समय बाद यह द्रव पूयमय हो जाता है और पिडकाये वडी हो जाती हैं। पिडकाबो के फूटने पर पूय जमकर पपडी के रूप मे पिडका के ऊपर कई दिनो तक स्थित रहती है। पपडी निकल जाने पर क्षत के चिह्न प्रतीत होते हैं। सचयकाल १२-१३ दिन होता है। दोषप्रकोप की न्यूनाधिकता और कीटाणु विष के प्रभाव या बलावल के अनुमार पिडकायें दूर या समीप, एव रक्त से परिपूर्ण निकलती हैं।

प्रकार—इस रोग के तीन प्रकार हैं—१ वृहद् मसूरिका, २. लघु मसूरिका और 3 रोमान्तिका। इनका वर्णन क्रमश. किया जायेगा।

लक्षण र

इम रोग मे शीत, कम्प और शिर शूल के साथ ज्वर चढता है और बढता है। किट और पीठ मे अतिशय वेदना होती है। मोह, प्रलाप, निद्रानाश, मलावरोध, वमन आदि उपद्रवो के होने पर कदाचित् रोगी की जीवन-लीला समाप्त हो जाती है।

प्राय तीसरे दिन ज्वर कम हो जाता है और कठोर पिडकार्ये त्वचा के नीचे स्पष्ट देखने मे आ जाती हैं। मस्तिष्क, ललाट और मणिवन्घ पर उत्पन्न होकर क्रमश मुख पर, गले मे और देह मे हो जाती हैं तथा अन्त मे पैरो पर उतरती हैं। छठे दिन पिडकार्यें जल से भर जाती हैं। आठवें दिन पूय हो जाता है और फिर विप कम होने पर ताप तथा अन्य उपद्रव शनै शनै कम हो जाते हैं। प्राय वारहवें दिन पिडकार्यें सूख जाती हैं।

प्राय दो समाहं मे पिडकार्ये नष्ट हो जाती है और तीसरे समाह रोगी स्वस्थ हो जाता है। अतिप्रकोप होने पर जीवन भर त्वचा पर चिह्न वने रह जाते हैं। इस रोग मे प्राय मलावरोध रहता है। जिह्ना शुष्क और मैली रहती है। नाडी तीन्न और स्थूल चलती है। दूसरे-तीसरे दिन तापमान १०३°-१०४° फा० तक हो जाता है। पिडकानिगमन के बाद ताप १००°-१०१° फा० तक चला जाता है। पुन पूय बनने के समय सातवें दिन से ताप पूर्ववत् बढ जाता है। पूय सूखने पर ताप धीरे-धीरे कम हो जाता है।

मसूरिका के प्रकार

| अस युक्त साधातिक सामान्य

पिडका पिडका पिडका पिडका

अर्थमयुक्त दलबद्ध मोम्य

पिडका पिडका मसूरिका

१ सि० नि० प्र० ए०

१ असयुक्त पिडका (Discrete)—इसमे पिडकार्ये विरल और अलग-अलग होती हैं। इसमे ज्वर मृदु होता है। एक सप्ताह बीतते-वीतते पूय बनकर दूसरे सप्ताहान्त तक पूय भर जाता है और तीसरे सप्ताह मे खुरण्ट आ जाता है।

२ सयुक्त विडका (Confluent)—इसमे विडकार्ये एक-दूसरे से सयुक्त रहती हैं। विडकार्ये बहुत अधिक और घन निकलती हैं। कटिशूल, लालाग्रिन्थशोथ, नेत्रच्छद, तथा ओष्ठशोथ, नाडी क्षीण और तीव्र, प्रलाप तथा मस्तिष्क विकार हो जाता है। इसमे आठवें से तेरहवें दिन के मध्य रोग उग्र होने से रोगी की प्राय मृत्यु हो जाती है।

३ अर्घसपुक्त (Semiconfluent)—इसमे छिटपुट स्थान-स्थान पर पिडकार्ये सपुक्त मिलती हैं और लक्षण भी अति उग्र नहीं होते । अत इससे मृत्यु कम होती है ।

४ दलबद्ध या गुच्छाकार (Corymbose)—इसमे पिडकार्ये दलबद्ध गुच्छाकार एक-एक दल मे अनेक स्थानो पर च्याप्त रहती है। यह अधिक घातक नहीं होता।

५ सौम्य मसूरिका (Modified)—इसमे रोग का आक्रमण क्रमिक होता है। लक्षण कमश वढते हैं। रोग की द्वितीयावस्था मे पिडकार्ये नियमित निकलती है और उनमे शीघ्र ही पूय पडकर फिर खुरण्ट आ जाता है। यह सौम्य प्रकार है और रोगी बच्छा हो जाता है।

६ साघातिक (Malignant)—इममे सभी लक्षण वहें ही जग्र होते हैं। पिड-काओं के निकलने समय आक्षेप और वेहोशी होने लगती है। पिडकाओं का रग काला पड जाता है। मुख, गुदा या मूत्रेन्द्रिय से रक्त आने लगता है अथवा मसूरिका में से या क्लेड्मत्वचा से रक्तस्राव होने लगता है। इसको रक्तस्रावी मसूरिका या हीमोरेजिक (Haemorrragic) भी कहते हैं। इसमे प्राय हृदयावरोध होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है।

७ सामान्य (Benign)—इसे शीतला कहते हैं। इसमें सभी लक्षण मृदु होते हैं तथा सम्पूर्ण अगो में पिडकाये निकलती हैं और पूर्य उत्पन्न होने के पूर्व ही वे सूख जाती हैं।

उपद्रव

इम रोग मे नेत्रगोलक-(-Cornea-)—की श्लेष्मल त्वचा मे दाह, शोथ और वण, नेत्रशुक्र, कर्णदाह, अन्धत्व, फुप्फुस-दाह, कास, वृषण-दाह, वृक्क-दाह, रक्तस्नाव, विसर्प, सन्धिस्थानो मे शोथ, वण, विद्रधि और इन्द्रलूम आदि उपद्रव होते है।

१ घोरे विषामिषङ्गे तु दोपकोषात् सुदारुणात् ।

पिटका श्रांतसान्द्रा स्यु घोरश्चोपद्रवेर्ज्यर ॥

अष्टाहात् परतस्तेन प्रायश्च स विषद्यते ।

कुप्यन्ते क्वापि पिडका ह्या तत्राप्यसाध्यता ॥

शोणितेऽतिप्रदुष्टे तु रक्तिपत्त प्रवर्तते ।

रक्तपूर्णाश्च पिटका प्राणास्तृत्रापि दुर्लभा ॥ सि० नि० प्र० ख०

वृहन्ममूरिका मे उपद्रवो के हो जाने पर अधिकतर रोगियो की मृत्यु हो जाती है, विशेषकर बच्चो की।

गोमसूरिका तथा वैक्सीनिया

मसूरिका के त्रिप को गाय के न्तनों में प्रतिष्ट कर वहाँ मसूरिका उत्पन्न कर, पुन वहाँ से तरल निकालकर टीका तैयार किया जाता है। मनुष्य के शरीर में टीका द्वारा मयूरिका विप प्रविष्ट करने पर टीका के स्थान पर पित्रका निकल आती है और सब अगो में मसूरिका के मृदु लक्षण उत्पन्न होने हैं। इससे अर्थात् चेचक का टीका लगवाने से बृहन्मसूरिका के आक्रमण की समाजना क्षीण हो जाती है।

वैक्सीन की उत्पत्ति

वृहन्ममृरिका की पूययुक्त पिडका से जीवाणु लेकर गो, भैम, गदहा आदि पशुओं को टीका लगाकर गोमसूरिका उत्पन्न की जाती है। जब उनमें तरलयुक्त पिडकायें निकल आती हैं, तब उनको पुरचकर जीवाणुओं में युक्त लसीका (तरल पदार्थ) एक शुद्ध पात्र में एकप कर लेते हैं, फिर इसको पूयजनक अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित करके कार्बोलिक फ्लिसरीन में मिश्रित करते हैं और छोटी-छोटी जीशियों में भर लेते हैं।

चिकित्सा-सूत्र

- १ रोगी को स्वच्छ, हवादार एव प्रकाशयुक्त स्थान मे रखना चाहिए। खिडिकयो पर हलके रंग का पर्दी डालना चाहिए, ताकि अधि ह प्रकाश न हो।
- २ रोगी के विद्याने-ओढने और पहनने के वस्त्रों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। कपडे गरम पानी में धोकर धूप में सुखावे।
 - ३. शय्या या विस्तर मृद्रुल और मुखद हो और ओढना भारी न हो।
- ४. कमरे को २ बार घोना चाहिए और मच्छरो में वचने के लिए मच्छरदानी लगानी चाहिए। कमरे को डी॰ डी॰ टी, डेटाल या फिनायल से घोना चाहिए।
- ५ वायु की शुद्धि के लिए गूगल, निम्बपत्र, लोहवान, जटामासी और देवदारु आदि जलाना चाहिए। विस्तरे पर, ख्टियो पर और दरवाजो पर नीम की टहनी टैंगी होनी चाहिए। शय्या के सिरहाने ताजे सुगन्धित फूल रखने चाहिए।
- ६ आँख, नाक, मुख एव त्वचा की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेत्र मे गुलावजल मे फिटकरी डालकर निर्मित द्वव की कुछ बूँदे प्रात -साय डालनी चाहिए।
- ७ नामिका को स्निग्ध रखने के लिए उसमे कपूर मिलाया हुआ मक्खन लगाना चाहिए। मुख-शोधनार्थ पोटाश का घोल प्रयोग करना चाहिए।
- ८ रोगी के शरीर को गुनगुने १ सेर जल में २ ड्राम (१५-२० बूँद) कार्बी-लिक एसिड डालकर अथवा नीम की पत्ती डालकर उवाले जल से पोछ लेना चाहिए। पानी को ठीक से सुखाने के वाद बोरिकयुक्त डिस्टिंग पाउंडर समस्त शरीर पर छिडककर रोगी को लिटा देना चाहिए।

९ पूर्योत्पत्ति के बाद पूरा शरीर पोछना सभव न होने पर रूई को डेटाल या कार्बोलिक घोल में दुबोकर विस्फोटो को पोछना चाहिए।

१० यदि रोगी के वाल लम्बे हो, तो छोटे करवा देना चाहिए। छोटे बाल होने पर सफाई करने मे सुविधा होती है। नाखूनो को छोटा करवा देना चाहिए और उनकी सफाई पर भी ध्यान रखना चाहिए।

११ खुजली की शान्ति के लिए सोडावाईकार्व को पानी मे घोलकर उससे शरीर पोछने से लाभ होना है।

१२ पूर्योत्पत्ति के फलस्वरूप दुर्गन्ध उत्पन्न होती है, उसके शमन के लिए शतधौत घृत मे दशाङ्ग लेप मिलाकर लेप करना चाहिए।

१३ चेहरे पर लगाने के लिए कार्बोलिक एसिड का ग्लिसरीन मे बनाया हुआ २% घोल प्रयोग किया जाता है।

१४. रोगी को शय्या पर ही मलमूत्र कराना चाहिए और इनकी सावधानी से सफाई करनी चाहिए। मल-मूत्रादि मे पर्याप्त मात्रा मे विषाणु होते हैं, अत इनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

१५ आक्रान्त रोगी को सक्रामक रोग चिकित्सालय मे प्रविष्ट कराना उत्तम है।
१६ रोग-प्रतिपेधार्थ सम्पर्के मे रहनेवाले परिचारक आदि को रद्राक्ष की माला
का धारण, इमली के बीज और हलदी उचित मात्रा मे पीना और वाक मे बैंगन का
भूती खाना लाभकर है।

औषध-स्यवस्था

९ रुद्राक्ष 🗦 ग्राम काली मिर्च 🗦 ग्राम ९ मात्रा

पीसकर १ कप जल मे घोलकर १ सप्ताह तक प्रतिदिन एक बार पीना । इससे पिडकाओ की उग्रता शीझ शान्त होती है ।

२ अनन्तमूलचूणं ५ ग्राम

१ मात्रा

चावल के धोवन से प्रतिदिन १ वार एक सप्ताह पर्यन्त ।

३ पटोलादि क्वाथ---

पटोलपत्र गुडूची नागरमोथा अरुस चिरायता नीम की छाल कूटकी पित्तपापडा

सव समभाग लेकर भूसा की तरह क्रूटकर रख ले। २० ग्राम दवा आधा लीटर जल मे चतुर्थाशाविकट क्वाय कर योडा-योडा करके चीनी मिलाकर पीना।

इमसे उपद्रवो का शमन तथा पूय का शीघ्र गोधन होता है।

अथवा ---

४ गुडूच्यादि क्वाथ का पान करावे।

1

योग-गृहच, गुलहठी, मुनवका तथा गन्ने की जड समभाग लेकर पूर्ववत बवाय वनाकर चीनी हालकर घोटा-योडा पीना।

इससे पूय की मात्रा कम हो जाती है और खुरण्ट शीझ आ जाते हैं।

न्यवस्था-पत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४ वार

प्रपालपश्चामृत ५०० मि० ग्रा०

त्रिभुवनकीति ५०० मि० ग्रा०

मुक्तापिप्टी

५०० मि० ग्रा०

योग---४ मात्रा

मधु से । बाद में पटोल।दि क्वाय पीना ।

२. प्रात -साय

पश्वतिक्तपृत २० ग्राम

२ मात्रा

गोद्ग्ध और चीनी के साथ।

३ निम्ब-पत्र जल से

अवयेचन तथा प्रशालन ।

४ दाह-शमनार्थं

शतधौत घृत मे दगाञ्जलेप मिलाकर लगाना।

५ रात में सोते नमय

वेदनान्तक रस (रसतर द्विणी)

१५० मि० ग्रा०

१ मात्रा

गोदुग्ध से।

लाक्षणिक चिकित्सा

तापाधिक्य--१०४° से अधिक ज्वर होने पर पडगपानीय को पर्याप्त मात्रा मे पिलाना चाहिए। मुखोष्ण जल मे कपडा भिगोकर बरीर को बार-बार पोछना चाहिए। वकरी के दूध में रुई मिगोकर मस्तक पर रखना और पैर का तलवा पोछना चाहिए।

पानी मे यूडीकोलन मिलाकर शरीर पोछे। मस्तक पर वर्फ की थैली रखना चाहिए। कच्चे नारियल के जल से वार-वार शरीर पोछना दाह एव ज्वर का शामक है।

प्रलाप-

३~३ घण्टे पर ४ बार बृहद्वातचिन्तामणि २५० मि० ग्रा० चतुर्भुज ब्राह्मीवटी ५०० मि० ग्राव ५०० मि० ग्ना०

योग---४ मात्रा

मधु से।

शिरःशूल, अंगमर्व-

३-३ घण्टे पर ४ बार

गोदन्ती मिश्रण

१ ग्राम शिर शूलादि वज्ररस ५०० मि० ग्रा०

वेदनान्तक रस

५०० मि० ग्रा०

योग---४ मात्रा

मधु से।

पिडकाओं का न निकलना-

४-४ घण्टे पर ४ वार

स्वर्णमाक्षिक भस्म ५०० मि० ग्रा०

सर्वतोभद्र रस

५०० मि० ग्रा०

योग--४ मात्रा

कचनार की छाल के क्वाय से।

प्रात -साय निम्वादि क्वाथ ५० मि० ली० पीना ।

योग-नीम की छाल, पित्तपापडा, पाठा, पटोलपत्र, कूटकी, अरुस, यवा अविला, खस, क्वेतचन्दन, लालचन्दन, प्रत्येक समभाग लेकर कूटकर २० ग्राम ले आद्या लीटर जल मे चतुर्थाशावशिष्ट क्वाय बनाकर चीनी डालकर पीना।

रक्तस्राव--

३-३ घण्टे पर ४ वार

शुद्ध स्वर्णगैरिक १ ग्राम

रक्तपित्तकुलकण्डन

३ ग्राम

प्रवालिपष्टी

रे ग्राम

लाक्षा चूर्ण

१ ग्राम

दूर्वास्वरस तथा मधु से।

४ मात्रा

मसूरिकामुक्त होने के बाद बलाधानार्थं व्यवस्थापत्र

४-४ घण्टे पर तीन वार

१ स्वर्णवसन्तमालती

३७५ मि० ग्रा० ३७५ मि० ग्रा०

प्रवालभस्म गुडूचीसत्त्व

१ ग्राम

१२ का० वि०

कायचिकित्सा

सितोपलादि चूर्ण

३ ग्राम

मधु से।

योग ३ मात्रा

२.-भोजनोत्तर

,दशमूलारिष्ट

२० मि० लि० १ मात्रा

समान जल से पीना।

३. दाग दूर करने के लिए

हल्दी

विरोंजी

मसूर की दाल

मुलेठी

दारुहल्दी

सब समभाग लेकर बकरी या गाय के दूध मे पीसकर उबटन लगाना।

४. उबटन लगाने के बाद

बादाम तेल

तुवरक तेल

चन्दन तेल

गरी का तेल

समभाग मिलाकर सर्वांग मे लगाना ।

. अथवा

चमेली के पत्ते

अखरोट की छाल

सरसो तथा चिरौंजी

पानी में पीसकर मक्खन मिलाकर पूरे शरीर मे मालिश करना।

Harr

मसूरिका पित्तप्रधान व्याधि है। अत शीतल पेय, कच्चे नारियल का जल, यव की पेया, गन्ने का रस, फलो का रस, नीबू की शिकञ्जी पिलाना हितकर है। दूध फाडकर उसका पानी पिलाना चाहिए। रोग-मुक्त होने पर बल्य, सुपाच्य एव पोषक आहार देय हैं। दूध, मक्खन एव फलो का रस अग्निबल के अनुसार दे। पुराना साठी का चावल, चना, सूग, मसूर, जौ, सहिजन, परवल, मुनक्का, अनार, अगहनी का चावल, घृत, गो-दुग्ध आदि पथ्य हैं।

> लघु मसूरिका (Chicken Pox) पर्याय और परिचय

इसे छोटी माता, मोतिया और वेरीसिर्ला भी कहते हैं। स्वल्प ज्वरयुक्त, तरक भरी पिडकाओं सिंहत विशेष संज्ञानक रोग को सबु मसूरिका कहते हैं। यह बहुधा वालको की होता है। कभी कभी यह रोग जनपदन्यापी हो जाता है। इसकी मर्यादा ग्यारह से चीवीस दिन तक है।

निदान

वायु, जल तथा भूमि के दोष से या रोगी के सस्पर्श से इस रोग के कीटाणु या विप के सक्रमण से यह रोग हो जाता है।

संप्राप्ति

वायु आदि के दूषित होने से अथवा रोगी के ससर्ग से इस रोग का विष शरीर मे प्रविष्ट होकर दोपो को प्रकुपित कर देता है, जिससे वाह्य त्वचा में स्वल्प पिडकाओं का निर्गमन होता है। ज्वर का वेग हलका रहता है और थोडे ही समय (५-६ दिन) में यह रोग जान्त हो जाता है।

लक्षण^२

इसमे पहले दिन या दूसरे दिन पिडकाये निकलती है। वे थोडे समूह मे छोटे मोती के दाने जैसी रहती हैं। पहले गले मे, फिर छाती पर, फिर अन्य अवयवो मे फैल जाती हैं। लगातार तीन दिन तक पिडकायें निकलती रहती हैं। ज्वर का वेग १००° फा॰ तक होता है, किसी को १०२° फा॰ तक हो जाता है। लक्षण सामान्य होने के कारण यह रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है। चौथे दिन पिडकायें तरलमय हो जाती हैं, पाँच छह दिन मे सूख जाती हैं, उन पर खुरण्ट आ जाता है और आठवें दिन आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। पिडकाओ मे अतिकण्ड होती है।

कभी-कभी विष की अधिकता और रोगी की दुवंलता के कारण पिडकाओं में कोथ हो जाता है तथा उनमें रक्त या पूर्य भर जाता है, जिसके कारण तीन ज्वर हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोग कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है।

१ वाय्त्रादे रोगिसगाद् वा सङ्क्रान्तं तद्विपं वनौ । दोपक्रोपं विधायाल्प निरेति त्वचि सत्वरम् ॥ ततम्ता पिडका स्वल्पा ज्वर. स्वल्पश्च जायते । शीव्रमुल्लाघता चापि पिडकानां प्रशोपणात् ॥ सि० नि० प्र० स०

२ नातितोत्रो ज्वर स्वरुपिक्त शीघ्र प्रमुखति ।
प्रथमेऽद्वि दितीये वा पिडका सम्भवन्ति हि ॥
लिएला स्वरुपसङ्ख्याका क्षुद्रमौक्तित्रसित्तमा ।
अमध्यनिम्ना भित्रास्तु तोयमात्र स्ववन्ति ता ॥
पद्मपश्च दिने प्रायस्ता प्रशुप्यन्ति सर्वत ।
प्रायोऽष्टमेऽद्वि-नैकत्य लक्ष्मणाख्च द्रुत लय ॥
वर्शवद् विषम्य बाहुल्याद् दौवैल्यादाथ रोगिण ।
कोथ गच्छन्ति पिटका नानास्त्रपा भवन्ति वा ॥
रक्तेत पा प्रभूष्य्नेत्ते ज्वरो घोरश्च नायते ।
क्षिष्ठुसाम्यानसाध्यान वा प्रवार्होन्तन्त् प्रकक्षते ॥ सि० नि० प० स्व

सामान्य चिकित्सा

१. यह पित्तज विकार है, इसमे खुजली होती है। वच्चो मे इस बात का ध्यान रखे कि वे पिडकाओ को रगडे नहीं। खुजली होने पर चन्दन का तेल या नीम का तेल या कपूर मिला मक्खन लगावे।

२. ज्वरशमनार्थे लालचन्दन, अरुस, नागरमोथा, गुरुच और मुनक्का, इनका शीतकषाय पिलावे।

३ नीम की छाल, पित्तपापडा, पाठा, परवल की पत्ती, कुटकी, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, खश, आंवला, अस्स और धमासा इनका क्वाथ चीनी मिलाकर सवेरे-शाम पिलावे।

४ स्वर्णमाक्षिक भस्म २०० मि० ग्रा० काञ्चनार त्वक् चूर्ण १ ग्राम मधु के साथ ३ बार दे।

५. व्रणो पर पञ्चवल्कल त्वक् की राख का अवचूर्णन करे।

६. मसूरिका चिकित्सा मे कथित उपचार करना चाहिए।

७. रोगी को सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थान मे रखना चाहिए।

रोमान्तिका

(Measles)

पर्याय और परिचय

इसे रोमान्तिका, खसरा और मीजल्स कहते हैं। यह रोमो के मूल मे ताम्रवर्ण की सूक्ष्म पिडकाओं वाला रोग है। रोमान्त मे पिडकाओं के निकलने से इसे रोमा-न्तिका कहते हैं। इसमें पहले ज्वर होता है, फिर कास, अरुचि आदि लक्षण होते हैं। विषाणुजन्य यह रोग तीन्न सक्रामक होता है। प्रधानत यह बच्चों को होनेवाला रोग है।

निदान

इसका कारण विषाणु है। वातावरण के दूषित होने से यह रोग देशव्यापी'हो जाता है। इसका सक्रमण विन्दूत्क्षेप उपसर्ग से होता है। इसमें कफ तथा पित्तसम्बन्धी विकृतियाँ होती हैं तथा श्वासपथ और फुप्फुसो में विकार होता है।

लक्षण^२

इस रोग मे सहसा ज्वर होता है, नासाझाव होता है और छीकें आने लगती हैं। नेत्रों में लालिमा हो जाती है, खाँसी आने लगती है और पलकें भारी हो जाती हैं।

१. (क) रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्य कफिपत्तजाः। कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विका ॥ मि० नि० प्र० ख०

⁽ख) क्षुद्रप्रमाणा पिडका शरीरे सर्वाक्षमा मन्त्ररदाइतृष्णा।
कण्डूयुता सारुचि मप्रमेका रोमान्तिका पित्तकफात प्रदिष्टा॥ च० चि० १०१० २. तत्रादित प्रतिदयायो ज्वरो रागश्च नेत्रयो।
तन्द्राऽरुचि. क्लम. साँदो विङ्मेदश्चापि कुत्रचित ॥

आंखों से पानी गिरने लगता है तथा प्रकाश नहीं सहन होता है। तन्द्रा, अरुचि, ग्लानि, शिर शूल आदि लक्षण हो जाते हैं।

मसूडों के सामने मुख के भीतर वारीक लाल और कुछ उभरी हुई फुन्सियाँ हो जाती हैं। तीसरे-चौथे दिन मस्तक पर या कानों के पास, फिर पूरे शरीर में फुन्सियाँ निकलने लगती हैं। प्रारम्भ में कान के पास, दाढी और ओठ पर मच्छर काटने के समान घड़वे प्रतीत होते हैं। दो-तीन दिन में सब पिडकायें निकल जाती हैं। जबर कम हो जाता है, तत्प्रधात् पिडकाओं पर की पतली त्वचा निकल जाती हैं और घड़वे पड जाते हैं। जब तक ऊपर से त्वचा नहीं निकल जाती, तब तक रोगी रोग फैला सकता है। रोगमुक्ति के १५ दिन बाद तक बच्चों को रोगी से दूर रखना चाहिए।

इस रोग के प्रारम्भ के २-३ दिन मे तापक्रम १०१° फा॰ तक रहता है। पिडका निकलने के बाद चौथे दिन ताप बढकर १०३°-१०४° फा॰ तक हो जाता है। सातवें-आठवें दिन ताप पुन कम हो जाता है जब पिडकायें शान्त हो जाती हैं। पि से १८ दिन मे रोगी स्वस्थ हो जाता है। रोमान्तिका मे मुख के भीतर श्लैष्मिक कला मे उभड़े लाल घेरायुक्त दानो का सर्वप्रथम शोध करने वाला 'कोपलिक्स' था, अत उसके ही नाम पर इन चिह्नों को कोपलिक्स स्पॉट्स (Koplik's spots) नाम दिया गया है। इस रोग मे नाडी और श्वास की गति उष्ण की अपेक्षा तीव्र रहती है।

इस रोग के दो प्रकार हैं—१. सौम्य और २ तीव । सौम्य प्रकार उपयुंक्त लक्षणो वाला होता है। तीव प्रकार मे पिडकाओं का रग जामुन जैसा होता है। तीव प्रकार में पी दो भेद होते हैं—१ रक्तस्रावी, जिसमें त्वचा में से रक्तस्राव होता है और २ शक्तिनाशक, जिसमें जीवनीय शक्ति की अतिशय क्षीणता होती है तथा उपद्रव भी तीव होते हैं, कभी-कभी प्रलाप आदि उपद्रव भी हो जाते हैं।

शोणायनानां ताल्वादी दर्शनं लक्ष्मणां प्रवम् । अथ तुर्यात् तृतीयाद्वा दिनात्ताम्राभलक्षमणाम् ॥ स्तीकोन्नतायतानां स्थानमुखे गात्रेषु चोद्भव । दिनेश दिवसैस्तेपां भवेन्नि श्रेपनिर्गम ॥ ततो ज्वरश्च लघुता थाति नो चेद्पद्रवा । त्र्यहाल्लयश्च चिहाना तुषाभत्विग्वमोक्षणात् ॥ अथ चेद् रोगमध्ये वा रोगशेषेऽथ वा क्वचित् । तिद्देषं मासनिकिका फुप्फुसी च प्रसर्पति॥ तदा श्रासश्च कासश्च ज्वरवेगश्च वर्धते। मोहस्तन्द्रावसादश्र प्रायश्च प्राणसंशय ॥ **त्रियन्ते च ततो वाला विशेषेण सहस्रश**ा. जीवन्त्युपक्रमात् केचित् सुचिरं दुर्बलीकृता ॥ गम्भीररक्तविह्वाना रक्तिवित्तस्य चेक्षणात्। ष्टते रक्तातिसारे वा रोमान्त्यां दुरुँम सुखम् ॥ सि० नि० प्र० ख०

उपदव

श्वासप्रणालिका-प्रदाह, स्वरयन्त्र-प्रदाह, नेत्ररोग, कर्णशूल, दाह, वृक्कशोथ, पक्ष-वध एव कोथ आदि उपद्रव होते हैं। कभी प्रबल कास, श्वास और तीन्न ज्वरवेग हो जाता है। ऐसी अवस्था मे न्नाको-न्यूमोनिया के लक्षण मोह, तन्द्रा, हृदयावरोध आदि उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाती है। उपद्रवग्रस्त कोई वालक समुचित चिकित्सा से आरोग्यलाम करने पर भी दीर्घकाल तक निर्वल बना रहता है।

इस रोग मे रक्तपित्त का गम्भीर उपद्रव, रक्तष्ठीवन और रक्तातिसार हो जाना प्राणघातक होता है।

चिकित्सा-सूत्र

- रोगी को पृथक् कमरे मे रखना चाहिए, जो हवादार, स्वच्छ और सुस्रकर
 हो। शय्या मृदु और ऋतु के अनुकूल होनी चाहिए।
- २ कमरे मे प्रकाश या रोशनी कम हो और ठडी वायु नही लगती हो। ओढना-विछीना प्रतिदिन धूप में सुखाना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए।
- ३ प्रथमत रूघन कराना चाहिए। भोजन मे रुचि होने पर लाजमण्ड, यवपेया, नारिकेल जल, दूध, मुसम्मी आदि द्रव पदार्थ दे। ज्वर का शमन होने पर क्रमश सुपाच्य तथा पोषक आहार देना चाहिए।
- ४. ज्वरप्रशमनार्थं मृदु किन्तु मोटा तौलिया सुखोष्ण जल मे भिगोकर शरीर को पोछना चाहिए। उष्ण जल, उष्ण निवास और उष्ण जल-परिमार्जन करना सुखपूर्वक पिडकानिर्गमन मे सहायक होता है।
- ५ इसमे मुखपाक, नेत्राभिष्यन्द और नासा तथा कोष्ठ-शोथ होने की अधिक सभावना होती है। अत इन अगो की स्वच्छता पर घ्यान देना चाहिए।
- ६. आंको मे शुद्ध स्फुटिका और रसाञ्जन का गुलावजल मे बना द्रव हालना चाहिए।
- ७. मुखशोधनार्थं शिरीर्ण्यूल की छाल, चाभ, आँवला, मुलेठी और चमेली के पत्ते को डालकर अर्धावशिष्ट पकाया जल कुल्ला करने को देवे।
- ८ मलशोधनार्थं यष्टचादि चूर्णं ३-४ ग्राम सुखोष्ण जल से १-२ वार देवे अथवा 'अश्वकञ्चुकी रस' १ वटी देकर उदरशोधन कराना चाहिए।

औषघ व्यवस्था

- १. पटोलािद षवाथ—परवल की पत्ती, आँवला, हर्रा, वहेडा, नीम की छाल, गुरुव, नागरमोथा, लालचन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा, हल्दी और धमासा, सभी २०-२० ग्राम लेकर कूटकर १५ खुराक बनावे। १ खुराक दवा को १ गिलास जल में चतुर्थाशाविशष्ट क्वाथ कर मधु के साथ थोडा-थोडा पिलावे। इससे खुजली एव ज्वर का शमन होता है।
- . २. खिंदराष्ट्रक क्वाथ—खैर की छाल, आँवला, हर्रा, बहेडा, नीम की छाल, परवल के पत्ते, गुरुच और अरुस, इनका क्वाय मधु मिलाकर प्राय -साय पिलाना चाहिए।

वण्डक-पीत-कृष्णमेह-मूखिकदंश-कर्णमूलिक-मसूरिका-रोमान्तिका

४~४ घण्टे पर ३ वार

रत्नगिरि रस ३०० मि० ग्राम त्रिभुवनकीति रस ५०० मि० ग्राम ब्राह्मीवटी ५०० मि० ग्राम योग ३ मात्रा

मधु से । बाद मे पहग जल पिलाना ।

लाक्षणिक चिकित्सा

१. अगमर्द-शिर-शूल मे

४-४ घण्टे पर ३ बार

गोदान्तीमस्म १ ग्राम गुडूचीसत्त्व १ ग्राम मृत्युञ्जय आधा ग्राम योग ३ मात्रा

मधु से।

२ विस्फोट-निर्गमनार्थ-

२-३ वार

करेले के पत्ते का स्वरस १० ग्राम हरिद्रा चूर्ण १ ग्राम मधु ३ ग्राम मिलाकर पिलाना । १ मात्रा

वयवा

कचनार की छाल २ • ग्राम अष्टगुण जल मे चतुर्थांशावशिष्ट पकाकर छानकर स्वर्णमाक्षिक भस्म १२५ मि० ग्राम के साथ २ बार पिलाना ।

अथवा

र्लींग सीठ श्राह्मी की पत्ती गुरुच पाठा

समभाग का क्वाय सवेरे शाम पिलाना ।

३. बाह मे-

नीलकमल, लालचन्दन, लोध, खस, ध्वेत तथा काली सारिवा को गुलाबजल मे पीसकर ललाट, नाभि तथा हाथ-पैर आदि मे लेप करावे।

४ नाड़ी की कीणता मे---

३--३ घण्टे पर ४ बार बृहत्कस्तूरीभैरव १५० मि० ग्रा०

कायचिकित्सा

योगेन्द्र १५० मि० ग्रा० ग्राह्मी वटी १५० मि० ग्रा० योग—३ मात्रा

पान के रस और मधु से।

५ कायफल के चूर्ण की हाय-पैर मे मालिश करावे।

६. रोगमुक्ति के बाद वल प्राप्ति के लिए। प्रात , सायं, मध्याह्व-

स्वर्णं वसन्तमालती

३०० मि० ग्रा०

शृगभस्म

३०० मि० ग्रा०

लौह भस्म

३०० मि० ग्रा० ३०० मि० ग्रा०

प्रवाल भस्म सितोपलादि

३ ग्राम

योग---३ मात्रा

सवेरे-शाम मधु से।

च्यवनप्राश

१० ग्राम दूघ से। १ मात्रा

प्रतिषेध

१. आक्रान्त व्यक्ति को अलग कमरे मे रखना चाहिए।

२ रोग-प्रतिरोधार्थं निम्न योग का प्रयोग करना चाहिए-

सर्वतोभद्र रस १५० मि० ग्रा०

ब्राह्मी वटी १५० मि० ग्रा०

योग--- २ मात्रा

तुलसीपत्र-स्वरस और मधु से।

अथवा---

मजीठ गुरुच

देवदारु वरुण कूठ मुलहठी

समभाग लेकर २० ग्राम दवा अठगुने जल में चौथाई शेष पकाकर १ चम्मच मधु डालकर सवेरे-शाम पीना।

अष्टम अध्याय अरुचि, अग्निमान्द्य, अजीर्ण

अरुचि या अरोचक (Anorevia) पर्याय जोर परिचय

बर्गिव, अरोचक, भक्तहेष, समक्तच्यत्य अयवा अयातिभान्दन ने मन्द परम्पर पर्याय हैं। यद्यपि इन मन्द्रों के अपने अन्य-अलग विशिष्ट गर्थ भी है, फिर भी इन सबका प्रयोग अर्थिन के ही अर्थ में होता है। इने 'भक्तोगमार्स' भी गहते है।

अरुचि - भूम लगी हो और नोजन भी स्वारिष्ट हो, फिर नी नोजन अच्छा न लगे और गले के नीचे न उतरे, तो उसे अरुचि कहते हैं।

भक्तहेष³— गोजन का नाम मुनने, म्मरण करने, उने देशने या रणशं करने स्थवा भोजन की गन्ध ग्रहण करने मात्र ने भोजन के प्रति उद्गेग, अनिक्ष्य और द्वेष का होना मक्तहेष कहलाता है।

अम्राज्यस्मितन्दन (अभक्ताच्छाप)—क्रोध के आवेश में होने का, यस से ग्रस्त होने के कारण अथवा द्वेपवश प्रतिकृत्व तान्त्रिक प्रयोग किये जाने के कारण मन-पसन्द भोजन रहने पर भी नोजन में उच्छा का न होना 'अन्नाशानिनन्दन' या 'अभक्तच्छन्द' कहलाता है।

अभक्तच्छन्द में भोजन की एक्टम इच्छा नशे होती है। सुश्रुतानाय ने अरोचक के लिए 'मक्तोपधात' शब्द का प्रयोग किया है। चरकाचाय ने अरोचक के लिए 'मक्त का अन्यान' कहा है।

^{? (} 不) मत्याम् अपि बुगुद्यायाम् अन्यादाराऽपः मध्येम् अर्थनः । (क्युकीप)

⁽स) प्रक्षिप्त तु मुखे चान । मोन म्यदत मुद्र । अरोचक स विशेषो (भरारेवमत श्णु) ॥ एदमोज (मधुकोष)

२ (म) अन्नरय श्रवण-स्मर्ण दशन ग प रपर्शनयं हिजते म भराद्वेष । (मधुकीष)

⁽ छ) चिन्तयित्वा तु मनमा दृष्वा शुरवापि भो अनम् । द्वेषमायाति यो जन्तुभैतद्वेष स उच्यते ॥ वृद्धभोज (मधुकोष)

 ⁽ क) अभिलिपतमप्यम्न दीयमानं ना-यवहरिन इत्यनम्नाभिनन्दम् । (मधुनोप)

⁽ रा) कुषितन्य भयार्तस्य अभिचारदतन्य च । यस्य नान्ने गवेच्ट्रद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते ॥ वृद्धगोज (मधुकीप)

४ भक्तोपधातमिह पद्मविध वदन्ति । स० उ० अ० ५७

५ पद्म भक्तस्य अनशन स्थानानि । च० स्० अ० १९।३

निदान

अरोचक के मुख्यरूप से दो कारण होते हैं---


- १. शरीरिक और २ मानसिक अथवा आगन्तुक।
- 9. बारीरिक कारण-9. वात, २ पित्त ३ कफ और ४ सिन्नपात भेद से चार प्रकार के होते हैं।

आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि अरुचि की उत्पत्ति का स्थान आमाशय है, उसके द्वारा ही क्षुधानाश और क्षुधानृद्धि होती है। आमाशय में वात-पित्त-कफ दोपो का प्रकोप या आमाशयिक कलाशोथ (Gastritis), आमाशयिक कर्केटार्बुद (Gastric cancer), आमाशयिक उपाम्लता (Hypochlorhydria) तथा रक्ताल्पता (Anaemia), ये शारीरिक कारण है, जिनके कारण भोजन में अरुचि होती है।

राजयक्ष्मा के आरम्भक पृथक्-पृथक् तथा ममस्त दोपो का रसना एव हृदयस्य मन मे म्थानसश्रय होने से और द्वेपजनक मान्स कारणो के होने से भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। ^२

२. मानसिक कारण³—शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध तथा मन के लिए अरुचि-कर रूप एवं गन्ध के सेवन से भोजन में अरुचि हो जाती है।

यह अन्न लाने की इच्छा का न होना उसी दोष के विकार का सूचक है, जो दोष किंच उत्पन्न करने का कार्य करता है और उसका स्थान रसना है। ऐसा दोष कफ है और अक्चि रोग कफप्रधान व्याधि है।



१ वातादिभि । मांधवनिदान

२ पृथग्दोपे मगस्तिर्वा जिह्नाहृदयगंत्रिते । जायतेऽरुचिराहारे दिष्टरर्थेश्व मानसे ॥ च० चि० ८।६०

शोकभयातिलोसकोधैर्मनोन्नाशनरूपगन्धै , अरोनका स्यु.। मा० नि०

संप्राप्ति

वातादि शारीरिक दोप तथा शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध एव मन को नापसन्द रूप तथा गन्ध आदि के कारण रसना स्थायीवोधक कफ की विकृति होने से अन्नवह तथा स्रोतस की दुष्टि होने के कारण आमागय और मनोवह स्रोतस में अधिष्ठित र स्थानसभ्रय किये शारीर तथा मानस दोप अरुचि उत्पन्न करते हैं।

सप्राप्ति—निदान—(क) कफप्रधान वातादि दोष—अन्नवहस्रोतस मे दोपवृद्धि एव तथा
्,, (ख) शोक-भय-अतिलोभ-क्रोध
नापसन्द भोजन, रूप-गन्ध आदि—मनोबहस्रोतस गे दोपवृद्धि

दोष-दूष्य आदि

दोष—कफप्रधान वातादि
दूष्य—रस
स्रोतस्—अन्नवह तथा रसवह
अधिष्ठान—आमाशय, जिह्ना एव
मनोवहस्रोतस्
स्रोतोदृष्टि लक्षण—सग

लक्षण

वातज अरुचि

मुख का स्वाद कसैला होना, दाँतो का कोट होना, खट्टापन (अम्लद्रच्य के सेवन से जैमे दाँत हो जाते हैं, उसे दाँत खट्टा होना या दन्तहर्प कृहते हैं। हृदय (छ।ती) मे शूछ तथा पीडा होना वातज अरुचि के लक्षण हैं।

पित्तन अरुचि

मुख का स्वाद कटु (तिक्त), अम्ल, विरस (फीका) होना, मुख मे उष्णता और दुर्गन्ध्र होना, हृदय के समीप अतिशय दाह और चूपणवत् पीडा होना तथा प्यास मालूम होना, ये पित्तज अरुचि के लक्षण हैं। र

कफज अरुचि

मुख का स्वाद विदग्ध कफ के कारण नमकीन और अविदग्ध कफ से मीठा होना, मुख मे पिच्छिलता, कफस्नाव और दुर्गन्ध होना, अगो मे स्तव्धता, भारीपन और स्निग्धता होना, कफ की जकडाहट से गलावरोध होने के कारण आहार को गले से नीचे उतारने मे असमर्थता का होना, ये कफज अधिच के स्रक्षण हैं।

१. (क) परिदृष्टदन्त कपायवक्त्रश्च मनोऽनिलेन । च० चि० २६

⁽ ख) हृच्छूलपीष्ठनयुतं पवनेन । च० चि० ५६६

र (क) कट्वम्लमुष्ण विरसं च पूर्ति पित्तेन विद्यात । च० चि० २६

⁽ख) पितातृड्दाह्चोपवहुलम् । च० चि० २६

३ (क) लवण च वक्त्रम् । माधुर्यपै च्छिल्यगुरुत्वशैत्यविबद्धसम्बद्धगुतं कफेन । च० चि० २६ (ख) सक्तफप्रसेक इलेष्मात्मकम् । च० चि० २६

त्रिदोवज अरुचि

सित्रपातज अरुनि में तथा तीनो दोषों में वतलाये गये मुख का कसैलायन आदि अनेक लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है और शरीर में अनेक प्रकार की पीडाओं का अनुभव होता है।

आगन्तुज अरुचि

इसमे दोष के अनुबन्ध के अनुसार मुख का स्वाद होता है, अन्यथा स्वाभाविक रहता है। शोक-भय आदि जन्य अरुचि मे मन की ज्याकुलता और मूर्च्छा आदि लक्षण होते हैं।

विकित्सा-सूत्र

9 मानसिक अवसाद को दूरकर प्रसन्नता का वातावरण वनाना, रमणीय स्थान में निवास, पुष्पोद्यान मे भ्रमण, भय-शोक-चिन्ता-क्रोध आदि का निराकरण, प्रिय, हम-उम्र मित्रो का साहचयं, कविगोष्टी, रेडियो-सगीत, दूरदर्जन आदि द्वारा मनोरञ्जन, आश्वासन, हुपंण तथा इष्ट वस्तु की प्राप्ति कराना श्रेयस्कर है।

२ प्रिय और हितकर विविध प्रकार के हुच तथा रुचिकर आहारों की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि अहित पदार्थ भी रोगी को रुचिकर प्रतीत हो, तो उसे अल्प मात्रा में देना चाहिए। 'अन्न ही प्राणियों का प्राण है' इस सिद्धान्त के अनुसार अपध्य अन्न में भी यदि रुचि हो तो उसे खिलाना चाहिए।

- ३. दोपज अरुचि मे प्रधान दोप को लक्ष्य कर शोधन करावे, जैसे— वातज अरुचि मे—विस्त का प्रयोग करे। पित्तज अरुचि मे—विरेचन का प्रयोग करे। कफज अरुचि मे—वमन कराना चाहिए।
- ४ कवलग्रह, मुख्यावन, मनपसन्द आहार, ह्षं, आश्वासन, पुन -पुन जिह्वा-विशोधन तथा औषधयुक्त धूम्रपान करावे।

५ रुग्ण की परिस्थिति, उसकी प्रकृति तथा देश-काल आदि का विचार कर अनेक प्रकार के पानक, अवलेह, तक्र, पाडद, चूर्ण आदि तथा सुरुचिपूर्ण पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिए।

१ त्रिदोपजे नेकरस भवेत् । बहुरुज बहुभिश्च विषात । च० चि० २६

२ वैगुण्यमोहजङताभिर्थापर च। च० च० २६

इ वन्तिः समीरणे पित्ते विरेशे वमन करे।
सर्वजे सर्वकामार्थे हर्पण स्यादरोचते॥
अम्बौ कवल्याहो धूम सुमुखभावन।
मनोश्वमन्नपान वा हर्पणाश्वासनानि च॥
सारम्यान् स्वदेशरिवतान् विविधा मस्यान्
पानानि मूल्फलखाण्डवरागलेहान्।
सेवेद् गर्मांश्च विविधान् विविधे प्रयोगैमूंकीत चापि लघुरूश्चमन सुखानि॥ यो० र०

१० ग्राम लेकर महीन चूर्ण कर ले। इस चूर्ण को ५ ग्राम लेकर गाय के १०० ग्राम मट्ठे मे घोलकर पिलावे। इससे रुचि मे वृद्धि होती है।

५ शिखरिणी—अच्छी तरह औटा हुआ दूघ और कपडे मे वाँधकर पानी निथारी हुई भैंस की दही, इनको समभाग चीनी मिलाकर किसी मोटे कपडे पर घिसकर छान लें, फिर उसमे छोटी इलायची, लींग, कपूर, कालीमिचं उचित मात्रा मे मिलाकर पिलावे। यह परम रुचिवर्धक और तृप्तिकारक पेय है।

६ रसाला—खट्टी दही १३ किलो, सफेद चीनी ७५० ग्राम, गोष्टत और मधु ५०-५० ग्राम, कालीमिचं और सोठ का चूणं २५-२५ ग्राम, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर प्रत्येक ५-५ ग्राम लेकर चूणं कर ले। पहले दही को कपडे मे बाँधकर खूँटी मे टाँग दे, जिमसे दही का पानी निथर जावे, फिर किसी स्वच्छ कपडे पर दही को रखकर साफ हाथों से घिसकर छान ले, फिर चूणं किये द्रव्यों को मिलाकर किसी पात्र में सुरक्षित रख दे। यह उत्तम बृहण और हचिवधंक पेय है।

अवलेह

- 9. विडङ्गयोग-वायविडग का चूर्ण १० ग्राम और मधु ४० ग्राम मिलाकर मुख मे धारण करने से असाध्य अरुचि भी ठीक हो जाती है।
- र मातुलुङ्गकेशर—विजीरा नीवू की केशर, सेंघानमक और कालीमिर्च समभाग का चूर्ण मुख मे घारण करने से अरुचि दूर होती है।

अथवा

- ३. विजीरा नीवू की केशर, सेंघानमक और मधु अथवा घी मिलाकर मुख में धारण करने से रुचि होती है। इसी प्रकार अनारदाना चूसने से, भी रुचि उत्पन्न होती है।^२
 - ४. आर्द्रफयोग³---
 - १. आर्द्रक स्वरस और मधु का सेवन रुचिकारक है।
- २ भोजन के पूर्व लवणयुक्त अदरख का सेवन जिह्ना और कण्ठ को गुढ करनेवाला, रुचिकर, आह्नादकर तथा अग्निप्रदीपक है। ४

१ त्रिडङ्गचूर्णं कर्षेकं क्षीद्रं कर्पंचतुर्मितम् । असाध्यामपि सहन्यादरुचि वक्त्रधारणात् ॥ यो० र०

२ केशर मातुलुक्तस्य सैन्धव मधुनाऽपि वा । आस्यवैरस्यशमनं भक्षयेत्कर्षसम्मितम् ॥ शमयित केशरमंशींच सलवणघृतमाशु मातुलुक्कस्य । दाक्षिमचवणमथवा चरको कचिकारि सचयामास ॥ यो० र०

३ शृह्रवेररस वाऽि मधुना सह योजयेत । अमन्त्रियासकासच्न प्रतिस्यायकपापहम् ॥ मा० प्र०

४. भोजनाग्रे सदा पथ्य छवणार्द्रकमक्षणम् । रोसनं दीपनं बह्वजिह्नाकण्ठविशोधनम् ॥ भाव प्रव

परवल की सब्जी या लाजमण्ड से यदि रोगी की नापसन्दगी हो जावे, तो मूग का पापड, परवल का भुर्ता और धान का लावा देना चाहिए। इस प्रकार प्रकार-भेद से पथ्य पकाकर उसे रुचिकर बनाना चाहिए।

२ जब रुग्ण को अपने स्वजनो का स्नेह, परिजनो का सद्व्यवहार शुभिनिन्तको की सहानुभूति और वडे-बुजुर्गों का आधामन तथा घर या अस्पताल का रमणीय मनोऽनुकूल वातावरण उपलब्ध हो, तो ऐमी परिस्थिति में औपध या आहार के सेवन का परिणाम सुखप्रद होता है, रोगी को सन्तोप, मनोवल, रुचि, शारीरिक वलदृद्धि, आरोग्यलाभ और रोगविनाश की उपलब्धि होती है। अत सर्वात्मना रुग्ण के मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए।

३. मन की चचलता से रोगी की किंच मिन्न-भिन्न वस्तुओं के खाने में होती है या दोषों के क्षय होने के कारण किंच में परिवर्तन हो जाता है अथवा व्याधि के प्रभाववण विचित्र प्रकार की किंच उत्पन्न हो जाती है, जैसे—पाण्डुरोग में मिट्टी खाने की इच्छा वढ जाती है एवं कफज्बर में अम्ल और कदुरम खाने की इच्छा होती है, रूक्ष पुरुप की स्निग्ध वस्तु के सेवन में किंच तथा अम्लद्रव्य के अतिसेवन से मधुर पदार्थ खाने की इच्छा होती है।

इस रुचियों के होने पर भी पथ्य का ही प्रयोग करना उचित होता है। उस पथ्य को स्वादिष्ट बनानेवाले द्रव्यों से मस्कृत कर रोगी को खिलावे।

यदि रोगी की रुचि किसी अपथ्य मे ही होवे, तो उस अपथ्य को, सस्कार द्वारा पथ्य बनाकर खिलाना चाहिए। भोजन, लघु आकर्पक, सुगन्धयुक्त और स्वादिष्ट होने मे भोजन की लालसा होती है।³

पथ्य

तेहूँ, अगहनी चावल, साठी का चावल, मूग, पतली मूली, बैंगन, केला, अनार, परवल, कमरख, नारगी, चिरौजी, खजूर, गो-दुग्ध, अगूर, आम, घी, लहसुन, सिरका, मद्य, झरबेर, रसाला, तक्र, दही, अदरख, मधुर, अम्ल, तिक्त रस, कालानमक, स्वच्छता, सौम्य एव शान्त वातावरण, ये सव पथ्य है।

अवध्य

मूत्र पुरीप-क्षुद्या-तृष्णा आदि के वेगो का रोकना, अप्रिय पदार्थों का सेवन, भय-शोक-क्रोध-लोभ आदि मनोविकार, रक्तमोक्षण, वीभत्स दृश्य देखना, मन के प्रतिकूल व्यवहार और अशान्त वातावरण आदि अपय्य हैं।

१ सातत्यात्स्वाद्वभावाद् वा पथ्य द्वेष्यत्वमागतम् । कन्यनाविधिभस्तस्ते प्रियत्व गमयेत्पुन ॥ च० चि० ३०।३३१

२ मनसोऽर्थाऽनुदूल्यादि तुष्टिरूझाँग्निवरेलम् । सुखोपमोगता च स्पाद् न्यापेक्षातो वलक्षय ॥ च० चि० ३०।३३२

३ स्त्रील्याद् दोपक्षयाद् न्याधेर्वेथर्म्याच्चाऽपि या रुजि । तासु पथ्योपचार स्याद् योगेनाच निफल्पयेत्। चि०चि०३०।३१३

सभी दोपों के प्रकोप और प्रधामन का कारण जठराग्नि है, अत उसकी समता की रक्षा में सदैव सावधान रहना चाहिए तथा अग्नि को विकृत करनेवाले कारणों से बचना चाहिए।

तीन या तेरह अग्नियां

जठराग्नि १, धात्वग्नि ७ और भूताग्नि ५ कुल मिलकर १+७+५=१३ अग्नियाँ होती है। 2

जठराग्नि की प्रधानता

जठराग्नि सभी अग्नियों मे प्रधान है, क्योंकि जठराग्नि जब प्रदीस होती है, तब सभी अग्नियाँ प्रदीस होती हैं और जब जठराग्नि क्षीण होती है, तब सभी अग्नियाँ क्षीण होती हैं।

चक्रपाणि और डस्हण ने 'कायचिकित्सा' के 'काय' शब्द का अर्थ जठराग्ति कहा है और उस जठराग्ति की चिकित्सा को कायचिकित्सा माना है। शिवदास सेन ने भी 'काय' का अर्थ जठराग्ति कहा है और अपने कथन के प्रमाण में भोज के चचन का उद्धरण दिया है। इस प्रकार आयुर्वेद के आठ अगो में सर्वप्रधान अग, जठराग्ति की चिकित्सा के नाम पर रखा गया है—काय का अर्थ अग्ति और काय-चिकित्सा का अर्थ दुर्वेस अग्ति की चिकित्सा है।

घात्वरिन

धातुएँ सात हैं और प्रत्येक धातु की अपनी-अपनी अग्नि होने से धात्वग्नियाँ सात हैं, जैसे--- १ रसाग्नि, २. रक्ताग्नि, ३ मासाग्नि, ४ मेदोऽग्नि, ५. अस्थ्यग्नि,

- १ शमप्रकोषी दोषाणां सर्वेषामग्निसश्रिती। तस्मादग्नि सदा ग्हेश्रिदानानि च वर्जयेदा ॥ च०्चि० ५।१३६
- २ भौतिका पद्म, पात्वग्न्य सप्त, अन्नपक्ता एक । च० चि० १५।३८ पर चक्रपाणि
- ३ (क) अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पम्तृणामधियो मत । तन्नृलास्ते हि तद्बृद्धिक्षयद्वद्विक्षयात्मका ॥ च० चि० १५।३९
 - (ख) स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा थातुषु सस्थिता ।

तेषां सादातिदीप्तिस्यां धातुवृद्धिस्रथीद्भव ॥ अ० ६० स्० ११।३४

- (ग) तचादृष्टदेतुकेन विशेषेण पक्वामाश्चयमध्यस्थं पित्त चतुर्विषमन्नपानं पचित, विवेष यति च दोषरसमूत्रपुरीपाणि, तत्रस्थमेव चारमश्चरया श्रेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाऽग्वि कर्मणाऽनुग्रह करोति, तस्मिन् पित्ते पाचकोऽग्विरिति संशा। सु० स० २१।१०
 - ४ कायस्यान्तरग्नेश्विकित्सा कायचिकित्सा । च० स० २०।२८ पर चक्रपाणि
 - ५ कायोऽत्राग्निकच्यते, तस्य चिकित्सा कायचिकित्सा । सु० सू० १।७ पर टल्हण
 - ६. कि वा कायी जाठराग्नि, उक्त च मोजे--

जाठर प्राणिनामिनं काय इत्यिभियते।

यस्त चिकित्सेत् सीदन्तं स वै कायचिकित्सक ॥ युक्तं चैततः—यतो ज्वरानिसारादय कायचिकित्साविषया रोगा अग्निवोषादेव सवन्ति ।

मा० सूरु ३०।२८ पर शिवदास सेन

६. मज्जाग्नि, और पुरुषों में ७ शुक्राग्नि तथा स्त्रियों में ८ आर्तवाग्नि इन सभी का एक नाम धारवग्नि है।

पक्रभूताग्नि

प्रत्येक धात्विग्न मे अन्नपानगत प्रत्येक भूत के पाचन और पृथक्करण के लिए पृथक् अग्नि होती है। इस प्रकार प्रत्येक धातु मे पाँच भूतो की पाँच अग्नियाँ होती हैं, इन्हे भूताग्नि कहते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्यों मे भी अपने अन्दर स्थित भूतो की पाचक अग्नियाँ होती हैं।

9 भीम या पायिव २ आप्य या जलीय ३ वायव्य ४ आग्नेय और ५ नाभस— ये पाँच भूताग्नियाँ कही जाती हैं। र

पञ्चमहाभूतात्मक देह के पोषणार्थ जब पाँचभौतिक आहार किया जाता है, तो वह पचमहाभूताग्नियों से परिपक्व होकर शरीर के पाणिव आदि गुणों की वृद्धि करता है। 3

सजातीय द्रव्यो के गुण सजातीय द्रव्यगुणो का ही पोषण करते हैं, एवन्च पाधिव आहारद्रव्य के गुण शरीरगत पाधिव गुणो का ही पोषण करते हैं।

अग्निमान्द्य का परिचय

आचार्यं चरक ने तीक्ष्ण अग्नि के विपरीत लक्षण होने पर अग्नि को मन्द कहा है। अत पहले तीक्ष्णाग्नि का परिचय आवश्यक है। तीक्ष्ण अग्नि नियत समय पर किये गये अधिक मात्रावाले आहार को भी शीघ्र पचा देती है। इसके विपरीत अग्नि मन्द हो, तो पुरुष अल्पमात्रा मे ही आहार ले, तो वह बहुत देर से पचता है और साथ ही उदर और शिर मे भारीपन, कास, श्वास, लालास्नाव, अगो मे वेदना आदि लक्षण होते हैं।

अग्निमान्द्य का निवान

परस्पर विरुद्ध आहार, पूर्व मे किये गये भोजन के विना पचे पुन भोजन करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, आटे या वेसन की बनी वस्तुओ का अधिकाश

सप्तिभिर्देहधातारो धातवो द्विविधं पुन । यथास्त्रमग्निमि पाकं यान्ति किट्टप्रसादवत् ॥ च० चि० १५।१५

१ यथास्त्रेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातव ।

२ भौमाप्याग्नेयवायव्या पञ्चोष्माण सनाभसा । पञ्चाहारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थवादीन् पचन्ति हि ॥ च० चि० १५।१३

र पञ्चभूतात्मके देहे धाहार पाञ्चभौतिक । विषयन पञ्चथा सम्यक् स्वान् गुणानभिवर्थयेत् ॥ सु० स्० ४६।५२६

४ येथा स्व स्व च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणा पृथक् । पार्थिवा पार्थिवानेव शेषा शेषांश्च कृत्स्तत्तश्च ॥ च० चि० १५।१४

५. तीक्षणविपरीतलक्षणस्तु । च० वि• ६।१२

प्रयोग करना, अपनव भोजन करना, मद्य, दूध, गुरु और अभिज्यन्दी पदार्थों का सेवन, अति उदण, अति स्निग्ध, अति रूझ, अति अम्ल और अति द्रव पदार्थों का अधिक सेवन करना, फाणित (राव) चीनी के बने पदार्थ तथा चूडा अधिक खाना, दिन में भोजन के बाद नित्य सोना, अति जलावगाहन, भोजन के बीच में जल पीने का अभ्यास और बासी भोजन करना तथा मल-मूत्रादि वेगो को रोकना आदि कारणो से बात आदि दोषो का प्रकोप होता है, फिर उनमे से कोई दोप जठराग्नि को मन्द कर देता है।

वातज अग्निमान्द्य का निदान

कटु, तिक्त, कषाय रसप्रधान अति रूझ, सयोग आदि की दृष्टि से विरुद्ध भोजन, अल्पमात्रा मे भोजन, अनशन करंना, दूर तक पैदल चलना, मल-मूत्रादि के वेगों को रोकना और अति मैथुन करना इत्यादि कारणो से प्रकुपित हुआ वायु जठरानि को दूषित कर मन्द बना देता है, जिससे अग्निमान्द्य होता है और अग्निमान्द्य होने से अनेक प्रकार के अजीणं, अतिसार, ग्रहणी आदि रोग जन्म लेते हैं।

वित्तज अग्निमान्छ का निवान

कदु, विदाही, अम्ल, क्षार आदि द्रव्यों का अधिक सेवन करने से बार वार विदग्धाजीण के होने से तथा पित्तवर्धक पदार्थों के अति सेवन से प्रकुपित हुए पित्त का जलीयाश वढ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह जठराग्नि की पाचन-क्षमता को मन्द कर देता है या बुझा देता है, जैसे कि उष्ण किया हुआ जल भी अपने द्रवत्व के कारण अग्नि को शान्त कर देता है। पित्त में जब द्रवता वढ जाती है, तब वह जठराग्नि को मन्द कर देता है।

क्फज अग्निमान्द्य का निदान

अति गुरु, अति स्निग्ध, अति शीत, पिच्छिल एवं मधुर भोजन, अधिक मोजः करने तथा दिन में भोजन करके सोने से कफ प्रकुषित होकर जठराग्नि को नष्ट या

- १ (क) कडितिक्तकषायातिरूक्षसन्दृष्टभोजने । प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमेथुने ॥ मारुतः कुपितो विह्नं सम्छाच कुरुते गदान् । च० चि० १५।५९-६०
- (ख) वातलस्य वातातपन्यायामातिमात्रनिषेविणो रूक्षाल्पप्रमिताशिनस्तीक्ष्णमद्यस्यवाय नित्यस्योदावर्तयतश्च वेगान् वायु प्रकोपमापद्यते पक्ता चोपइन्यते । च० चि० १९।५
- (ग) स यदा प्रकृषितः प्रविदयामाश्चयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामघातु रसना मानमन्यवेत्य रसस्वेदवदानि स्रोतांसि पिषायाग्विसुपहत्य । च० नि० १।२०
 - २ (क) कट्वजीर्णेविदाद्यम्ळक्षाराचे पित्तमुल्वणम्।

षाप्लावयद्धन्त्यनल जलं तप्तमिवानलम् ॥ च० चि० १५।६५

(ख) वित्तलस्य पुनरम्ललवणकडुकक्षारोष्णतीक्ष्णातिमात्रनिषेविण पित्त प्रकीपसाप खते, तत् प्रकुपित द्रवत्वादूष्माणसुपहत्य । च० चि० १९।६

(ग) उच्याम्छकडुकाजीर्णमोजनेम्योऽतिसेनितेम्य पत्त प्रकोपमापचते, तबदा प्रकृतितम्'' '' '' रसस्वेदवहानि स्रोतांभि थिषाय द्रवस्वादिग्नसुपहस्य । ख० नि० १।२१ मन्द कर देता है। कफ प्रकृति से गुरु, मधुर, शीत एवं स्निग्ध होने से अग्नि को मन्द बना देता है।

बक्तव्य-अग्निमान्द्य मे तीन स्थितियाँ हो सकती हैं- १. पित्त का निर्माण अल्प मात्रा मे होना, २ आमाश्य और पच्यमानाश्य मे उसकी गित मन्द होना और ३. स्रोतस् के अवरुद्ध होने से विविध पाचक रसो का स्नाव पूर्णतया न होना। इन परिस्थितियो के कारण अग्नि मन्द हो जाती है।

वातज अग्निमान्द्र मे भी तीन दशायें होती हैं—१ वातप्रकोपक आहार-विहार के अतियोग के कारण पाचक ित्त का पोषण नहीं होता है। २ वातप्रकोपवश ित्त के वाहक स्रोत के कृश हो जाने से पित्त का सम्यक् वहन नहीं हो पाता है और ३. स्रोतस् की गित के स्तब्ध हो जाने या स्रोतस् के छिद्र सकुचित होने से पाचक रसो का स्राव समुचित न होने से अग्निमान्द्य होता है।

वातज अग्निमान्द्यकारक कतिपय द्रव्य

चाय—चाय में टैनिन नामक एक पदार्थ रहता है, अतएव चाय का अधिक पीना जठराग्नि को मन्द बनाता है। चाय कषायरसवाला होता है और कषायरस वातप्रकोपक होने से वातप्रकृति के पूरुषो मे चाय पीने से वातज अग्निमान्द्य होता है।

सुपारी^२—यह कषायरस-प्रधान द्रव्य है और इसके अतिसेवन से वात का प्रकीप होकर अग्नि मन्द पड जाती है, जिससे उदावर्त आदि रोग होते हैं।

जम्बूफल — प्राय मधुमेह में जामुन के फल और बीज का प्रयोग होता है, किन्तु इसके अतियोग से क्षुधानाश होता है। यह उत्कृष्ट वातजनक होता है, अत यह वात-प्रकोपक द्रव्य है, जो वातज अग्निमान्द्य उत्पन्न करता है। वायु सभी क्रियाओं का सन्धालक और दोषों का नेता है। इसके प्रकोप से अन्य दोप भी प्रकृपित हो जाते है। अत वात को वढाने वाले द्रव्यों का अतियोग नहीं करना चाहिए।

भेस का दूध - यह महा अभिष्यन्दी है अर्थात् अपनी पिच्छिलता, स्निग्धता

मुक्तमात्रस्य च स्वप्ताद्धन्त्यर्गिन कुपित कफ ॥ च० चि० १५।६७

ज्ञान्यव वातजननाम् । च० स० २५।४०
४ महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं विद्वनाशनम् ।
निद्राकर शीततरं ग्रन्याद्य स्निग्धतर ग्रुष् ॥ स्व० स्५।५५
महाभिष्यन्दि—दोषधातुमकस्रोतसाम् अतिशयेन क्लेदप्राप्तिननकम् ।

१ (क) गुर्वतिस्निग्धशीतादिमोजनादितमोजनादः।

⁽ ख) श्लेष्मलस्य दिवास्वप्नपरस्यालसस्य श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते, स स्वभावाद् गुम्मधुरशीतस्विग्ध सस्तोऽग्निमुपहस्य । च० चि० १९।७

⁽ग) स्निग्धगुरु इलेष्मा प्रकोपमापद्यते । स यदा प्रकुपित स्रोतांसि पिधाया-ग्निमुपहत्य । च० नि० १।२६

२ पूग ग्रुरु हिम रूक्षं कषायं कफिपत्तिति । आर्द्रे तद् गुर्वभिष्यन्दि वहिद्दष्टिहर स्मृतम् ॥ मा० प्र० फक्ष्वगं

३ राजजम्बूफलं स्वादु विष्टम्मि गुरु रोचनम्। मा० प्र० फल०

तथा गुरुता से रसवाही स्रोतों का अवरोधक, कफप्रकोपक तथा अग्नि को मन्द बनाने वाला होता है। यह गौरवोत्पादक, शीत, मधुर और अपनी पिच्छिलता तथा गुरु गुणयुक्त विपाक के कारण स्रोतो को द्रवगुणाधिक कफ से अतिशय लिस करनेवाला होता है।

अग्निमान्य की संप्राप्ति

जब पुरुप कफप्रकृति का हो अथवा अन्य दोप-प्रधान हो और उसकी जठरानि कफ से अभिपूत हो, जिसके परिणामस्वरूप उसकी अग्नि मन्द हो गई हो, फिर भी वह अहितकर आहार-बिहार कर रहा हो, तो अग्निमान्द्य की जिटलता वढ जाती है। अग्नि मन्द होने से अन्नपान के पूर्ण परिपाक होने तक उमे धारण करनेवाले अवयव—पच्यमानाशय, पितधराकला या ग्रहणी या झुद्रान्त्र निवंल हो जाते हैं। जठराग्नि के मन्द या दुवंल होने मे पाचन-मस्यान के अवयव—आमागय, धुद्रान्त्र आदि हीनवल हो जाते हैं और उनके कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप ग्रहणी भी दुवंल हो जाने के कारण अन्नपान के परिपक्ष होने के पूर्व जब वह विदग्ध या अधंपक्ष या पनवापक्ष होता है, तभी उसे पनवाग्य मे जाने के लिए छोड देती है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें अग्निमान्द्य के कारण अन्नरम के रूप मे न परिणत होकर बुक्त (सिरके) के रूप मे परिणत होकर विवतुल्य हो जाता है।

अप्टाङ्गसप्रह में कहा है, कि जठरानि द्वारा सम्यक् पनव अम्र अमृतस्वरूप होता है और अपन्य अम्र विपरूप हो जाता है। मानव-देह के अवयव भी अपने और रारीर के हितिचन्तन में कितने मजग और सावधान रहते हैं, यह ग्रहणी की विलक्षण फ़िया से परिलक्षित होता है। ग्रहणी में यह निणंय करने की बुद्धि है, कि शरीर के लिए क्या हित है और क्या अहित है? यह निणंय करके वह हित का सरक्षण और अहित का परित्याग करती है। समाग्नि समयोगगुक्त अन्नपान के सम्यक् परिणत होते हुए अश और अनरस का यावव् परिपाचन धारण करती है, किन्तु इसके विपरीत अविधि-सेवित अन्नपान जठगानि की दुवंलता से जब अन्नविप के रूप में तैयार होने लगता है, तो ग्रहणी अपने लिए तथा शरीर के लिए उसे बहित कर समझकर छोड देने की चेव्टा करती है। इस प्रकार से अग्निमान्ध तथा तंजनित अतिसार, ग्रहणी, अर्थ, उदावतं आदि नाना प्रकार के रोगो का जन्म होता है जिसके मूलभूत हेतु के रूप में अग्निमान्ध को श्रेय प्राप्त है।

१ (क) दुष्यत्यग्नि, स, दुष्टोऽनं न तद्य पचित रुध्विष । अपच्यमानं शुक्तस्व यात्यम्नं विपरूपताम् ॥

⁽ ख) घोरमन्नविषं च तत् । च० चि० १५।४४, ४६

२ तथाऽन्नमपि तेनीव (अग्निना) पनवममृततां यात्यपमव च विपताम्। अ० स० शा० ६

३ (क) अग्निदोपानमनुष्याणां रोगसङ्घा पृथग्विधा । च० चि० १३।९

⁽ ख) अशोंऽतिसारग्रहणीविकारा प्रायेण चान्योऽन्यनिदानभूता.।

[·] सन्नेऽनले सन्ति न सन्ति दीप्ते रक्षेदतस्तेषु विशेषतोऽग्निम् ॥ म० ६० चि० ८।१६४

संप्राप्ति

कफप्रधान त्रिदोषप्रकोपक हेतु

कफप्रधान दोषप्रकोप

आहार का अविपाक

अल्पाहार का भी अपाचन, आमोत्पत्ति, शिरोगौरव, लालाप्रसेक, शरीर-शैथिल्य आदि सहकृत

> । अग्निमान्द्य

वातज अग्निमान्द्य का उक्षण

वातज अग्निमान्द्य मे उदरशूल, आध्मान, तोद, भेद, मलावरोध, अधोवायु की कुकावट, अगो मे जकडाहट, मूच्छी, अगमदें, अन्न का पाचन कठिनाई से होना, कण्ठ और मुख सूखना, पार्श्व, ऊरु तथा वक्षण मे वेदना, कृशता तथा दुवंलता आदि लक्षण होते हैं।

पित्तज अग्निमान्द्य का लक्षण

शिर मे चक्कर आना, तृष्णा की अधिकता, खट्टी डकार के साथ मुख से धुँआ जैसा निकलना, पसीना आना, जलन होना और भोजन मे अरुचि होना आदि लक्षण होते हैं।

कफज अग्निमान्य का लक्षण

कफज अग्निमान्द्य में शरीर में भारीपन, कपोल और नेत्रकूट में शोथ, मीठा डकार आना, वमन की इच्छा होना या वमन होना, मुख मीठा रहना, अगो में थकावट, आलस्य, स्तब्धता और मैथुन की अनिच्छा होना आदि लक्षण होते हैं।

चिकित्सा-सूत्र

9 अग्निमान्द्य के कारण, लक्षण तथा रोगी के अवस्था-विशेष को देखते हुए अग्निमान्द्य के रोगी को स्नेह (घृत) का उपयोग कराना चाहिए तथा विविध प्रकार के आसव, अरिष्ट, अग्निदीपक चूणें, क्वाथ एव हितकर आहार-विहार का सेवन कराया जाना चाहिए। इससे शरीर और अग्नि दोनो के वल की वृद्धि होती है।

२ जिस दोव-विशेष से अग्निमान्च हुआ हो, उस दोव की शामक औषधों के

१ स्नेहासवसुरारिष्टचूर्णक्वाथहिताशनी । सम्यक् प्रयुक्तैदेंहस्य बलमग्नेश्च वर्धते ॥ अ० हृ० चि० १०।७८

क्वाथ-कल्क से सिद्ध घृतो का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे घृत अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जिससे गुरु अन्न का भी पाचन ही जाता है।

३. अग्निमान्छ के कारण अपक्व पुरीप का यदि अतिसरण होता हो, तो दीपन-पाचन द्रव्यों से सिद्ध या उनसे संयुक्त घृत का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इस योजना से जठराग्नि का समीपवर्ती समान वायु प्रसन्न एवं सम अवस्था में होकर स्वमार्गगामी हो जाता है तथा अग्नि को वलवान् बनाता है।²

४ जब पुरुप की अग्नि मन्द हो और उसका मल कठिन हो गया हो तथा मल निकालने के लिए घौच के समय प्रवाहण करना (कौंखना) पडता हो, तो उसे उचित मात्रा मे पश्चलवण मिश्रित घृत का पान कराना चाहिए।

इस घृत का प्रयोग दो प्रकार से होता है—१. या तो घृत पिलाकर तुरन्त भोजन करावे अथवा २ आधा भोजन के वाद घृत पिलाकर पुन. शेष भोजन करावे।

५. अग्नि की रक्षा की दृष्टि से सम गात्रा मे आहार कराने से अग्निवल की घृद्धि होती है।

६ अग्निमान्द्य होने पर उचित मात्रा में स्नेह, अझ, चूर्ण, आसव, अरिष्ट तथा सुरा के प्रयोग से जठराग्नि का वल वढ जाता है। जिस प्रकार सारयुक्त लकडी की अग्नि बहुत देर तक स्थिर और प्रज्वलित होती रहती है, उसी प्रकार स्नेहयुक्त अन्नपान आदि के समुचित प्रयोग से जठराग्नि बहुत दिनों तक स्थिर एव प्रज्वलित रहती है।

- ७ भोजन के पच जाने पर हितकर और परिमित मात्रा मे आहार करनेवाला व्यक्ति चिरकाल तक स्वस्थ वना रहता है। प
- ८. अग्निमान्द्य मे वातादि दोष तथा रस-रक्तादि घातुओ की विषमता न होने पावे, इस वात का ध्यान रखते हुए अग्नि को वढाने का प्रयत्न करना चाहिए।

१. स्तेहमेव परं विधाद दुवैलानलदीपनम् । नाऽल स्तेहसमिद्धस्य शमायात्र सुगुवैषि ॥ च० चि० १५।२०१

२ मन्दाग्निर्विपक्वं यो पुरीवमितसार्यते । दीवनीयीवर्षेयुक्तां घृतमात्रां पिवेन्तु स ॥ तया समान पवन प्रसन्नो मार्गमास्थित । स्रग्ने समीवचारित्वादाशुप्रकुरुते वस्त्रम् ॥ च० चि० १५।२०२-२०३

३ काठिन्याच पुरीष तु कृच्छान्मुऋति मानव । सञ्चत कवणेर्युक्त नरोम्नावग्रह पिवेत्॥ च० चि० १५।२०४

४ स्तेष्ठान्नविधिभिश्चित्रैक्चूर्णारिष्टचुरासर्वे । सम्यक्त्रयुक्तीभिषता बलमग्ने. प्रवर्धते ॥ यथा हि सारदार्विन स्थिर सन्तिष्ठते चिरम् ॥ स्तेष्ठान्नविधिभिस्तद्भदन्तरिनमंत्रेष्ठ स्थिरः। च० चि० १५।२१२--२१४

५ हित जीर्णे मित चाइनश्चिर्मारीग्यमश्चते । च० चि० १५।२१४

६ अनेषम्येण धातूनामभिष्ट्रही यतेत ना । च० चि० १५।२१५

आवस्यिक चिकित्सा

- १. अति में रूसता के कारण यदि शन्ति मन्द हो जाये, तो दीपन औषधी से सिद्ध किया हुआ एत या तैल का सेयन करे अपना दीपन द्रव्यों के पूर्ण एत या तैल के साथ प्रयोग करे।
- २. स्निग्ध पदायों के अधिक सेवन करने से यदि अग्नि मन्द हो गयी हो ती चूर्ण, आसव एवं नरिष्ट का प्रयोग हितकर होता है। र
- ३. उदावर्त रोग के कारण यदि अग्नि मन्द हुई हो, तो निम्न्ह और अनुवासन-वस्ति का क्रम से प्रयोग करना चाहिए। मस्ति का प्रयोग तज्ज वैदा से ही कराया जाना चाहिए।
- ४. वातादि दोष के अधिक बढ़ जाने से यदि अग्नि मन्द हो गई हो, तो यमन-विरेचन या वस्ति के द्वारा दारीर का घोधन कर छेने के बाद उस बढ़े हुए धोप के प्रतिकार का प्रयत्न करना चाहिए।
- ५ रोगमुक्त हो जाने पर यदि अग्नि मन्द हो, तो एत का सेवन करना ही अग्नि-प्रदीपक होता है। भ
- ६. उपवास करने से यदि अग्नि मन्द हो, सो मण्ड, पेया, विलेपी आदि में एत मिलाकर पिलाना चाहिए। अन्न के साथ मिला हुआ एत अग्निदीपक, वलवर्धक और बृहणकारक होता है।
- ७ दीर्घकाल तक किसी रोग से पीडित होने के कारण घुटा, शीण एव ग्रुझ हुए मांसभा व्यक्ति को कव्वा मांग खाने वाले पद्यु-पित्रयों के मांसरस में अनार का रस मिलाकर भोजन के साथ पिलाये। कक्ने गाम को धाने वाले पद्यु-पित्रयों का मांस लघु, तीक्ण, उटण, दोधन होने के पारण अग्नि को बीद्र प्रदीम करता है तथा उनके घरीर का मांस मांस से सर्वधित होता है, इसलिए अतिबोद्र धरीर का बृहण करता है।

१ रीक्ष्यान्मन्द्रे विवेद सर्विसीलं वा दीवनैर्युतम् । च० चि० १५।२०५

२ मतिरनेषातु मन्देऽरनी चूर्णारिष्टामवा विता । य० वि० १५।२०६

इ उदावर्तातु मन्देजनी निरूहा रनेएवरतय । प० चि० १५।२०७

४ दोषष्टदया तु मन्देऽग्नी शुद्धो दोषविधि चरेत् । च० चि० १५।२०७

५ व्याधिमुक्तस्य मन्दे तु सपिरेवाग्निदीपनम् । प० नि० १५।२०८

६ उपवासाच्च मन्देऽग्नी यवाग्भि विवेद् घृतम् । अन्नावपीष्टित बन्यं दीवनं चृंदणं च तद्य ॥ च० चि० १५।२०८-२०९

७ दीर्घकालप्रमद्गाच क्षामक्षीणफ्रशानराम् । प्रसद्दानां रमे साम्लेभोंवयेष् पिशिताशिनाम् ॥ रुष्ठ, तीक्ष्णोष्णशोधित्वादीपयन्त्याशु तेऽनलम् । मसोपचितमांसत्ताष् सथाऽऽश्चतरमृंष्टणा ॥ च० चि० १५।२०९–२११

लार्साणक चिकित्सा वातज अग्निमान्द्य चिकित्सा

9 वातज अग्निमान्द्य मे पुरीष और अद्योवायु की प्रवृत्ति रुक जाती है। कोष्ठा-श्रित दूषित वायु मूत्र और मल का निग्रह करती है और पक्वाशय मे विकृत वायु उदरशूल, गडगडाहट, मूत्रकृष्णु, मल का किठनाई से निकलना, आनाह और त्रिक-प्रदेश मे वेदना उत्पन्न करती है। 2

२ मलप्रवृत्ति को व्यवस्थित करने के लिए लवण का विशेष रूप से प्रयोग करना हितकर है। अहार में और औषध मे नमक की पर्याप्त मात्रा डालकर खाया जाय। इस दृष्टि से लवणमास्कर तथा सामुद्रादि चूणें का प्रयोग उपयुक्त है।

३ लवणों में मल को ढीला कर प्रवृत्त करने का स्वधाव होता है, अत अग्नि-मान्द्य और उससे होने वाले उदावर्त, मलकाठिन्य, नाभिशूल, आनाह, अन्त्रकूजन आदि के साथ मलावरोध हो तो लवणभास्कर या सामुद्रादि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए।

४. द्रवमल की प्रवृत्ति हो, अघोवायु की रुकावट हो, आध्मान और अन्त्रकूजन बादि हो, तो हिंग्बष्टक चूर्ण का प्रयोग हितकर होता है।

५ आध्मान, उदावर्तं बादि युक्त अग्निमान्द्य मे शिवाक्षार पाचन का प्रयोग अद्भृत लाभ करता है। चरक के हिंगुद्धिरुत्तरादि योग का भी प्रयोग सफलता के साथ होता है। वैद्यसम्राट् श्री प० सत्यनारायण जी शास्त्री (काशी) प्राय 'हिंगु-दिक्तरादि' का प्रयोग करते थे।

६ लवण आमाशयगत पाचकिपत्त के उद्रेक को बढाता है, जिससे पाचनप्रक्रिया में सहयोग मिलता है और आमाशयिक पाचन के सुचार रूप में सम्पन्न होने से पच्यमानाशय या प्रहणी की भी क्रिया समुचित होती है। अथ च पनवाशय भी अपना कार्य ठीक से सम्पन्न करने में समर्थ होता है, जिससे मलविसर्जन में कठिनाई नहीं होती।

७ वायु को शोपक स्वभाववाला कहा गया है, अत वातज अग्निमान्द्य में शोषणजनित रूक्षता एव मलावष्टम्भ को दूर करने के लिए घृत का प्रयोग आवस्यक है, असी प्रकार लवणप्रधान औषधें भी उपयोगी हैं।

१ तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे नियहो मूत्रवर्चसो । च० चि० २८।२४

२ पक्वाशयस्थोऽन्त्रकुतं शूलाटोपी करोति च। कृच्छुमूत्रपुरीपत्वमानाह त्रिकवेदनाम्॥ च० वि० २८।२८

३ पक्वाश्यगते वाते देयं स्तेहविरेचनम् । वस्तय श्रीभनीयाश्च प्राशाश्च छचणोत्तराः ॥ छ० चि० ४।५

४. दोपमशोषण । च० स्०१२

५ दशमूलादि घृत, त्र्यूपणादि घृत, पश्चमूलादि घृत का प्रयोग कत्तम है। —च० वि० ^{१५}

- ८. वातज अग्निमान्द्य मे लवण तथा अम्लसहित एत का व्यवहार करना चाहिए, वयोकि दुवेल अग्नि को तीव करने के लिए एत उत्तम औषध है।
- ९. वातदोप को व्ययस्थित करने के लिए वातनाशक रस-गुण-वीयं-विपाक याले द्रव्यो का एव मधुर, अम्ल तथा लवण रमयुक्त पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए।

पित्तज अग्निमान्द्य चिकित्सा

- पत्तज अग्निमान्य मे पित्त के शमन के लिए मधुर द्रव्य सिंहत तिक्तरस
 प्रधान अग्निप्रदीपक द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए।
- २. यदि बढा हुआ पित्त जठराग्नि की नष्ट कर रहा हो, तो पित्त को वमन अथवा विरेचन द्वारा वाहर निकाल देना चाहिए। आहार में विदाह न उत्पन्न करने वाले तिक्तरस युक्त लघु अन्न खाने के लिए देना चाहिए। भोजन के साथ दीपन औषध, घृत तथा खट्टे अनार का रस मिलाकर देना चाहिए।
- ३. कुष्ठाधिकार मे कथित तिक्तकघृत^र और दीपनीय द्रव्यो के चूर्ण के प्रयोग से जठराग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए। ग्रहणी अधिकार मे कथित चन्दनादि घृत, नाग-रादि चूर्ण, भूनिम्वादि चूर्ण, वचादि चूर्ण और किरातादि चूर्ण का प्रयोग करना हितकर होता है।³

कफज अग्निमान्द्य चिकित्सा

- १ कफज अग्निमान्द्य मे विधिपूर्वक वमन कराने के वाद कटु, अम्ल, लवण क्षार और तिक्त द्रव्यो का प्रयोग कर जठराग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए।
- २. यदि कफ का प्रकोप अधिक हो, परन्तु रोगी व्यक्ति कृशकाय हो, तो कभी रूस तया कभी स्निग्ध दीपन द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी की कृशता पर ध्यान देकर उनके वृहण के लिए मात्र स्निग्ध द्रव्यो का प्रयोग किया जावे, तो सभव है कि कफ की वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप अग्नि की मन्दता वढ़ जावे। इसी प्रकार रोगी के कफप्रकोप को ध्यान में रखकर केवल रूक्ष दव्यो का सेवन कराया जावे, तो उससे अधिक कर्षण होकर रोगी को कृशतर वना देगा। इसलिए वारी-वारी से कभी स्निग्ध, कभी रूक्ष द्रव्यो का उचित मात्रा में सेवन कराया जाना चाहिए।
- ३ यदि कफज अग्निमान्य का रोगी कृश और क्षीण हो अथवा रोगी के शरीर में आमाश की अधिकता हो, तो पीपर, पिपरामूल, चव्य, चित्रक और सोठ के चूर्ण को घृत के साथ सेवन कराना चाहिए।
 - ४ जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए पलाश की छाल, चित्रकसूल, चव्य,

१ च० चि० १५।२०१

२ च० चि० ७।१४०-१४३

३ च० चि० अ० १५

विजीरा नीवू, हर्रे, पीपर, पिपरामूल, पाठा, सोठ और धनियां, इन सबको १०-१० ग्राम लेकर जीकुट कर १ लीटर जल मे चतुर्याशाविशष्ट क्वाथ कर छान ले। प्यास लगने पर इसी जल को पिलावे और इसी जल मे मण्ड, पेया, विलेपी बादि पकाकर खाने के लिए देवे।

५ अग्नि के तीव्र हो जाने के बाद सूखी मूली का यूष अथवा कुलथी के यूष में कटुद्रव्य या अम्लद्रव्य या क्षारद्रव्य या नमक मिलाकर, पुराने चावल का भात वना-कर खिलावे और खाने के बाद खट्टा महा या तक्रारिष्ट या मदिरा आदि पिलावे।

६ अग्निमान्द्यज रोगो मे मघूकासव, दुरालभासव, मूलासव, पिण्डासव, मध्व-रिष्ट, पिप्पलीमूलादि चूर्ण, क्षारपृत और क्षारगुटिका (सभी च० चि० अ० १५) का प्रयोग लाभकर होता है।

ओषघ-प्रयोग

- 9. भोजन करने के पहले आईंक की कतरन सेंघानमक के साथ चवाकर खानी चाहिए, क्योंकि अग्निमान्च कफ-प्रधान रोग है और आईंक उष्णवीर्य होने से कटु-रसयुक्त तथा रूक्ष होने से कफज विकारनाशक और अग्निसन्दीयन, रुचिकारक, जीभ एव कण्ठ का शोधन करनेवाला होता है।
- २. रुचि के अनुसार सिरका और आईंक को समभाग मे मिलाकर खाने से अग्निमान्च नष्ट हो जाता है। व आईंक के साथ हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, पके टमाटर, पतली मूली, नीबू का रस और नमक मिलाकर सलाद बनाकर भोजन के साथ लेना भोजन मे रुचि उत्पन्न करता है।
- ३ पित्तप्रधान अग्निमान्द्य मे सितोपलादि चूर्ण अथवा यवानीवादव चूर्ण का प्रयोग करना हितकर होता है।
- ४ वातप्रधान अग्निमान्द्य मे शिवाक्षारपाचन चूर्णं का प्रयोग उत्तम है। इसी तरह सामुद्रादि चूर्णं, हिंग्वष्टक चूर्णं एव अग्निमुख चूर्णं और जीरकादि चूर्णं का प्रयोग श्रेयस्कर है।
- ५. अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते है, कि जैसे बन्द ताले मे चाभी लगाकर उसे खोल दिया जाता है, उसी प्रकार बन्द क्षुधा को अग्नितुण्डो वटी की यथोचित मात्रा खिलाकर खोला जा सकता है। दिन मे ३ बार, १२५ मि० ग्रा॰ से २५० मि० ग्रा॰ की १ मात्रा मध् से दे।
- ६ इस अधिकार की प्रसिद्ध औषघो मे चित्रकादि वटी, हिग्वादि वटी, शखवटी, रसोनादि वटी, सजीवनी वटी, अग्निकुमार रस आदि उल्लेख्य हैं।

१ भोजनाग्रे सदा पथ्यं छवणार्दकमक्षणम् । स्रोनसन्दीपनं रुच्यं विद्वाकण्ठविशोधनम् ॥ भा० प्र०

२. समशुक्तादं कमात्रा मन्दे वही । अ० ह० उ० ४०।५५

व्यवस्था-पत्र

१ ४-४ घण्टे पर दिन मे ३ वार
अग्नितुण्डी वटी ५०० मि० ग्रा०
शस्म १ ग्राम
रामवाण रस ५०० मि० ग्रा०
सजीवनी वटी ५०० मि० ग्रा०
योग—३ मात्रा

मधु से।

२ भोजन के ५ मिनट पूर्व हिग्वादि वटो २ गोली

चूसना। १ मात्रा

३ भोजन के साथ

यवानीपाडव चूर्णं ५ ग्राम से १० ग्राम तक

४. भोजनोत्तर २ वार

द्राक्षासव २५ मि० ली० की १ मात्रा

५ रात में सोते समय

वविपत्तिकर चूर्णे ४ ग्राम

१ मात्रा

उप्णोदक से।

वयवा

शिवाक्षार पाचन चूणें ५ ग्राम

या

वैश्वानर चूर्ण ५ ग्राम चण्णोदक से।

आहार या पथ्य

अग्निमान्द्य में लघु आहार द्रव्य देने चाहिए, जैसे पुराने लाल अगहनी के चावल का बना मण्ड या भात, घान के लावा का मण्ड, मूग का यूप, बथुआ, कच्ची मूली, लहसुन, सहिजन, परवल, वैगन, करेला, आंवला, अनार, विजीरा नीवू, अदरख, नमक, धनियाँ, जीरा, तक्र और कटु तथा तिक्त रसयुक्त द्रव्य पथ्य है।

अपध्य

मल-मूत्रादि के वेगो को रोकना, तीक्ष्ण विरेचन, अध्यक्षन करना, रात्रिजागरण, विषमाश्चन, उडद या चावल आदि के आटे से बने पदार्थ, जामुन, आलू, विरुद्ध एव असात्म्य, दुजर और भारी पदार्थों का सेवन अपध्य है।

विहार

अग्निमान्द्य कफप्रधान रोग है, अत इसमे कफ को घटानेवाला ही उपचार करना हित कर होता है। इस दृष्टि से अग्निमान्द्य मे ज्यायाम का विशेष महत्त्व है। जठरानि को प्रदीप्त करने के लिए ज्यायाम एक वहुत उपयोगी प्रक्रिया है। जो ज्यक्ति आलसी और आरामतलब, सुल्ली, सम्पन्न और विलासी होते हैं, वे प्राय अग्निमान्द्य से होनेवाले लक्षणो या उपद्रवों के शिकार होते हैं। जो लोग वैठकर काम करनेवाले होते हैं और शारीरिक श्रम नहीं करते, वे प्राय अग्नि के मन्द होने की शिकायत करते हैं। अत उक्त वातो पर ध्यान देने से श्रम का महत्त्व जठरानि को प्रदीप्त करने के लिए मान्य है।

वैठे-ठाले लोग अग्निमान्द्य से ग्रस्त होकर अविराम रूप से रुग्ण का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है— १ श्रोत्रिय (वैदिक ब्राह्मण), २ राजा का नौकर, ३. वेश्या और ४ दूकानदार, ये चार सदा रोगी रहते हैं, वयोकि श्रोत्रिय लोग अध्ययन, व्रतपालन, नित्यकर्म, यज्ञ-हवन आदि मे सलग्न रहने के कारण शरीर के हित का चिन्तन नहीं कर पाते हैं। राजसेवक सदैव राजा या स्वामी के अनुकूल आचरण करने में संलग्न रहने के कारण स्वय के देह का हित-चिन्तन नहीं करता है। वेश्याय दूसरों की इच्छा के अनुकूल अपने को सजाने सवारने में और उन्हें प्रसन्न करने में तल्लीन रहने से अपने शरीर के स्वास्थ्य के विषय में नहीं सोचती हैं और विणक विक्री खरीद के लोग में लगातार वैठे रह जाते हैं तथा अपने देह के हित की क्रियाओं के प्रति असावधान रहने से रोगी वन जाते हैं। इस प्रकार ये चार तरह के लोग सदा आतुर (रोगी) होते हैं।

अग्नि को समृद्ध बनाने के उपायों में ज्यायाम का स्थान प्रथम है, क्यों कि ज्यायाम करने से शरीर में हलकापन होता है, किसी कमें के करने में उत्साह और सामध्यें होता है, शरीर में स्थिरता तथा कष्ट सहन की शक्ति आती है। दोषप्रकीप का नाश और अग्नि की वृद्धि होती है। चरक, सुश्रुत तथा वाग्मट आदि ने ज्यायाम की अनिवाय उपयोगिता का विशेष वर्णन किया है।

सदातुरा श्रीत्रियराजसेवकास्तथैव वेदया सह पण्यजीविभि ॥
 द्विजो हि वेदाध्ययनव्रताहिकक्रियादिभिदेहिहितं न चेष्टते ।
 नृपोपसेवी नृपचित्तरक्षणात परानुरोधाद्वद्वचिन्तनाद्वयात ॥
 नृचित्तवर्तिन्युपचारतत्परा सृजाविभूषानिरता पणात्रना ।
 सदाऽऽसनादत्यनुबन्धविक्रयक्षयदिलोभादिष पण्यजीविन ॥ च० सि० ११।२७ २९

२ (क) लावनं कर्मसामध्ये स्थैये दु खसिष्ट्याता । दोबक्षयोऽग्निनृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ च० स.० ७।३२ '

⁽स) दीप्ताश्नित्वमनालस्य स्थिरत्व लाघवं मृजा । शमकलमिपासोष्णशीतादीनां सिंहण्युता । आरोग्यं चापि परम भ्यायामादुपनायते ॥ स्र० चि० २४।३९-४०

⁽ग) अंट इ० स्० रा१०

जब भी भूख लगे वही भोजन का काल है, इसलिए भूख लगने पर भोजन कर लेना चाहिए।

अजीणं की स्थिति मे भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। दुर्वेल और अग्निमान्द्य वाले को अग्नि की दीप्ति के लिए चौबीस घण्टे में एक बार अन्न खाने को देना चाहिए। र

आचार्यं चरक ने भोजन सम्बन्धी विशिष्ट नियमो को 'आहारविधि विशेषायतन' कहा है और भोजन के सम्बन्ध मे उनका विचार करना आवश्यक वतलाया है।

इसके अलावे आहार-विधि-विधान में यह कहा गया है, कि भोजन गरम होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, अपनी पाचनशक्ति के उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए, गनपसन्द स्थान में मनपसन्द आहार पदार्थ को बहुत जल्दी या बहुत विलम्ब कर नहीं खाना चाहिए, खाते हुए हँसना या बोलना ठीक नहीं है और सबसे अधिक ध्यान देने की बात है, कि भोजन करते समय मन को खाने में ही लगाना चाहिए तथा अपनी रुचि आदि के अनुरूप ही भोजन करना चाहिए।

अग्निमान्य मे उष्ण जल पीना चाहिए, वयोकि वह अग्नि को प्रदीप्त करता है, तथा कफ, मेदोदोप और वातप्रकोप तथा कास-श्वासनाशक है।

अजीर्ण

(Indigestion)

परिचय

खाये हुए भोजन का ठीक ढग से न पचना 'अजीणं' है। जठराग्नि की मन्दता से भोजन का परिपाक नहीं होता है और इस भोजन की अपिंपविवता को अजीणं कहा जाता है। होता यह है कि भोजन जब नहीं पचता तो उस अपविव अप्रपान को आम कहते हैं। एक तरह से अजीणं आम का पर्याय है। इस आम (अध-फचरे) आहारपाक से बहुत कम मात्रा में अग्नरस का निर्माण होता है और अधिक अस में किट्ट बन जाता है तथा किट्ट से वायु की वृद्धि होने से पाचन-प्रणाली की

भी नस्य फाल गुनयो युमुश्वा पदन्ति तृष्णामि पानकालम् । वास्य० भो० कल्प २०

र. ए हकार भवेदेयी द्वलान्तिविष्द्वये । मु० उ० ६४।६२

१. अष्टी मन्त्रिमान्यादारविधिविदीवायननानि भवन्ति, सपथा—प्रकृतिकरणस्योगराशिदेश-कालीपयोगसंरभोषयोगयष्टमानि । च० वि० १।२१

४ रणी, रिनम्प, मात्रावस्, जीणी, बीबीविरुद्धम्, इष्टे देशे, प्रवस्तीदगरण, नातिवृतः, नाडि-विजीवनम्, जनपुर, प्रसम्, तनम्मा भुजीतः, आरपानविनमीक्ष्य सम्वत्। जलावन १०४४

५ वयानेदोइनिमाधार्त दीवनं वितिद्योधनम् ।

र्थ सम्मानकारहर प्रथम्भीत्व सदा ॥ मृ० स० ४५।३०

६ सनिवस्तवार्धस्त्रमा देन तो रस म निवस्तर । रोगानी भगवा हेन्न सद्देगसामसंदया ॥

अग्रिम गतिविधियों भी अस्त-न्यस्त हो जाती हैं। जब अन्नरस से रसादि धातुओं का निर्माण होता है, तो वहाँ भी आकर वह अन्नरस धातुओं के किट्टस्वरूप कफ तथा पित्त की बृद्धि करता है। इस तरह अजीर्ण अथवा आमदोपों को प्रकृपित कर वढा देते हैं। इसलिए अजीर्ण रोगसमूह का मूल कहा गया है।

अजीणें, जीणें का अभाव है, उसे जानने के लिए जीणें का लक्षण जानना आवश्यक है—

हकार का विकाररिहत आना (अर्थात् कच्ची हकार या अम्ल आदि विकृत हकार न आना) दारीर और मन में सबलता तथा कार्यं करने का उत्साह होना, मल-मूत्र का त्याग वेगसिहत और यथोचित रूप से होना, दारीर में और विशेषकर कोष्ठ में हलकापन प्रतीत होना और भूख-प्यास का यथासमय अनुभव होना, ये जीर्णाहार के लक्षण होते हैं।

जब अजीणं होता है, तब मन अप्रसन्न रहता है, मुख मिलन और धूमिल होता है, धरीर तथा कोष्ठ में भारीपन होता है, कोष्ठ में जकडाहट होती है, चक्कर आता है, बायु की गित अवरुद्ध या विलोम हो जाती है, मल का विबन्ध होना अथवा मल की अति प्रवृत्ति होना, ये सब लक्षण होते हैं।

अजीणं का निदान

- १. उपवास करना।
- २ मजीणं होने पर भी भोजन करना।
- ३. अधिक भोजन करना।
- ४. कभी अधिक, कभी अल्प तथा अनियमित भोजन करना।
- ५. प्रकृति देश-काल के विषरीत असातम्य भोजन करना।
- ६ अतिगुरु भोजन करना।
- ७, अतिशीव भोजन करना।
- ८ अतिरूक्ष भोजन करना।
- ९ संयोग, मात्रा आदि के विरुद्ध भोजन करना।
- १०. वमन का हीन, मिथ्या या अतियोग होना।
- ११ विरेचन का हीन, मिण्या या अतियोग होना।
- **५२ स्नेहपान का सम्यक् योग न होना ।**
- १३ देश-विषम आहार होना।

१. अनारमवन्त पशुवद्भुं अते येऽभमाणत । रोगानीकस्य ते मूलमजीर्ण प्राप्तुवन्ति हि ॥ मा० नि०

२ उद्गारशुद्धिरुत्साही वेगोत्सर्गो यथीचित । लघुता धुरिवपामा च जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥ मा० नि०

३ ग्लानिगौरवविष्टमभ्रममारुतमूढता । विवन्थो वा प्रश्नुत्तिर्वा सामान्याजीणैलक्षणम् ॥ मा० नि०

```
१४ कालविषम आहार होना।
```

- १५ ऋत्विषम आहार होना ।
- १६ मत-मुत्रादि वेगो को रोकना ।
- १ । वटायं या जल का अधिक पीता ।
- १८ में मोना।
- १९. रात में जागरण करना ।
- २०. कप्टप्रद शय्या का होना ।
- २१ ईप्या करना।
- २२. गग याना ।
- २३ क्रोध करना।
- २४ लोभ करना।
- २५ रोगपीछित होना ।
- २६ गन मे दीनता का भाव होना।
- २७ द्वेप होना। र
- २८ निन्ताग्रस्त होना ।
- २९ शोगातुर हो गा।

इत्यादि शारीरिक तथा मानस कारणो से अजीण हो जाता है और किये हुए भोजन का सम्यक् पाक नहीं हो पाता है।

अजीर्ण के सामान्य लक्षण

- १ मल या अन्न का कोष्ठ में कका रहना।
- २ मल-विबन्ध या मल की अतिप्रवृत्ति होना ।

८ शिर'शूल होना।

९. मूच्छी होना ।

१०-११ पृष्ठ और कटि मे जकडन।

१२ जम्भाई आना।

१३. अगो मे वेदना होना।

१४-१५ प्यास लगना तथा ज्वर होना।

१६ वमन होना।

१७ वार-वार शीच लगना।

'१८ भोजन मे अरुचि होना।

१९ भोजन का पर्चना आदि लक्षण अजीर्ण के सूचक होते हैं।

अन्नविष के लक्षण

नहीं पचे हुए अन्न को अन्निविप कहा गया है। यह भयकर आमिवप है। यह अजीर्ण का एक स्वतन्त्र ही प्रकार है। यह जिस घातु या मल या दोप से सयुक्त होता है, उसी के अनुसार लक्षणों को प्रकट करता है। जैसे—

पित्तसमृष्ट अन्नविष-यह दाह, प्यास, मुख के रोग, अम्लपित्त और अन्य पित्तज रोगो को उत्पन्न करता है।

कफससृष्ट अन्नविष-यह राजयक्ष्मा, पीनस, प्रमेह तथा कफज रोगो को उत्पन्न करता है।

वातससृष्ट अन्नविष-यह अनेक चातज रोगो को उत्पन्न करता है।

मूत्रससृष्ट अन्नविष --यह मूत्राशय मे पहुँच कर मूत्र सम्बन्धी विकार उत्पन्न
करता है।

मलसमृष्ट अम्नविष—यह अनेक प्रकार के उदर रोगो को उत्पन्न करता है। रस-रक्तादि धातुसमृष्ट अम्नविष—यह रमादिगत अनेक रोगो को उत्पन्न करता है।

१. (क) विवन्धोऽतिप्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारतमूदना । अजीर्णेलिद्वं सामान्यं विष्टम्भो गौरवं अम ॥ अ० ६० स्० ८

(ख) तस्य छिद्ममजीणस्य विष्टम्भ सदर्न तथा। शिरसो रुक् च मूच्छी च श्रम पृष्ठकटियह ॥ जुम्भाऽद्गमदैस्तृष्णा च ज्वरश्छिदै प्रवाहणम् । अरोचकोऽविषाकश्च ॥ च० चि० १५।४५-४६

धोरमन्नविषं च तत्।
संस्वयमानं पित्तेन दाहं तृष्णा मुखामयान् ॥
जनयस्यम्छपितं च पित्तजांश्चापरान् गदान् ।
यहमपीनसमेहादीन् कफजान् कफसन्नतम् ॥
करोति वातसंस्रष्ट वानजांश्चापरान् गदान् ।
मूत्ररोगांश्च मूत्रस्थं कुक्षिरोगान् शक्कद् गतम् ॥
रसादिमिश्च संस्रष्टं कुर्याद् रोगान् रसादिजान् ॥ च० चि० १५।४७-४९

अजीणं की संप्राप्ति

जब आहार-विहार तथा मानसिक कारणो से जठराग्नि मन्द हो जाती है, तो आहार का सम्यक् पाचन नही होता और अजीणं हो जाता है। अजीणं रोग का कारण कफ और वातदोव की वृद्धि है। कफ की वृद्धि होने पर पाचक रसो के साथ जलाश की अधिकता के कारण उनकी पाचन-क्षमता घट जाने पर आहार का पाक न होने से अजीणं हो जाता है।

अजीणं के भेदो की अलग-अलग सप्राप्ति-

9 आमाजीजं — कफ के प्रशाव से मां अर्थ को प्राप्त आमादायगत अस को आमा-जीजं कहते है। कफ की अधिकता होने पर आमाजीजं होता है। जब कफ की बृद्धि होती है, तो आमाश्यिक बरूटक कफ की भी वृद्धि हो जाती है तथा उसके जलीयाश की वृद्धि से आमाश्यिक अम्लरस का नाव अल्प एव दुवंल होता है। क्षारीय स्नाव भी अल्प तथा दुवंल होते है। इस प्रकार रमों का सन्तुलन ठीक न होने से अस का सम्यक् पाक नहीं होता। एवन्च कफ का अधिक मिश्रण होने कारण अस के अविपक्य रह जाने में आमाजीजं की उत्पत्ति होती है।

२. विदरधाजीणं—पित्त के कारण अम्लता को प्राप्त आहारभूत अन्न विदरधाजीणं कहलाता है। जब पित्त का सजातीय अम्लरम अधिक स्रवित होता है और क्षारीय विस्ताब अपेक्षाकृत कम होता है। तो आहार का सम्यक् पाक न होने से उसके अर्ध-पक्व होने पर विदरधाजीणं की उत्पत्ति होती है।

३ विष्टव्धाजीण-वायु की वृद्धि होने पर मभी सावों की कमी और उनकी अव्यवस्थित मात्रा होने से अन्न का परिपाक कुछ ही अश में होता है और उदर में सूई चुभाने जैमी पीडा तथा शूल होता है एव वायु की हकावट होती है। अन्न कुछ समय हककर पचता है, जिससे पेट में आवाज होती है, गैस वनती है और शौच का झूठा वेग अनेकश अनुभूत होता है, इस स्थित को विष्टव्धाजीण कहते हैं।

४ रसशेषाजीणं³—आचायं जेज्जट ने रमशेप का 'रसाय शेष. रसशेप' यह विग्रह किया है। 'रस' शब्द से 'रस का आश्रय द्रव्य' लिया जाता है। जिससे यह अभिप्राय प्रकट होता है कि 'आहारद्रव्य के अधिकाश भाग का पाचन हो जाने पर भी कुछ अश का अपाचित रह जाना 'रसशेपाजीणं' है। आचायं गदाधर ने 'रसे शेप रसशेप' यह विग्रह किया है और उनके अनुमार—आहारजनित रस के अन्दर आहार के अपरिपक्व अश का रह जाना 'रसशेपाजीणं' है।

इस अजीर्ण की विशेषना यह है कि डकार शुद्ध आने पर भी भोजन करने की

१ माधुर्यमन्नं गतमामस्म विदग्धसंत्रं गतमम्लमावस् । किञ्चिद् विपक्व मृशतोदशुलं विष्टब्धमानद्धनिरुद्धवातस् ॥ सु० स्० ४६।५०९

२. वद्गार शुद्धाविष मक्तकाब्झा न जायते हृद्गुरुता च यस्य । रसावशेषेण तु सप्रसेकं चतुर्थमेतत् प्रवदन्त्यजीर्णम् ॥ सु० स्० ४६।५०३

इच्छा नहीं होती है, छाती और उदर प्रदेश में भारीपन मालूम होता है तथा मुख से लार टपकता रहता है।


५ विनपाकी अजीर्ण—स्वाभाविक स्वस्थता मे भोजन का पूर्ण पाक एक अहो-रात्र (२४ घण्टे) मे होता है, किन्तु अधिक मात्रा मे भोजन करने से, असमय मे भोजन करने से अथवा सारम्य के विपरीत भोजन करने से उसका परिपाक निश्चित समय मे न होकर अगले दिन होता है, उसे 'दिनपाकी अजीर्ण' कहते है।

इस कथन का तात्पर्य यह है, कि जब तक पूर्व का आहार न पच जाये, तव तक पुन भोजन नहीं करना चाहिए।

६ प्राकृत अजीर्ण — भोजन करने के प्रश्चात् जब तक वह पच नही जाता है, तब तक अपरिपक्व आहार अजीर्ण की स्थिति मे रहता है, वही 'दिनपाकी अजीर्ण' कहलाता है। यह रोगजनक नही है अपितु स्वाभाविक है, जो सबको ही रहता है। इस प्रकार प्राकृत रूप मे सब मे पाये जाने के कारण इसे 'प्राकृत अजीर्ण' कहते हैं।


इस प्रकार अजीर्ण के आठ भेद कहे गये हैं---

१. आमाजीणं २. विदंधाजीणं ३ विष्टव्धाजीणं ४ रसशेषाजीणं ५ दिनपाकी अजीणं ६ प्राकृत अजीणं ७. अन्नविष अजीणं और ८ लीन आम ।



८ लोन आमाजीणं—कभी-कभी अजीणरिम्भक दोष से युक्त आम (अपन्व अन्न) अति अल्प होता है और वह लीन होता है, वह दोषान्वित आम जठराग्नि के मागं को आच्छन्न नहीं कर पाता, तब अजीणं होने पर भी (झूठी) भूख लगी रहती है। जिसके परिणामस्वरूप मन्दबुद्धि पुरुष प्रज्ञापराध्यवश अन्नपान का सेवन करता है, इससे आम की वृद्धि होकर आम विष-सदृश हो जाता है और वह लीन आम विष के समान मारक हो जाता है।

सामान्य संप्राप्ति-



श्वलप यदा दोपनिवद्धमाम लीन न तेन पथमांवृणोति ।
 भवत्यनीर्णेऽपि तदा बुमुक्षा सा मन्दनुर्द्धि निषनित्रहन्ति ॥ सु० स्० ४६।५२०

(२) निदान

कफवृद्धि--आमाशेयिक पाक का मधुरीभाव

। अग्निमान्द्य | आमाजीणं

(३) निदान

पित्तह्नास-क्षुद्रान्त या ग्रहणी मे आहार का अम्लविपाक

| अग्निमान्ध | विदग्धाजीणं

(४) निदान

वातवृद्धि-पदवाशय मे आहार का कद्वािशक

| अग्निमान्स ' | विष्टब्धाञीणं

दोष-दूष्य-अधिष्ठान— दोष—कफप्रधान त्रिदोष, पित्तोष्मा का ह्रास । दूष्य-जठराग्नि, रस । अधिष्ठान—अन्नवहस्रोतस, आमाशय, पक्याशय ।

अजीर्ण के विशेष लक्षण

आमाजीर्ण मे—१ शरीरगुरुता २. वमनेच्छा ३ कपोलशोथ ४ अक्षिक्तटशोथ ५ भोजन के अनुसार अविदग्व डकार आना, वे लक्षण होते हैं।

विदग्धाजीणं मे—१ चनकर आना २ तृष्णा ३ मूच्छा ४ ओप-चोप मादि ५ सधूम अम्ल डकार ६. स्वेद और ७ दाह, ये लक्षण होते हैं।

विष्टन्धाजीणं मे—१ शूल, २ आध्मान ३ विविध वात वेदना ४ मलावरोध ५. अधोवायु न निकला ६ स्तन्धता ७ मूच्छी ८ अगो मे पीडा होना, ये लक्षण होते हैं।

१ तत्रामे गुन्तीत्मलेद शोथो गण्टाश्चिक्टगः। चटगारश्च यथामुक्तमितृरथ प्रवर्तते ॥ विदय्धे अमृतृण्मूच्छां पित्ताच्च विविधा रुज । चदगारश्च सधूमाम्ल स्वेदो दाहश्च जायते ॥ विष्टच्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदना । मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽद्गपीडनम् ॥ रसशेपेऽञ्जविद्देशो हृदयाशुद्धिगीरवे । मा० नि० मजीणं

रसरोषाजीणं में—१ अन्न से द्वेष (अरुचि) २. हृदगौरव और ३. हृदयाशुद्धि ये लक्षण होते हैं।

अजीर्ण के उपद्रव⁹

मूच्छी, प्रलाप, मुख से पानी छूटना, वमन की प्रवृत्ति होना, अगों में यकावट होना और शिर में चक्कर आना, ये अजीर्ण के उपद्रव होते हैं। अतिप्रवृद्ध अजीर्ण में मृत्यु भी हो सकती है।

गणनाथ सेन जी ने भ्रम, मूर्च्छा, ज्वर, वमन, शूल, अलसक और अतिसार होना, इन सातो को अजीर्ण का उपद्रव बतलाया है।

अनीर्ण का दीर्घकालिक उपद्रवर

'आमदोष' शरीर के जिस भाग में रहता है, वहाँ स्थित दोषों के ससर्ग से अनेकिवध रोगों से पीडित करता है। आम दो प्रकार का होता है— १ आम अस और २. आमरस। आम अस से महास्रोतगत 'विसूचिका' आदि रोग होते हैं तथा आमरस से 'आमवात' आदि सर्वेशरीरव्यापी रोग होते हैं।

विदग्दाजीणं और अम्लपिस का सापेक्षं निदान

विदग्धाजीर्ण अम्लिपत्त 3 १ केवल पित्तज विकार १ वात-कफानुगत पित्तप्रधान व्याधि २ तिक्त + अम्ल उदगार २. सधूम-अम्ल उद्गार ३. सभाव्य है ३ हत्कण्ठदाह ४ हो सकता है ४. उत्मलेश ५ आवश्यक नही ५ अधोग प्रवृत्ति ६ अरुचि ६ अरुचि ७ अविपाक ७. अविपाक ८ हो सकता है ८ भ्रम ९. सम्भावित ९. तृष्णा ९०. सम्भावित १० मुच्छी ११ गौरव 99. X 97. X १२ कम्प आदि

मूच्छा प्रलापो वसशु प्रसेक सदनं म्रम ।
 उपद्रवा भवन्त्येते मरण चाप्यजीर्णतः ॥ द्यु० स्० ४६

२ भ्रमो मोहो न्नर्बर्छादं. शूल्झालसकस्तथा। अतीसारश्च सप्तेते अजीर्णोपद्रवा स्पृता ॥ सि० नि०

३, अविपाकक्लमोत्क्लेशितक्ताम्लोद्गारगौरवै. ।
इत्कण्ठदाहारुचिमिश्चाम्लपितं वर्देद् भिषक् ॥ मा० नि०

चिकित्सा-सूत्र

(१) आमाजीर्ण मे---

प. सामान्यत सामजन्य सभी विकारो मे अपतर्पण अर्थात् उपवास कराना या लघु भोजन देना उपयुक्त होता है।

२ उक्त अपतर्पण का अच्छी तरह विचार कर तीन प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आमदोप—१ अल्प, २ मध्य और ३ तीव्र भेद से तीन तरह का होता, है। जैसे—

३ यदि आमदोष स्वल्प हो, तो उपवास पथ्य (हितकर) है।

४ यदि आमदोष मध्य हो, तो उपवास के साथ-साथ पाचन औपध भी खिलानी चाहिए।

५ यदि आमदोष तीत्र हो, तो वमन और विरेचन से सशोधन करना चाि्ए। शोधन मलो का मूल से उन्मूलन करता है।

(२) विदग्धाजीणं मे-

१ वमन कराकर दोष-शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा विकृत अम्लरस शरीर मे
रहकर कुष्ठ आदि उत्पन्न करता है।

२. अपक्व भुक्तान्न के पाचनार्थ कितपय आचार्यों ने 'लघन' का उपदेश किया है।

३. 'कीतल जल' पिलाना चाहिए। वार-वार थोडी मात्रा मे जल पिलाते रहने से विदग्ध अन्न का परिपाक हो जाता है। जल अपने क्षीत गुण से उप्णगुणयुक्त पित्त का शमन करता है और द्रव गुण के कारण पित्त के 'सर' गुण में सहयोग देकर पित्त को नीचे मलमागं की ओर ले जाता है।

(३) विष्टब्धाजीणं मे-

 वायु का प्रकोप होता है, अत वायु के अनुलोमन का प्रयत्न करना श्रेयस्कर होता है। जैसे—

२. हाट वाटर वैग मे गरम जल भरकर उदर प्रदेश का स्वेदन करना चाहिए या बोतल मे गरम पानी भरकर मजबूत काग और ढक्कन लगाकर पेट का 'स्वेदन' करना चाहिए। भ

२ (कृ) विदन्धे वमन यदा लहुनं शिशिरोदकम्।

(ख) विदम्धे वमन यदा यथावस्थ हितं भुजेत् । अ० ह० स० ८।२७

३ अन्नं विदग्धं हि नरस्य शीन्न शीताम्बुना वै परिपाकमेति । तद्ध्यस्य शैत्येन निहन्ति पित्तम् आक्लेदिभावाच नयत्यथस्ताह् ॥ सु० सू० ४६।५१०

४ (क) विष्टम्धे स्वेदन मृज्ञम् । स० ६० स० ८।२७

(ख) विष्टब्धे स्वेदनं वर्त्यों लवणोष्णाम्ब शस्यते । खरनाद

शान्तिरामिवकाराणां भवति त्वपतर्पणात् ॥
 त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्त्तमीक्ष्य प्रयोजयेत ।
 तत्राल्पे छङ्गन पथ्य, मध्ये छङ्गनपाचनम् ॥
 प्रभृते शोधनं तद्धि मूळादुन्मूळयेन्मळान् । स० ६० ६० ८।२०–२२

- ३. दिन मे रोगी को सुलाना चाहिए।
- ४ अवरुद्ध वायु को प्रवृत्त कराने के लिए गुदवित लगावे।
- ५. गरम जल मे नमक मिलाकर पिलाना चाहिए।
- (४) रसशेषाजीणं मे ---
- १ रोगी को पूर्ण विश्वाम के साथ शयन कराने चाहिए।
- २ उदर-प्रदेश पर स्वेदन कराना चाहिए ।
- ३. पाचन द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए।
- ४ लघन करावे।

वक्तव्य—जब आमदोष से अग्नि मन्द हो गई होती है तो वह दोष, औषध और भोजन को पचाने मे समर्थ नहीं होती। इमिलए अजीणीं को भीषण वेदना होने पर भी शूलघ्न औषघ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका पाचन तो होता नहीं है, उल्टे वह अपक्व रहकर आम की वृद्धि ही करती है और उसका उपद्रव रोगी को मार सकता है²।

चिकित्सा-मुत्र

१ सभी तरह के अजीणों मे सोठ, मरिच, पीपर समभाग मे लेकर चटनी की तरह बारीक पीस ले और एक द्रव्य के अज्दमाश हीग तथा सेंघानमक मिलाकर पुन पीसकर सुखोष्ण कर उदर पर लेप कर रोगी को शान्त स्थान में सुखद शय्या पर सुलाना चाहिए।

२. दीपन-पाचन औषघो का प्रयोग करे और हलका भोजन दे।

३ यदि भोजन करना हो, तो भोजन के तुरन्त पूर्व आईक की पतली कतरन में जम्बीर रस या कागजी नीवू का रस, सँघानमक, लह्सुन के टुकडे, हरी धनिया की पत्ती, भूनी हीग और भूने जीरे का चूर्ण रुचि के अनुसार मिलाकर खाना चाहिए।

४ यदि लघन करना हो, तब आदंक और नमक चूसना चाहिए। इसी प्रकार यवानीपाडव चूर्ण या लवणभास्कर थोडी मात्रा मे चूसना चाहिए। इससे रुचि, आम-पाचन और अग्नि का दीपन होता है।

५. पीवर, भुनी छोटी हरें और सोठ के समभाग चूर्ण मे पचमाश सेंधानमक मिलाकर खाने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा अपक्व अन्न का पाचन होता है।

६ उपवास के वाद जब भोजन करना अभीष्ट हो तो रोगी की रुचि का घ्यान रखते हुए नमकीन मे मूग का यूष, परवल, करेला, आवला, आईक आदि तथा मधुर में मण्ड, पेया, धान के लावा का लाजमण्ड, वार्ली आदि देना चाहिए।

१ (क) रसशेषे दिवास्वाप लहुन वातवर्जनम् । यो० र०

⁽ख) रसशेषे शयीत च। भा० प्र०

२ आमदोपदुर्वं हो हि अग्नि नयुगपद् दोषमौपधमाहारजात च शक्त पनतुम्। गपि च आमप्रदोप षाहार-भौपधिवभ्रमोऽतिबल्स्वात् उपरतकायार्गिन सहसा प्यातुरमबल्मितपातयेत् । च० वि० अ० २

७ यदि प्रात काल में अजीव की आशका हो, तो पुछ देर और सोना चाहिए अथवा भुनी छोटी हरें का चूर्ण और सोठ मा चूर्ण २-२ ग्राम तथा १ ग्राम सेंधानमक मिलाकर ठण्डे जल से साना चाहिए।

अजोर्जनाशक प्रमुख औपघयोग

चूर्ण-पयादि चूर्णं, सामुदादि चूर्णं, हिंग्वादि चूर्णं, हिंग्वष्टक चूर्णं, वैश्वानर चूर्णं, अन्तिमुख चूर्णं, लवणभारकर, हिंगुद्धिष्ठत्तरादि चूर्णं, समझकर चूर्णं, अविपत्ति-कर चूर्णं, शिवाक्षार-पानन चूर्णं ।

यटी — विनितुण्ही यटी, आरोग्यविधनी यटी, चित्रकादि यटी, हिम्बादि यटी चरा वटी, संजीवनी यटी, भक्तविषाक यटी, रसोनादि यटी।

रस-रसावन—अग्निमुमार रस, पाधुपत रम, क्रव्याद रम, हुताशन रस, अजी-णीरि रस, बादित्व रस, अजीपं मण्डम रस, धुप्रामागर रम ।

घृत—अग्नि एन, मस्तुवट्पल एत, वृह्द् अग्नि एर । आसव-अरिपट—गुमार्यागव, लोहासव, द्राक्षागव, कर्पूरागव ।

लाक्षणिक चिकित्सा

- (१) आमाजोर्ण मे औवध-प्रयोग --
- 9. यच का चूर्ण और सेंघानमक उत्तित मात्रा में घोलकर विछायर यमन कराना चाहिए। अयया—
- २ पीपर, यच और सेंधानगण का पूर्ण यथायोग्य माना मे कीतल जल में मिलाकर पिलाना चाहिए।
- ३. घनिया और सोठ १५-१५ ग्राम, १ लीटर जल में पकावे, जब भाधा बचे तो छानकर योटा-योटा पिलाना चाहिए।
- ४. यदि प्रात काल सो कर उठने पर अजीणं का अनुभव हो, तो हरीतकी चूणं ३ ग्राम, सोठ का चूणं २ ग्राम और सेन्धानमक १ ग्राम मिश्रित कर ठढे जल से पिला देना चाहिए। फिर भोजनकाल में हलका और अस्पमात्रा में भोजन देना चाहिए।

व्यवस्या-पत्र

१. प्रात -साय

अजीणंकण्टक रस ३०० मि० ग्रा० शखभस्म ३०० मि० ग्रा० अग्नितुण्डी वटी ३०० मि० ग्रा० शितोपलादि चूर्ण २ ग्राम योग—२ मात्रा

मध् से।

١

२ मोजन के तुरन्त पूर्व २ वार हिंग्वादि या रसोनादि वटी २ गोली चूसकर खाना।

३. भोजन के बाद २ बार चित्रकादि वटी २ गोली अथवा विडलवणादि वटी २ गोली या भास्करलवण २ ग्राम जल से।

४ रात में सोते समय वैश्वानर चूर्ण<u>ें ५ ग्रा</u>म १ मात्रा

उष्णोदक से।

(२) विवग्धाजीणं चिकित्सा-

9 वार-वार, थोडी थोडी मात्रा में शीतल जल पीने से अर्धपक्व भोजन का शीघ्र ही पाक हो जाता है। क्योंकि जल के योग से पित्त की दवता की वृद्धि होती है, जिससे अन्न की गति-सुदान्त्र एवं पक्वाशय की ओर हो जाती है।

२ यदि रोगी को भोजन के बाद उदर मे विदाह हो रहा हो, तो हरीतकी चूण, मृनक्का और मिश्री समभाग लेकर मधु मिलाकर चाटना चाहिए।

३. यवानीपाडव चूर्ण ३-३ ग्राम चूसकर खाने से विदाह शान्त हो जाता है।

व्यवस्था-पत्र

१ प्रात , सार्य, मध्याह्न अविपत्तिकर त्रूणं ६ ग्राम अथवा— शतपत्र्यादि चूणं ६ ग्राम प्रवाल भस्म ३०० मि० ग्रा० मुक्ताशुक्ति ३०० मि० ग्रा० योग—३ मात्रा

चीनी मिले नीवू के जल से।

२ भोजनोत्तर २ बार
महाशस वटी ४ गोली
अष्टाङ्ग लवण २ ग्राम
जल से । योग–२ मात्रा

३ रात मे सोते समय प्रव्यादि चूर्ण ३ ग्राम उडणोदक से । १ मात्रा

(३) विष्टक्याबीचं चिक्तिसा---

९ प्राव , माप , मध्या द् अनिमुख पूर्व - ४ दान हिम्मदि वरी - ४ क्टी

उप्लोदर में। मोग-६ मात्रा

२. भोदा के पूर्व

३. भोजनोत्तर

नामुद्रादि पूण ६ प्राम लपवा— चित्रकादि वटी ४ गी० जल से । योग २ मात्रा

४ रात में सोते ममय आरोग्यविधनी १ ग्राम गरम जल से । १ मात्रा

(४) रसशेयाजीणं चिकित्सा-

१ रोगी उदर पर होग, सोठ, पोपर, मर्ति और सँघानमक पीसगर प्रलेपकर, दिन में शयन करे।

२ बाहार में थोडी मात्रा मे दूध और रोटी खाने को देना चाहिए। ३ रोगी को पूर्ण विश्राम की सलाह देनी चाहिए।

व्यवस्था-पत्र

१. प्रात -साय

मण्डूर भस्म १ ग्राम
श्वासस्म ४०० मि० ग्रा०
श्रिफला चूणं ४ ग्राम
मधु से। योग—२ मात्रा
२ भोजनोत्तर
गन्धक वटी ४ गोली
जल से। २ मात्रा

€.

३ भोजन के पूर्व

यवानीपाइव ६ ग्राम

२ मात्रा

बिना अनुपान।

अजीर्ण मे पथ्य

अनेक प्रकार के ज्यायाम, अग्निदीनक छुपुँ आहार तथा कटु एव तिक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। पुराना अगहनी चावल, मूग का यूष, लाजमण्ड, बथुआ, कच्ची मूली, सहिजन, परवर, आँवला, आर्द्रक, अजवाइन, कालीमिर्च, मेथी, धनिया, जीरा, गरम जल, सुरा, हिरण, मोर, शशक, लवा, छोटी मछली, घी, नीवू, विजीरा नीवू आदि पथ्य हैं।

अपृथ्य

तीक्ष्ण विरेचन, मल-मूत्र एव अपानवायु का रोकना, अध्यक्षन, समज्ञन, विषमा-ज्ञन, रक्तनिहॅंरण, सेम, मटर, मास, अधिक जल् पीना, आलू, जामुन, असात्म्य अन्नपान, गुरुद्रव्य, विष्टम्भी द्रव्य, दूषित जल और विरुद्ध आहार आदि अपथ्य हैं।

नवम अध्याय

विद्यचिका, अलसक, विलम्बिका, आनाह, आध्मान, प्रत्याध्मान तथा आटोप

विसूचिका (Cholera) परिचय

इसे विसूची, विसूचिका, काठातिसार, हैजा और कॉलरा कहते हैं। इसमे चावल के घोवन के रग का सफेद पतला दस्त बिना किसी आयास के आने लगता है और हाय-पैर की पेशियों में ऐठन, पिपासा, भ्रम तथा मूत्राघात आदि लक्षण होते हैं।

चरकाचार्यं ने ऊपर की और मुखमार्गं से वमन के रूप में और नीचे गुदामार्गं से विरेचन (अतिसार) के रूप में प्रवृत्त आमदोप को 'विसूचिका' कहा है और उसे वात-पित्त-कफ इन तीनो दोषों के लक्षणों से युक्त वतलाया है।

निदान -

जिन-जिन कारणों से अजीण होता है, वे सभी कारण विसूचिका के भी जनक होते हैं। जो व्यक्ति अपने ऊपर नियन्त्रण नहीं रखते हैं और मूर्खतावश अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, वे विसूचिका से ग्रस्त होते है, विश्विक उनका भोजन नहीं पचता है, जो आम रहकर वातादि तीनो दोगों को प्रकुषित करता है। इसी प्रकार गुरु, रूक्ष, शीत, शुक्क, अप्रिय, कव्जकारक, विदाही, अपवित्र एव विरुद्ध अन्नपान का अकार में सेवन करना भी आमदीप को उत्पन्न करता है। एवन्च काम-क्रोध-छोभ-मोह-ईर्ज्या-लज्जा शोक-अभिमान-उद्धेग और भय से विद्धल मन या दु वी मन होकर जो अन्नपान का सेवन किया जाता है, वह भी आमदोपत्पादक होता है तथा चिन्ता-शोक-दु खद शयन और जागरण के कारण हितकर अन्न भी खाने पर नहीं पचता है। सुश्रुत ने भी 'आम' को विद्युनिका का जनक कहा है। 3

१ (क) अनात्मवन्त पशुनद् मुजते येऽप्रमाणत । रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णे प्राप्तुवन्ति हि ॥ मा० नि०

(ख) न ता परिभिताहारा, लभन्ते विदितागमा ।

मूढास्तामजिनातमानो लभन्तेऽशनलोनुपा ॥ सु० ७० ५६

२ न च खलु केवलमित्रमात्रभेवारारराशिमामदीपार्तिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरुरूक्षशीत- । शुष्कदिष्टविष्टम्मिवदाद्यशुनिविरुद्धानामन्नपानानामकाले चीपसेवन, काम क्रीध लोम-मोहेर्ष्या छी शोक मानोद्देग मयोपतप्तमनसा वा यदन्नपानमुपयुज्यते तद्द्याममेव प्रव्यति ।

तथा च-मात्रयाऽप्यभ्यवहृत पथ्य चान्न न जीर्यति ।

चिन्ताशोकमयकोधद खशस्याप्रजागरे ॥ च० वि० २।८-०

३ अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम् ।

विस्च्यलसकौ तस्माद् भवेचापि विलम्बिका ॥ मा० नि०

पचन-सस्थान के जीर्ण विकारों से पीडित व्यक्ति का अनशन, अध्यशन, गुरु भोजन वादि एव आहार का हीनयोग, मिथ्यायोग एव अतियोग करना, मद्यपान करना, बार-बार विरेचनकारक औषधों का प्रयोग करना आदि कारण भी विसूचिका के निदान वन जाते हैं।

साद्रं जलवायु, उष्णता, सानूपदेश, अपर्याप्त वर्षा आदि भी सहकारी कारण है।

सम्प्राप्ति

जब कोई भोजन-लोलूप पुरुष ठोस आहार को भरपेट खाकर, तुरन्त किसी द्रव आहार या पेयद्रव्य को भी आकण्ठ तृप्तिपर्यन्त पी लेता है, तब उस पुरुष के आमाश्य में स्थित वात-पित्त-कफ ये सभी दोष अधिक किये गये भोजन के कारण पींडित होकर एक साथ ही प्रकुपित हो जाते हैं। प्रकुपित हुए दोष कुक्षि (आमाश्य) के एकदेश मे जाकर उस आहार के आश्रित होकर, उम अपक्व आहारराशि को विष्टिम्भित करते (रोकते) हुए अथवा सहसा उस आहार को मुख और गुदा मार्ग से बाहर निकालते हुए विसूचिका रोग को उत्पन्न करते हैं।

नव्यमतानुसार निदान-सम्प्राप्ति

9. इस रोग का प्रमुख कारण एक जीवाणु है, जो अर्घविराम चिह्न (कॉमा,) के समान होता है, अत इसे कॉमा वैसिलस (Coma Bacillus) कहते हैं। जो आहार जीवाणुओ से दूषित एव सर्क्रामत होता है, उस आहार के खाने से विसूचिका की उत्पत्ति होती है। मेलो या भीड-भाडवाले विविध भोज के अवसरो पर खाद्य-पेय सामग्रियो का उचित प्रकार से सरक्षण न करने से मिनखयों के वैठने से वे पदार्थ दूषित हो जाते है। ये जीवाणु रोगी के मल एव वमन मे पर्याप्त सख्या मे रहते हैं और मिन्खयाँ मल एव वमन पर वैठकर फिर खाद्याओं पर भी बैठती है, तो उनके द्वारा जीवाणुओं का खाद्यान्न पर भी सक्रमण हो जाता है तथा उस आहार को ग्रहण करनेवाले व्यक्ति भी रोगाक्रान्त हो जाते हैं।

२ यह रोग अशुद्ध जल वाले स्थान मे फैंजता है, क्यों कि उन दूपित जलाशयों मे इस रोग के कीटाणु शरण पाते हैं। जिन देशो, प्रदेशों या भूभागों में नदी, तालाव, पोखरा एवं कुँआ आदि खुले न्यानों का जल पीने के उपयोग में लिया जाता है, वहाँ पर इस रोग के होने की अधिक सभावना होती है।

३ मेला, युद्ध या भीड भी इस रोग को फैलाने में कारण हैं। जनसमूह वाले स्थान के मल-मूत्रादि के नाशन की उचित व्यवस्था और स्वच्छता न होने से तथा इस रोग के रोगियों के था जाने से यह रोग फैलता है।

४ वातावरण की आईता, जल की अवृष्टि या अत्पवृष्टि भी इसके प्रसारक हैं। ग्रीब्म ऋतु के अन्त और वर्षा के आरम्भ और अन्त मे, वगाल, विहार आदि में अधिकतर विसूचिका हो जाती है।

तत्र मधुकोप 'आमिवष्टक्थविदग्येषु त्रिष् विस्च्यलमकाविलम्बिका यथा सहर्ख्यं भवन्ति' इति कार्तिककुण्ड ।

, ५ सक्रमण—रोगी के मल-मूत्र तथा वमन मे असख्य जीवाणु होते हैं। मल और वमन के ससगं से दूषित खाद्य-पेय पदार्थों द्वारा रोग का प्रसार होता है। मिक्ख्यों मल आदि पर बैठती हैं, जिससे उनके अगो मे जीवाणु लिपट जाते हैं और वही मिक्ख्यों फिर भोजन, जल, दूध, शाक, भाजी आदि खाने-पीने की वस्तुओ पर बैठकर जीवाणुओ को सक्रमित कर देती हैं। इस प्रकार स्वच्छता न रखनेवाले नीरोग मनुष्यो पर इस रोग का सहसा आक्रमण हो जाता है।

यात्रियो द्वारा यह रोग'एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचाया जाता है। इसके जीवाणु वस्त्र पर भी जीवित रह जाते हैं। रोगी के परिचारक मल-मूत्रादि का स्पर्श कर यदि अच्छी तरह हाथ नहीं साफ करते और गन्दे हाथों से भोजन करने लगते हैं, तो जीवाणु उनके उदर में पहुँचकर रोग की उत्पत्ति करते हैं। ये जीवाणु क्वित् (पित्ताशय, उदर्याकला और उदर के अन्य अवयवों में भी प्रवेश कर जाते हैं।

भारतवर्षं मे पर्वो पर तीर्थंस्थानो मे जब लाखो लोग अस्वास्थ्यकर यात्री स्थानो मे इकट्ठा होते हैं, तब वहाँ पर प्राय हैजा उत्पन्न हो जाता है और जब प्रवासी यात्री वहाँ से अपने-अपने गाँव जाते है, तो वे वहाँ रोग का प्रसार करते हैं।

नव्यमतानुसार संप्राप्ति

विसूचिका के जीवाणु अम्ल मे मर जाते हैं और क्षार मे जीवित रहते हैं, इसलिए खाद्य एव पेय पदार्थों के साथ जो जीवाणु आमाशय मे प्रविष्ट होते हैं, वे जठराम्ल से मर जाते हैं। जब आमाशय मे भोजन रहता हैं,तो आमाशयिक रस का अम्लसाव होता रहता हैं, इसीलिए विसूचिका की महामारी के फैलने के दिनों में भूखा नहीं रहना चाहिए, अपितु आमाशय में भोजन का अश रहना चाहिए, जिससे अम्लरस का साव होता रहे और वहाँ पहुँचे हुए जीवाणुओं का सहार हो जाया करे।

जब जठराम्ल कम होना है या बहुत पतला होता है, तब जीवाणु आमाशय से सुदान्त्र मे पहुँचकर वहाँ अपनी सख्यावृद्धि करते हैं, जिससे इनका विष भी बढता जाता है और रक्त मे चूषित होकर पूरे शरीर मे फैल जाता है। अन्त्र मे असख्य जीवाणु मर जाते हैं, जिनके गल जाने से अन्तिविप बनता है। इस विष के स्थानिक प्रभाव से अन्त्र मे प्रसेक उत्पन्न होकर वहुत अधिक मात्रा मे लसीका का स्नाव होने लगता है, जो मल के साथ बाहर निकल जाता है। इससे द्रवापहरण होकर रक्त मे तथा शरीर की अन्य धातुओं में जलीयाश की कमी हो जाती है। इस विप का प्रभाव अन्त्र के अलावे वृक्क, यकृत्, रक्तवाहिनियों एव हृदय आदि पर पडता है। अतएव विसूचिका में हाथ-पैर में ऐंठन, तृषा, अल्पमूत्रता या मूत्राघात, नाडी की क्षीणता और श्वासाधिक्य आदि लक्षण होते हैं। क्षुद्वान्त्र के अन्तिम भाग में रक्ताधिक्य के कारण उसके ऊपर की पर्त छिल जाती है। इस लिली हुई श्लेष्मलकला से शरीर का द्रवाश और लवण अन्त्रों के भीतर आकर मलद्वार से वाहर चले जाते हैं। पत्ताशय में स्थित विप का रक्त में शोपण होता है। यकृत् में रक्ताधिक्य होता है। पित्ताशय में गाढे काले रग का जमा हुआ पित्त रहता है। पित्त के गाढेपन और पित्तवाहिनी

के शोथ के कारण अन्त्र में पित्त का उत्सर्ग नहीं होता और पित्ताभाव के कारण विसूचिका में मल का रंग सफेंद होता है।

वृत्को मे रक्ताधिक्य होता है तथा शोथ होता है। गुच्छ और निलकाओ में कुछ स्नाव भी होता है, निलकाओ में टूटी हुई कोशायें इकट्ठी हो जाती हैं। इस विकृति के कारण वृत्कों में रक्त का सचार ठीक से न होने पर पहले मूत्राधात और वाद में मूत्रविपमयता (Ureamia) उत्पन्न होती है। वमन और अतिसार के होते रहने से रक्त का तरल भाग कम हो जाता है। साधारण विसूचिका में एक तिहाई, तीन्न में आधा और अतितीन्न प्रकार में दो-तिहाई शरीर का जलीयाश नष्ट हो जाता है, जिससे रक्त की गुक्ता (Sp Gravity) स्वाभाविक १०५६ से वढकर १०७८ तक हो जाती है। विप के कारण दुवंल बना हृदय गाढे रक्त को वृत्क तथा अन्य अगो में सचालित करने में असमर्थ होता है, जिससे मूत्राधात और अन्त में हृद्भेद (Cardiac Failure) भी हो जाता है। रोगी के शरीर में जलापूर्ति के लिए लवण-जल तथा क्षारीयता को बढाने के लिए सोडा-वाइ-कार्ब सिरा द्वारा प्रविद्ध किया जाता है।

जलहीनता के कारण फुप्फुस हलके और शुब्क होते हैं। उनकी रक्तवाहिनियों में गाढा काला रक्त भरा रहता है। जो रोगी इस रोग से मरते हैं उनके शरीर का ताप मरणोत्तर बढता है। मृत्यु होते ही प्रेतकाठिन्य प्रारम्भ होकर अधिक देर तक रहता है। मृत्यु होने पर भी प्रेत की आँखों में और हाथ-पैरों में कुछ हल्चल हुआ करनी है। विसूचिका की सारी विकृतियाँ उग्र विषमयता के कारण हुआ करती हैं। मृत्यूत्तर परीक्षण करने पर रोगी के अन्त्र, पेशी आदि सभी अग शुब्क एव सकुचित मिलते हैं।

. लक्षण

मूच्छी, अतिसार, वमन, पिपासा, शूल, भ्रमं, उद्वेष्टन (ऐंठन, जानु से गुल्फ-पर्यन्त सिवयप्रदेश मे मरोड होना), जम्माई आना, दोह, विवर्णता, कम्पन होना और शिर मे फटने जैसी वेदना होना, ये विसूचिका के लक्षण हैं।

चरक ने आमदोष के प्रकोप से त्रिदोषप्रकोप पूर्वंक वमन और विरेचन की प्रवृत्ति को विसूचिका कहा है। जिसमे प्रकृषित वात के कारण उदर तथा सर्वाङ्ग मे शूल, आनाह, अङ्गमदं, मुखशोष, मूच्छा, चनकर आना, अग्नि की त्रियमता, पसली, पीठ तथा कमर मे जकडन, सिराओ मे आकुञ्चन (सिराओ का टेढी मेढी-कुटिल तथा शोथयुक्त होना, वेरीकोसिस होना) और जकडन होना, ये लक्षण होते हैं।

पित्त के प्रकोप से ज्वर, अतिसार, उदर के आन्तरिक अवयवो मे दाह, प्यास, मद, भ्रम और प्रलाप होता है।

१ मूर्च्छाऽतिसारो वमशु पिपासा जूलो भ्रमोद्देष्टनजृम्भदाहा । वैवण्यकम्पी दृदये रुजश भवन्ति तस्या शिरमश्च भेद ॥ सु० उ० ५६।६

कफ के प्रकोप से वमन, भोजन मे अरुचि, अपचन, शीतज्वर, आलस्य और शरीर के सर्वाङ्ग मे भारीपन होता है।

इसमे तीनो दोषो का प्रकोप होने से विविध वेदनाएँ हुआ करती हैं, फिर भी वायु का विदेश प्रकोप शरीर मे अनेक सूदयो के चुभाने जैसी पीडा उत्पन्न करता है, इसलिए इस रोग को विसूचिका कहा जाता है।

अरुणदत्त³ ने इस व्याधि को विविध विकारों की सूचिका होने के कारण विसुचिका नाम रखना सार्थक वतलाया है।

नव्यमतानुसार लक्षण

इस रोग का सचयकाल कुछ घण्टो से ६ दिनो तक का, प्राय ३ दिनो का और अधिक से अधिक ९० दिनो का होता है। महामारी फैलने के दिनो मे ३ दिन से अधिक का सचयकाल नहीं होता।

सौम्य स्वरूप का आक्रमण होने पर मुख्य लक्षणों के प्रकट होने के पूर्व पित्तयुक्त हिर्त् वर्ण के पतले दस्त, वमन, मुख से पानी छूटना, थकावट, मूत्राल्पता आदि लक्षण होते हैं। विसूचिका के कारण अकस्मात् पीडारहित अतिसार, मण्ड के समान श्वेत मल, अनायास जलसदृश वमन, दौर्वल्य, नाडी की क्षीणता, पेशियों मे ऐंठन, अगुलियों में सिकुडन, आँखों का नेत्र-कोटरों में घँम जाना, वेदनायुक्त आकृति, नखों और ओठों का श्याव वर्ण हो जाना, दाह, वेचैनी, प्यास की अधिकता और मूत्राल्पता आदि लक्षण होते हैं।

इस रोग की तीन अवस्थायें व्यक्त की जा सकती हैं—१. आक्रमणावस्था २ पतनावस्था और ३ प्रतिक्रियावस्था।

१ आक्रमणावस्था—इस रोग का आरम्भ अतिसार से होता है और पानी के समान पतले दस्त आने लगते हैं। पहले पीले रग के, फिर सफेद रग के दस्त वारम्बार होते हैं। मल मे क्लैंब्मिककला के परमाणु एिपथेलिया (Epithelia), म्यूकस, असल्य जीवाणु, लालकण और क्वेतकण होते हैं। यह सफेदी लिया हुआ दस्त १०-१५ मिनट के अन्तर से होने लगता है।

भ० ह० स्० ८१७ की टीका

१ (क) तत्र वात श्रूलानाहाङ्गमदंमुखशोषमूच्छीभ्रमाग्निवैषम्यपार्थंपृष्ठकटिग्रहसिराकुञ्चन-स्तम्भनानि करोति ।

⁽ख) पित्तं पुनर्ज्वरातीसारान्तर्दाहतृष्णामदभ्रमप्रलपनानि (करोति)।

⁽ग) छेष्मा तु छर्षरोत्रकाविपाकशोतज्वरालस्यगात्रगौरवाणि (करोति)। च० वि० २।७

स्वीभिरिव गात्राणि तुदन् सन्तिष्ठतेऽनिल ।
 यत्राजीर्णेन सा वैद्यैर्विस्चीति निगद्यते ॥ सु० उ० ५६१४

३ (क) विविधाना विकाराणां स्चिका विस्चिका।

⁽ ख) विविधेर्वेदनाभेदैर्वाय्वादेमृ शकोपत । पनीभिरिव गात्राणि भिनत्तीति विस्मिनका ॥ (सन्द्रान्सर वस्पन)

कुछ समय बाद वमन भी होने लगता है। वमन में पहले अन्न का अन्न, आमा-श्वायिक रस, फिर क्षुद्रान्त्र के पित्त आदि द्रव निकलते हैं। बाद मे वमन भी पानी की तरह पतला और सफेद निकलने लगता है। नाड़ी दुवल किन्तु गति तेज, श्वास-प्रश्वास तीन्न, तृषा, बलक्षय, सूत्राल्पता या मूत्राधात और बाहर मे ठडक तथा भीतर मे उष्णता मालूम होती है। हाथ पैर मे ऐंठन होकर जंधा की पिण्डलियो मे ऐंठन और तीन्न पीडा होने लगती है।

र पतनावस्था— यह अवस्था विरेचन शुरू होने के ४ से ८ घण्टा बाद बारम्भ होती है। क्वचित् २४ घण्टे बाद शुरू होती है। इस अवस्था मे वमन और अतिसार जारी रहते हैं। शरीर मे जलाश की कमी होने से हाथ-पैर तथा अन्य अगो मे ऐंठन वढ जाती है। त्वचा ठडी रहती है, पसीना ठडा आता है और रोगी शक्तिहीन हो जाता है। उसके ओठ-दांत और नख नीले पड जाते हैं, आंखें भीतर की ओर घँस जाती हैं, कपोल पिचक जाते हैं तथा त्वचा नीली और शुष्क हो जाती है। आवाज क्षीण और नाडी मन्द हो जाती है, जो अनियमित और अस्पष्ट होती है। रोगी को वेचैनी होती है। अन्त मे वमन और अतिसार कुछ कम हो जाते हैं। रोग की तीव्रावस्था मे हृदय की क्रिया क्षीण और अनियमित हो जाती है। रक्त गाढा होने के कारण रक्त का सचार ठीक नहीं होता, जिससे मूत्राघात और मूत्रविषमयता हो जाती है। इस अवस्था मे मूच्छी होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है।

३ प्रतिक्रियावस्था—वमन और अतिसार कम होने लगते हैं। इनका वर्ण भी बदल जाता है, मूत्र आने लगता है, शरीर उष्ण हो जाता है, रोगी की स्थिति सुधरने लगती है और निद्रा आने लगती है। हृदय का बल बढ़ने लगता है। शीच गाढा और पित्त की उपस्थिति से पीले रग का होता है। इस प्रकार शनै शनै. रोगी स्वस्थ हो जाता है।

शुष्क विसूचिका

(Dry Cholera)

यह विसूचिका का अतितीव प्रकार है। प्रारम्भ से ही अधिक विषमयता होने के कारण दस्त और वमन की सख्या नगण्य होते हुए भी गम्भीर निपात के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उदर कुछ आध्मानयुक्त होता है। हाथ-पैर की पेशियों में ऍठन तथा शरीर में द्रव धातु की कमी के लक्षण अल्प मात्रा में ही होते हैं। प्राय र-४ षष्टे के भीतर ही रोगी की मृत्यु हो जाती है।

विसुचिका के उपद्रव

१ निद्रानाश २. अरित (वेचैनी) ३. कम्प ४. मूत्राघात और ५. बेहोशी, ये पाँच विसूचिका के दारुण उपद्रव होते हैं।

निद्रानाशोऽरितः कम्यो मूत्राधातो विसंदता ।
 सभी सुपद्रवा घोरा विस्च्यां पञ्च दास्णाः ॥ मां० नि०

इनके अतिरिक्त मूत्रविषमयता, हृदयातिपात, कर्णमूलिक शोथ, आन्त्रशोथ और जलीयाश की कमी आदि भीषण उपद्रव होते हैं।

असाध्य लक्षण

दन्त, ओष्ठ और नख का नीला पडना, वेहोश होना, लगातार वमन होना, आंखो का भीतर घँस जाना, स्वर का क्षीण हो जाना और सभी सन्धियो का ढीला या शिथिल हो जाना विस्विका का अमाध्य लक्षण है।

कम आयुवाले बालको, अधिक अवस्था के वृद्धो, गिंभणी स्त्रियो तथा अहिफेन-मद्य आदि मादक द्रव्यो का प्रयोग करनेवालो तथा विरकालीन वृक्कशोथ से पीडित रोगियो को होनेवाली विसूचिका अधिक घातक होती है। रोग का आरम्भ होते ही हिक्का, अत्यन्त बेचैनी, असह्य उद्देष्टन, उदर मे तीन्न पीडा, नखो और ओष्ठो मे श्यावता, श्वास की वृद्धि, शीताधिक्ययुक्त प्रस्वेद निकलना, गुदा के ताप का वहुत अधिक या कम होना, रक्तनिपीड का ७०-८० से कम होना, रक्त की गुरुता का १०६६ से अधिक होना आदि लक्षण असाध्यता के सूचक हैं।

साध्य लक्षण

असाध्य लक्षणों की अनुपस्थिति, नाडी का स्पर्शेलम्य होना, पूर्ण मूत्राघात का अभाव, प्रतिक्रिया की अवस्था का शीघ्र प्रारम्भ, शाखाओं में उद्देष्टन की कमी आदि लक्षणों के होने पर विस्चिका को साध्य जानना चाहिए।

चिकित्सा-सूत्र

- विसूचिका के रोगी को अकेले मे या सक्रामक रोग चिकित्सालय मे स्वच्छ हवादार कमरे मे मृदुशय्या पर सुलाना चाहिए।
- २ रोगी को विस्तर पर ही वमन-विरेचन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और वस्त्र तथा विस्तर को गन्दा होने से बचाना चाहिए।
 - ३. रोगी के मल-मूत्रादि को गड्ढे मे गडवा देना चाहिए या जला देना चाहिए।
- ४. कमरे के फर्ज को फिनायल के घोल से धुलवाते रहना चाहिए और मिक्स्यों के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए।
- ५. रोगी के वस्त्रो की सफाई फार्मेलीन के घोल मे घोकर तथा उदालकर करनी चाहिए।
 - ६ खाद्य-पेय पदार्थों को मिन्खियो से बचाकर रखना चाहिए।
- ७ मल-मूत्र के पात्र और स्थान की अच्छी सफाई व्यवस्था रखनी चाहिए तथा विसक्रामक द्रव्यों के घोल से घुलवाना चाहिए।
- ८ रोगी को कम्बल या चादर से ढँककर रखना चाहिए। रोगी का सिरहाना पैताने की अपेक्षा नीचा रखनां चाहिए।

१ यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽस्पर्सन्नो वन्यदितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः। क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्विर्यायात्ररः सोऽपुनरागमायः॥ सु० ७० ५६।११

- ९. परिचारक को चाहिए कि वह रोगी की कौंख एव गुदा का ताप, मलिवसर्जन एवं ब्रग्नन की सल्या, मात्रा, स्वरूप, मूत्र की राशि और नाडी की गति आदि का प्रति घण्टें का चाटं तैयार करे।
 - १०. रोगी की प्यास के शमनार्थ उसे वरफ के टुकडे चूसने के लिए दे।
- ११ तृषाशमन के लिए सौंफ या पित्तपापडे का अर्क अथवा लौंग, इलायची डालकर उवाला हुआ जल थोडा-थोडा पिलाना चाहिए।
 - १२. कच्चे नारियल का पानी या अजवायन का अर्क प्यास को रोकते हैं।
- 9३ इमली का पानी (५० ग्राम पकी इमली को ४ लीटर पानी मे अर्धाविशष्ट पकाया हुआ जल) या नीवू का पानी (१ वोतल जल में १ कागजी नीवू का रस डालकर निर्मित) अथवा निम्बजल (२ लीटर स्वच्छ जल मे नीम की वारीक पिसी पत्ती १०० ग्राम घोलकर, पुन छानकर वोतलो मे भरा जल) थोडा-थोडा पिलाते रहने से वमन, प्यास और दाह का शीघ्र शमन होता है।

१४ आचार्य चरक ने कहा है, कि विसूचिका में सर्वप्रथम लच्छन कराना चाहिए। क्योंकि आमप्रदोषज रोगों की निवृत्ति लघन (अपतर्पण) से ही होती है। लघन युक्तियुक्त उपचार है। यह हेतुविपरीत उपचार है, जो कुशल चिकित्सको द्वारा सान्यता-प्राप्त है। यदि फिर भी रोगशमन न हो, तो व्याधिविपरीत उपचार करना चाहिए।

१५ आचार्य सुश्रुत ने साध्य लक्षण युक्त विस्चिका मे दोनो पैरो की एडियो में दाह (अग्निकमं) करना प्रशस्त माना है। इससे सज्ञाप्रवोधन हो जाता है और अतिविरेचन मे भी लाभ होता है। आमदोप के पाचन के लिए उदर पर गरम पानी से भरी रवर की थैली से सेंक करना चाहिए तथा आमाशयस्य दूषित अन्नशत्य को निकालने के लिए मदनफल आदि तीक्षण वामक द्रव्यो को पिलाकर वमन कराना चाहिए। यह आमावस्था का चिकित्सा-क्रम है: किन्तु दोष के अथवा अन्न के पाका- भिमुख होने पर लघन कराना चाहिए तथा स्वेदनादि कर्म से सम्यक् पाचन और विरेचन कर्म करना चाहिए। विष्टम्म की स्थिति होने पर आस्थापन (निरूह) विस्त का प्रयोग करना हितकारक होता है।

१ विस्चिकाया तु लङ्घनमेवाञ्चे विरिक्तवचानुपूर्वी। आमप्रदोषजाना पुनर्विका राणामपत्तर्पणेनेवोपरमो भवति, सित त्वनुबन्धे कृतापत्पणाना न्याधीनां निग्रहे निमित्तविपरीत-मपास्यीषधमातद्वाविपरीतमेवावचारयेषधास्वम्। सर्वविकाराणा च निग्रहे हेतुन्याधिविपरीनमौपध-मिक्कन्ति कुश्ला, तदर्धकारि वा। च० वि० २।१३

र साध्यासु पाष्योदं इन प्रशस्तमिनप्रतायो वमनस्र तीक्ष्णम् ।

पन्ने ततोऽत्रे तु विल्रह्मनं स्यात् सम्पाचनं चापि विरेचन च ॥

विशुद्धदेहस्य हि सद्य प्रव मूर्च्छातिसारादिवपैति शान्तिम् ।

साह्यापनं चापि वदन्ति पथ्य सर्वासु (योगानपरात्रिवोष)॥ सु० ७० ५६।१२-१३

औषघ-प्रयोग

- १. पत्थरचूर के पत्ते का स्वरस १ चम्मच १५-१५ मिनट पर देते रहने से वमन रक जाता है। यह अनुभूत और सिद्ध प्रयोग है।
- २ प्याज का स्वरस २-३ चम्मच १०-१० मिनट पर देने से विसूचिका की आरम्भिक अवस्था मे लाभ होता है।
- ३. आम की गुठली की मज्जा और वेलफल की कच्ची मज्जा समभाग का क्वाथ ४-४ चम्मच बार-बार देने से वमन और अतिसार दोनो का शमन होता है।
- ४. मदार की जड की छाल, कालीमिर्च और सेंधानमक समभाग लेकर पीसकर नीबू के रस मे घोटकर २-२ रत्ती की गोली बनावे, इसे १-१ घण्टे पर देना चाहिए। यह अर्कवटी है।
 - ५ अपामार्ग (चिचिडा) के मूल को जल मे पीसकर पिलाना लाभप्रद है।
- ६ लालिमचें १० नग पीसकर १०० ग्राम चीनी के शर्वत में घोलकर थोडा-थोडा पिलाने से आध्रयंजनक लाभ होता है।
- ७ सफेद या काले धतूरे के पत्तो का स्वरस १ चम्मच और ताजा दही २५-३० ग्राम की १ मात्रा, आधे-आधे घण्टे पर ३ बार देना चाहिए। यदि इतने से लाभ न हो, तो असाध्य समझना चाहिए और इसे फिर अधिक न देवे।
- ८ एक योग—लालिमर्च, शुद्ध हीग, कपूर, लहसुन प्रत्येक १ भाग शुद्ध वत्सनाभ है भाग, मदार के फूल २ भाग, पिपरामेण्ट रे भाग—इनको नीबू के रस तथा आईक स्वरस की ३-३ भावना देकर २५० मि० ग्राम की गोली बनाकर प्रयोग करे। प्रति १५ मिनट पर २-२ गोली तब तक देवे जब तक वमन या अतिसार के वेग का शमन न हो।
- ९ हिंग्वादि वटी—शुद्ध तलाव हीग १० ग्राम, कपूर १ ग्राम, शुद्ध विभीम २ ग्राम, लालिमचं ८ ग्राम, चन्द्रोदय १ ग्राम लेवे। पहले लालिमचं का कपडलन चूर्ण करे, फिर अन्य औषधें मिलाकर प्याज के स्वरस से २ दिन मर्देनकर, मूँग के वराबर वटी वनाकर छाया मे सुखा ले। १५-१५ मिनट के बाद १-१ गोली प्याज के रस अथवा अर्क पुदीना से देवे।
- १० अमृतिबन्दु यह औषध नहीं है, विल्क औषधालय है। इसके विविध प्रयोग हैं और विसूचिका में तो बहुत ही प्रसिद्ध और लाभप्रद योग है। इसे १५-१५ मिनट पर ५-५ बूँद छोटे वतासे में गिराकर मुख में चूसने के लिए देते रहें। इसमें कपूर १० ग्राम, अजवायन का सत्त्व १० ग्राम, पिपरामेण्ट सत्त्व १० ग्राम, लवग का तेल ३ ग्राम, इलायची का तेल ३ ग्राम और सौफ का तेल ३ ग्राम लेकर १ सीसी में डाल देते हैं और सब मिलाकर पानी जैसा हो जाता है। इसका ३-४ वार से अधिक प्रयोग न करे अन्यथा वृक्क की क्रिया में बाधा होकर मूत्राघात हो सकता है।
- ११ सञ्जीवनी वटी—विसूचिका के लिए यह बहुप्रचलित है। इसे २ गोली की मात्रा मे जल से या आदी के रस से आधे-आधे घण्टे पर ४-५ वार दे।

कायचिकित्सा

१२ चूसने के लिए हिंग्वादि वटी, गन्धक वटी अथवा लगुनादि वटी १–१ गोली देते रहना चाहिये।

१३ व्यवस्थापत्र---

१. अग्नितुण्डी वटी १०० मि० ग्राम
सजीवनी वटी ३०० मि० ग्रा०
रामबाणरस ३०० मि० ग्रा०
कपर्दभस्म २०० मि० ग्रा०

योग १ मात्रा

पलाण्डुस्वरस या मधु से। इसे आधे-आधे घण्टे पर ६-७ बारं देवे।

- २ प्रति १५ मिनट पर अमृतबिन्दु ५ बूँद छोटे बतासे मे चूसने को देवे।
- ३ २०-२० मिनट पर गन्धक वटी, रसीत वटी या हिंग्वादि वटी १-१ गोली चूसने को दें।
- ४ प्यास लगने पर सौंफ का या पित्तपापडे का या जवायन का अर्क २−४ चम्मच दे।
- ५. वमन अतिसार के कुछ वेग निकल जाने पर ग्राही एव दीपनपाचन योग दे, जैसे---

२-२ घण्टे पर--५-६ बार

कपूँररस १२५ मि० ग्रा० पीयूषवल्ली १२५ मि० ग्रा० रामबाण १२५ मि० ग्रा० अजीर्णकण्टक १२५ मि० ग्रा०

१ मात्रा

भुना जीरा १ ग्राम और पलाण्डु स्वरस १ चम्मच के साथ। ६ मुख मे चूसने के लिए आलूबुखारा या बरफ का दुकडा, भुनी सौंफ या भुनी बडी लाइची व मधु के साथ चटाना चाहिए।

लाक्षणिक चिकित्सा

तृष्णा मे

१. पीपल वृक्ष की मोटी छाल को आग पर जलावें, अङ्गार हो जाने पर उसे पानी में डालें और ठडा होने पर पानी छानकर मिट्टी के पात्र मे रखें तथा थोडा- छोडा पीने को देवे।

- २. १५ नग लवंग को कूट कर २ लीटर जल मे **डालकर २**-३ उ**बा**ल आने तक औटार्ये, फिर छानकर मृत्पात्र मे रखकर पिलावे । अथवा—
 - ३ सौंफ, पित्तपापडा, पुदीना, गुलाब या केवडे का अर्क थोडा-थोडा पिलावे।
 - ४ बरफ या आलूबुखारा चूसने के लिए देवे।
- ५. उबाल कर शीतल किये हुए जल मे ताजा नीबू का रस निचोडकर थोडा-थोडा करके पिलाते रहने से तृषा का शमन होता है।

प्रस्वेव में

- १. अरहर्या कुलयी की दाल को भूनकर सूक्ष्म चूर्ण, कर उसमे चौथाई हिस्सा कायफल तथा सोर्ठ का (मिलित) चूर्ण मिलाकर अगो पर मलना चाहिए।
- २ गरम पानी मे नमक मिलाकर उसमे कपडा भिगोकर हाथ-पैर, जघा-पिण्डली आदि पर सेंक करना चाहिए।
- े ३ बोतलो मे या रबर की थैली मे गरम पानी रखकर पैरो के पास रखना चाहिए।

खल्ली मे

- ('खल्ली तु पादजङ्घोहकरमूलावमोटनी' मा० नि०)।
- 9 दालचीनी, तेजपात, अगरु, रास्ना, सिहजन की छाल, कूठ, बच और सोवा का बीज, समभाग लेकर काञ्जी या ईंख के सिरका मे पीसकर उबटन लगाना चाहिए। अथवा—
 - २ महानारायण तैल और सिरका समभाग मिलाकर मालिश करनी चाहिए। अथवा---
 - ३ तिलतैल में कपूर मिलाकर पैर, जघा और हाथ में मालिश करनी चाहिए।

 यमन और अतिसार

जब वमन और अतिसार लगातोर जारी हो, तो नेत्र में अञ्जन लगाने से उनका क्रम रक जाता है।

म्योषादि अञ्जन —

सोंठ, मरिन, पीपर, करंज के फल की गुद्दी, हलदी और बिजौरा नीबू की जड की छाल को पीसकर गोली बनाकर छाया में सुखाकर रख ले। इसके अजन से विशेष लाभ होता है।

मूत्राघात मे

- १ पेडू पर गरम पानी की बोतल से सेंक करना चाहिए।
- २ कपडे को ५-६ पर्त कर तवे पर सुखोब्ण गरम कर उससे उदर और मूत्राश्य पर शुष्क स्वेद करना चाहिए।

३ चूहे की लेडी, चूहे के बिल की मिट्टी, केले की जड और कलमीसोरा की ठडे पानी मे पीसकर पेडू पर लेप करने से मूत्र का निकलना आरम्भ हो जाता है।

४. कलमीसोरा ५० ग्राम और नौसादर ५० ग्राम लेकर पीसकर १ गिलास पानी मे घोल दे और उसमे ४ तह कपडे का टुकडा भिगोकर बार-बार पेडू पर रखना चाहिए।

हृदयावसाव और नाड़ी-शैथिल्य मे

स्वर्णसिन्दूर १०० मि० ग्रा० और सजीवनी वटी ३०० मि० ग्रा० की एकमात्रा, प्रति २-२ घण्टे पर मधु से देना चाहिए और २ चम्मच सौंफ के अर्क मे १५-२० बूँद मृतसजीवनी सुरा मिलाकर ३-३ घण्टे पर ४ वार देना चाहिए।

विवसयता के प्रतिकारार्थ

- १ सुलोब्ण जल मे तौलिया भिगोकर रोगी के शरीर को पोछना चाहिए।
- २. मल के शोधन का प्रयत्न करना चाहिए।
- ३. कच्चे नारियल का जल १-२ चम्मच देते रहना चाहिए।
- ४. २० ग्राम ग्लूकोज और १ चम्मच सोडा-वाई-कार्व मिलाकर मधु या चीनी मिलाकर थोडा-थोडा पिलाना चाहिए।
 - ५ पुनर्नवार्क और मकोय का अर्क पिलाना चाहिए।

छदि में

यदि अन्य उपचारो से वमन न रुक रहा हो, तो राई को पानी मे पीसकर आमाश्य पर लेप करना चाहिए।

जलाल्पता

विसूचिका मे वमन तथा अतिसार की अधिकता से द्रवधातु का नाश होता है। द्रवनाश के परिणामस्वरूप रोगी मे उदर मे दाह, नृषाधिक्य, हाथ-पैर मे ऐंठन, सूत्रावसाद, नाडी और हृदय की दुवेंलता, त्वचा की रूक्षता, नेत्रो का भीतर की ओर धेंस जाना, ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इनके शमनार्थ सिरामार्ग से लवण-जल निक्षेप करना एकमात्र कारगार उपाय है, जिसके प्रयोग से उक्त घातक उपद्रवों से प्राणरक्षा की सभावना हो सकती है। ईस लवण-जल के निक्षेप (Salme Infusion) का सिद्धान्त यह है, कि शरीर से जिन धातुओं का अत्यधिक सरण हो जाता है, उनकी पूर्ति करना। द्रवनाश से जल, लवण तथा क्षार की कमी हो जाती है और इन्ही द्रव्यो का सिरा द्वारा अन्त भरण करने से स्थित मे सुधार होता है।

प्राय जलात्पता का शिकार और तज्जन्य उपद्रवों के हो जाने के बाद ही कोई रोगी चिकित्सक के यहाँ पहुँचता है, क्योंकि ४-६ बार में ही वमन और अतिसार से अत्यधिक जलीयाश निकल जाता है। जलात्पता का सही ज्ञान करने के लिए रक्त के सापेक्ष गुरुत्व (Sp Gravity) का ज्ञान आवश्यक है—

१. कायचिकित्सा-गंगासहाय पाण्डेय, पृ० ८६१-६५

कौच की साफ शीशी, परखनली या गिलासो में ग्लिसरीन तथा जल का घोल भिन्न-भिन्न अनुपातों में रखकर उनकी गुरुता का मापन कर ले। १०५७ से १०६५ सापेक्ष गुरुता का पोल परखनली में अलग-अलग रखकर सिरावेध द्वारा पिचकारी में रक्त निकालकर ११ बूँद रक्त जल-ग्लिसरीन के मिश्रणों में डालना चाहिए। रक्तिवन्दु के तैरने, घुलने या नीचे बैठ जाने से गुरुता की अल्पता या हीनता का निर्णय होता है। जिस सीसी में रक्तिबन्दु डालने पर १-२ सेकेण्ड तक स्थिर रहकर घुल जाय, उस सीसी के ग्लिसरीन के घोल की गुरुता के समकक्ष समझनी चाहिए। विशिष्ट गुरुता १०६० होने पर १ पाइण्ट लवणजल तथा १०६१ होने पर २ पाइण्ट, १०६२ होने पर ३ पाइण्ट—इसी क्रम से १०६६ होने पर ७ पाइण्ट लवणजल की अपेक्षा हो सकती है। जलीयाश की पूर्ति के लिए लवणजल-ग्लूकोज का क्षारीय घोल, रक्तरस आदि का प्रयोग किया जाता है। लवण जल का प्रयोग हीन, सम या अतिबल घोल के रूप में विशिष्ट अवस्थाओं में किया जाता है। नीचे उनका विवरण पृथक् पृथक् दिया जा रहा है—

समलवण (Normal Saline)

Sodium Chloride gr. 90 Aqua Dist water pint 1

अतिवल लवणजल (Hypertonic Saline)

Sodium Chloride gr 120
Cal Chloride gr 4

Sterilised dist water pint 1

क्षारीय लवण जल (Alkaline Saline)

Sodium Chloride gr. 90 Sodi Bicarb gr 160 Sterilised dist water pint 1

रक्त की विशिष्ट गुक्ता के बढ जाने, सकोचिक रक्तभार के ८० मि० मा० से कम होने तथा नाडी की क्षीणता तथा मूत्राघात के लक्षण होने पर अतिवल लवणजल उपयोगी होता है।

सिराद्वारा प्रयोग सम्भव न होने पर अधस्त्वक् मार्ग से समबल लवण जल का प्रयोग किया जाता है। क्वचित् मलमार्ग (Rectal drip) के द्वारा भी ५% ग्लूकोज मिलाकर बूद-बूद की मात्रा मे प्रयोग करते हैं।

सारीय लवणजल-वमन तथा अतिसार होने के कारण शरीर के क्षरीय द्रव्य भी उत्सर्जित हो जाते हैं, उनकी पूर्ति के लिए जल के साथ क्षारतत्त्वो का प्रयोग आवश्यक है।

व्याधि की तीव्रता के आधार पर प्रदेय लवणजल की मात्रा निर्धारित कर लेनी चाहिए। सामान्यतया मात्रा के निर्धारण का आधार रक्त की विशिष्ट गुरुता होती है। ४ पाइण्ट द्रव के प्रयोग की अपेक्षा होने पर प्रारम्भ मे एक पाइण्ट क्षारीय लवणजल देने के उपरान्त दो पाइण्ट अतिबल लवणजल तथा अन्तिम में एक पाइण्ट मे अतिबल लवणजल तथा ग्लूकोज मिलाकर देना चाहिए।

लवणजल के प्रयोग की विधि—रोगी की गम्भीरता तथा निपात की स्थिति के आधार पर सिरामार्ग से लवणजल के प्रयोग के दो साधन होते हैं—

9 सूचीवेष द्वारा या बन्द विधि (Closed method), २. कीनुला द्वारा या खुली विधि (Open method)।

विस्विका का उचित उपचार बारम्भ से ही करने पर तथा जलाल्पता के लक्षण उत्पन्न होते ही लवणजल का प्रयोग करने पर सिरा के खोलने की अपेक्षा नहीं होती। अन्यथा अत्यधिक जलाल्पता हो जाने पर हीन रक्तनिपीड (साकीचिक रक्तभार ५० से नीचे) होने पर सिरावेघ के लिए चेष्टा करने पर भी सिरा नहीं मिल पाती। ऐसी अवस्था में शस्त्रकमें द्वारा कूपेंरसिंध के पास सिरा को खोलकर विशेष विधि से सिरा के भीतर कैनुला प्रविष्ट कराकर लवणजल का प्रयोग किया जाता है, किन्तु रोगी की अत्यधिक दुबलता एव हीन क्षमता के कारण शस्त्रकमें के बाद स्थानीय शोष-पाक आदि के उपद्रव गम्भीर स्वरूप ले सकते हैं। इसलिए यथासम्भव बन्द विधि से ही रोगारम्भ काल से लवणजल देना चाहिए।

लवणजल-प्रयोग के सामान्य नियम

ताप—लवणजल का ताप रोगी की गुदा के ताप पर नियन्त्रित किया जाता है। गुदा का ताप १०१° फा० तक होने पर लवणजल को गरम करने की अपेक्षा नहीं होती। सामान्यतया जल का ताप ८०° फा० होता है। गुदा का ताप हीन प्राकृत होने पर लवणजल के घोल को १००° फा० तक गरम कर लेना चाहिए। गुदा का ताप १०४ या अधिक होने पर पहले सन्ताप की चिकित्सा द्वारा ताप कम कर लवणजल का प्रयोग करना चाहिए।

गति—आरम्भ मे ४ औंस प्रति मिनट लवणनल के देने की सात्रा रखी जाती है। इस क्रम में ५ मिनट मे १ पाइण्ट जल पहुँचता है। किन्तु बाद मे गति की तीव्रता कम कर देनी चाहिए। अन्यथा हृदय एव फुप्फुस पर अधिक भार पड़ने के कारण अनेक अनुगामी उपद्रवी की सम्भावना हो सकती है। इसलिए कुछ समय बाद लवण जल की मात्रा १ औंस प्रति मिनट के आस-पास रखनी चाहिए। इस क्रम से २-३ पाइण्ट देने के बाद आखिरी पाइण्ट बिन्दु-बिन्दु (Drip) क्रम से ४०-५० बूँद प्रति मिनट के हिसाब से देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीव्रगति से लवंणजल के प्रयोग करने पर जलीयाश शरीरकोषाओं मे व्याप्त नहीं हो पाता, अपितु वमन और अतिसार के माध्यम से तुरन्त उत्सर्गित हो जाता है।

मात्रा—रक्त की विशिष्ट गुक्ता के आधार पर लवणवल की मात्रा का निर्धारण करने का सिद्धान्त पूर्वकथनानुसार जानना चाहिए। एक बार मे बहुत अधिक जल देने से रक्त की स्वाभाविक क्षारमर्यादा असन्तुलित हो जाती है, जिसके कारण कोषाओं का समवर्त (Tissue metabolism) तथा हृदय-मस्तिष्क-वृक्क आदि अगो की क्रियाशीलता पर हानिकर परिणाम होता है।

निषेध—ह्दय की विकृति, फुण्फुसशोथ, अत्यधिक आव्मान, परिसरीय रक्त-वाहिनी निपात (Peripheral vascular failure) के कारण उत्पन्न हीन रक्त-निपीड तथा रक्त की विशिष्ट गुरुता की स्वामाविक मर्यादा के निकट रहने तथा गर्भिणी, अतिवृद्ध एव वालक मे सिरा द्वारा लवण जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

पथ्य

जब विचूचिका के रोगी का रोगवशात् अथवा चिकित्सा द्वारा सम्यक् वमन और अतिसार के माध्यम से दोषनिर्हरण हो जावे तथा लघन के द्वारा उन लक्षणों का प्रशमन हो जावे एव रोगी को मूख लगने लगे, तो दीपन-पाचन औषघों के योग से पकायी गयी पेया आदि के क्रम से पथ्य देने का विधान आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है।

अतः रोगमुक्ति के पश्चात् पहले मूग या मसूर के यूष को जीरा, मरिच, हीग और लहसुन से छोंककर सेंधांनमक डालकर अल्पमात्रा मे देना चाहिए। फिर रोगी की एचि तथा पाचन-क्षमता के अनुसार नीवू का शरवत, फलो का रस, दही की लस्सी बरफ डालकर, मठ्ठा, बालीं, साबूदाना या लाजमण्ड देवे। क्रमश पुराने चावल और मूग की खिचडी, करेला, परवल, नेनुआ, तरोई, आदी, सिरका, नीवू आदि से युक्त हलका और अल्प मात्रा मे भोजन देवे।

अपध्य

विरुद्ध, प्रतिकूल, विवन्धकर, गुरु अन्न, नया चावल या गेहूँ, पूढी, हलवा, उडद, चना, बालू, अरुई, कोहडा, कटहर, गरिष्ट और दुर्जर पदार्थ, चिकने पदार्थ नहीं खाना चाहिए।

प्रतिषेध

- १ विसूचिका फैलने के पूर्व डी० डी० टी० या फिनायल आदि से मक्खियो का विनाश या दूरीकरण करना चाहिए।
- २ जल के शोधन के लिए पोटास परमैंगनेट या क्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना चाहिए।
 - ३ जल-वितरण प्रणाली का विसक्रमण (Sterilization of water supply)।
 - Y. खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उचित देखमाल।
 - ५ मल-मूत्र के विसर्जन की समुचित व्यवस्था और सफाई।
- ६. जनता मे हैजा से वचाव के तरीको को बुलेटिन, समाचारपत्र, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, सभा, ज्याख्यान आदि के द्वारा प्रसारित करना । मेला आदि के समय मेला-क्षेत्र की स्वच्छता, उचित जलापूर्ति और मेला में जाने वालो के लिए टीके की अनिवायंता आवश्यक है।

७ एण्टीकॉलरा इनावयुलेशन (Anti-cholera Inaculation)—यह पहुले ० ५ मि० ली० की मात्रा फिर एक सप्ताह वाद १० मि० ली० की द्वितीय मात्रा दी जाती है। इससे छह मास तक के लिए व्याधिक्षमता प्राप्त होती है।

८. बाजार की मिठाई, लस्सी, कुल्फी और आइसक्रीम का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। फलो को पोटाम के जल से परिमाजित कर लेना चाहिए।

रोग-मुक्ति के पश्चात् बलवर्धक योग

१ प्रात-साय प्रवालपश्चामृत २५० मि० ग्रा० वृहत् लोकनाथ २५० मि० ग्रा० नवायस लोह १ ग्राम रसिन्दूर २५० मि० ग्रा०

सितोपलादि मधु से।

२ ग्राम योग २ मात्रा

२ भोजन के १० मिनट पूर्व

यवानीपाडव या महापाडव १० ग्राम विना अनुपान चूसना। २ मात्रा

३ भोजन के वाद

द्राक्षासव

१ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

४. ९ वजे तथा २ वजे दिन

हिंग्वादि वटी या रसोनादि वटी २-२ गोली चूसना।

अलसक

जब खाया हुआ आहार आमाशय मे जाकर सुस्त और आलसी पुरुष की तरह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, न तो उसका पाचन होता है, न ऊपर से वमन की प्रवृत्ति होती है और न वह नीचे सरकता है, तो इस स्थिति को 'अलसक' रोग की सज्ञा दी गयी है। इस दशा को नन्य दृष्टि से पूर्णत अन्त्रावरोध (Acute Intestinal Obstruction) सदृश माना जाता है।

निदान और सम्प्राप्ति

जब कोई दुवंल, मन्दाग्निग्रस्त, श्लेष्माधिक तथा अधोवायु, मल एव मूत्र के वेगो

१. प्रयाति नोध्व नाथस्तादाहारो न विपच्यते । आमाश्चेऽलसीमृतस्तेन सोऽलसक स्मृत ॥ मा० नि० वर्जीण २० (मधुकोप)

२ दुर्वरुस्याल्पाग्नेवंहुइरुष्मणो वातमूत्रपुरीषवेगविधारिण स्थिरगुरुवहुरूक्षशीतशुष्कान्नसेविन-स्तदन्तपानमनिलप्रपोडित रलेष्मणा च विवद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमलसत्वान्न बहिर्मुखी मवति, तत्रदृष्ट्यतीसारवर्ज्यान्यामप्रदोपलिङ्गान्यभिदश्येयत्यतिमात्राणि । च० वि० २।१२

को रोकने के स्वभाववाला व्यक्ति स्थिर-गुरु-अतिरूक्ष-शीतल वासी और सूखे अन्न का सेवन करता है, तो उसका खाया हुआ अन्न-पान वायु द्वारा घकेला जाता हुआ, किन्तु करू के द्वारा मार्ग के वन्द होने से भीतर की ओर लीन होकर रुका हुआ रह जाता है, तो अतिमात्रा में लीन होकर अलमीभूत हो जाने से उस आहार को वाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जिसके कारण उसमें आमदीप के बहुत अधिक लक्षण दिखलाई देने लगते हैं, केवल वमन और अतिसार नहीं होते हैं। इस रोग में वात और करू की प्रधानता होती है और इनकी रस्साकशी में रोगी की आंखों के सामने दिन में भी तारे नजर आने लगते हैं।

संप्राप्ति--→

दुवंल, मन्दाग्निग्रस्त, वेगावरोधक, बहुश्लेष्मा, गुरु-शीत रूक्षभोजी-रोगी + शुष्कान्नमेवन—

कफ-वात प्रकोप

वागुवीडित एव कफ से अवरुद्धमार्ग अन्नपान

लीन अन्नपान का अलसभाव

. अलसक रोग

दण्डालसक

अजीण ननक निदान के मेनन मे जन तीनो दोष प्रकुषित हो जाते हैं, तो वे अधिक मात्रा मे दूषित दोष, चिर सचयवश अतिदुष्ट आम के कारण मार्ग के रुक जाने मे, शरीर मे नियंक् चलते हुए, रोगी के सम्पूर्ण शरीर को दण्ड के समान जकड लेते हैं और शरीर मे स्तब्धता होने मे अगो का आकुश्वन-प्रसारण वाधित हो जाता है, तो इसे 'दण्डा उसक' कहते हैं। यह असाध्य कहा गया है।

डल्हण और आतस्त्रदर्पंगकार का मानना है, कि चरक ने जिस रोग को दण्डालसक कहा है, उसी को मुश्रुत ने विलिध्यका नाम दिया है—'इयमेव विलिध्यका तन्त्रान्तरे दण्डालसक इति नाम्ना पठ्यते' (मा० नि० अजीणं २१ पर आतस्त्रदर्पण टीका) तथा—''इयमेव' 'विलिध्यका' तन्त्रान्तरे 'दण्डालसक' इति नाम्ना कथ्यते''। (सु० उ० ५६१९ पर डल्हण टीका)।

अलसक के लक्षण

9 कुक्षिप्रदेश में कसकर वैंधे होने जैसा प्रतीत होना, २ रोगी का मूच्छित हो जाना, ३ कहरना (पीडा के 'कारण कराहते रहना), ४ अवस्द्र एवं प्रतिलोमगति

१ अतिगात्रप्रदृष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गाष्टिनर्यंग्गच्छन्तः कदाचित्रेय केवलमस्य शारीरं दण्डनद स्तम्भयन्ति, ततस्तं दण्डालसक्तममाध्यं मुन्ते । च० पि० १।१२

वायु का कुक्षि के ऊपरी भाग (ह्दय, कण्ठ आदि) में भ्रमण करना, ५. अद्योवायु और मल का पूर्णतः अवरोध होना, ६. बहुत प्यास लगना, ७. डकार आते रहना और ८ शल्य की तरह शूल का उग्ररूप में होना, ये सब अलसक के लक्षण है।

असाध्य लक्षण^२

१. दन्त, ओष्ठ तथा नख का नीचा पड जाना, २. वेहोशी होना, ३ तमन की प्रवृत्ति होना, ४. नेत्रो का भीतर घँस जाना, ५ स्वर का क्षीण होना और ६. सभी सन्धि-बन्धनो का ढीला पड जाना, ये अमाध्यता के सूचक लक्षण हैं।

विलम्बिका का लक्षण³

जिस रोग में कफ और वायु से दुष्ट अन्न कपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकलता हो, उस अत्यन्त दुश्चिकित्स्य रोग को शास्त्रवेताओं ने विलम्बिका कहा है।

, बक्तव्य-यद्यपि वातकफारव्य होने से और नीचे या ऊपर के किसी मार्ग से बन्न या दोप के न निकलने से अलसक और विलम्बिका मे अन्तर नहीं प्रतीत होता, तथापि दोनो मे कुछ अन्तर है, जिससे दोनों का अलग-अलग पाठ और लक्षण कहा गया है। निम्नलिखित तालिका से दोनों का सापेक्ष लक्षण व्यक्त किया जा रहा है—

सापेक्ष निदान

अलसक	विलम्बिका
१ अजीणं	१ वजीर्ण
२. कफ + वायु	२. कफ ∔ वायु
३ पित्त का संसर्ग नही ४ मल एवं अघोवायु का अवरोध	३. पित्त का संसर्ग और अन्न की विदम्धता ४ मल एवं अधोवायु का अवरोध

- (क) कुक्षिरान हातेऽत्यर्थे प्रताम्यति विक्रजित ।
 निरुद्धो मारुतश्चापि कुक्षौ विपरिधावति ॥
 वातवर्चो निरोधश्च यस्यात्यर्थे भवेदपि ।
 तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोदगारौ च यस्य तु ॥ मा० नि०
 - (ख) पीडित मास्तेनान्नं श्रेष्मणा रुद्धमन्तरा। मलस क्षीमितं दोपै शल्यत्वेनेव सस्थितम्॥ शूलादीन् कुस्ते तीवाश्चर्धतीसारवर्धितान्॥
- २. य इयावदन्तीष्ठनखोऽल्पसंशे वर्म्यादंतोऽभ्यन्तरयातनेत्र । क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायात्ररः सोऽपुनरागमाय ॥ ग्र० ७० ५६।११
- ३ (क) दुष्ट तु मुक्त कफमारुताभ्या प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य। विलम्बिकां तां मुशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविद पुराणाः॥ सु० उ० ५६।९
 - (ख) गरीयसी भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका । कफवातानुबद्धाऽऽमलिङ्गा तत्सममाधना ॥ अ० ६० स्०८।२८
 - (ग) यदा मुक्त विदग्ध च नोध्व नाध प्रवर्तते । तां बिलम्बी विगर्हन्ति विष्ठुल्या विद्यविकाम् ॥ मेहसै० वि० ११

विसचिका-अलसक-विलम्बिका-आनाह-आध्मान-प्रत्याध्मान-आटोप

५. चदरशूल, श्रे आर्तनाव ५ शूल नही या अल्प ६ सद्य उत्पत्ति ६ विलम्ब से उत्पत्ति ७. प्राय साध्य ७ कृच्छ्रसाध्य या असाध्य ८. पूर्ण अन्त्रावरोध ८ पेरालिटिक इल्यिस रोग द ९ अविलम्बित ९. दीर्घकाल तक अनुबन्ध र १०. प्रारम्भिक रोग १० अलसक ही विलम्ब तक बने रहने पर

१०. प्रारम्भिक रोग १० अलसक ही विलम्ब तक बने रहने विलम्बिका³

-११ दण्डालसक एक भेद

११ दण्हालक पर्याय 🐔

२३९

अलसक और विलम्बिका चिकित्सा-सूत्र

१ दूषित और अलमीभूत साध्य आमदोष को गरम जल में सेंघानमक मिलाकर वमन करावे।

२ सुश्रुताचायं ने पार्षिणदाह, अग्निताप, तीक्ष्ण वमन, लंघन, सम्पाचन, विरेचन और आस्थापनवस्ति का प्रयोग करने को कहा है।

३ चरकाचार्यं^६ ने वमन, स्वेदन, गुदर्वात तथा उपवास कराने का निर्देश दिया है। औषध प्रयोग

9 अलसक और विलिम्बिका की चिकित्सा एक ही समान की जाती है। यह स्मरण रखना चाहिए, कि अलसक की अपेक्षा विलिम्बिका अधिक घातक रोग है। अलसक तथा विलिम्बिका में स्वयमेव न तो वमन होता है न विरेचन और रोगी वैदना से अस्त होकर रोता-चिल्लाता है। अतः इसमें सर्वेप्रथम वमन कराना चाहिये। एतदर्य—

- रे. सेंद्रानमक का गरम जल में घोल तैयार कर रोगी को आकण्ठ पिलाना चाहिए। अथवा—
 - रै. काशीश (शुद्ध) और सेंधानमक २-२ रत्ती मिलाकर जल से खिलावे । अथवा---
 - ४. कंकुष्ठ (उशारेरेवन्द) को १-२ ग्राम की मात्रा में उष्णजल के साथ देवे।

र अलसके तीवा शुलादयो भवन्ति । मा० नि० (मधुकोष)

र तदनुबन्धेन दीर्घकालविलम्बनात विलम्बिकत्युच्यते। हेमाद्रि

३. लीनमेव चिरमवतिष्ठते । हेमाद्रि

इयमेव विलिम्बका तन्त्रान्तरे दण्डालसकमंश्योक्ता । सु० उ० ५६।९ पर डल्हण टीका

५. साध्यास पाश्चर्योदं इन प्रशस्तमिनमतापो नमनन्न तीक्ष्णम्। पक्वे ततोऽन्ते तु विलङ्कन स्वाद सम्पाचनं चापि विरेचनं च॥ सु० उ० ५६।१०

६. तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमलसीभूतमुक्लेखवेदादौ पायवित्वा सलवणमुण वारि, ततः स्वेदन-वर्तिप्रणिधानाभ्यामुपाचरेदुपवासयेकचैनम् । च० वि० २।१३

७ विरुन्तिकालसक्यीरध्यां प्रशासनं दितम् । नाकेन प्रस्वस्यां च तथा शोधनभेवजै ॥ यो० र०

५ रवर के वैग या बोतल मे गरम पानी भरकर उससे उदर का स्वेदन करे।

६. पाचनार्यं पथ्यादि चूर्णं १ (सु० उ० ५६) ३-३ ग्राम, आद्या-आद्या घण्टे पर ५-६ वार गरम पानी से खिलावे।

७ विरेचनार्थं फलवर्ति का विधान है। इसके प्रयोग से मल और अधोवायु का

अनुलोमन होता है। योग इस प्रकार है-

फलवर्ति -पीपर, गृहधूम (रस्रोईघर का झाला), मदनफल, सरसो, निशोध, स्वर्णक्षीरी, वच, किण्व, कूठ, दन्ती तथा यवक्षार को पीसकर उसमे नमक और गोमूत्र मिलाकर हाथ के अगूठे जितनी मोटी वर्ती वनायें, फिर इसे घी या तेल चुपडकर प्रयोग करे। अथवा--

८. इच्छाभेदी रस ५०० मि० ग्रा० की माश्रा मे शर्वत के साथ पिलाकर विरेचन करावे। इससे वमन और विरेचन दोनों काम हो जाता है।

९ उदरजूल की अधिकता हो, तो दारुपट्क लेप उदर पर लगाना चाहिए। दारुबट्क—देवदार, वच, कूठ, सोवा का बीज, होग और सेंधानमक समान भाग लेकर कूट पीसकर सुखोज्ण लेप करे। अथवा—

१० जो का आटा मट्ठा मे पीसकर, यवावार मिलाकर गरम कर उदर पर

११ दीपन-पाचन के लिए हिंगुद्धिकत्तरादि चूर्ण (चरक) रसोनवटी (वैद्य-जीवन) गन्धकवटी, हिंग्वादि वटी सादि का प्रयोग करे।

अन्य पाचन औषघो मे काकायनवटी, कुवेराक्षवटी, धनञ्जयवटी, अजीर्णकण्टक-रस, क्रव्यादरस, नाराचरस, नारायण चूर्ण आदि का प्रयोग करे।

पथ्य

अग्निमान्द्य के समान पथ्य देवे । उण्ण जल दे । सारक तथा मूत्रल पथ्य देवे । घी डालकर खिचडी खिलावे । नीवू, आदी, लह्सुन की चटनी या सलाद दे ।

सवष्य

अध्यक्षन, विरुद्धाशन, असात्म्य आहार, गुरु आहार और अप्रिय, रूक्ष, कठिन आहार नहीं देना चाहिए।

आनाह, ओष्मान और साटोप

परिचय-आनाह शब्द से सामान्य कव्ज (Simple Constipation?) जाना

१ पथ्यावचाहिङ्गुकलिङ्गगृजसौवर्चले सातिविषेश्च चूर्णम् । सुलाम्युपीत विनिद्दन्त्यजीर्णं शूलं विस्चीमरुचिन्न सद्य ॥ सु० ७० ५६।१४

² Constipation means an undue delay in the evacuation of faeces. This may be due to abnormal retention of faecal matter or delay in the discharge of excreta from the rectum. Other symptoms, such as abdominal discomfort or fullness and flatulence, may be associated with constipation.

८. अशं के मस्से होना, महास्रोत की गतिशीलता का अभाव आदि कारणो से आनाह रोग हो जाता है।


निवंचन

जिस रोग मे अध्वं और अध. या उभय मार्ग में वायु की विकृति से अवरोध हो जाने के कारण मल एव वायु की प्रवृत्ति न हो तथा उदर भीतर से कसा हुआ एव वंधा हुआ-सा प्रतीत होवे, उसे आनाह कहते हैं। आङ् उपसर्ग पूर्वक णहबन्धने धातु से आनाह शब्द बनता है—'आ समन्ताल ह्यते वध्यतेऽवरुष्यते वा मलस्य वायोध मार्गो यस्मिन् रोगे स आनाह'।

आनाह के भेद

दूष्य तथा अधिष्ठान-भेद से आनाह दो प्रकार का होता है— १. आमरस (अपन्व अन्न) जन्य तथा आमारायोत्य और

२. पुरीषजन्य तथा पनवाशयोत्य ।



संप्राप्ति

आमदोष (अपक्व अस्र) और पुरीप, क्रमश आमाशय तथा पक्वाशय में धीरे-धीरे सचित होते हुए, विकृत वायु से अवरुद्ध होकर अपने यथोचित मार्ग से जब नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में महास्रोत की गतिविधि का अवरुद्ध हो जाना आनग्द रोग कहा जाता है।

मामज बानाह का लक्षण

आमरस से उत्पन्न हुए आनाह मे प्यास, प्रतिश्याय, शिर में जलन, आमाशय मे शूल तथा भारीपन, वमन की इच्छा होना और डकार न आना, ये लक्षण होते हैं। इसका पाइलोरिक आब्स्ट्रक्शन (Pyloric obstruction) से साम्य है।

१ श्राम शकृदा निचित क्रमेण भूयो विवद्ध विग्रणानिछेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेन विकारमानाद्दमुदाहरन्ति ॥ सु० उ० ५६।२०

२ तस्मिन् भवन्त्याभसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायश्चिरो विदाहाः। आमानये शूलमयो गुरुखं हरलास उद्गार्विमातनञ्च ॥ स्० ७० ५६।११

पुरीषज आनाह लक्षण

पुरीवजन्य एवन्त्र पक्वाशय में उत्पन्न हुए आनाह में किट और पीठ जकड जाते हैं और शूल होता है, मूत्र तथा मल का अवरोध हो जाता है, रोगी मूच्छित हो जाता है, कभी-कभी वमन में पुरीप आता है, कभी श्वास उभड जाता है और अलसक रोग के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

आमज आनाह चिकित्सासूत्र^२

१ आमदोपजन्य अथवा अविपन्त अन्नरसजन्य आनाह रोग मे रोगी को सर्व-प्रथम वमन कराना चाहिए।

२ वमनान्तर रोगी को जब भूख मालूम हो, तो उसे भोजन-विधि के अनुसार पिप्पल्यादि गण (सुश्रुतोक्त) की दीपनीय औपघो को डालकर पकाये गये जल से सिद्ध पेया, विलेपी, यवागू खाने को देना चाहिए।

आमज आनाह मे औषध-प्रयोग

9 अोषध-प्रयोग के पूर्व रोगी का स्नेहन, स्वेदन, नस्य, अभ्यग आदि का प्रयोग कर वायु तथा आमदोप को गतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।

२. व्यवस्थापत्र---

१. प्रति आधा घण्टे पर ६-७ वार

हिंग्वष्टक चूर्ण २ ग्राम शखभस्म २५० मि० ग्रा० सर्जिकाक्षार ३ ग्राम सुखोष्ण जल से। १ मात्रा

- २ चूसने के लिए प्रति १५ मिनट पर हिंग्वादि वटी या रसोनादि वटी २-२ गोली
- ३. आहार देने के वाद
 द्राक्षासव (उत्तम कोटि का) २५ मि० ग्रा०
 समान जल मिलाकर पीना। 9 मात्रा
- ४ रात मे— आरोग्यविधनी वटी १ ग्राम सुस्रोब्ण जल से।

१ स्तम्भ कटीपृष्ठपुरीपमूत्रे शूलोऽथमूर्च्छा सशक्तदमेच्च । श्रास्थ्र पुष्ताशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च्लक्षणानि ॥ सु० उ० ५६।२३

२ आमोद्भवे वान्तसुपक्रमेत संसर्गभक्तकमदीपनीयैः। सु० उ० ५६।६३

कायचिकित्सा

आहार

जौ की रोटी, मूग की दाल, अदरख, लहसुन, नीबू, मूली पतली, हरी मिर्च, सेंघानमक आदि वातानुलोमन डकार के प्रवर्तन एव दीपन-पाचन पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए।

पुरीषज आनाह चिकित्सासूत्र

9 वायु के अवरोध को दूरकर स्वाभाविक मलदोष को प्रवृत्त कराने का प्रयत्न करना चाहिए।

२ यदि रोगी के मुखमार्ग से पुरीष निकल रहा हो, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यदि रोगी के अभिभावक विशेष आग्रह करें, तो उसकी यथोचित चिकित्सा करके वायु की गति को अनुलोम बनाना चाहिए।

३. पुरीषज आनाह मे स्वेदन, अभ्यग, अजन, नस्य, पाचन औषध-प्रयोग, फलवर्ति एव विरेचन देना चाहिए।

४. रोगी के उदर का स्वेदन कर आस्थापनवस्ति देनी चाहिए।

५. उदर पर तैलाभ्यग, लेप तथा गुदर्वीत लगाकर मलावरोध को दूर करना चाहिए।

पुरीषज आनाह मे औषध

9 आसव-अरिष्ट, एरण्डस्नेह, अमलतास की गुद्दी, निशोध, शुद्ध जयपाल बीज तथा गोसूत्र का प्रयोग सुविधानुसार करे।

२. विरेचन के लिए राजरेचन (रसायनसार) का प्रयोग करे। योग-अमलतास का गूदा ५०० ग्राम लेकर, कूटकर १ लीटर नीवू के रस मे २ दिन तक भिगोवे। फिर मसलकर रस छान ले। उसमे दालचीनी चूर्ण २५ ग्राम, सोठ चूर्ण २५ ग्राम, कालीमिचं चूर्ण २५ ग्राम, पीपर चूर्ण २५ ग्राम, भुनी हीग २५ ग्राम, बडी इलायची बीज चूर्ण ६ ग्राम, सेंधानमक का चूर्ण ६० ग्राम, कालानमक चूर्ण ६० ग्राम, हलका भुना कालादाना चूर्ण ६० ग्राम और सफेदजीरा भुना चूर्ण ६० ग्राम लेकर सबको घोटकर मिला देवे। फिर बीज निकाला हुआ ६० ग्राम मुनक्का चटनी की तरह पीसकर उक्त चूर्ण मे मिला दे। इसे रात मे सोते समय १० ग्राम की मात्रा मे कुनकुने पानी से खिलावे। यह सुखविरेचन और वातानुलोमन है।

३ आस्थापन विस्ति मे निशोथ, वित्व, पीपर, कूठ, सरसो, वच, इन्द्रयय, सीफ और मुलहठी का प्रयोग करना चाहिए।

४. गुदवित के रूप मे- १ फलवित २. हिंग्वादि वित ३ आगारघूमादि वित अथवा ४ रामठादि वित का प्रयोग करना चाहिए।

५. खाने की औषधो मे—हिंग्वादि चूणें, वचादि चूणें, नारायण चूणें, नाराव चूणें, पचसकार चूणें, पट्मकार चूणें, नाराच रस एव इच्छाभेदी रस का प्रयोग करे।

६. उदर पर दारुपट्क लेग (देवदारु, घोडवच, कूठ, सीवा का वीज, हींग और सेघानमक) लगाना चाहिए। अयवा-होंग और अजवायन समभाग मे लेकर पीसकर

विसूचिका-अलसक-विलम्बिका-आनाह-आध्मान-प्रत्याध्मान-आटोप २

गरम कर लेप करे। अथवा—जो के आटे मे यवाखार मिलाकर मट्ठे मे पीसकर गरम कर के उदर पर लेप करना चाहिए।

७. रेचन औषधो मे—कम्पिल्लक, करज, स्वर्णक्षीरी, अमलतास, कालादाना, निशोध आदि का यथालाभ प्रयोग करना चाहिए।

व्यवस्थापत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४ वार
हिंगूग्रगन्धादि चूर्ण (चरक) १२ ग्राम
हरीतक्यादि चूर्ण (च० द०) ८ ग्राम
सुखोष्ण जल से। योग—४ मात्रा

२ भोजन के प्रथम ग्रास मे २ वार

हिंग्वष्टक चूर्ण <u>६ ग्राम</u> घीके साथ । योग—२ मात्रा

३ भोजनोत्तर २ वार

अभयारिष्ट २५ मि० ली० समान जल से पीना । १ मात्रा

४ रात में सोते समय---

नाराच चूर्णं १० ग्राम अथवा इच्छाभेदी रस २५० मि० ग्रा० जल से ।

५ १-१ घण्टे पर चूसना

चित्रकादि, हिंग्वादि अथवा रसोनादि वटी १-१ गोली

पथ्य

जो की दिलया या जो की रोटी, मूँग की दाल, पुराना अगहनी चावल, खिचडी पतली, पतली मूली, अमलतास का फूल, निशोध, वथुआ, कच्चा पपीता, सिहजन की फली, नेनुआ, ताड या ख़जूर की ताडी, मुनक्का, लींग, हीग, नीबू, अदरख आदि पथ्य हैं।

अपध्य

आलस्य, उपेक्षा, गुरु पदार्थं, विष्टम्भी पदार्थं, विषद्ध आहार, मटर, चना, सेम आदि, कोदो, महुआ, आलू, कोहडा, कटहल, जामुन, उडद या चावल के आटे से या मैंदे से बने आहार और वेगो का अवरोध अपथ्य है।

आध्मान े

(Tympanitis, Flatulence)

निदान, संप्राप्ति लक्षण

पित्त की न्यूनता के कारण आहार का ठीक से पाचन न होने तथा प्रकुपित वायु के निरोध से भयकर रूप मे उत्पन्न हुए आटोप (गुडगुडाहट) के सहित अत्यधिक पीडायुक्त पक्वाशय मे शोथमय वायु का सचय होना आध्मान कहलाता है।

वक्तव्य—यह रोग पुरीषज आनाह से साम्य रखता है। इसमे भी पुरीष का अप्रवर्तन और वायु का सचय होता है, किन्तु मुख्य रूप से वायु का अत्यधिक सचय होने से इस रोग का पाठ वातव्याधि के प्रकरण मे किया गया है। इसे जनरेलाइण्ड टेम्पनाइटिस (Generalised Tynpanitis) कहते हैं।

चिकित्सासूत्र

- पिक्त हुए दूषित मल और वायुसश्चय को वातानुलोमन औषधो के प्रयोग से बाहर निकालना चाहिए।
- २. शिथिल हुए पक्वाशय को सिक्रय बनाने के लिए आन्दोलित करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- ३ उदर का स्वेदन, अभ्यग, लेप, गुदर्वात औरर्े, आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए।
 - ४ दारुषट्क लेप को गरम करके लेप करना चाहिए।
 - ५ हॉट वाटर वैग से गरम-गरम स्वेदन करना चाहिए।

औषध-प्रयोग

हिंग्वादि चूर्णं, हिंग्वष्टक चूर्णं, शिवाक्षार पाचन चूर्णं, नारायण चूर्णं आदि का प्रयोग करना उत्तम है।

व्यवस्था-पत्र

- १ ३-३ घण्टे पर दिन मे ४ बार हिंगूग्रगन्धादि चूर्णं १२ ग्राम उज्जोदक से। योग ४ मात्रा
- २ भोजन के पूर्व ३ बार लशुनादि या हिंग्वादि वटी २--२ गोली चूसना ।
- ३ भोजनोत्तर २ बार कुमार्यासव ३० मि० ली० समान जल से ।

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं मृशम् ।
 आध्मानमिति जानीयाद् घोरं वातिनरोधजम् ॥ स० नि १।८८

४ रात मे सोते समय
पथ्यादि चूणं (सुश्रुत) ५ ग्राम
पचसकार ५ ग्राम
उज्जोदक से। 9 मात्रा

प्रत्याध्मान

निदान एवं लक्षण

यदि कफ और वायु के विकार से उदर के ऊपरी भाग आमाशय मे गुटगुडाहट, अत्यिधिक पीडायुक्त वायु का सचय हो तथा पार्श्व एव हृदय मे पीडा का अभाव हो, तो उसे प्रत्याष्मान कहते हैं।

वक्तव्य—यह आमाशय मे वायुसचय होने का रोग है। इसका साम्य आमज आनाह के साथ है। इसमे आमदोष तथा कफावृत वात होता है। इसे गैस्ट्रो टेम्प-नाइटिस (Gastro Tympanitis) कहते है। इस प्रकार आध्मान और प्रत्याद्यान क्रमश पुरीपज आनाह तथा आमज आनाह सदृश रोग हैं और इनकी चिकित्सा प्रक्रिया भी पूर्वकथित आनाह के दोनो प्रकारों के ही समान है।

व्यवस्था-पत्र

१. प्रात -साय २ वार

•		
	अग्नितुण्डीवटी	२५० मि० ग्रा०
	रससिन्दूर	२५० मि० ग्रा०
	त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु	२ ग्राम
	चित्रकादि वटी	२ गोली
		२ मात्रा
भुः	नी अजवायन का चूर्ण २	ग्राम मिलाकर जल से ।
_	भोजन के पूर्व २ बार प्र	
	हिंग्वष्टक चूर्णं	६ग्राम
	घी मिलाकर खाना।	२ मात्रा
₹	भोजन के वाद	
	लशुनादि वटी	२ ग्राम
	हिंगूप्रगन्धादि	४ ग्राम
	जल से ।	२ मात्रा
٧.	रात में सोते समय	
	पचसकार चूर्ण	६ग्राम

१ मात्रा

गरम जल से।

विमुक्तपार्श्वहृद्यं तदेवामाशयोश्यितम् ।
 प्रस्याध्मान विजानीयात् कफव्याकुलितानिलम् ॥ मु० नि० १।८९

कायचिकित्सा

५ उदर पर लेप दारुषट्क लेप लगाना।

सापेक्ष निदान (१)

	आमज आनाह	प्रत्याध्मान
9	आमाशयोत्य	१. आमाशयोत्य
२	दोपआम, वात	२. दोष—कफावृत वात
	दूष्य-मल, मलवायु	दूष्य—मलवायु, मल
₹	तृष्णा, प्रतिश्याय,	३ आवश्यक नहीं।
	िरोविदाह, हृत्स्तम्भ	
४	आमाशयधूल, गुरुत्व,	४. आमारायशूल, गुस्त्व,
	उद्गार विघात	उद्गार-विघात
4	माम, अनिवार्यं मलसचय	५. मलसचय अनिवार्य नही ।
Ę	×	६. उदर मे आटोप, अत्यधिक पीडा
		उदर का आध्मान
৩	वातनिरोध अनिवायं नही	७ वातनिरोध
6	पाइलोरिक आव्स्ट्रक्शन	८ गैस्ट्रो टिम्पेनाइटिस
	(Pyloric obstruction)	(Gastro Tympanitis)
	सायेक्ष निव	ग्रन (२)
	पुरीवज आनाह	आध्मान
٩.	पक्वाशयोत्य -	१ पक्वाशयोत्य ,
₹.	दोपवात	२ दोपवात
	दूष्य—मल, मलवायु	दूर्प्य—मलवायु, मल
₹	कटिपृष्ठस्तम्भ, मल-मूत्रस्तम्भ,	३ कटिपृष्ठस्तम्भ आदि वावश्यक नहीं।
	कटिपृष्ठ शूल, मूर्च्छा, पुरीप-वमन	
	श्वास तथा अलसक के लक्षण	
٧.	मलसचय अनिवार्य	४. मलसचय अनिवार्य नही ।
4	इन्टेस्टिनल आव्स्ट्रक्सन	५. जनरल टिम्पेनाइटिस
	(Intestinal Obstruction)	(General Tympanitis)
आदोप		

आटोप

आटोप शब्द का प्रयोग 'आध्मान रोग' के लक्षण मे किया गया है। 'साटोप-मत्युग्रहजमाध्मातमुदर भृशम्। आध्मानमिति त विद्याद् घोर वातनिरोधजम्॥' - (सु० नि० १।८८)

9 यहाँ पर सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने साटोप का निर्वचन करते हुए कहा है—'आटोप सञ्चलन तेन सह नर्तते, इति साटोपम्'।

- २ विजयरिक्षत ने माधवनिदान की मधुकीप टीका मे आटोप का अर्थ दो बाचार्यों के मत से दिया है-
 - मा० नि० (मधुकोष) ३ 'ओटोपश्चलचलनम्' इति गयदास ।
 - र जाटापश्चलपलनम् हात गयदास । ४ 'बाटोप गुडगुडा शब्द ', इति कार्तिकः । वातव्याधि, ऑध्मान
- ५ भाविमध्य ने उदर मे होनेवाले गुड-गुड की ध्विन को आटोप कहा है-'काटोपो गुडगुडाशब्द प्रोक्तो जठरसम्भव ।

इस प्रकार 'आटोप' एक लक्षण या व्याधि है, जिसमे उदर मे वायु की गति-शीलता के कारण गडगडाहट होती है और जैसे आसमान को बादल आच्छादित कर देते हैं अथवा जैसे सर्प अपने फन को चौडा करके एक आच्छादन या मेहराब बना देता है, उसी तरह उदर की आच्छादित करनेवाला तथा ध्वनि उत्पन्न करनेवाला भीर वाय के विकार से उत्पन्न होनेवाला यह आटोप रोग है। इस रोग मे उदावर्त, मानाह, माहमान, प्रत्याध्मान, अष्टीला, प्रत्यष्टीला प्रमृति वातप्रधान व्याधियो के लक्षणों के सदश समधिक लक्षण होते हैं।

इसके जनक कारणों में वातव्याधि के सभी निदान हैं, विशेषकर कोहडा, कटहल, वडहल, उडद का वडा अथवा कलाय (मटर) का सत्त आटोप का घटाटोप उत्पन्न करते हैं।

चिकित्सा

इसकी चिकित्सा मे वातानुलोमन उपचार प्रमुख है। स्नेहन, स्वेदन, दीपन-पाचन, मद्य, आसव, अरिष्ट, होग, लहसुन, अदरख का प्रयोग करना श्रेयस्कर है।

इसमे अजीर्णाधिकार की औषघो का प्रयोग करना चाहिए। हिंग्वादि चूर्ण, हिंग्वष्टक चूर्ण, भास्करलवण, हिंग्वादि वटी तथा रसोनवटी का प्रयोग बारी-वारी से करते रहना चाहिए।

दशम अध्याय छर्दि एवं अम्लपित्त

र्छीद

पर्याय और परिचय

वमन, विम, वान्ति, छिदि, उल्टी और कै ये सभी पर्याय शब्द है। आमाशय पर अन्त्र एव महाप्राचीरा पेशी के दबाव से उत्पन्न क्षोभ के कारण अन्ननिलका तथा मुख से आमाशय स्थित वस्तु का वेगपूर्वक वाहर निकलना 'छिदि' है।

छदि शब्द का निवंचन

जिस न्याधि मे प्रकुपित जदान वायु मुखगह्वर को आच्छादित करता (भरता) हुआ और अगो को अनेक तरह की वेदनाओ से पीडित करता हुआ एव आमाशयगत पदार्थों को वेगपूर्वक बाहर निकालता हुआ स्वय बाहर निकलने के लिए मुखमार्ग की ओर दौड पडता है, उसे छर्दि कहते हैं।

निरुक्ति — जो मुलगुहा को आच्छादित या भरपूर कर दे और अगों को पीडित करे, उसे 'छिंदि' कहते हैं। छिंद शब्द का निर्माण दो धातुओं से हुआ है। 'छद अपवारणे' और 'अर्द हिंसायाम्' इन दो धातुओं से अक्षर लोप और आगम होकर 'पृषोदरादिगण' से छिंद शब्द बनता है। 3

¹ By vomiting is meant a forceful expulsion of stomach contents through the mouth, as the result of increased intra-abdominal pressure, produced by abdominal and diaphragmatic contractions. The act of vomiting is frequently preceded or accompanied by nausea or a peculiar feeling of impeding vomiting, usually experienced in throat or epigastrium. Due to a sudden rise of intra-abdominal pressure, secondary to simultaneous, vigorous and rhythmic contractions of the diaphragm and abdominal muscles, the gastro-intestinal contents are forcefully expelled through the mouth, in vomiting. The act of vomiting is highly complex and involves descent and contraction of the diaphragm, spasm of abdominal muscles, pyloric spasm with relaxation of the cardia, forward and upward movement of the larynx and hyoid bone, elevation of the soft palate, closure of glottis and rise of intra-abdominal and intra-pulmonary pressures

[—]क्लिनिकल डायग्नोसिस, ए० ५८ से साभार।

२ छादगन्नानन वेगैरदैयन्नक्षमञ्जने । निरुच्यते छदिरिति दोषो वक्त्राद् बहिश्चरन् ॥ ग्रु० उ० व० ४९

३ छादयति मुर्ख, अदैयति चाङ्गानीति छर्दि । 'छद अपवारणे' 'अद हिंसायाम्' अनयो ोदरादित्वेन रूपसिद्धि । मा० नि० छर्दि० ४ पर मधुकोष ।

र्छाद का सामान्य निदान⁹

- १ भोजन से सम्बन्धित-
 - १. अत्यन्त द्रव (जलीय) आहार का सेवन ।
 - २ अत्यधिक चिकने पदार्थ खाना।
 - ३ मन की पसन्द के प्रतिकूल आहार करना।
 - ४ नमकीन पदार्थी का बहुतायत मे सेवन करना।
 - ५ भोजन के नियमित समय के पूर्व या वाद मे (असमय) भोजन करना ।
 - ६ जठराग्नि की पाचन-क्षमता से अधिक भोजन करना।
 - ७ असातम्य (अहितकर) भोजन करना ।
 - ८ अजीणं होना।
- २. विहार से सम्बन्धित-
 - ९ शीघ्रता से भोजन करना।
 - १०. अधिक श्रम करना।
 - ११ भयग्रस्त होना।
 - १२. उद्देग होना।
- ३ अन्य---
 - १३ उदर मे कृमियो की उत्पत्ति होना।
 - १४ स्त्री का सगर्भा (आपन्नसत्त्व) होना ।
 - १५ शरीर मे आमज विकारो का बढ जाना।
 - १६ वीभत्स घृणाजनक दृश्यो का देखना।

अतिद्रव---आमाशय मे अतिद्रव की उपस्थिति, वहाँ अत्यधिक तनाव (Over distention) उत्पन्न करके प्रत्यावर्तन द्वारा छर्दि उत्पन्न करती है।

अतिस्निग्ध-अतिस्निग्ध भोजन दुष्पाच्य एव कफवर्धंक होता है। वह विकृत होकर स्रोतोरोध तथा आमाशियक क्लैब्मिककला मे क्षोभ उत्पन्न करके वमन कराता है।

१ अतिद्रवैरतिनिग्धेरहृषैक्वणैरति ।

असाले चातिमात्रेश्च तथाऽसात्म्येश्च मोजने ॥

अमाद क्षयात्तथोद्देगादजीर्णाद कृमिदोपत ।

नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्रुतः चनत ॥

अस्थन्तासपरीतस्य छर्देने सम्मनो ध्रुवम् ।

बीमत्सेर्हेतुर्भिश्चान्येद्रु तमुत्क्लेशितो बलात ॥ सु० ड० ४९।३–५

२ मा० नि० की श्रीसुदर्शनशास्त्री की टीका (विमर्शे) से सामार उद्धत ।

अहुद्य-खाने मे अरुचिकर एवं आमाशियक श्लैष्मिककला मे सक्षोभ उत्पन्न करनेवाले सभी पदार्थ अहुद्य कहलाते हैं। मुख द्वारा ग्रहण करने पर आमाशय मे क्षोभ उत्पन्न करके प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन करानेवाले वामक या अन्य असात्म्य 'पदार्थ इस वर्ग मे आते हैं।

अतिलवण —लवण रलेष्म-िपत्तवर्धक होने से स्रोतोरीध एव विदग्ध पित्त का आधिक्य उत्पन्न करके व्यमन कराता है। इसके अतिरिक्त लवण मे आस्नुतीय पीडन (Osmotic pressure) बढाकर अपनी ओर द्रवाश को खीच लेने की अद्भृत शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण वह आमाशयस्य केशिकाओ की दीवारों से अत्यधिक मात्रा में द्रवाश का स्नाव कराकर उदर को फुला देता है, जिमके फलस्वरूप प्रत्यावर्तनिक्रियाजन्य छिंद की उत्पत्ति होती है। इसी दृष्टिकोण से लवण का सतृप्त घोल वमनार्थं प्रयुक्त होता है।

अकाल तथा अतिमात्र भोजन भोजन का परिपाक करने के लिए निश्चित समय एव निश्चित प्रमाण मे पाचक रस का स्नाव होता है। असमय मे भोजन करने से आमाशियक रस का स्नाव न होने से भोजन का परिपाक नहीं होता, एव वह विकृत होकर अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा छर्दि को उत्पन्न करता है। ठीक यही परिणाम अधिक भाजन करने पर भी होता है।

असातम्य भोजन — आमाशय मे क्षोभ उत्पन्न करनेवाले सिखया सदृश विष तथा अन्य वामक और अनिष्ट पदार्थ असातम्य कहलाते हैं। इनमे से कुछ केन्द्र पर साक्षात् प्रभाव द्वारा एव कुछ प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा और कुछ उमय (दोनो) विधि से वमन कराते हैं।

श्रम, मय तथा उद्देग—ये मानसिक कारण है एव इनके द्वारा होनेवाली छर्दि केन्द्रीय छर्दि (Central vomiting) कहलाती है। इसमे मिचली नही होती।

अजीणं — अजीणं के कारण आमाशयस्य पदार्थं विकृत होकर आमविषोत्पति तथा वायु की उत्पत्ति (Gas formation) के द्वारा प्रत्यावर्तनजन्य छर्दि को उत्पन्न करता है।

कृमिदोष—आमाशय मे गण्डूपद कृमि की उपस्यित से पत्यावतंन क्रिया द्वारा वमन होता है। इमके अतिरिक्त कभी ये कुण्डलित होकर अन्त्रावरोध एव उदावतं -उत्पन्न करके भी वमन के प्रवर्तक होते हैं।

सगर्भावस्था—गर्भ के पीडन से उत्पन्न वायु की विकृति से छर्दि की उत्पत्ति होती है ('गर्भोत्पीडनेन वातवैगुण्याच्छर्दि'—मधुकोष टीका) गर्भ के प्रथम तीन मासो मे प्राय वमन होता है। इसका कारण प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चरक ने भी तृतीय मास मे होनेवाले दौहूंद तथा गर्भ-धारण के सामान्य लक्षणों का वर्णन करते हुए छर्दि का वर्णन किया है, तद्यथा—'आतंवादर्शनमास्यसम्भवणमनन्नाभिलाप छर्दिररोचकीऽम्लकामता च विशेषेण' इत्रादि।

स्रतिशोध्र मोलन परमा—अतिशोधातापूर्वक भोजन करने से भी आमाशय के शोध मरने एवं क्षोभ होने पर प्रत्यानतंनकरण छिंद होती है।

वीमस कादि हेतु — दन रेपुर्श को गापितक कारणों के अन्तर्गत ही समझना चाहिये। ये मन्तिरकमत यामक नेन्द्र पर पत्वक्ष प्रभाव उत्तक्ष करके वमन कराते है।

अन्य कारण—हन वाहा नाएणों है सितिरिक्त आमाश्य के कुछ रोगों (आमाश-विक कन्यशोध, ल्यामायय क्या तथा धातक अर्जुद, आमाश्य का तीम्र विस्फार) में भी आमाश्यिक छोभ तथा तक्लर प्रत्यासन क्रिया के ज्ञारा भी छिद होती है। सक्षोप द्वारा होने पाठ सभी प्रयन प्राणश (Vagus) नाटी की सिजयता पर निभर हैं।

छर्दि को आधुनिक परिभाषा

अन्नतिया एवं मुग द्वारा जामाधिक पदानों को वेगपूर्वक व हर निकालने की किया को छदि कहते हैं --'Vomiting is forcible expulsion of the gastric contents through the resophingus and mouth'

पाखात्म बैचक के व्याधान पर छदि को तीन यह भागों में विभक्त किया जाता है-

प बेन्द्रीय छिंद (Central Vomiting)—यागफ केन्द्र मस्तिष्क में प्राणगुहात (Floor of the sourth ventricle) में अपन्यत है। किमी वस्तु के प्रति
स्वामानिक पूणा या गय आदि कारणों में वामक केन्द्र की उत्तेजना के फलस्वरप
होनेवाली छिंद केन्द्रीय छिंद महत्राती है। इस प्रकार की छिंद अधिकतर अमहिष्णु
स्वक्तियों में पायी जाती है। जिनकों भय, प्रमा या भीद्र आदि कारणों से पहले कभी
वगन हो चुका है, उनकी रमृति तथा अनुभव से भी पुन पमन हो जाता है। इसके
अतिरिक्त मस्तिरामपुँद (Cerebral tumour) एवं मस्तिष्कावरणशीय
(Meningitis) सद्य मस्तिर्क के रोगों में भी छिंद होती है। इसका प्रधान कारण
घीर्यान्तरोय निरीप (Intracremal pressure) की बृद्धि तथा वामक केन्द्र की
उत्तेजना है। केन्द्रीय छिंद की यह विद्यापना है, कि इसमें अन्य छिंद के समान छिंद
के पूर्व मिन्द नी तथा उदस्कृत या उदस्क अन्य विकार नहीं पाये जाते, किन्तु इसमें
चिरोवेदना हो सकती है।

र प्रत्यावर्तनिक्रियां जन्य छिंद (Rellex vomiting)—यह आभाशयस्थ विकृत खाद्य पदार्थ तया विभिन्न ऐन्द्रियक एव अनैन्द्रियक विपो से आमाशियक रलेष्मल कला के क्षोभ तथा माजनादि से आमाशय के अधिक तन जाने में होती है। इसके अतिरिक्त किमी मावेदनिक नाटी की गीडायुक्त उत्तेजना के फन्स्वरूप भी प्रत्यावनित छिंद हो सकती है।

रे विण्जन्य छोंड — (Toxic vomiting) — एपोमाफीन सदृश वामक पदार्थ वामक थेन्द्र पर प्रन्यक्ष प्रभाव द्वारा वमन कराते है। इमके अतिरिक्त ताम्र तथा ज्वणजल आमाश्रय भे पहुँच कर प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन कराते हैं। सूत्र-विषमयता तथा परमावदकग्रन्थिता (Hyperthyroidism) के द्वारा उर्स्पन्न विष अहुद्य--- खाने मे अविचकर एव आमाशयिक व्लैष्मिककला मे सक्षोभ उत्पन्न करनेवाले सभी पदार्थ अहुद्य कहलाते हैं। मुख द्वारा ग्रहण करने पर आमाशय मे स्नोभ उत्पन्न करके प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन करानेवाले वामक या अन्य असात्म्य 'पदार्थ इस वर्ग मे आते हैं।

अतिलवण — लवण श्लेष्म-पित्तवर्धंक होने से स्रोतोरोध एव विदग्ध पित्त का आधिवय उत्पन्न करके व्यमन कराता है। इसके अतिरिक्त लवण मे आसुतीय पीडन (Osmotic pressure) बढ़ाकर अपनी ओर द्रवाश को खीच लेने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण वह आमाशयस्थ केशिकाओ की दीवारो से अत्यधिक मात्रा मे द्रवाश का स्नाव कराकर उदर को फुला देता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्यावर्तनक्रियाजन्य छिंद की उत्पत्ति होती है। इसी दृष्टिकोण से लवण का सतृप्त घोल वमनाय प्रयुक्त होता है।

अकाल तथा अतिमात्र भोजन भोजन का परिपाक करने के लिए निश्चित समय एव निश्चित प्रमाण में पाचक रस का स्नाव होता है। असमय में भोजन करने से आमाश्यिक रस का स्नाव न होने से भोजन का परिपाक नहीं होता, एवं वह विकृत होकर अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा छिंद को उत्पन्न करता है। ठीक यही परिणाम अधिक भोजन करने पर भी होता है।

असातम्य मोजन — आमाशय में क्षोभ उत्पन्न करनेवाले सिखया सदृश विष तथा अन्य वामक और अनिष्ट पदार्थ असातम्य कहलाते हैं। इनमें से कुछ केन्द्र पर साक्षात् प्रभाव द्वारा एवं कुछ प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा और कुछ उमय (दोनो) विधि से वमन कराते हैं।

श्रम, मय तथा उद्देग—ये मानसिक कारण है एव इनके द्वारा होनेवाली छर्दि केन्द्रीय छर्दि (Central vomiting) कहलाती है। इसमें मिचली नहीं होती।

अजीणं — अजीणं के कारण आमाशयस्य पदार्थं विकृत होकर आमिविषोत्पति तथा वायु की उत्पत्ति (Gas formation) के द्वारा प्रत्यावर्तनजन्य छर्दि को उत्पन्न करता है।

कृमिदोष—आमाशय मे गण्डूपद कृमि की उपस्थिति से पत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन होता है। इनके अतिरिक्त कभी ये कुण्डलित होकर अन्त्रावरोध एव उदावर्त र उत्पन्न करके भी वमन के प्रवर्तक होते हैं।

सगर्भावस्था—गर्भ के पीडन से उत्पन्न वायु की विकृति से छदि की उत्पत्ति होती है ('गर्भोत्पीडनेन वातवैगुण्याच्छिंद'—मधुकोष टीका) गर्भ के प्रथम तीन मासो मे प्राय वमन होता है। इसका कारण प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) के अतिरिक्त कुछ नही है। चरक ने भी तृतीय मास मे होनेवाले दौहुंद तथा गर्भ- धारण के सामान्य लक्षणो का वर्णन करते हुए छदि का वर्णन किया है, तद्यथा—'आतंवादर्शनमास्यसम्भवणमनन्नाभिलाप छिंदररोचकोऽम्लकामता च विशेषेण' इत्रादि।

अतिशोध्र मोजन करना—अतिशोध्रतापूर्वक भोजन करने से भी आमाशय के शीध्र भरने एव क्षोम होने पर प्रत्यावर्तनजन्य छदि होती है।

वीमत्स आदि हेतु—इन हेतुओं को मानसिक कारणों के अन्तर्गत ही समझना चाहिये। ये मस्तिष्कगत वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करके वमन कराते हैं।

अन्य कारण—इन वाह्य कारणो के अतिरिक्त आमाशय के कुछ रोगो (आमाश-यिक कलाशोध, आमाशय यण तथा घातक अर्बुद, आमाशय का तीव विस्फार) मे भी आमाशयिक स्रोभ तथा तज्जन्य प्रत्यावर्तन क्रिया के द्वारा भी छिंद होती है। ससीम द्वारा होने वाले सभी वमन प्राणदा (Vagus) नाही की सिक्रयता पर निर्मर हैं।

छर्दि को आधुनिक परिभाषा

अञ्चनलिका एव मुख द्वारा आमाशयिक पदार्थों को वेगपूर्वक व हर निकालने की क्रिया को छदि कहते हैं--'Vomiting is forcible expulsion of the gastric contents through the oesophagus and mouth'

पाश्चात्य वैद्यक के आधार पर छदि को तीन वडे भागो मे विभक्त किया जाता है-

- 9. केन्द्रीय छर्दि (Central Vomiting)—वामक केन्द्र मस्तिष्क मे प्राणगुहातल (Floor of the fourth ventricle) मे अवस्थित है। किसी वस्तु के प्रति
 स्वाभाविक घृणा या भय आदि कारणो से वामक केन्द्र की उत्तेजना के फलस्वरूप
 होनेवाली छर्दि केन्द्रीय छर्दि कहन्त्राती है। इस प्रकार की छर्दि अधिकतर अमहिष्णु
 व्यक्तियों में पायी जाती है। जिनको भय, घृणा या भीड आदि कारणो से पहले कभी
 वमन हो चुका है, उनकी स्मृति तथा अनुभव से भी पुन वमन हो जाता है। इसके
 अतिरिक्त मस्तिष्कार्बुद (Cerebral tumour) एव मस्तिष्कावरणशोथ
 (Meningitis) सवृत्र मस्तिष्क के रोगो में भी छर्दि होती है। इसका प्रधान कारण
 भीर्यान्तरोय निरीड (Intracrenial pressure) की वृद्धि तथा वामक केन्द्र की
 उत्तेजना है। केन्द्रीय छर्दि की यह विशेषता है, कि इसमें अन्य छर्दि के ममान छर्दि
 के पूर्व मिन्न जी तथा उदरशू ज या उदर के अन्य निकार नहीं पाये जाते, किन्तु इसमें
 शिरोवेदना हो सकती है।
- र प्रत्यावर्तनिकवाजन्य छिंद (Reflex vomiting)—यह आभाशयस्य विकृत खाद्य पदार्थ तथा विभिन्न ऐन्द्रियक एव अनैन्द्रियक विषो से आमाशयिक इलेष्मल कला के क्षीभ तथा भोजनादि से आमाशय के अधिक तन जाने मे होती है। इसके अतिरिक्त किसी सावेदनिक नाडी की पीडायुक्त उत्तेजना के फरुस्वरूप भी प्रत्यावितत छिंद हो सकती है।
- रे विण्जन्य छर्डि (Toxic vomiting) एपोमार्फीन सदृश वामक पदार्थ वंभक थेन्द्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा वमन कराते हैं। इसके अतिरिक्त ताम्र तथा ल्वणजल आमाश्य मे पहुँच क प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन कराते हैं। मूत्र-विष्मयता तथा परमाबदुकग्रन्थिता (Hyperthyroidism) के द्वारा उर्देशन विष

वामक केन्द्र पर साक्षात् प्रभाव करके छर्दि को उत्पन्न करते हैं। इस छर्दि मे हुल्लास अधिक, किन्तु वास्तविक वमन कम रहता है। केन्द्रीय तथा प्रत्यावर्तनजन्य छदि से पृथक् करने के लिये यह विशिष्ट लक्षण है।

. वातनाडियों के कारण जो वमन होता है, उनमे अपतन्त्रकजन्य (Hysterial), अर्धावभेदक जन्य, पित्तज (Bilious) तथा मस्तिष्क के विकार तथा प्रत्यावर्तन-क्रियाजन्य, जैसे — पहाड या समुद्रयात्रा काल मे या किसी विशेष यान पर सवारी करने से छदि होती है।

सम्प्राप्ति

- (१) व्यान के साथ मिला हुआ उदान वायु (जिसका एक कम कहवैंगमन है) विरुद्ध आहार के सेवन से प्रवृद्ध हुए (पित्त एव कफ) दोपो को प्रेरित करता हुआ वेगपूर्वेक आमाशयस्य पदार्थों को और कभी-कभी (अन्त्रावरोध होने पर) अन्त्रस्य पदार्थी को भी मुखद्वारा वाहर निकाल देता है, तो छदि रोग की उत्पत्ति होती है।
- (२) जब लवणरसयुक्त लालास्नाय अधिक मात्रा मे आमाशय मे पहुँच जाता है तो तुरन्त छदि उत्पन्न करता है। प्रथमत हृद्-उत्क्लेश होता है अर्थात् हृदय के समीपस्य आमाशयिक छिद्र (हार्दिकद्वार-Cardiac orifice) के समीपस्य भाग में आमाशयस्य पदार्थं को वाहर निकालने की विशेष प्रवृत्ति होती है। आमाशय मे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने पर दुग्धिक, घृतिक इत्यादि सेन्द्रिय अम्लो की उत्पत्ति होती है। ये अम्ल हृदय-प्रदेश मे उत्क्लेश करते हैं और ये अम्ल आमाशय के हार्दिक द्वार को खोलकर ऊपर था जाते हैं।
- (३) तीसरी अवस्था यह है, कि महाप्राचीरा (Diaphragm) पेशी के कडी हो जाने से आमाशय पर दवाव पडता है तथा ग्रहणी छिद्र (Pylorus) बन्द रहता है, साथ ही औदर्य पेशियां सकुचित होती हैं, जिससे हृदय-द्वार की पेशियां स्वभावत ढीली पड जाती है। इस प्रकार हार्दिक-द्वार के खुल जाने पर वेग के द्वारा आमाशयिक पदार्थ मुखद्वारा वाहर निकल जाता है।

सप्राप्ति-सारणी

अतिद्रव आदि निदान --व्यान-उदान प्रकोप---कफ-पित्त का प्रेरण

वोष-दूष्य-अधिष्ठान आदि---१ दोष-उदान वायु प्रधान तीनो दोप। २ दूष्य-अन्न एव आहाररस।

३ स्रोतस-अन्नवह, मनोवह।

उत्मलेश मुख का आच्छादन (पूरण)

उदानी विकृती दोषान सर्वास्वप्यूध्वमस्यति । वाग्भड

१ दोपानुदीरयन् वृद्धानुदानो व्यानसद्गत । कर्ध्वमागच्छति भृश विरुद्धाहारसेवनात् ॥ सु० उ० ४९।७

४. अधिष्ठान--आमाशय ।




छवि का पूर्वरूप

9 मिचली होना, २. डकार निकलने में एकावट होना, २. मुख से पतले और नमकीन स्नाव का होना और ४. खाने-पीने में सर्वया अरुचि (अनिच्छा Anorexia) का होना, ये छदिरोग के पूर्वरूप है।

छदि के भेदर

कारण-भेद से छदि के पाँच भेद होते हैं-- १. वातजा, २ पित्तजा, ३ कफजा, ४. सिन्नपातजा और ५ जागन्तुजा।

कागन्तुज छदि के पुन पाँच भेद होते हैं— १. वीभत्सजा द्विष्टाथंसयोगजा अर्थात् जिन वस्तुको के देखने से, स्पर्ध करने से, गन्धग्रहण करने से, नाम सुनने से या खाने से छणा होती है, उनके दर्धन-स्पर्धन-गन्धग्रहण-श्रवण एव भक्षण से उत्पन्न, २. दौहू-दजा अर्थात् गर्भावस्था मे होनेवाली, ३ जामजा, ४ असात्म्यजा और ५ फृमिजा।



र्छींद के भेदो मे पृयक्-पृथक् निदान, संप्राप्ति और लक्षण वातज र्छींद का निदान और संप्राप्ति

9 व्यायाम, २. तीक्ष्ण औषध-सेवन, ३ शोक, ४ जीणं रोग, ५ भय तथा ६ उपवास आदि के कारण व्यक्ति का क्षीण हो जाना, वातज छर्दि का निदान है।

१ (क) इस्रासोद्गाररोधी च प्रसेको छवणस्तनु ।
देपोऽत्रपाने च मृत्रा वमीनां पूर्वछक्षणम् ॥ छ० छ० ४९

⁽ ख) तासां हदुत्तलेशकफप्रसेती हेपोऽशने चैव हि पूर्वरूपम् । च० चि० २०।६

२ दोपे पृथक् त्रिप्रमवाश्चतस्रो दिष्टार्थयोगादपि पन्नगी स्यात् । च० चि० २०१६

१ न्यायामतीस्गीपथञ्चोकरोगभयोपत्रासाधिकिर्द्धितस्य । वायुर्महास्रोतिस सम्प्रवृद्ध उत्तरलेश्य दोपास्तत अध्वमस्यन् ॥ न्यामाशयोश्वरेशकृतां च भर्म प्रपीडयंदछदिमुदीर्योद्द तु । च० चि० २०।७-८

ऐसे व्यक्ति के महास्रोत (अन्नवहस्रोत) मे कुपित वायु उस स्रोत मे रहनेवाले दोषो को उमाडकर ऊपर फेंकती है तथा फेंकते समय आमाशय मे उत्कलेश (क्षोभ) हो जाने से ममंम्थान (हृदय) मे पीडा उत्पन्न करती हुई छिंद रोग को उत्पन्न करती है।

वातज छदि का लक्षण

इसमे कुपित हुई वायु हृदय और पार्श्व प्रदेश मे वेदना, मुल का सूलना, मस्तक एवं नाभि में पीडा के नाथ खाँसी, स्वरभेद और अङ्गो में सूई चुमाने जैसी पीडा उत्पन्न करती है। इसमें डकार का शब्द वहें वेग से निकलता है, वमन पदार्थ फेनयुक्त होता है और दुकडे-दुकडे के रूप में निकलता है, उसका वर्ण काला होता है, वह पतना होता है एवं उसका रस (स्वाद) कसैला होता है। वान्त द्रव्य का प्रमाण अल्प होता है और उसे निकालने के लिए वहां जोर लगाना पडता है, जिससे वेग का प्रवाहण एवं उदीरण होकर समस्त शरीर में क्षीम तथा पीडा के साथ वमन होता है। यह वातज छाँद कब्ट के साथ प्रवृत्त होती है तथा भोजन के पच जाने पर वढती है।

पित्तज छर्दि का निदान और संप्राप्ति^२

१ अजीणं भोजन, २. कटुरस सेवनाधिक्य, ३ अम्लरस-सेवनाधिक्य, ४ विदाही पदार्थं सेवन और ५ उष्ण आहार सेवन से बढा हुआ पित्त आमाश्य मे सचित होकर पित्तज छदि का निदान होता है।

वह बढ़ा हुआ नित्त प्रवल वेगयुक्त होने से रसायनियों में फैल जाता है और ऊपर बाकर मर्म (हृदय) में पीड़ा उत्पन्न कर वमन उत्पन्न करता है।

पित्तज छदि का लक्षण³

मूर्च्या, प्यास की अधिकता, मुख का सूखना, शिर, तालु एव नेत्रों में जलन होना, आंखों के मामने अंधेरा होना, चक्कर आना, वान्त पदार्थ का पीले या हरे वर्ण का होना, उज्ज होना और तिक्तरस का होना, वमन करते समय मुख से धुँआ निकलने जैसा अनुभव होना तथा गले में दाह होना, ये पित्तज छर्दि के लक्षण हैं।

श्रान्त संघोप वहुश् कपाय जीर्णेऽधिकं साऽनिलजा विमस्त । सु० उ० ४९।९

३ (क) तृष्णापिपासामुखशोपमूर्घताल्वक्षिसन्तापतमोभ्रमातं । पीत मुशोष्णं हरितं मतिक्त धूम्र च पित्तेन वमेत सदाहम् ॥ च० चि० २०।११

१ (क) हृत्यार्श्वपीढामुखशोपमूर्धनाम्यतिकासस्वरभेदनोदे । छद्गार्शब्दप्रग्लं सफेनं निच्छित्रमृष्ण तनुक कपायम् ॥ कृच्छ्रेण चारप महता च वेगेनानोंऽनिळाच्छर्दयतीह दु खम् । च० चि० २०।८-९ (ख) प्रच्छर्दयेत् फेनिळगल्पमल्पं शूळादितोऽम्यदितपार्श्वपृष्ठ ॥

२ अजीर्णकट्वम्लिविशास्त्रितिगामाशये पित्तसुदीर्णवेगम् । रमायनीभिविसत प्रपीटय मर्मोर्ध्वमागम्य विभ करोति ॥ च० चि० २०।१०

⁽ख) सोइन्लं मृशं वा मद्धतिक्तवक्त्र पीत सरक्त हरितं वमेद् वा। सदाहचोपन्वरवक्त्रशोपो मूच्छांऽन्वित पित्तनिमित्तजा मा॥ स० उ० ४९।१०

कफज छदि का निदान और संप्राप्ति

जो व्यक्ति अधिक स्निग्ध, अधिक गुरु, आम और विदाही आहारो का सेवन करता है तथा जो अधिक सोता है, उसके शरीर में कफ की दृद्धि हो जाती है, यह छिंद रोग का निदान है।

वह बढ़ा हुआ कफ उर प्रदेश, शिर, मर्म (हृदय) और सपूर्ण रसायनियो मे फैलकर छर्दि रोग को उत्पन्न करता है।

• कफज छर्दि का लक्षण^२

तन्द्रा, मुख का मधुर होना, वार-वार मुख से कफ निकलना, बिना खाये पेट भरा मालूम होना, नीद अधिक आना, क्षुष्ठा होने पर भी भोजन मे अरुचि होना, शरीर मे भारीपन बना रहना, वान्त पदार्य का स्निग्ध, घना, मधुररस तथा शुद्ध कफ रूप का होना, रोगी के शरीर मे रोमाञ्च होना, विना कष्ट के वमन होना या अल्प कष्ट के साथ वमन होना, ये कफज छिंद के लक्षण हैं।

सन्निपातज र्छाद का निदान और संप्राप्ति³

जो व्यक्ति उचित-अनुचित आहार द्रव्यो का विचार न करते हुए सभी रसो का अनुचित रूप मे सेवन करता है, जिसके कारण तथा आमदोष के कुपित होने से एव ऋतु का विपर्यय होने से, वात-पित्त-कफ तीनो दोष एक साथ कुपित होकर वमन रोग को उत्पन्न करते हैं।

सन्निपातज छदि का लक्षण

उदर मे शूल होना, आहार का सम्यक् पाक न होना, भोजन मे अरुचि, उदर या गले में दाह, प्यास की अधिकता, श्वास और मूच्छा होना, ये लक्षण सिन्नपातज र्छाद मे प्रवल रूप से होते हैं। वमन से निकला हुआ पदार्थ नमकीक और अम्ल रस का, नीलवर्ण का, उप्ण और रक्त मिला हुआ होता है।

अमक्तरुगौरवसादयुक्ती वमेद् वमी सा कफकोपजा त्यात् ॥ सुः उ० ४९।११ ३ समइनत सर्वरसान् प्रसक्तमामप्रदोषर्तुविपर्ययेश ।

सर्वे प्रकोपं युगपत् प्रपन्नावछदि त्रिदोषा जनयन्ति दोषाः ॥ दः चि० २०।१४

१. स्निग्धातिगुर्वामविदाहिभोज्ये स्वप्नादिभिक्षेव कफोऽतिवृद्ध ।
 चर शिरो मर्मरमायनीक्ष सर्वा समावृत्य विम करोति ॥ च० चि० २०।१२

२ (क) तन्द्रास्यमाधुर्यं कफप्रसेकसन्तोपनिद्राऽक्चिगौरवार्त ।
स्निग्ध वन स्वादु कफाद् विशुद्ध सलोमहर्षोऽन्यरुज वमेत्तु॥ च० चि० २०।१३
(ख) यो इष्टरोमा मधुरं प्रमृतं शुक्ल हिन सान्द्रकफानुविद्धम्।

४^१(क) श्रूकाविपाकारिचदाहतृष्णाश्वासप्रमोहप्रदला प्रसक्तम् । छर्दिश्विदोपाक्लवणाम्छनीलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥ च० चि॰ २०११५ (ख) सर्वाणि रूपाणि भवन्ति यस्यां सा सबदोषप्रभवा मता तु । सु० ७० ४९।१२ ९७ का० द्वि०

अागन्तुजा द्विष्टार्थसंयोगजा छदि

जिसके प्रति मन मे हेप हो, जो मन के विपरीत हो, जो अपवित्र हो, जो सडा हुआ हो, जो बुद्धि को कुठित करनेवाला हो, जो घणास्पद हो या मानसिक क्रिया को नष्ट करनेवाला हो, ऐसे गन्धयुक्त पदार्थ, आहार या दृश्य के दर्शन से जिस व्यक्ति का मन सत्तर हो जाता है, वह वमन करने लग जाता है, उप वमन को द्विष्ट वस्तु के सयोग से उल्पन्न हुआ माना जाता है।

वक्तन्य—आचार्यं चरक वातज, पित्तज, कफज, सित्तपातज और दिष्टार्थंसंयोगज भेद से छिंद रोग को पाँच प्रकार का सानते हैं। सुश्रुताचार्यं ने पाँचवीं छिंद को आगन्तुजा माना है और उसके पाँच प्रकार कहे हैं——१ वीभत्सजा, २. दोहृदजा, ३ आमजा, ४. जमात्म्यजा और ५ कृमिजा।

चरक ने स्वतन्त्र रूप से होनेवाले छिंद रोग का वर्णन किया है, इसिलए कृमिजा का वर्णन नहीं किया है, क्यों कि कृमिजन्य छिंद स्वतन्त्र छिंद नहीं है। आमजा को सिल्पातज में गतार्थ माना है। सगर्भा स्त्री स्वभावत अन्नपान से द्वेप करती है और वीभत्सजा तथा असात्म्यजा ये दोनो भी द्विष्ट अर्थ सयोग से ही होती हैं, इस प्रकार वीभत्सजा, दौहृदजा एव असात्म्यजा, इन तीनो का अन्तर्भाव चरक के द्विष्टार्थ-सयोगजा में हो जाने से कोई मतभेद नहीं है।

बागन्तुज छर्दि का लक्षण

घृणित वस्तुओं के दर्शन-स्पर्शन-चिन्तन या सम्पर्क से, स्त्रियों मे सगर्भावस्था से, आमदोष या आमाजीणं से, असात्म्य (प्रतिकूल) आहार के सेवन से और अन्त्र में कृमियों की उपस्थिति से—१ वीभत्सजा, २ दौहूदजा, ३ आमजा, ४. असात्म्यजा, और ५ कृमिजा के रूप में छिंदि के ये पाँच प्रकार होते हैं। इनमें भी दीपों के अनुबन्ध का विचार करना चाहिए।

कृमिज छदि लक्षण³

उदर मे जूल होना, मिचली होना तथा कृपिज हुद्रोग के लक्षणो का छदि के साथ होना, कृपिज छदि का लक्षण है।

छदि के उपद्रवभ

खाँसी आना, दम फूलना, जनर होना, हिचकी आना, प्यास लगना, बेहोशी होना, हृदय रोग होना और तमकश्वास होना, ये छदिरोग के उपदव हैं।

- १. द्विष्टप्रतीपाशुचिपूत्यमेध्यनीभःसगन्धाशनदर्शनैश्च । यदछद्येतसमना मनोन्नेद्विष्टार्थसयोगमवा मता सा ॥ च० चि० २०१८८
- २ वीमत्सजा दौद्धदजाऽऽमजा च सात्म्यप्रकोषात् कृमिजा च या हि । मा पञ्चमी ताञ्च विभावयेत् दोषोच्छ्येणेव यथोक्तमादी ॥ सु० उ० ४९।१३
- ३ शूलह्हासबहुला कृमित्रा च विशेषत । कृमिहृद्गोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिना ॥ सु० ४० ४९।१४
- ४ कास यासी ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्यमेव च। हृद्रोगस्तमकृत्वेव शैयाइछर्देरुपद्रवा ॥

असाध्य छदि के लक्षण

जब प्रकुपित वायु मलवह-स्वेदवह-मूत्रवह और अम्बुवह स्रोतो को अवरुद्ध कर कपरी भाग मे आती है, तब जिन व्यक्तियों के शरीर में एकत्र दोप उभड़े हुए होते हैं, उन दोपों को कोष्ठ से वाहर निकाल कर ऊपर ले आती है, ऐसी अवस्था में वमन से निकले पदार्थ में मल-मूत्र के समान वर्ण और गन्ध होती है। वह रोगी प्यास, श्वास, हिचकी से लगातार कष्ट पाता रहता है। जब वमन होता है, तब उसका वेग बहुत कीरों का होता है और जो पदार्थ वमन से निकलता है वह अत्यन्त दूषित होता है। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त सित्रपातज छिंद रोग से पीडित व्यक्ति की शीझ ही मृत्यु हो जाती है।

वमन-रोगी यदि क्षीण हो, वमन का वेग तीव्र हो, वमन के सभी उपद्रव विद्यमान हो, वमन से निकले पदार्थ में रक्त और पूय का मिश्रण हो और उसमें मोर की पाँख की तरह चकमकाहट हो, तो उसे अमाध्य कहा जाता है। जो छिंद रोग उपद्रवरहित हो, वह साध्य होता है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए।

चिकित्सासूत्र

9 सभी प्रकार के छर्दिरोग आमाशय में उत्कलेश या क्षोभ होने से होते हैं और आमाशयोत्य रोगो का सर्वप्रथम उपचार लघन कराना है, इसलिए छर्दिरोग में सबसे पहले लघन कराना चाहिए।

२ वातज छर्दि मे लघन नहीं कराना चाहिए। क्योकि लंघन से रसादि धातुओं का क्षय होने के परिणामस्वरूप वायु का प्रकीप वढ जाता है।

३ जब दोप अल्पमात्रा में हो और रोगी दुर्वल हो, तो लघन करावे और यदि दोप अधिक कुपित हो, तो सशोधन का प्रयोग करना चाहिए।

४ कफ दोप की प्रधानता में वमन तथा पित्त दोप की प्रधानता में विरेचन के द्वारा शोधन कराना चाहिए।

५ छर्दि मे वायु की विलोमगित होने से दोप की ऊर्ध्वमार्ग मे प्रवृत्ति होती है। विरेचन देने से अधोमार्ग से दोप की गित होने से शोधन तो होता ही है, साथ ही

विट्स्वेदम्त्राम्बुवहानि वायु स्रोतासि सम्ध्य यदोर्ध्वमिति ।
 वत्सन्नदोषस्य समाचित त दोष- समुद्ध्य नरस्य कोष्ठात ॥
 विण्मृत्रयोस्तत् समवर्णंगन्थ तृद्धासहिक्कार्तियुतं प्रमक्तम् ।
 प्रच्छदयद् दुष्टमिहातिवेगात्त्रयार्ऽादत्तश्चाञ्च विनाशमिति ॥
 क्षीणस्य या छदिरतिप्रवृद्धा सोषद्रवा शोणितपूर्ययुक्ता ।
 सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्या माध्यां चिकित्सेदनुषद्रवा च ॥ च० चि० ४१।१६-१७,१९

२ आमाशयोत्क्लेशभवा हि सर्वोदछर्घी मता लक्षनमेव तस्मात् । प्राक् कारयेनमारुतजा विद्याय सशोधन वा कफ्पित्तहारि ॥

२ लक्षनभन्पतीयविषय शोधनं च बहुदोपविषयभिति व्यवस्था।

वायु का विलोमभाव भी नष्ट हो जाता है, अत विरेचन के रूप मे सशोधन का प्रयोग र्छाद में हितकारक सिद्ध होना है।

६ विरेचन कराने के लिए ५ ग्राम वडी हरें का चूर्ण मधु या चीनी से खिलावे। ७. मनपसन्द रुचिकर विरेचन द्रव्य—मुनक्का, इसवगोल की भूसी, निशोयचूर्ण या अविपत्तिकर चूर्ण आदि को उचित मात्रा मे मदिरा या दूध मे मिलाकर थोडा- थोडा करके पिलाना चाहिए।

- ८. वमनार्य सवल रोगी की तितलीकी या कडवा नेनुआ के ब्रीज को दूध आदि के साथ पीसकर पिलाना चाहिए।
- ९. उपद्रव की चिकित्सा—पदि छदि रोग की चिकित्सा करने पर भी छदि के उपद्रव—कास-श्वास-हिक्का आदि उपस्थित हो जायें तो 'उन-उन उपद्रवो की, जो उनके चिकित्साधिकार मे औपद्यियाँ वतलायी गयी हैं, प्रयोग करना चाहिए।
- १०. दीर्घकालीन छर्षि —लगातार अधिक दिनो तक छर्दि होने से धातुओ का क्षय हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि हो जाती है। इसलिए बहुत दिनो से होने बाले छर्दिरोग मे वायुनाशक, स्तम्भन और वृहण चिकित्सा करनी चाहिए।
- ११ चिरकालीन छिंद मे क्षतक्षीण चिकित्सा मे कथित सिंपगुंड, दुग्धपाक विधि से पकायी गयी औपिधयाँ, उन्मादाधिकार में कथित कल्याणघृत, त्र्यूवणघृत (कासाधिकार), जीवनीयघृत (वातरक्ताधिकार) तथा वृष्ययोग, मासरस और अवलेह (कूष्माण्डावलेह आदि), आंवले या सेव के मुरब्बे आदि ख्लाने चाहिए। इससे जीणं छिंदरोग शान्त हो जाता है।
- १२. जीणं छिंदरोग प्राय मानिसक या वातिक होता है और उसमें वायु के विलोमगित का होना प्रमुख कारण होता है, अत वायु को अनुलोमन तथां निम्न-मागंगामी बनाने के लिए एरण्डतैल की 'मात्राविस्त' देनी चाहिए। मात्राविस्ति—स्नेहविस्ति की जो मात्रा निविद्ध है उसकी चौथाई मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना मात्राविस्ति कहलाती है। जैसे—एरण्ड तैल २५ ग्राम, तारपीन तैल (श्रीत्रास तैल) ५५ बूँद, सोचर नमक ५०० मि० ग्रा०, गोमूत्र इतना ले कि रेक्टल सिरिज्ज की खाली जगह भर जावे। इन द्रव्यो की वस्ति धीरे-धीरे चढावे।

१३ कफ दोष की प्रवलतावाले र्छादरोग में वमनकर्म करना हितकर होता है अथवा जिस दोप की अधिकता हो, तदनुसार चिकित्सा करे।

१४ संनजं रक्रम रे सशोधन करने के प्रश्चात् पेया, विलेपी, अकृतयूप तथा कृतयूष आदि के क्रम से दोपनाशक औषध चूर्ण के साथ पथ्य देना चाहिए।

े १५. पेया आदि के क्रम के बाद, स्वभाव तथा मात्रा से लघु द्रव्य धान का लावा आदि तथा ऋतुविपरीत एव व्याधिविपरीत शुष्क और सात्म्य आहार देना चाहिए।

१ कफारिमकायां वमनं प्रशस्तं सिपप्लिसिपैविनम्बतीयै । विण्डीतके सैन्धवसम्प्रयुक्तियं न्यां कफामाश्यशोधनार्थम् ॥ च० चि० २०।३४

९ संसर्गमानुपूर्वेण यथास्व भेषजायुतः। छ० व० ४९।१८

१६. यात्राछरि—विमान, रेल, वस या मोटर की यात्रा, झूला झूलना या तृत्य करना, इनके कारण भी छिंद होती है, ऐसी दशा में लघन करना और कागजी नीवू चूसना लाभप्रद है।

१७. कचूर (कपूरकचरी) का चूर्ण है ग्राम मधु से देना चाहिए या इसके साथ मयूरिपच्छ-भस्म, जहरमोहरािपटी है ग्राम प्रत्येक का योग कर पुदीना के अर्क से दे।

१८ वही लाइची का ठडा किया हुआ काढा उत्तम छदिनाशक है।

१९ वैर के फल की मज्जा का चूर्ण चूसने को दें या मधु से घटावें।

२० वालको को होनेवाली छर्दि मे आमाशय पर राई का लेप लगाना चाहिए। इसे १५ मिनट से अधिक नहीं लगा रहने दें।

सभी छवि भेदों में प्रयोज्य औषधें

२१ सूतशेखर	(योगरत्नाकर)
२२ रसादि चूणं	(योगरत्नाकर)
🤇 २३. रसादि वटी	(योगरत्नाकर)
२४ स्रोतोऽञ्जन वटी	(चिकित्सादशें)
२५ पारदादि चूर्ण	(योगरत्नाकर)
२६ छर्चन्तक रस 🦏	(योगरत्नाकर)
२७ छदिसहार	(चिकित्सादर्श)
२८ द्राक्षादि पानक	(चिकित्सादर्श)
२९ वमनामृत योग	(भिपक्कमंसिद्धि)
३० छदिरिपु	(सिद्धयोगसग्रह)

व्यवस्थापत्र

१ ३--३ घण्टे पर ४ बार

लीलाविलास रस ५०० मि० ग्रा० सूतशेखर ५०० मि० ग्रा० मयूरिपच्छभसम १ ग्राम मुक्तापिष्टी २५० मि० ग्रा० पिप्पलीचूर्ण १ ग्राम योग—४ मात्रा

भुनी बडी लाइची का चूर्ण १ ग्राम एव कचूर चूर्ण ५०० मि० ग्राम मधु मिलाकर चटाना।

२. प्रति आधा घण्टे पर यवानीषाडव चूर्ण १-२ ग्राम विना अनुपान चूसकर खाना । ३. १-१ घण्टे पर

सर्जिकाक्षार २ ग्राम अमृतविन्दु ५ बूँद जल २० ग्राम

१ मात्रा बना लें और थोडा-थोडा पीने को दें।

४ नम्बर १ की दवा के अन्तराल में अर्थात् उसके देने के १३ घण्टे पर—

वृहद्वातिचन्तामणि ५०० मि० ग्रा० भूगभस्म ५०० मि० ग्रा० सितोपलादि चूर्णं ४ ग्राम

नीवू की शिकञ्जी के साथ।

५ दाडिम शार्फर (चिकित्सादशं)

१-१ तोला दिन मे ४-५ बार चाटकर खाना चाहिए।

योग—अनार, नीवू, आदी और पुदीना के स्वरस की वरावर-वरावर लेकर, उसमें स्वरस की चौगुनी चीनी देकर चामनी बना ले और चासनी उतारकर उसमे भूना जीरा, छोटी इलायची और कालीमिर्च का वारीक चूणं मिलाकर रख देवे। इन चूणों की मात्रा अन्दाज से डालनी चाहिए।

दोषानुसार चिकित्सा बातज छॉट चिकित्सा

- १ १० ग्राम गाय के घी मे १ ग्राम सेंद्यानमक मिलाकर २—२ घण्टे पर ५ वार देना चाहिए।
- २ तीतर, मोर और लावा पक्षी के मास को पकाकर, खट्टे अनार के रस और मरिच चूर्ण से मिश्रित कर खाने को दे।
- ३. खट्टे वेर, कुलथी, धनियाँ, वृहत्पचमूल, खट्टे अनार और यव से पकाकर वनाये गये यूव का प्रयोग करे।
- ४ मुना हुआ मूँग २० ग्राम और आँवला १० ग्राम लेकर ३०० मि० ली० जल मे पकावे तथा चौथाई बचने पर १० ग्राम पी और १ ग्राम सेंघानमक मिलाकर पिलाने से वातज छिंद का शमन हो जाता है।
- ५. सशमनायं धनियां, शलपुष्पी, त्रिकद् और दशमूल के एक साथ बने क्वाय को दिलाना लाभप्रद है।
- ६. एरण्डतैल १५--२० ग्राम मे सेंधानमक मिलाकर सुस्रोब्ण कर धीरे-धीरे पिलाने से विरेचन हो जाता है।

- ७. दुवेल व्यक्ति की शमन चिकित्सा करे। उसके मन के अनुकूल सुखे फल, भक्ष्य-भोज्य एव पेय पदार्थ खिलाना चाहिए।
- ८ यदि वातज छिंद के रोगी को हृत्कम्प हो, तो उसे क्रमसंख्या १ के अनुसार सेंबानमक मिला घी पिलाना चाहिए। अयवा—
- ९. धनिया, सोठ, दही और अनार के रस से विधिपूर्वक पकाये गये घृत का णन कराना चाहिए।

ध्यवस्थापत्र

१. ४-४ घण्टे पर ३ वार

बृहद्दातिचिन्तामणि ५०० मि० ग्रा०
ग्रुगभस्म ५०० मि० ग्रा०
सितोपलादि ३ ग्राम
नीवू के रत के साथ। योग ३ मात्रा
अथवा—

३-३ घण्टे पर ४ बार

रसिसन्दूर ५०० मि० ग्रा० विकटु चूणं ३ ग्राम जीरा चूणं ३ ग्राम धनिया चूणं ३ ग्राम हरीतकी चूणं ३ ग्राम मधु से। ४ मात्रा

२. बाधे-आधे घण्टे पर ५-६ बार अमृतविन्दु ४-५ वूँद छोटे वतासे मे दे।

पित्तज छदि चिकित्सा

- १ पित्तज छर्दि मे दोप के अनुलोमन तथा मृदु विरेचन कराने के लिए निशोध (काला) का चूर्ण ३-४ ग्राम खिलाकर, ऊपर से मुनक्का और विदारीकन्द के स्वाथ मे गन्ने का रस मिलाकर पिलाना चाहिए।
- २ यदि आमाशय के अद्योगांग में पित्त अधिक बढ गया हो, तो मद्युर द्रव्यों के अनुपान के साथ वमनकारक द्रव्य पिलाकर पित्त का शोधन करना चाहिए।
- ३ जब पूर्णंत सशोधन हो जावे, तो भोजन के समय धान के लावा का सत् या उसकी ही पेया बनाकर मधु और चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए। अथवा—
- ४. मूँग के यूष के साथ या रोगी मासाधी हो, तो जागल पशु-पक्षियों के मासरस के साथ अगहनी चावल का भात खिलाना चाहिए।

५. त्रों के गत् में या मलूर के पर वी मज्ता में या नारियत के करने फाउ या मुनक्ता या सट्टी देर के पूर्व में मिली, मधु और धादी मात्रा में पीपर मां जूण मिलाकर चाटने को दे।

६ शुद्ध सोतोज्जन का पूर्ण, धान गा आया, नीलगणल और मट्टें बेर रे फल ना गूदा का पूर्ण बनाकर विश्वन कर मधु ने पटावे ।

- वडी हरें के चूर्ण की २-३ प्राम की माता में मधु के बाप देंगे ।
- ८ मुनको पा नवाय बीतल गर पीने को दे।
- ९ जापुन और क्षाप ने नारियालों ना गाय बना, धीतम भर गए गिटासर पिलाना चाहिए।
 - १०. मदा के चूर्ण की मधु मिलाकर पटाउँ।
- ११. सुद्ध स्यनंगीरिक के २ प्राम पूर्ण को तण्डुकोटक में मामु विकास उमरें साय दे।
 - १२ रलमबतन को धिनरर नारे अविने हे रन और मह में थे।
- १३ व्येतनन्दन, पान, जटामांनी, उत्तम मुनाका, मगन्यवाणा, स्वर्णगैरिक, हाको समान मात्रा में सेवर २ पान की मादा ने ठउ जर से सेवन गलाना चाहिल ।
- १४. चन्दनादि योग—व्वेतचन्दा विमा तुना, गधा, मुगन्धवादा, गाँठ, गोनागेम. आंत्रला और अम्स में पत्रे, जब समात नाम लेकर बारीक शिमकर, सण्युलीदक और मधु मिलाकर पानक बना के बीर योग भोग पीने को दे।
 - १५. पित्तपापटे वा अर्ग या फाटा पैतिक चमन मो धान्त करता है।
 - १६ अविने या कैंप के पान गा रम मधु मिलाकर पीने की देये।
- १७. चन्दनादि अके उत्तम पित्तय राहिशामक है। धोम—क्षेत्रान्दर का बुरादा, मौसमी गुलाव के पूछ, केवरा, वेदमुध्क और गमल में पूछ, इन सबको एकत्र कर आठ गुना पानी डालकर अमो न आधा अकं मीच ले। इम भोडा-गोरा पिलाना चाहिए।
- १८. सूतशेषर ५०० मि० या० तथा प्रवालिपटी ५०० मि० ग्रा० के साथ मधु से ३-४ बार देवे।

फफन छदि ,चिकित्सा

- 9 कफान र्छीद में आमाराय के जाधनाय पीपर-सरसो तथा निम्चपत्र का ववाय पिलाकर अथवा मदनफल और संधानमक पिलाकर यमा कराना चाहिए।
 - २ बोधन के बाद समन औषध एव आहार का प्रयोग करे।
- रे. त्रिफलाचूणं २ साम, विडात पूणं १ ग्राम और सोठका चूणं ३ ग्राम मित्राकर मधु से चटाना चाहिए।
 - ४. जागुन के बीज का जुर्ण मट्टे बेर के जुर्ण के साथ मध् से दे।
- ५ काकटारिंगी, नागरमीया और जवासा के समभाग का चूर्ण २-२ ग्राम की मात्रा में मधु के साथ ४-५ वार, १-,१ घण्टे पर दे।

- ६. आहार मे जगली पशु-पक्षियो का मासरस, आमव, अरिप्ट, मुनक्का और कैथ का प्रयोग करना चाहिए।
- ७. कफज छर्दि के बढे हुए वेग मे शुद्ध मैनसिल १ रत्ती नीवू के रस और मधु से २-४ बार दे। वथवा---
 - ८. पीपर और मरिच का समभाग चूर्ण १ ग्राम कैथ के रस और मधु से दे।
- ९. गुडूचीसत्त्व, हरीतकी चूर्ण, कालीमिर्च और पीपर के समभाग चूर्ण को २--२ ग्राम की मात्रा मे ४--५ बार मधु से दे।

१० मयूरिवच्छ भस्म १ ग्राम
स्तशेखर रस ३ ग्राम
प्रिगमस्म १ ग्राम
योग- ४ मात्रा

२-२ घण्टे पर बादी के रस और मधु से दे।

त्रिदोषज छदि चिकित्सा

१ सन्निपातज छदि रोग मे चिकित्सक को चाहिए कि ऋतु, रोगबल तथा रोगी के अर्ग्निवल आदि का विचार कर, पूर्व मे जो अलग-अलग दोषो की चिकित्सा कही गयी है, उनका अपने विवेक के अनुसार योग कर प्रयोग करे।

२ आंवला और मुनक्का निर्वीज कर १०-१० ग्राम लेकर पीसकर १०० ग्राम पानी, २५ ग्राम चीनी और १० ग्राम मधु मिलाकर पिलावे, ऐसा कई वार करे।

द्विष्टायंसंयोगज छदि चिकित्सा

- पानसिक या आगन्तुक छिंदरोग मे मन के अनुकूल वचन, आम्रासन और
 मन प्रसादकर उपचार करना चाहिए।
- २ लोकप्रसिद्ध कथाओं का श्रवण कराना, समान कील और आचार वाले नित्री का साहचर्य, श्रृगाररस की वार्ता, मनोरम स्थान में टहलना-घूमना लामदायक है।
- ३ विचित्र गन्ध सुँघाना, जैसे मिट्टी की, पुष्प की, शुक्त की या अम्ल फलों की गन्ध सुँघाना चाहिए।
- ४. खाने मे मनोऽनुकूल साग, भोज्य पदार्थ, राग, पाडव, अवलेह, मासरस इत्यादि देना चाहिए।
- ५. रोगी को जो-जो गन्ध, रस, म्यर्ब, शब्द और रूप पसन्द हो, यदि वह असारम्य भी हो, किन्तु प्रिय हो, तो उसका प्रयोग करना हानिकर नहीं होता।
- ६ मन की प्रसन्न करने वाले आहार-बिहार आदि का सेवन करना द्विष्टायें-सयोगज छदि को नष्ट करता है।
- ७ सगर्भा की छदि मे गर्भपाल ४०० मि० ग्रा०, स्त्रणेंमाक्षिक ४०० मि० ग्रा०, प्रवालिपिन्टी ४०० मि० ग्रा०, गुरुवसत्त्व २ ग्राम की ४ मात्रा बनाकर मधु से ३-३ घण्टे पर दे।

कृमिज छदि चिकित्सा

वायविरुग, निर्वीच खोंबला-हर्रा-बहेटा, सोठ, मरिन तथा पीपर के गमात्रमाग चुर्ण को २-२ पण्टे पर २-२ प्राम की माना में मधु में थे।

परा

वमन, विरेचन, अधन, लायमण्ड, साठी और सगहनी पाएल, जी, गेहूँ, पूँग, जागल पद्म-पक्षियो का माम, नारियल, तम्बीर, श्रांवला, आग, वेर, अगूर, कैय, जनार, विजीस नीयू, नीम, अहुमा एवं स्वादिष्ट हितमर भक्ष्य पदार्थ पश्च है।

बिहार—भोजन के बाद मुग पर शीतल जल या परिषेक, यस्तूरी, परका एव मनोहर गुग च का अनुलेपन, मनोरम दाब्द-स्पर्श-मप-रम-पन्ध का नेवन, पाँदनी रात, उद्यान बादि या नेवन पष्प है।

स्रपग्य

नस्य, वस्ति, स्वेदन, म्नेहपान, रत्तरााय, इन भोजन, शोभरस रूपा था देगना, असारम्य एव विरुद्ध भीजन, कहवी तरीई, तोरी, महुवा का सेवन, स्वायाम और वजन, ये सब अपस्य हैं।

वम्लपित

पर्याय और परिचय

अम्पित्त, हाइपर ग्निहिटी (Hyper acidity), एनिश्र हिरोप्निया (Acid dyspepsia), गैस्ट्रोनिया (Gastroxia) आदि नामो से इसे जाना जाता है।

जब विदाही बादि पदार्थों के सेयन से पिस में बम्ल गुण की असियदि हो जाती है, तो उमें अम्लिपन रोग कहते हैं।

निदान र

विरुद्ध अग्न (अर्थात् १ देश, २ काल, ३ अग्नि, ४ मापा, ५ सात्म्य, ६. वायु आदि दोष, ७ सस्कार, ८ घीषं, ९ कोष्ठ, १०. अवस्था, ११ क्रम, १२ परिहार, १३. उपचार, १४. पाफ, १५ सगोगिषद्ध, १६ हृदय (रुचि) विरुद्ध, १७ सम्पद् विरुद्ध और १८. विधि थिरुद्ध आहार फरना), दूषित अग्न, खट्टे पदायं, विदाही पदायं और पित्त को प्रमुपित करनेवाले (तक्र, सुरा, आसव, अरिष्ट, नया चावल, उटद आदि) भोजन तथा पेय पदायों के सेनन से प्रमुपित हुआ पित्त वर्षा आदि ऋतुओं में एवं प्रायं आनूपदेश में अम्लियिशकी जलों के प्रयोग करने से अधिक अम्ल होकर अम्लिपत्त रोग उत्यन्न करता है।

१ (क) अम्छं च तत् वित्तम् । विदाहावम्त्रगुणीदिक्तं वित्तमम्लवित्तम् । मधुकीव ।

⁽ स) अम्डाय वित्तगम्डवित्तम् । वाचरवत्यम् ।

२ विरुद्धदुष्टाम्नविदाहिषित्तप्रक्रीषिपानाश्रमुजी विदर्भम् । पित्तं स्वहेतुपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्त ॥ माधवनि०

मजीणं रहने पर पुन. भोजन करने से, मैदा या उडद पीसकर बनाये पदायं के खाने से, गुरु एव अभिष्यन्दी भोजन से, मल-मूत्रादि वेगों के रोकने से, अत्युष्ण, अति स्निग्ध, अति रूक्ष, अत्यम्ल और अतिद्रव पदार्थों के सेवन से, राव, गुड, कुल्थी के सेवन से, भूने हुए अन्न-भूसी सहित अन्न और चूडा के अधिकांश खाने से, भोजन के बाद दिन में अधिक सोने से, अत्यधिक स्नान तथा जलावगाहन से भोजन के बीच में अधिक जल पीने से, वासी भोजन तथा विदाही अद्य के खाने से वातादि दोष प्रकुपित हो जाते हैं। उनमें से प्रकुपित पित्त अग्निन को मन्द बना देता है, जिससे खाया-पिया आहार ठीक से नहीं पचता और विदग्ध हो जाता है। एवच्च भूक्तान्न तथा पित्त की अम्लता बढ जाती है और यही अम्लपित रोग है। इसी अभिन्नत्य से मधुकोप में कहा गया है—'विदाहाद्यम्लगुणोद्विक्त पित्तमम्लपित्तम्'।

वक्तव्य-पिन के दो भेद होते हैं- १ प्राकृत या अविकृत, इसका रस कटु होता है और २. विदग्ध या विकृत, इसका रस अम्ल होता है। जब विदग्ध पित्त की वृद्धि हो जाती है, तो वह अम्लपित्त कहलाता है। इसे हाइपर एसिडिटी (Hyper acidity) कहते हैं। आधुनिक चिकित्साविज्ञान की दृष्टि से इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- १ आमाशय और पच्यमानाशय के क्रण (Gastro-duodenal ulcer)।
- २ अत्यधिक धुम्रपान (Excessive smoking)।
- ३. किण्वीकरणजन्य अम्ल प्रोङ्गोदीय (Carbohydrate) का ठीक से पाचन न होने से शर्करा का किण्वीकरण (Fermentation) हो जाता है, इससे अम्ल उत्पन्न होकर अम्लिपत्त उत्पन्न होता है।
- ४. पित्ताश्मरी, जीणं उपान्त्र प्रदाह, आमाशयिक व्रण और ग्रहणी मे अवरोध आदि रोगो से आमाशय के भीतर आमाशयिक रस मे अम्लता (Hydrochloric acid) की वृद्धि हो जाती है। यहीं अम्लपित्त है।

संप्राप्ति

विरुद्ध, दुव्ट एव पित्तप्रकोपक आहार-विहार से वातादि दोषो का प्रकोप होता है और विशयकर पित्त की अम्लता तथा भुक्तान्न की अविपाकजन्य विद्याता बढ जाती है। वर्षा ऋतु भी अम्लपित्त रोग का सवाहक है। वर्षा ऋतु में गेहूँ, चावल आदि धान्य अल्पवीर्य होते हैं। वर्षा का नवीन जल अपरिपक्व, मलिन एव पृथ्वी के मलों से पूर्ण होता है। आकाश के मेधाच्छन्न होने तथा जलाधिक्य से पृथ्वी के वातावरण में आहंता होती है। मनुष्यों के शरीर भी पानी से भीगते रहने से एवं वातावरण की शीतता के कारण वायु का प्रकीप होने से मन्दाग्नियुत्त हो जाता है.

१. काइयप, खिल० १६


२ भृवाष्यान्मेवनिस्यन्दात् पाकादम्लाअलस्य च । वर्षास्वरिनवले क्षीणे कुप्यन्ति पदनादयः॥ च० ५० ६।३४

जिसके परिणामस्वरूप खाये हुए अन्न का विदाह एव अम्लपाक होता है, पित्त की अम्लता वढ जाती है और अम्लपित्त रोग की सप्राप्ति हो जाती है।

वर्षा ऋतु का जो प्रभाव होता है, वह स्थिति, आनूपदेश मे जलप्रायता तथा नमी के कारण वातावरण और भूमि मे बारहो महीने वनी रहती है, इसलिए वर्षा ऋतु की तरह आनूपदेश भी अम्लिपत्त के उत्पादन मे विशिष्ट कारण है, क्यों कि पित्त का सचय, विदाह एव प्रकोप होने की सभावना सतत बनी रहती है। अतएव अम्लिपत्त रोग की उत्पत्ति मे वर्षाऋतु और आनूपदेश ये दोनो ही कारण उतना ही महत्त्व रखते हैं, जितना विरुद्ध, दुष्ट आहार आदि। इस प्रकार अम्लिपत्त की सप्राप्ति मे पित्त-प्रकोपक आहार विहार, वर्षाऋतु और आनूपदेश, ये समान रूप से प्रभावी होते हैं और अम्लिपत्त की सप्राप्ति कराते हैं।

संप्राप्ति सारणी—

विरुद्ध-दुष्ट-विदाही आदि
पित्तप्रकोपक आहार एव पित्तल
विहार, वर्षाऋतु, आनूपदेश,
जलाई वातावरण, वेगावरोध
आदि निदान



सामान्य लक्षण

आहार का विपाक न होना, क्लम (परिश्रम के बिना ही थकावट) होना, मिचली आना, कडवी और खट्टी डकारें आना, शरीर मे भारीपन, हृदयप्रदेश और गले मे जलन होना, अरुचि होना, आहमान, अन्त्रकूजन, विड्भेद, कुक्षिशूल, अङ्गो मे शक्ति का हास और शिर में व्यथा होना, ये सब लक्षण अम्लिपत्त को सूचित करते हैं।

भेद

अम्लिपत्त के भेद दो प्रकार से किये ज़ाते हैं--- १ गतिभेद से और २. दोष्ससर्गं भेद से । गतिभेद से २ प्रकार होते हैं---


- १ कर्ध्वंग अम्लपित्त ।
- २. अघोग अम्लपित्त ।

दोषससर्ग भेद से ३ प्रकार होते हैं—

१. वाताधिक अम्लपित्त ।

१ अविपाकनलमोरक्लेशतिक्ताम्लोद्गारगौरवै । इल्कण्ठदाहारुविमिश्चाम्लपित्तं वदेद् मिषक् ॥ मा० नि० तथा का० सं० खिल० १६

- २ कफाधिक अम्लपित्त ।
- ३ वातकफाधिक अम्लिपन ।



कफ के अनुबन्धवाले अम्लिपत्त का वमन हरे-पीले-नीले-काले, हल्के या गहरे लाल रग का, बहुत खट्टा, मास के घोत्रन के समान, अत्यिधक चिपचिपा, स्वच्छ, कफ्युक्त और लवण, कदु तथा तिक्त भेद से रस मे अनेक प्रकार का होता है। भोजन का विकृत पाक होने पर या कभी भोजन न करने पर भी रोगी कडवा और खट्टा वमन करता है। रोगी को इन्हीं की डकारें आती हैं और गले मे, हृदयप्रदेश मे तथा उदर मे जलन होती है और शिरोवेदना से रोगी पीडित रहता है।

कफानुबन्धी अम्लिपत्त हाथ-पैर में जलन तथा उष्णता, भोजन में भयकर अरुचि तथा ज्वर को उत्पन्न करता है। रोगी के शरीर में खुजली, चकत्ते, पिडकाओं का समूह, आहार का अविपाक और उत्वलेश बादि लक्षणों को उत्पन्न करता है।

अघोग अम्लपित्त के लक्षण

प्यास लगना, जलन, मूर्च्छा, चक्कर आना, वेहोशी होना, हरे-पीले-काले या रक्त वर्ण के दुर्गेन्धयुक्त अम्लिपत्त का गुदामार्ग से निकलना, मिचली होना, शरीर पर चकत्ते निकलना, अग्निमान्द्य, रोमहर्ष, स्वेदनिर्गम और अगो का पीला पड जाना, ये सब लक्षण अधोग अम्लिपत्त के होते हैं। ³

अघोग अम्लपित्त और पैत्तिक ग्रहणी^४

इन दोनो रोगियो मे अनेकश समानता है। दोनो मे ही दाह, अरुचि, तृष्णा आदि

१ वान्त हरित्पीतकनीलकृष्णमाऽऽरक्ताभमतीव चाम्लम् । मासोदकाभ त्वतिपिच्छिलाच्छ श्रेष्मानुजात विविध रसेन ॥ मुक्ते विदग्धे त्वथवाऽप्यमुक्ते करोति तिक्ताम्लवर्मि कदाचित् । उद्गारमेवंविधमेव कण्ठहृत्कुक्षिदाई शिरसो रुज च॥ मा० नि०

करचरणदाह्मीष्ण्यं महतीमरुचि ज्वरं च कफपित्तम् ।
 जनयित कण्डूमण्डलपिडकाशतिनिचितगात्ररोगचयम् ॥ मा० नि०

३ तृडद्राहमूच्र्यांभ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् । ह्ह्यासकोठानलसादहर्पस्वेदाङ्गपोतत्वकरं कदाचित् ॥ मा० नि०

४ सोऽजीर्णं नीलपीतामं पीताम सायते द्रवम् । पूर्यम्लोद्गारहस्कण्ठदाद्दारविनृहद्दित ॥ च० चि० १५।६५

पित्तजनित लक्षण एक समान होते हैं। दोनों में रोगी पीला पड जाता है। रोगी के मलद्वार से द्रव का सरण होता है। विशेष अन्तर यह है कि ग्रहणी में दूष्य पुरीष होता है और नीले-पीले वर्ण के द्रवमल का नि सरण होता है तथा अद्योग अम्लपित्त में विविध वर्ण तथा रसवाले स्वच्छ द्रव द्रव्य का नि सरण होता है। दोनों में यह भेद है।

वाताधिक सम्लिपत्त के लक्षण

वाताधिक अम्लिपत्त मे कम्पन, प्रलाप, मूर्च्छा, शरीर मे चिमचिमाहट, अगो मे शिथिलता, शूल, आंखो के सामने अँधेरा, चक्कर आना, अतिमोह होना और रोमाञ्च होना, ये लक्षण होते हैं।

कफाधिक अम्लपित्त के लक्षण

कफाधिक अम्लिपत्त में मुख से कफ निकलना, शरीर में भारीपन, निष्क्रियता, अरुचि, शीत लगना, शिथिलता, वमन होना, मुख का कफ से लिप्त रहना, खुजली होना और नीद आना, ये लक्षण होते हैं। र

वात-कफाधिक अम्लपित्त के लक्षण

इममें ऊपर कहे गये वाताधिक तथा कफाधिक इन दोनो तरह के अम्लपित्त के लक्षण मिलते हैं।³

साध्यासाध्यता

यह अम्लिपित्त रोग नवीन हो तो यत्न करने पर साध्य होता है, पुराना होने पर याप्य होता है अर्थान् जब तक पथ्य, परहेज और सौषध का समुचित सेवन किया जाता है, तब तक शान्त रहता है एव थोडा भीड़ असयम या अपथ्य करने से रोग उभड जाता है। किसी किसी नियमिन आहार-विहार तथा औषध-सेवन करनेवाले रोगी का अम्लिपत्त रोग कष्टसाध्य होता है तथा कदाचित् दीर्घकाल तक चिकित्सा करने से ठीक भी हो जाता है।

चिकित्सासुत्र

9 निदान-परिवर्जन प्रथम चिकित्सा है अर्थात् जिस रोग के जो कारण हो, ऐसे आहार-विहार-औषध देश आदि का परित्याग करना तथा निदान के विपरीत

१ कम्पप्रलापमूर्च्छांचिभिगात्रावसादशूलानि । तमसो दर्जनविभ्रमविमोहहर्षाण्यनिलकोपात् ॥ मा० नि०

२ कफनिष्ठीवनगौरवज्ञहतारुचिशीतसादविमलेपा । दहनवलसादकण्हुनिद्राश्चिह्न कफानुगते ॥ मा० नि०

३ उभयमिदमेव निह्न मारुतकफनम्मवे भवत्यम्ले । मा० नि०

४ रोगोऽयमम्जिपताख्यो यस्नात् समाध्यते नव । चिरोत्थितो भवेद् याप्य कृच्छ्रमाध्य म कस्यचित् ॥ मा० नि०

५ सङ्क्षेपत क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम् ॥ स० ७०

हितकारक अञ्च-औषध-आहार-विहार का सेवन क्रना यह चिकित्सा का सिक्षस रूप है।

२. अम्लिपित्त मे पित्त की अम्लिता बढती है, अत इसमे अम्ल द्रव्यो का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। अम्लिशव्द से अम्लिरस, अम्लिपाकी और अम्लिविपाकी इन तीनो तरह के द्रव्यो का त्याग करना चाहिए। जैसे—टमाटर, चावल, साठी या अगहनी का नया चावल, अम्ल या अम्लिविपाकी होने से वर्जनीय हैं।

३. उपचार के क्रम मे १ निदानपरिवर्जन के साथ, २ सशोधन और ३ संशमन भी निर्दिष्ट हैं। अन अवसर के अनुसार उनका भी प्रयोग किया जाता है।

४. यदि रोगी सशोधन से होनेवाली हलचल को सहन करने योग्य हो, तो उस दोष और रोग के अनुसार वमन-विरेचन कराना चाहिए, अन्यया शमन उपचार करना चाहिए।

५ अम्लिपित्त रोग आमाशय को आश्रम बनाकर होता है, जो कफ एव पित्त का स्थान है, अत इस रोग को समूल नष्ट करने के लिए अक्षीण बल मासवाले रोगी को सबसे पहले वमन द्वारा शोधन कराना चाहिए। वमन कराने से आमाशय एवं पच्यमानाशय मे स्थित विकृत अम्लिपत्त वाहर निकल जाता है, जिससे रोग के विकार शान्त होते हैं।

६. पटोलपत्र, निम्बपत्र और मदनफल समभाग ५-५ ग्राम लेकर क्वाथ वनाकर मधु मिलाकर पिलाने से वमन हो जाती है और कफदोष का निर्हरण हो जाता है।

७ वमनानन्तर विरेचन कराकर पित्तदोष को निकालना चाहिए। विरेचनार्थे निशोध का चूर्ण ४ ग्राम ज्ञीनी मिलाकर दे या त्रिकचाचूर्ण ६ ग्राम दे या अविपत्तिकर चूर्ण ३-४ ग्राम दे।

८ नवीन रोग में वमन-विरेचन से पर्याप्त लाम होता है और यदि रोग पुराना हो तो निरूह और अनुवासनवस्ति भी देनी चाहिए।

९ यदि वमन-विरेचन कराने के बाद भी अनुबन्ध रूप दोष शेष रह जाय, तो लघन, लघुमोजन एव पाचन योगों के प्रयोग द्वारा उनका शमन करना चाहिए।

१० दोषशेप के शमनार्थ सींठ, अतीस और नागरमोथा के समभाग का २० ग्राम क्वाथ बनाकर दे। अथवा—

१९ त्रायमाणा, पटोलपत्र और कुटकी इन तीनो को मिश्रित २० ग्राम लेकर क्वाय बनाकर पिलावे । इसी प्रकार चिरायता का क्वाय भी पिलाना हितकर है।

१२. कुटकी का बवाय रोगी में बलानुसार उचित मात्रा में देना चाहिए।

औषध-प्रयोग

१३ मशोधन के प्रधात् लघु, रुचिकर मधुर आहार की योजना करनी चाहिए

संशोधनं सशमनं निदानस्य च वर्जनम् । प्रताबद् भिषजा कार्य रोगे रोगे वशाविधि ॥ च० वि० ७।३०

और अग्नि के सवर्धनार्थं भोजन के समय यवानीषाडव चूर्णं या सितोपलादि चूर्णं का प्रयोग करना चाहिए।

१४ चन्दन, लालचन्दन, नेत्रबाला, खरा, विदारीकन्द, शतावर, पित्तपापडा, फालसा और सन्तरा ये सब पित्त की उग्रता का शमन करते हैं।

१५. भोजन के पूर्व शीतल जलपान, नौसादर, सज्जीखार, मुक्ता, प्रवाल, शुक्तिभस्म, वराटभस्म, शखभस्म, चूने का पानी और चाक मिट्टी, ये आमाश्य की अम्लता शान्त करते हैं।

१६ कुटकी, आँवला, अजीर, त्रिफला, अमलतास की फलमज्जा, मुलहठी और मुनक्का, ये पित्तशामक और सारक हैं।

- १७ पिप्पली चूर्ण १ ग्राम मधु से ४ बार देना चाहिए।
- १८ भ गराज चूर्ण २ ग्राम हरीतकी चूर्ण २ ग्राम मिला कर ४ बार मधु से दे।
- १९ मध्यव्टी ४ ग्राम मधु से ३ बार दे।
- २० निशोथ चूर्णं रोगी के बलानुसार ३ से ६ ग्राम तक दे।
- २१. त्रिफला चूर्ण ३ ग्राम २-३ बार मधु से दे।
- २२. ऑवले का स्वरस १० ग्राम या चूर्ण ४ ग्राम मधु से दे।
- २३ कागजी नीवू को शर्वत मे डालकर अपराह्म मे दे।
- २४. मूनक्का को मिश्री के साथ खाना चाहिए।
- २५ पकी लाल वेर की चटनी मिश्री या नमक मिलाकर दे।
- २६ सर्जिकाक्षार (सोडा बाईकार्व) २ ग्राम आधा गिलास जल मे घोलकर १ कागजी नीबू का रस निचोडकर ३ बजे दिन मे १ बार दे।

२७. नारियल की गिरी मिश्री के साथ चूसना या नारियल का पानी पीना लाभदायक है।

२८ भूनिम्बादि भवाय — चिरायता, नीम की गीली छाल, बीज निकाले हुए जौवला-हर्रा-बहेडा, परवल के पत्ते, अरुस के पत्ते, गुरुच, पित्तपापडा और भृष्मराज समभाग लेकर भूसा की तरह कूट ले। २० ग्राम द्रव्य को ३०० ग्राम जल मे पकावे, चौथाई वचे तो छानकर शीतल होने पर मधु मिलाकर पिलावे। इसे दिन मे २ बार सवेरे-शाम देना चाहिए।

व्यवस्था-पत्र

१ ४-४ घण्टे पर ३ बार

प्रवालपश्चामृत ३०० मि० ग्रा० अम्लिपत्तान्तक रस ५०० मि० ग्रा० सूतशेखर २०० मि० ग्रा० लीलाविलास ५०० मि० ग्रा०

१ म्निन्वनिम्बन्निफलापटोलवासामृतापर्पटमार्कवाणाम् । मनायो हरेस क्षोद्रश्चतोऽम्लपितं वित्तं पथा बारवभूविकासः ॥ वैदानीवन १८ का० वि०

कायचिकित्सा

मुक्ताशुक्ति ५०० मि० ग्रा० सितोपलादि ३ ग्राम

योग---३ मात्रा

आँवला चूर्ण १ ग्राम और मधु से। बाद मे---भूतिम्बादि क्वाथ २५ ९ ग्राम पिलावे।

- २ ८ वजे प्रात और ४ वजे शाम
 नारिकेलखण्ड अथवा—
 कृष्माण्डखण्ड या आँवले का मुख्वा २० ग्राम
 गोदुग्ध १०० मि० ली० के साथ दे।
- भोजनं के १० मिनट पूर्वं
 यवानीखाडव ३ ग्राम
 चलकर खाना ।
- ४ भोजन के बाद २ बार अविपत्तिकर चूर्ण ६ ग्राम जल से। २ मात्रा

अस्लिपत्तनाशक योग

अम्लिपत्त मे क्षारवर्गं की औषघें लाभप्रद होती हैं, जैसे—्सर्जिकाक्षार (सोडा बाइकार्व), शखभस्म, शुक्तिभस्म, कपर्दभस्म, मुक्ताभस्म, प्रवालभस्म, चूने का पानी कादि प्रयोग योग्य हैं।

अम्लिपत्त में पित्त की अम्लिता उग्र होती है और उसके शमन के लिए क्षार का प्रयोग सफल होता है, क्योंकि क्षार अम्ल से मिलकर मधुर (न्यूट्रल) हो जाता है, न तो वह क्षार होता है न अम्ल होता है। इसी अभिप्राय से विदग्धाजीण में सर्जिकाक्षार का प्रयोग प्रचलित है।

सहिता-प्रन्थों में अम्ल और क्षार के सयोग का माधुर्य संगन्न होना उल्लिखित हैं। सुश्रुत में दग्ध में दाह होने पर काँजी की तलछट, तिलकल्क, मुलेठी, इन्हें पीसकर घी मिलाकर लेप करने का विधान बतलाया गया है और कहा गया है कि अम्ल रस के साथ तीक्ष्ण लवण रस वाले क्षार का सयोग होने पर वह माधुर्य को प्राप्त हो जाता है और उसकी तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है।

चरक^२ ने कहा है, कि मद्य के अतियोग से दाह आदि क्षारीय लक्षण हों तो मद्याम्लातियोगजन्य क्षारीय लक्षण के शमनार्थ पुन मद्यपान कराना चाहिए, जिससे अस्ल के सयोग से क्षार का मद्युरीकरण हो जाता है।

अम्लेन सह संयुक्तः स तीक्ष्गलवणी रस । माधुर्य मजतंऽत्यर्थं तीक्ष्णभाव विमुद्यति ।
 माधुर्याच्छममाप्नोति विद्वरिद्विरिवाप्छतः ॥ पु० ए० ११।२४-२५

२. क्षारी हि याति माधुर्यमम्बद्रव्योपसंहित । च० चि० २४

नारिकेल लवण (रसत०) पटोलादि बवाय (भै० र०) नारिकेल खण्ड (भै० र०) द्राक्षादि चूर्णं (यो० र०) कूटमाण्ड खण्ड (आ० सा० स०) अविपत्तिकर चूणं (भै० र०) अम्लिपतान्तक (भै०र०) घात्रीलीह (रसयोगसागर) कामघेनु रस (र० त० सा०) वलादि मण्डूर (रसयोगसागर) द्राधावलेह (र० त० सा०) सूतशेखर रस (यो॰ र॰) जीरकादि मोदक (र • त • सा •) लीलाविलाम रस (रसेन्द्रसारस०) मुक्तापिप्टी कल्याणवटक (गदनिग्रह) द्राक्षादि गृटिका (सि॰ यो॰ स॰) प्रवालिपटी क्षारपपंटी (सि॰ यो॰ स) प्रवालपचामृत इत्यादि बम्लिपत्त मे निश्चित लामकर औपधें हैं।

पध्य

पुराना चावल, जी, गेहूँ, मूँग, धान के लावा का सत्तू, जांगल पशु-पिक्षयो का मास, चीनी, मिश्री, पेठा, आँवले या सेव का मुरच्वा, गुलकन्द, मुनवका, किशमिस, अनार, वेर तथा इसी तरह के कफ व पित्तशामक तिक्त, कपाय एवं मधुर रस प्रधान द्रव्यों का सेवन उत्तम है। परवल, केरला, वथुआ, पालक, चौलाई, लौकी, तरोई, नेनुआ आदि तिक्तरस-भूषिष्ठ शाक उपयुक्त है।

गाय या भैंस का दूध, ताजा मनयन या घी, धनियाँ, जीरा, सेंधानमक और कागजी नीवू देना उचित है। मीठी मोसम्मी, केला, मीठा आम, छेने की मिठाई, खीरमलाई, रसगुल्ला, उत्तम, वर्षी (गरीयुक्त) और पेडा लिया जा सकता है।

अपध्य

नया चावल, विरोधी आहार, पित्तप्रकोषक आहार, तिल, उडद की द्वाल, बैगन, मछली, कुलथी, दही, कौजी, अम्लद्रव्य, गरिष्ट भोजन, मदिरा आदि अपथ्य हैं। धूम्रपान, चाय, गरम भोजन, सूर्यताप-सेवन, अन्नि-भेवन तथा क्रोध आदि मनी-विकार हानिकारक होते हैं।

रकाद्श अध्याय

ग्रूलरोग

परिचय—'शूल रुजायाम्' (भ्वा० प० से०) घातु से 'क' प्रत्यय होकर 'शूल' शब्द बना है। इसिलये सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार की वेदना को शूल कहा जाता है। जैसे—िशर के दर्द को शिर शूल, कान के दर्द को कणंशूल, नेत्र के दर्द को नेत्रशूल, दाँत के दर्द को दन्तशूल, पसली के दर्द को पाश्वेंशूल, पीठ के दर्द को पृष्ठ- शूल, वस्ति के शूल को वस्तिशूल, हृदय रे दर्द को हृदयशूल और उदर के शूल या दर्द को उदरशूल कहा जाता है।

शूल बहुत से रोगो के लक्षण के रामे अथवा उपद्रव के रूप में भी वर्णित है। रोग और शूल, इन दोनो शब्दो का समान अर्थ है, क्योंकि रोग का अर्थ पीडादायक है और शूल का भी पीडा देने वाला अर्थ है। इसलिए इन दोनो शब्दो का व्यवहार किसी भी रोग के नाम से किया जाता है। उमी अभिप्राय से—१ स्वतन्त्र और २ परतन्त्र भेद से दो प्रकार का शूल माना जाता है। परतन्त्र वह है जो किसी रोग के साथ अनुगामी अथवा उपद्रव स्वरूप होता है। कित्पय आचार्य स्वतन्त्र रूप से शूल का वर्णन नहीं किया है। जैसे चरकसहिता एव अष्टागहृदय में शूलरोग का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है। यहाँ उदरशूल के अर्थ में शूल शब्द का प्रयोग है।

सन्दर्भ-(१) सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र (अ०४२) मे गुल्म के उपद्रव रूप मे एव स्वतन्त्र रूप मे शूलरोग का वर्णन किया गया है।

(२) माधवनिदान मे शूल का निदान विस्तार से विणत है।

(३) काश्यपसहिता खिलस्थान अ० १८ मे शूल का वर्णन है।

निरुक्ति — (क) जिस रोग से रुग्ण व्यक्ति के शरीर में (उदर में) कील-खूँटा-वाण की नोक या किसी नोकदार दृहिषयार के धँमने के समान तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, उस रोग को शूल कहा जाता है।

(ख) शूलविद्ध व्यक्ति की तरह जिस रोग मे वेदना की तीवता होती है, उस

रोग को शूल कहते हैं।

(ग) इस रोग की उत्पत्ति शूल से हुई है, अत इसे शूल कहते हैं।

(घ) शूल धँसाने जैसी पीडा के कारण इस रोग को शूल कहा जाता है।

(ख) यतश्च तस्मिन् शूलविद्ध इव व्यथते तीव्रवेदनार्दित तस्माच्छूलमित्युच्यते । अ० स० नि० ११

१ (क) शङ्कुस्फोटनवत् तस्य यस्मात् तीव्राध वेदना । शूलासक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्माच्छूलमिद्दोच्यते ॥ स० ७० ४२

⁽ग) शूलसम्भवत्वादस्य शूलमिति सज्ञा। मधुकोष

⁽ प) शूलनिखातवद् वेदनाजनकरवाच्च । मधुकोष

वक्तव्य—'हारीतसहिता' में ज्वर की ही तरह शूलरोग की उत्पत्ति की पौरा णिक कया है—''जब भगवान् शिव समाधिस्य थे और उनकी समाधि भग करने के लिये कामदेव ने प्रयास किया, तो वे कृद्ध होकर उन पर त्रिशूल फॅक दिया और भयभीत कामदेव विष्णु की शरण में जाबर छिप गये। विष्णु भगवान् ने अपनी हुकार से उस त्रिशूल को छौटा दिया और वह पृथ्वी पर गिर पटा तथा उसी से शूलरोग की उत्पत्ति हुई''।

इस कया से यह अभिन्यक्ति निकलती है कि जो लोग वडो का अपमान करते हैं, उन्हें भयकर कप्ट का सामना करना पडता है।

शूल के प्रकार

माधवकर^२ ने आठ प्रकार के जूलरोगों का वर्णन किया है—१. वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ वातपित्तज, ५. वातकफज, ६ पित्तकफज, ७. सिन्नपातज और ८ आमज।

पुनम्च आठ शूलो का वर्णन इस प्रकार है—१ वातज परिणामशूल, २. पित्तज परिणामशूल, ३. कफज परिणामशूल, ४. वातपित्तज परिणामशूल, ५ वातकफज परिणामशूल, ६ पित्तकफज परिणामशूल, ७ सिन्नपातज परिणामशूल और ८. अन्नद्रवशूल।

सुश्रुताचायं ने उपहले दोपज चार शूलो का वर्णन किया है-- १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज और ४. सिन्नपातज।

पुनम्र सात प्रकार के शूलरोगो का वर्णन किया है, जैसे—पार्श्वशूल, २. फुक्षि-शूल, ३. हुच्छूल, ४. बस्तिशूल, ५. मूत्रशूल, ६. विट्शूल और ७. अविपाकज शूल।

इस प्रकार माघवकर के १६ प्रकार के शूल । अतिरिक्त सुश्रुत के ७ प्रकार के शूल । योग—२३

इस प्रकार कुल २३ तरह के धूलो का वर्णन मिलता है।


१ अनङ्गनाशाय हरिस्रश्र्ल सुमोच कोपा- १ रध्वनश्र । तमापतन्तं सहसा निरोक्ष्य भयादितो विष्युत । प्रविष्ट ॥ स विष्णुदृद्धारिवमोहितात्मा पपात भूमी प्रति स श्र्ल । स पञ्चभृतानुगत शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पृतंसिंछ ॥ मधुकोश

२ दोपे पृथक् समस्तामद्धन्द्धैः शूछोऽष्टथा भवेत् सर्वेष्वेतेषु शूछेषु प्रायेण पवनः प्रमु ॥ गा० नि०

३. सुश्रुत, उतर्० ४२।

४. यद्यपि चत्वार. शूला , तथापि दोवधातुमलसंसर्गादायतनविशेषात्रिमित्ततश्चेपा विकल्प इति कृत्वा पार्श्वादिशुलमाह । सु० उ० ४२।११७

कायविकित्सा



वातज ज्ञूल का निवान और संप्राप्ति

अधोवायु के वेग, मूत्र के वेग और मल के वेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से, अजीण होने से, भोजन के बिना पचे पुन. भोजन करने से, विरुद्ध भोजन करने से, भूख लगने पर अन्न न खाकर मात्र पानी पी लेने से, अकुरित अन्न खाने से, उडद, चावल आदि के आटे से बने पदार्थों के खाने से, सूखे सास का सेवन करने से

वातमूत्रपुरीषाणां निम्रहादितिमोजनात् ।
 अजीर्णाध्यशनायासिकरद्वान्नोपसेवनात् ॥
 पानीयपानात् क्षुत्काळे विरूढानाञ्च सेवनात् ।
 पिष्टान्नशुष्कर्मासानामुपयोगात् तथैव च ॥
 एवविधानां द्रव्याणामन्येपान्नोपसेवनात् ।
 बायु प्रकुपित. कोष्ठे शुळ सञ्जनयेद् मृशम् ॥
 निरुच्छ्वासो मवेत्तेन वेदनापीढितो नरः । सु० व० ४२।७८-८०

और इसी प्रकार के अन्य वातप्रकोपक द्रव्यों के सेवन से वायु प्रकुपित होकर तीव्र शूल उत्पन्न करता है।

माधव के अनुसार अधिक व्यायाम, सवारी पर अधिक चढना, अधिक मैथुन करना, रात्रि-जागरण, अतिशीतल जलपान, मटर-मूग-अरहर-कोदो तथा अन्य अत्यधिक रूक्ष पदार्थ खाना, अध्यशन करना, चोट लगना, कपाय तथा तिक्तरस-प्रधान दच्यो का अधिक सेवन करना, अकुरित चना आदि अन्न खाना, विरुद्ध भोजन, शुष्क मास तथा शुष्क शाक खाना, मल-मूत्र-शुक्र तथा अधोवायु का वेग धारण करना, शोक, उपवास, अत्यधिक हँसना तथा वोलना आदि कारणो से प्रकुपित हुई वायु हृदय, दोनो पाश्व, पीठ, त्रिक तथा वस्ति-प्रदेश मे शूल उत्पन्न करती है।

वातज शूल का लक्षण

वातज शूल भोजन के पच जाने पर, सायकाल के समय, वर्षा ऋतु और शीत के समय विशेष रूप से वढ जाता है। यह शूल बार-वार घटता बढता रहता है। इसमें मल तथा वायु की रुकावट हो जाती है और सूई चुभाने जैसी व्यथा और काटे जाने जैसी पीडा होती है। र

पित्तज शूल का निदान और संप्राप्ति³

क्षार, अति तीक्ष्ण, उच्ण, विदाही पदार्थ, सेम, तेल, तिल की खली तथा कुलथी का यूप अधिक खाने से, कदु-अम्ल-कांजी तथा मद्य का सेवन करने से, क्रोध करने से, अधिक अग्नि तापने से, अधिक परिश्रम करने से, घूप का अधिक सेवन करने एव अधिक मैथुन करने से भोजन का विदग्ध पाक हो जाता है, जिससे पित्त प्रकुपित होकर नाभि-प्रदेश में शूल उत्पन्न करता है।

पित्तज शुल का लक्षण

पित्तज शूल मे तृपा, दाह, मोह, पीडा, पसीना आना, मूच्छी, चक्कर आना

- १ न्यायामयानादितमैथुनाच प्रजागराच्छीतजलातिपानात् । कलायपुद्गाढिककोरदूपादत्यर्थस्क्षाध्यश्चाभिघातात् ॥ कपायतिकातिविरुद्धजात्रविरुद्धवरुद्धत्कशुष्कशाकात् । विद्शुक्रमूत्रानिरुवेगरोधाच्छोकोपवामादितिह्यस्यमाष्यात् ॥ वायु प्रवृद्धो जनयेद्धिशुलं हृत्पार्थपृष्ठत्रिकवस्तिदेशे । मा० नि०
- २ (क) जीर्णे प्रदोपे च धनागमे च शीते च कोपं समुपैति गाढम् ॥ मुद्दमुद्दश्चीपशमप्रकोपी विद्वातसस्तम्भनतोदभेदे ।
 - (ख) निराहारस्य यस्यैन तीच श्रूलमुदीर्यते। प्रस्तन्धगात्रो भवति कृच्छ्रेणोच्छ्वसितीव च॥ वातमूत्रपुरीपाणि कृच्छ्रेण कुरुते नर। एतेजिङ्गेविजानीयाच्छ्ल वातसमुद्रवम्॥ सु० ड० ४२।८२-८३
- ३ क्षांरातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलनिष्पावपिण्याककुल्त्ययूषै । कट्वम्ल्सीवीरसुर।विकारै क्रोधानलायासरविप्रतापै ॥ प्रान्यातियोगादश्चनिविदग्धे पित्तं प्रकुप्याशु करोति शूलम् । मा० नि०

भीर शूल स्थान में चूसने जैसी पीडा का होना, ये सब लक्षण होते हैं। यह शूल मध्याह्न मे, आधी रात मे, भोजन पचते समय और शरद् ऋतु में बढता है।

फफज शूल का निदान और संप्राप्ति'

आनूपदेश के पशु-पक्षियों का तथा जलचर जीवो का मास खाने से, खोवा, छेना अथवा दूध के बने हुए पदार्थों के खाने से, मास का अधिक सेवन करने से, गन्ने का रस, उडद आदि की पिठी से बने पदार्थ, खिचडी, तिल और पूडी के अधिकाश सेवन से तथा अन्य कफकारक पदार्थों के सेवन से प्रकुपित हुआ कफ आमाश्य में शूल उत्पन्न करता है।

कफज शूल का लक्षण

कफज शूल मे मिचली बाना, खाँसी, अगो में थकावट, अरुचि, मुख से लार टपकना, कोष्ठबद्धता होना और शिर मे भारीपन होना, ये लक्षण होते हैं। यह शूल भोजन करने के तुरत बाद, प्रात काल, शिशिर और वसन्त ऋतु मे विशेष रूप से होता है।

वक्तव्य-नातज शूल का मुख्य स्थान वस्ति, पित्त का नाभि तथा कफज शूल का मुख्य स्थान हृदय, पार्वे एव कुक्षि है, क्योंकि उक्त स्थान उन दोपों के मुख्य स्थान हैं। 3

द्वन्द्वज शूल के लक्षण

वातकफन शुल

यह शूल हृदय, पार्श्व तथा पीठ मे होता है।

कफपित्तव शुल

यह शूल कुक्षि, हृदय और नामि के मध्य मे होता है। बातिपत्तज शूल

यह शूल वस्ति और नाभि मे भयकर रूप से होता है और इसमे दाह तथा ज्वर भी होता है।

१ आनुपवारिजिक्तिलाटपयोविकारैमीसेसुपिष्टकृशरातिलशष्त्रलीभि । अन्यैर्वलासजनकैरपि हेतुमिश्च श्लेष्मा प्रकोपसुपगम्य करोति शूलम् ॥ मा० नि०

२ हल्लासकाससदनारुचिसम्प्रसेकैरामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोग्ररुत्वे । भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्र सर्योदयेऽथ शिशिरे कुद्धमागमे च ॥ मा० नि०

श्वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाम्याम् ।
 हृत्यार्श्वकृक्षी कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात् ॥ मधुकीप

४. वस्तौ इत्पार्श्वपृष्ठेषु सञ्चलः कफवातिकः । कुक्षौ इन्नाभिमध्येषु सञ्चलः कफपैत्तिकः ॥ दाइन्वरकरो घोरो विश्वेयः वातपैत्तिकः । मा० नि०

शूल की साध्यासाध्यता

एकदोषज जूल साध्य होता है, द्विदोषज जूल याप्य होता है और अनेक उपद्रवो से युक्त भयानक त्रिदोषण जूल असाध्य होता है।

श्रूल के उपद्रव^२

पीडा होना, प्यास लगना, मूच्छां, आनाह (कोष्ठबद्धता), शरीर मे भारीपन, अरुचि, खाँसी, श्वास और हिचकी, ये शूल के उपद्रव कहे गये हैं।

सन्निपातज शूल का लक्षण³

तीनो दोषो से होनेवाले सिन्नपातज शूल मे सभी दोषो के लक्षण पाये जाते हैं। यह शूल अत्यन्त कष्टप्रद होता है। विद्वान् लोग इस शूल को विष और बिजली (वज्र) के समान असाध्य मानते हैं।

आमज शूल का लक्षण^४

इसमे आवाज के साथ पेट फूलना, मिचली, वमन, शरीर मे भारीपन, शरीर को जैसे भीगे चमडे मे लपेट दिया गया हो ऐसा लगना, विवन्ध और लार टपकना, ये सब लक्षण होते हैं। इसके लक्षण कफज शूल के समान ही होते है और यह आमाशय मे होता है।

परिणामशूल

रूझ आदि स्वप्नकोपक कारणो से प्रकुपित वायु स्थानविशेष में स्थित होने से भोजन के परिणाम काल (पच्यमानावस्था) में प्रबल होकर कफ और पित्त को आवृत कर शूल उत्पन्न करता है। यह शूल भोजन के पचने के समय होता है, अत इसे परिणामशूल कहते हैं।

तन्त्रान्तर के वचनानुसार परिणामशूल

अपने स्थान (आमाशय) से च्युत कफ विकृत पित्त से मिलकर वायु को भी प्रकुपित कर, भोजन के पचते समय कुक्षि-उदरपाश्वं-नाभि-वस्तिप्रदेश तथा दोनो

एकदोषोत्थित. साध्य कुच्छूसाध्यो द्विदोषज ॥ सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्श्वपद्रवः । मा० नि०

२. वेदना च तृषा मूच्छा द्यानाहो गौरवारुची। कास श्वासथ हिका च शूलस्योपद्रवा. स्मृता ॥

२. सर्वेषु दोषेषु च सर्वेलिङ्गं विद्याद्भिपक् सर्वभवं हि शूलम् । सुकष्टमेनं विषयज्ञकल्प विवर्जनीय प्रवदन्ति तज्ज्ञा ॥

४. षाटोपदृ ह्यासवमीगुरुत्वस्तैमित्यकानाइकफप्रसेकै ।

कफस्य लिक्षेन समानलिङ्गमामोद्भवं शूलमुदाइरन्ति ॥ मा० नि०

५. स्वेनिदाने अजुपितो वायु चित्रिष्टितस्तदा ॥
 कफिपेचे समानृत्य शूलकारी भवेदली ।
 मुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ॥ मा० नि०

स्तनों के बीच के प्रदेश अर्थात् छाती के बीच पृष्ठमूल (किट) में से किसी एक या अनेक या सभी प्रदेशों में शूल को उत्पन्न करता है। यह शूल भोजन कर होने से या वमन हो जाने से या आहार का पूर्णत पाक हो जाने पर शान्त हो जाता है। यह साठी या अगहनी का चावल खाने में बढनेवाला शूल है। इसे दुविज्ञेय महारोग परिणामञ्चल कहा गया है। यह रसवहस्रोतों के विकार से होता है। इसे कुछ लोग अन्नद्रव शूल कहते हैं, साथ ही पित्तदोष, पित्तशूल या अन्नविदाहन शूल भी कहते हैं।"

वक्तव्य—उक्त तत्रान्तर-वचन में परिणामशूल को ही अन्नद्रवशूल कहा गया है, जब कि ये दोनो अलग-अलग रोग हैं, अतएव माधवनिदान में इन दोनो के लक्षणों का पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है। लक्षण की भिन्नता के कारण दोनों को दो रोग मानना ही उचित है। परिणामशूल का सादृश्य डघूओडिनल अल्सर (Duodenal vicer) के साथ है, जब कि अन्नद्रव की तुलना गैस्ट्रिक अल्सर (Gastre vicer आमाशयिक न्नण) के साथ की जाती है। अन्नद्रवशूल का वर्णन आगे किया जायेगा।

परिणामशुल का दोषभेदानुसार लक्षण

वातिक परिणामशुल

जदर का फूलना, उदर में गुडगुडाहट, मल-मूत्र का अवरोध होना, वेचैनी होना कोर शरीर में केंपकेंपी होना, ये वातिक परिजामगूल के लक्षण हैं। यह शूल प्राय स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से शान्त होता है।

पैतिक परिणामशुल

प्याम की अधिकता, दाह, वेचैनी तथा अधिक पसीना होना और फटु-अम्ल एवं लवणरसयुक्त पदार्थों के सेवन से जूल की वृद्धि तथा जीतल उपचार से जूल का ज्ञामन होना, ये पैक्तिक परिणामशूल के लक्षण हैं।

कफज परिणामशूल

वमन, मिचली, मूच्छी, अधिक काल तक थोटी-थोटी पीटा का बना रहना तथा कटु एव तिक्त पदार्थों के सेवन से शूल का शान्त होना, ये कफज परिणामगूल के लक्षण हैं।

१. वलास प्रच्युत स्थानात् वित्तेन राह मृन्छिनः । वागुमादाय कुरते श्रूलं नीयंति मीकते ॥ कुर्सी जठरपार्थेषु नामी वस्ती स्तनान्तरे । पृष्ठमृत्यदेशेषु सर्वे पेठेषु वा पुनः । मुक्तमानेऽथवा वान्ते जीगेंऽथे न प्रशास्यति । पृष्टिकवीहिशाशीनामीदनेन न वर्षते ॥ तत्परिणामव श्रूलं दुविहेष महागदम् । तमाह् रग्नवाहानां सीनतां दुविहेषुकम् ॥ किनिद्यप्रद्वं प्राहुरन्ये तत्पिकदोषत । पृक्तिश्चलं वदन्यके किपिद्यप्रदिशहमम् ॥ —मधुक्तेव प्राहुरन्ये तत्प्रतिन्त्रम् ॥ —मधुक्तेव में वद्गृत तत्प्रतिन्त्रप्तः ।

२ माधवनिदान ।

द्वन्द्वज तथा सिन्नपातज परिणामशूल

किन्ही दो दोषों के मिलने पर द्वन्द्वज और तीनो दोषों के लक्षण मिलने पर जिदोषज परिणामशूल जानना चाहिए।

परिणामशुल की असाध्यता

जब त्रिदोषज परिणामशूल हो अथवा जिस किसी तरह का परिणामशूल हो गया हो तथा रोगी के शरीर का मास तथा बल एव उसकी जठरांग्नि नष्ट हो गई हो, तो उसे असाध्य समझना चाहिए।

पित्तज शूल और परिणामशूल का सापेक्ष निदान

पित्तव शुल परिणाम शूल

- १. इसके प्रकोप व शमन का सम्बन्ध १ परिणामशूल के घटने-बढ़ने मे दिन, पित्तकारक तथा पित्तशामक दिन, रात या ऋतु का सम्बन्ध आवश्यक रात्रि एवं ऋतु से होता है। नहीं।
- २ पित्तज शूल का बाहार परिणाम २ इसके होने का समय आहार का काल में होना स्पष्ट नही। परिणाम काल निश्चित है।
- ३. यह एकदोपन तथा सुखसाध्य है। ३. यह पित्तोल्वण त्रिदोषन रोग है।

अन्नद्रवश्ल

जो शूल भोजन के पच जाने पर या भोजन के पचते समय या भोजन के पचने से पूर्व अर्थात् भोजन के बाद एवं अजीणं स्थिति में होता है और पथ्य या अपध्य के सेवन से तथा भोजन कर लेने पर या खाली पेट रहने पर नियम से शान्त गरी होता है, उस शूल को अन्नद्रवशूल कहते हैं। इस शूल में रोगी को आराम नहीं मिलता और लगातार शूल बना रहता है। जब वमन द्वारा पित्त निकल जाता है, तब शीघ्र ही शूल बन्द हो जाता है।

वक्तव्य वमन होने पर शूल का शमन होना देखकर यह घारणा बलवती होती है, कि इस शूल मे विकृति आमाशय मे होती है। इस शूल के समय तथा परिस्थिति का निर्धारण न हो पाने से यह त्रिदोषज शूल जाना जाता है। इस शूल का मुख्य कारण जीणं आमाशयशीथ (Chronic Gastritis) या आमाशयक त्रण (Gastric ulcer) है। इसके कारण नाभि के ऊपर के प्रदेश मे दबाव नहीं बर्दाश्त होता। अन जब तक आमाशय मे होता है, तब तक शूल शान्त नहीं होता है। वमन द्वारा आहार द्वय के वाहर निकल जाने पर या ग्रहणी मे चले जाने पर कुछ समय के लिए शूल शान्त हो जाता है।

जीर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छलमुपजायते ।।
पथ्यापय्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ।
न श्मं याति नियमात् सोऽन्नद्रव उदाहृत ॥
अन्नद्रवाख्यश्लेषु न तात्तत् स्वास्थ्यमञ्जते ।
वान्तमात्रे जरत्यत्तं श्रृतमाश्च व्यपोहृति । भ्रम्० नि०

जब भोजन आमाशय में पहुँचता है, तो उसके पाचन के लिए आमाशियक रस का स्नाव होने लगता है और तभी शूल प्रारम्भ हो जाता है। यह शूल तब शान्त होता है जब आहार ग्रहणी में चला जाता है। आमाशियक पाचन के समय अम्ल के प्रत्युद्रिण (Regurgitation) के कारण रोगी को हृत्प्रदेश में जलन (Heart burn) का अनुभव होता है। सारयुक्त औषध अथवा द्रव पदार्थ के सेवन से अम्ल का प्रभाव नष्ट होने पर कदाचित् शूल का शमन हो जाता है।

पार्श्वशूल की सप्राप्ति और लक्षण

मिच्या आहार-विहारों से प्रकुपित कफ कुक्षि तथा पार्श्व में स्थित होकर वायु को रोक देता है तथा वह किन हुई वायु शीघ्र ही कुक्षि में आध्मान और गुडगुडाहट पैदा कर देती है एव पार्श्व-प्रदेश में सूई चुमाने जैसी पीडा उत्पन्न करती है। उस समय वह रोगी शूल के कारण कठिनाई से श्वास लेता है तथा खाने की इच्छा नहीं करता और शूल की पीडा के कारण सीता भी नहीं है। इस प्रकार का कफ और वायु से उत्पन्न शूल पार्श्वशूल कहलाता है।

वक्तव्य—पार्श्व शब्द से उदर और वक्ष दोनों का पार्श्व जाना जाता है और दोनों में शूल होता है। अन्त्र की विकृति से अर्थात् कृक्षि-स्थित क्लेष्मा के द्वारा अन्त्रगत वायु का अवरोध होने पर उदरपार्श्वशूल उत्पन्न होता है। यह कभी एक पार्श्व में तथा कभी दोनों पार्श्वों में भी होता है।

वक्षगत पार्श्वंशूल का कारण परिफुप्कुसशोथ (Dry pleurisy) है। यह शूल विकृत पार्श्व के अनुसार कभी एक पार्श्व में तथा कभी दोनो पार्श्वों में हो सकता है। इस शूल में विकृत वक्षपार्श्व की गति कम होती है तथा श्वास के समय उदर की गति बढ जाती है।

कुक्षिशूल का निदान और लक्षण

मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित वायु जठराग्नि को मन्द कर देती है, जिससे खाया हुआ भोजन ज्यो का त्यो जकडा हुआ-सा उदर मे पढ़ा रहता है और उसका उचित रूप से पाचन नहीं होता। जिससे रोगी कठिनाई से माँस लेता है तथा आम मल के कारण उत्पन्न हुए शूल से पीडित रहता है। रोगी को बैठने, सोने या खडे होने मे कब्ट होता है। इस प्रकार प्रकुपित वात तथा आमदोब से उत्पन्न इस शूल को कुक्षिशूल कहते हैं।

१ रुणद्धि मारुत श्लेष्मा कुक्षिपार्श्वन्यवस्थित ।
स संरुद्धः करोत्याशु साध्मानं गुडगुडायनम् ॥
सूचीभिरिव निस्तोढं कृच्छ्रोच्छ्वासी तदा नरः॥
नान्नं वाञ्छति नो निद्रामुपैत्यर्तिनिपीडित ।
पार्श्वश्चल स विश्वेय कफानिलसमुद्धवः॥ स्ट० उ० ४२।११८-११९

[🦯] २. सु० च० ४२।१२४–१२५

हृदयशूल का निदान और लक्षण

मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित कफ तथा पित्त से अवरुद्ध हुआ वायु रसधातु से मिलकर हृदय मे अवस्थित होकर वहाँ शूल उत्पन्न करता है, जिसके कारण रोगी का श्वास रकने लगता है। इस स्थिति को हृदयशूल कहते हैं। यह शूल आहार रस और वायु के मिलने से होता है।

वक्तव्य—इस शूल का प्रारम्भ उर फलक के उपरितन तथा पृष्ठभाग से होता है। परिश्रम करने से इसका दौरा होता है। यह शूल वक्ष के वाम बाहु के भीतिरी भाग से होता हुआ अँगुलियों के अन्तिम छोर तक पहुँच जाता है। कभी-कभी ग्रीवा के वामपाश्वं में भी इस वेदना का अनुभव होता है। प्राय हृदय की रक्तवाहिनियों में विकृति होने के बाद प्राणवायु की कमी होने के परिणामस्वरूप हृदयशूल होता है। श्वासावरोध होना हुच्छूल का प्रधान लक्षण है।

वस्तिशूल का निदान, संप्राप्ति और लक्षण

मल-मूत्र आदि के वेगो को रोकने से प्रकुपित वायु वस्ति में जाकर उसमें चारों बोर घेर कर एक जाती है, जिससे रोगी के वस्ति, वक्षण और नाभि में शूल होता है तथा पुरीष, मूत्र एवं बद्योवायु का अवरोध हो जाता है। इसे वस्तिशूल कहते हैं। यह प्रधानरूप से वातजन्य होता है। द

मूत्रशूल का निदान और लक्षण

मिथ्या आहार विहार से प्रकुपित वायु मूत्रेन्द्रिय तथा अन्त्र मे पीडा उत्पन्न कर मूत्र के निर्गमन को अवस्द्ध कर देती है, तब नाभि, वक्षण-प्रदेश, दोनो पास्वं और समस्त कुक्षि (उदर) मे शूछ होता है। इसे मूत्रशूछ कहते हैं। यह वात से उत्पन्न होता है। 3

विट्जुल का निदान, संप्राप्ति और लक्षण

रूक्ष आहार-विहार करने से प्रकुपित वायु मल का अवरोध कर देता है और जठराग्नि को मन्द कर देता है, फिर स्रोतसो को घेर कर कुक्षि या उदर के वाम या दक्षिण पाइवें मे तीव्र शूल उत्पन्न करती है। पुन वह प्रकुपित वायु आवाज के साथ घूमती हुई पूरे उदर मे फैल जाती है। तब रोगी की प्यास बढ जाती है,

१ कफिपत्तावरुद्धस्तु मारुतो रसमूच्छित । इदिस्थ कुरुते शूल्रमुच्छ्वासारोधकं परम् ॥ स इच्छ्ल इति ख्यातो रसमारुतसम्मव ॥ मा० नि०

२. सरीधात कुपितो वायुर्वस्तिमावृत्य तिष्ठति । वस्तिवब्क्षणनामीषु तत श्रूलोऽस्य जायते ॥ विण्मूत्रवातसेरोधी वस्तिशूल स मारुतात्॥

३ नाम्यां वह्रक्षणपार्श्वेषु कुक्षौ मेद्रान्त्रमर्दक । मूत्रामावृत्य गृह्णानि मूत्रद्राहाः स मारुताहा ॥

उसे चक्कर आता है और बेहोशी भी होती है। मलत्याग या पेशाब करने पर भी उसकी बेचैनी नहीं मिटती। इसे विट्शूल कहते हैं। यह भयंकर कष्टप्रद होता है।

अविपाकशुल का निदान, संप्राप्ति और लक्षण

जब मन्दाग्निवाला व्यक्ति अधिक मात्रा मे भोजन कर लेता है, तब वह पक्वाश्य में जाकर स्थिर बैठ जाता है और उसका पाचन नहीं होता तथा प्रकृषित वायु उसे घेर लेती है, जिससे वह अपक्व आहार उदर में तीव्र शूल उत्पन्न करता है। फिर रोगी को मूल्क्का, आध्मान, विदाह, मिचली या विलम्बिका रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त कभी विरेचन होने लगता है कभी वमन होता है और रोगी काँपने लगता है तथा वेहोश हो जाता है। इस अविपाक से होनेवाले शूल को अन्नदोष (अजीण) से उत्पन्न शूल कहते हैं।

शूलरोग का चिकित्सा-सूत्र

- 9. शूलरोग मे यदि कफ के कारण उत्क्लेश आदि हो, तो पहले वमन कराना चाहिए।
 - २. कफप्रधान आमाशयगत विकार मे अनशन अथवा लघुमोजन देना चाहिए।
 - ३. उष्ण, दीपन तथा लेखन एवं क्षार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए।
 - ४. आम की अधिकता होने पर लघन उत्तम उपचार है।
- ५. किसी भी दोष या कारण से शूल उत्पन्न हुआ हो, तो उसमे वायु की प्रधानता अवश्यम्मावी है। शूल मे आध्मान, तोद, आयाम आदि लक्षणो को वायु ही उत्पन्न करता है। अवतएव शूलमात्र मे विविध प्रकार के स्वेद लाभकारक होते हैं।
 - १. वायु प्रकुपितो यस्य रूक्षाहारस्य देहिन ।

 मल मणित कोष्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकम् ॥

 भूल सञ्जनयस्तीव स्रोतास्यावृत्य तस्य हि ।

 दक्षिणं यदि वा वाम कुक्षिमादाय जायते ॥

 सर्वत्र वर्षते क्षिप्र अमन्नय सघीषवान् ।

 पिपासा वर्षते तीवा अमो मूर्च्या च जायते ॥

 उच्चारिनो मूत्रितश्च न शान्तिमधिगच्छति ।

 विद्शुलमेतन्जानीयाद् भिषक् परमदारुणम् ॥ सु० उ० ४२।१३६–१३९
 - २ अतिमात्र यदा भुक्त पानके सृदुता गते।
 स्थिरीभृत तु तस्कोष्ठे नायुरावृत्य तिष्ठति॥
 अविपाकगतं द्यन्न शूलं तीनं करोत्यति।
 मून्ज्रांऽऽ-मानं विदाहश्च दृदुत्वलेशो विलम्बिका॥
 विरिच्यते हर्द्रयति कम्पतेऽथ विमुद्यति।
 अविपाकाद् भवेच्छूलस्त्वन्नदोषसमुद्भव॥ सु० उ० ४२।१४२-१४४
 - ३ (क) मर्वेष्वेतेषु शुलेषु प्रायेण पवन प्रसु । मा० नि०
 - (स) कुद्धो वायु कर्तनायामतोदै कम्पाध्मानैराविश्चन् कुक्षिदेशे। शूल पित्तेनान्वित स्रेष्मणा वा द्वाभ्या वापि प्रेर्यमाण करोति॥ काश्यप०
 - ४ पुस. शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावह ।

६. आमज शूल मे कफशूलघ्न, अग्निप्रदीपक और आमपाचक चिकित्सा करनी चाहिए। रोगी की शक्ति के अनुसार वमन और लंघन कराना चाहिए।

७ आमाशय एवं पक्वाशयगत शूलो की दृष्टि से तथा मल और वायु के अनुलोमन के लिए वमन-लघन एव स्वेदन के साथ पाचन द्रव्यो का प्रयोग, गुदद्वार में मल-अधोवायु के प्रवर्तनार्थं गुदर्वात (फलवर्ति) का प्रयोग, क्षार, चूर्णं तथा गुटिका-वटी आदि का प्रयोग करना चाहिए।

८ सभी प्रकार के शूलों में पहले वात को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। तीव शूल होने पर तलाव हीग को २ रत्ती भर पानी से निगलवा दे या हिंग्वष्टक चूर्ण या शिवाक्षारपाचन चूर्ण तथा सज्जीखार (सोडा बाई कार्व) १ ग्राम मिलाकर आधा-आधा धण्टे पर ३-४ बार जल के साथ खिलावे।

९ आनाह या मलावरोघजन्य शूल होने पर निरूहवस्ति के रूप में साबुन के
 पानी की वस्ति देनी चाहिए।

१०. मलवातानुलोमन, शूलघ्न एव स्निग्ध वस्ति देने की उपयोगिता प्रतीत हो, तो—

एरण्डतेल ३० ग्राम तारपीन का तेल १५ बूँद सोचरनमक ३ ग्राम जल आवस्यकतानुसार ।

इस योग के अनुसार वस्ति वनाकर वस्ति के ज्ञाता चिकित्सक द्वारा वस्ति देने की योजना करे।

११. पैतिक शूल में मैनफल चूण को परवल के पत्ते और नीम की गीली छाल के क्वाय या दूध अथवा गन्ने के रस में मिलाकर एवं पिलाकर वमन कराना लाभदायक है।

१२ पैत्तिक शूल में उष्ण आहार-विहार तथा उष्ण औषध त्याज्य हैं।

२३. परिणामशुल में कडवी और मीठी औषधियों से वमन, विरेचन, निरूह-वस्ति और मध्र मिली तैल की वस्ति देनी चाहिए।

१४ अन्नद्रव शूल मे प्राय पित्त की अधिकता होती है, अत वमन-विरेचन कराकर उसका शोधन करना चाहिए।

अन्नद्रवशूल (आमाशियक व्रण) होने पर रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। आमाशिय पर आघात न हो, यह सावधानी बरतनी चाहिए। व्रणस्थान पर भोजन का दबाव जितना ही कम होगा, उतना ही कम कष्ट होगा। जिस आसन से बैठने या सोने मे आराम हो, उसी आसन से बैठना और सोना चाहिए।

१ वमन लहुनं स्वेद पाचन फलवर्तय । क्षारारचूर्णानि गुटिका शस्यन्ते शूलशान्तये ॥ यो० र०

१५. प्याज, लहसुन, चावल, गरममसाला, खटाई, गुरु पदार्थे भोजन और उग्न पदार्थी का सेवन वर्जित है।

विशिष्ट चिकित्सा वातज शुल-चिकित्सा

- 9. वायु बहुत शीघ्र मात्यियक स्थिति उत्पन्न कर देता है, इसलिए उसका शमन शीघ्रता से करना चाहिए। वातज शूल में स्नेहन और स्वेदन सद्य फलप्रद उपचार है।
- २. स्वेदन उदर का वातव्न तैल से अभ्यङ्ग करने के पश्चात् स्वीर, मास-पिण्ड, स्निग्ध पिट्ठी, हलवा या तिल-चावल-मूँग और उडद की खिचडी से सेंक करना चाहिए।
 - ३ शूलजनक कारणो का परित्याग करना चाहिए।
- ४ नारायण तैल, महाविषगर्भ तैल या महामाप तैल की सुखोडण मालिश करने से वेदना दूर होती है।
- ५ तारपीन के तेल की मालिश कर सुखोज्ण जल से सेंकना शीघ्र शूलशामक होता है।
- ६ गरम जल मे तारपीन का तेल डालकर उसमे छोटी तौलिया भिगोकर, निचोडकर उदर को सेंकना लाभदायक है।
- ७ लम्बी बोतल मे गरम जल भरकर अथवा रबर की थैली (Hot water bag) मे गरम जल भरकर उदर का सुखोष्ण सेंक करना दर्द को दूर करता है।
- ८. लेप—देवदारु बुरादा, वच, वक्, सौंफ, हीग और सेंधानमक को कौंजी में पीसकर गरमकर उदर पर मोटा लेप करने से शूल शान्त होता है।
- ९ मल और वात के अनुलोमनार्थ गुश्वित का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार 'ग्लिसरीन सपोजिटरी' की योजना करे अथवा साबुन की बनाई वित का प्रयोग करे। उत्तम मुलायम साबुन को चाकू से शकु-सदृश उतार-चढावयुक्त किनिष्ठिका जितनी मोटी वित बनाकर उसे एरण्ड तैल मे लिप्त करके गुदहार मे भीतर तक प्रविष्ट करे और रोगी को देर तक उसे घारण करने को कहे।
- १० दीपन-पाचन-स्निग्ध-उष्ण एव वातानुलोमन द्रव्यो का आम्यन्तर प्रयोग करना लाभप्रद होता है, जैसे—हीग, कालानमक, अजवायन, सोठ, सौंफ, वच, सेंधा-नमक, पोहकरमूल, अम्लवेत, हरीतकी और निशोध आदि का उचित रूप मे प्रयोग करना वातनाशक होता है।
 - १९ वातजशूल में सुरा, कौजी, सिरका, दही का पानी, मट्ठा अथवा दही मे

१ माशुकारी हि पवनस्तरमात् तं त्वरया जयेत् । सम्य शुलामिपसस्य स्वेद एव स्रखानदः ॥ स० ७० ४१।८८

से रोगी की प्रकृति, रुचि, दोष तथा काल के अनुसार किसी एक मे कालानमक ढालकर पिलाना चाहिए।

१२ सुश्रुतोक्त विडङ्गादि चूर्णं या पृथ्वीकादि चूर्णं की उचित मात्रा मे मद्य या काँजी के साथ लेना शूलनाशक है।

9३ चलादि ववाथ — वरियार, पुनर्नवा, एरण्डमूल, छोटी कटेरी और गोखरू की जड इनको समभाग मे लेकर २० ग्राम का यथाविधि ववाथ बनाकर, भूनी हीग तथा कालानमक का प्रक्षेप डालकर पिलाना चाहिए।

१४ वशमूलक्वाथ मे एरण्डतैल २० ग्राम, हीग और कालानमक मिलाकर पीना वातशूलनाशक है।

१५ करञ्जादि चूर्ण — भुने करज फल का गूदा, कालानमक, बैतरा सोठ और घी मे भुनी होग, सब समभाग लेकर वारीक चूर्ण बना ले। ३ ग्राम की मात्रा दिन मे ३ बार एरण्डमूल और सोठ के क्वाथ से दे।

१६ **कुबेराक्ष वटी** बालू मे भूना करज वीज, मट्ठें मे भिगोकर घी मे तला लहसुन और सोठ प्रत्येक १०-१० ग्राम, घी मे भूनी हीग और सुहागे का लावा ५-५ ग्राम लेकर सहिजन के पत्ते या छाल के रस मे घोटकर आधा ग्राम की गोली बना ले। १-२ गोली गरम जल से ३ बार दे। यह सर्वे शूलनाशक है।

१७ मलविवन्धयुक्त वातज शूल मे ३ वार शिवासारपाचन चूर्ण ४ ग्राम और सोचरनमक बाधा ग्राम मिलाकर सुखोष्ण जल से देना चाहिए।

१८ वातज शूल मे १५-१५ मिनट के अन्तर पर सर्जिकाक्षार (सोडा बाइ-कार्ब) ४-४ ग्राम की मात्रा मे ५० ग्राम पानी मे घोलकर २-३ खुराक पिलाने से शूल शान्त हो जाता है।

१९ सामुद्रादि चूर्ण रोगी के बलानुसार ३-३ ग्राम की मात्रा मे सुखोष्ण जल से खिलाने से सभी शूल शान्त होते हैं।

२०. वातिक शूल मे शखवटी, लवणभास्कर चूर्ण, हिंग्वष्टक चूर्ण, हिरुत्तर-हिंग्वादि चूर्ण, हिंगूग्रगन्धादि चूर्ण अविदि विशिष्ट औषम्रें है। इनको उचित मात्रा मे प्रयोग करना चाहिए।

१ सुरा सौनीरकं नुकं मस्तूदश्वित्तथा दिथ । सकाललवण पेयं शूले नातसमुद्भवे ॥ सु० ७० ४२।९२

२ त्रिकडकमजमोदा सैन्थवं जीरके हे समधरणष्ट्रतानामष्टमो हिङ्गुभाग । प्रथमकवलमुक्त चूर्णमेतन्नराणा जनयति जठराग्नि वातरोगाश्च हन्ति ॥

३ दिरुत्तर हिड्गुवचारिनकुष्ठ सुवर्षिका चैव विटक्ष्चूर्णम् । सुलाम्बनाऽऽनाहविस्चिकासिद्धद्रोमगुल्मोध्वसमीरणध्नम् ॥ च० चि० रहा२०

४ हिड्गूमगन्धाविडशुण्ठयजाजीहरीतकीपुष्करमूलकुष्ठम् । यथोत्तरः भागविष्टद्रमेततः प्लोहोदराजीणैविस्चिकासु ॥ च० चि० २१।०२ ९९ का० द्वि० -

कायचिकित्सा

व्यवस्थापत्र

१. ३-३ घण्टे पर ४ बार

सामुद्रादि चूणं

१-२ ग्राम

सर्जिकाक्षार

१ ग्राम

सुखोष्ण जल से।

४ मात्रा

२. भोजनं के प्रथम ग्रास मे दोनो समय

हिंग्वष्टक चूर्णं

६ ग्राम

घी मिलाकर खाना

२ मात्रा

३. भोजनोत्तर २ बार

कुमार्यासव

२० मि० ली०

समान जल मिलाकर पीना। २ मात्रा

४. ४-५ बार

शूलविजणी वटी २--२ गोली

या

महाशखबटी १-१ गोली

या

लवणभास्कर चूर्ण १-१ ग्राम

या

हिंगूग्रगन्धादि वटी १-१ ग्राम

चूसकर खाना।

५ विबन्ध होने पर रात मे सोते समय

पंचसकार चूर्ण

६ ग्राम

गरम जल से।

१ मात्रा

पथ्य

रूक्ष रोगी को स्निग्ध भोजन कराना चाहिए। विशेषकर सोठ, मरिच बारि से शुक्त घी में 'तले हुए मालपूर खिलाकर कपर से सुरा को अनुपान रूप में पिला में शूलरोगी को आरोग्यलाम होता है।

स्निग्ध, उष्ण, द्रव तथा मलवातानुलोगन आहार देना चाहिए।

अपच्य

चावल, दाल, मटर, उडद, अरहर, ज्वर, कटहर, कोहडा आदि एव शीत तथ गरिष्ट आहार विजत है।

पैत्तिक शूल-चिकित्सा

9. पित्तज शूल मे शोधन और शमन दोनो प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए।

२ यदि दोष आमाशयस्य हो, तो परवल की पत्ती और नीम की पत्ती के रोगी के बलानुसार उचित मात्रा मे लेकर दूध, पानी या गन्ने के रस के साध पीसकर, पिलाकर वमन कराना चाहिए।

३. यदि दोष अन्त्रस्थ हो, तो गोदुग्ध १ गिलास लेकर उसमे , २५ मि० लीटा एरण्ड तैल मिलाकर विरेचन करावे अथवा ईसबगोल की भूसी १०-१५ ग्राम की मात्रा मे दूध मे पिलावे या निशोय चूर्ण ३-४ ग्राम खिलाकर विरेचन करावे।

४ सन्तर्पणार्थं घान के लावा का मण्ड चीनी मिलाकर पिलावे।

५ पित्तज शुल मे शमन उपचार की दृष्टि से शीतजलावगाहन, शीतल मन पवन से युक्त नदी के पेटे मे कभरी हुई रेत पर रोगी को रखे तथा काँसे के जलपा? मे शीतल जल भरकर उसे शुलस्थान पर रखे। रे

६ बार्ली (जौ का मण्ड) बनाकर थोडा-थोडा पिलाना चाहिए।

- ७ परूपकादि योग-फालसा, मुनक्का, किसमिस, खजूर और जलकमल वे कन्द को जल से पीसकर चीनी मिलाकर पिलाने से पित्तज शूल शान्त हो जाता है।
- ८ पित्तज शूल मे पुराना गुड, शालि (अगहनी) चावल, जी, दूध, घृत औ जाञ्जल मास का सेवन आरोग्यप्रद होता है।3
- ९ आँवले का चूर्ण ४ ग्राम मधु के साथ दिन में ३-४ बार चाटना पित्तर शुलशामक होता है।
- १० हर्रा, वहेडा, आंवला, नीम की अन्तर छाल, मुलहठी, कुटकी और अमलताः के फल का गूदा, इनका क्वाथ पैत्तिक शूल, दाह तथा विवन्ध को दूर करता है।
 - ११ मुलहठी का क्वाथ ऐरण्ड तैल मिलाकर पिलाना पित्तज शुलनाशक है।
 - १२ शतावरी स्वरस मधु से एव द्राक्षा का कल्क या क्वाथ लाभप्रद है।

१. ३-३ घण्टे पर ४ बार

शूलविज्रणी वटी १ ग्राम शखवटी

१ ग्राम

घात्रीलीह

२ ग्राम

क्षारराज

४ ग्रामं

योग-४ मात्रा

नीवू का रस निचोडकर चीनी के शबंत के साथ दे।

२ भोजन के पूर्व २ बार

यवानीखाडव चूर्णे ४ ग्राम विना अनुपान २ मात्रा

१ पित्ते तु शुरुं वमनं पयोऽन्तुरसैस्तथेक्षो मपटोलनिम्बै । भै० र०

२ शीतावगाहा पुलिना सवाता कांस्यादिपात्राणि जलप्लुतानि । भै० र०

३ गुड शालियँवा क्षीरं सर्पिष्पानं विरेचनम्। जाज्ञलानि च मांसानि भेषजं पित्तक्ष्तिनाम् ॥ स० ७० ४२।१०६

भोजनोत्तर २ बार
 धात्र्यरिष्ट २ चम्मच
समान जल से पीना ।
 ४ रात मे सोते समय
अविपत्तिकर चूर्ण ४ ग्राम
दूध से । १ मात्रा

पध्य

पुराना शालि चावल, जो, चीनी, पुराना गुड, मधुर एव तिक्त रसवाले बाहार, गोदुग्ध, घृत, जगली पशु-पक्षियो का मास, खरगोश और लवा का मासरस, धान के लावा का सत्तू, जो के सत्तू में घी-चीनी मिलाकर खाना, सेव का मुरव्वा और आंवले का मुरव्वा खाना पथ्य है। मुनक्का, किममिस, गुलकन्द, नारिकेलखण्ड बादि मधुर पदार्थ तथा परवल, आंवला आदि तिक्त एव कषाय रसवाले पदार्थ पथ्य हैं।

अपथ्य

पित्तवर्धक अम्ल, लवण, कटुरस युक्त पदार्थ, उष्ण द्रव्य तथा विदाही द्रव्य, इनका परित्याग करना चाहिए।

लवण को धीरे-धीरे छोडना चाहिए। मद्य, गाजा आदि तीक्ष्ण द्रव्यो का सेवन त्याज्य है।

कफज शूल-चिकित्सा

- भोजन करने के तुरन्त बाद कफज शूल का प्रकोप होता है। अत मदनफल-पिप्पली का चूर्ण खिलाकर आकण्ठ जल पिलाकर वमन कराना चाहिए।
- २. कफज शूल में इँट की सुर्ली या बालू की पोटली को गरम कर उससे रूझ स्वेदन करना चाहिए।
 - ३. पीपर और सोठ का चूर्ण अथवा इनका क्वाथ पीना कफज शूलनाशक है।
- ४ वचाि चूर्ण--पाठा, बच, सोठ, मरिच, पीपर और कुटकी इन्हें समभाग में लेकर चूर्ण बना ले और ३ ग्राम की मात्रा में चित्रकमूल के क्वाय के अनुपान से सबेरे-शाम देवे।
- ५ दशमूलक्वाथ मे २ ग्राम सेंघानमक, है ग्राम जवाखार मिलाकर पिलाने से लाभ होता है।
- ६ त्रिलवणादि चूर्णं सेंधानमक, कालानमक, विडनमक, पीपर, पिपरामूल, चाम, चीता, सोठ और शुद्ध हीग, इन्हे समभाग लेकर बारीक चूर्णं कर छानकर रख ले। प्रात, साय, मध्याह्म ३-३ ग्राम की मात्रा मे उष्णोदक से देवे।
- ७ चित्रकादि क्वाथ—चीता, पिपरामूल एरण्ड की जड की छाल, सोठ और धिनया समभाग लेकर आठ गुने जल मे पकार्व, चौथाई बचे तो छान कर शुद्ध हीग, कालानमक और सेंधानमक मिलाकर पीने के लिये देना चाहिए।

व्यतस्थापत्र

१ ४-४ घण्टे पर ह छ। र शूलविद्याणी वटी <u>१३ माम</u> ३ मात्रा

चित्रकादि नवाय मे । २. भोजन के पूर्व २ बार हिग्यादि यटी २-२ गोजी मुगरण गाना ।

३. भोजनोत्तर २ वार

नामुटाहि पूर्ण <u>८ ग्राम</u> जल से । २ मात्रा

४. रात में गोते गमय पट्मकार पूर्ण ६ ग्राम गरम जन्ह में ।

परय

गेहूँ या जी की रोटी, मस एव कटु पटायं, मधु नीधु, जी का मण्ड, जगनी पधु-पिंद्यों का मामरम, पेया, जामव, जरिष्ट, पुराना मद्य आदि का सेवत करना चाहिए। रूक्ष म्वेदन और उप्ण उपचार हितकर है।

अपय्य

कफकारक मधुर-जम्ब लवण रम युक्त पदार्थ, दही, कूरमाण्ड, फटह्ल, गरिष्ठ और शीतल पदार्थ नहीं खाना चाहिए।

द्वन्द्वज शूल-चिकित्सा

9 वातिपत्तज श्रुल में पृथक् पृथक् पातज तथा वित्तज श्रूर की जो चिकित्सा वहीं गयी है, उसका युक्तियुक्त ढग से प्रयोग करना चाहिए।

हृहत्यादि ष्वाय—वातिपत्तज मूल में छोटी कटेरी, बडी कटेरी, जुण की जड, कास (राही) की जड, गन्ने की जड, गोलरू, ए॰ण्ड की जड, इनको सममाग में लेकर क्वाय बनाकर भीतल कर चीनी मिलाकर पीना चाहिए।

२. कफिपत्तज शूल मे पित्त और कफ दोनो दोषो की सम्मिलित विकित्सा करनी चाहिए। वमन और विरेचन कराकर द्राक्षा-पटोलादि क्वाथ पिलावे।

योग—मुन्दका, अवस की पत्ती, परयल की पत्ती, आवला, हर्रा, बहेडा और गुव्च समभाग लेकर क्वाथ बनाकर ठण्डाकर मधु मिलाकर पिलाना चाहिए।

नाराच चूर्ण-पीपर १० ग्राम, निशोथ ४० ग्राम, चीनी ४० ग्राम, सब कूट-पीसकर मिला ले। इसे ५ ग्राम की मात्रा मे मघु से खिलाने से कफिपत्तज शूल तथा विवन्ध दूर होता है। रे वातकफन भूल में खिलका उतार कर पिसा हुआ लहसुन ५ ग्राम मद्य अथवा आसवारिष्ट के साथ खिलाना चाहिए।

रचकादि चूर्ण-कालानमक, शुद्ध हींग और सोठ के समभाग चूर्ण को ३ ग्राम की मात्रा में स्पेठ के काढ़े के अनुपान से देना चाहिए।

वक्तव्य—सभी प्रकार के द्वन्द्वज शूलों से शूलविज्ञणी लाभप्रद है। वातिपत्तज शूल में सूतशेखर, प्रवालपचामृत और कामदुधा का प्रयोग प्रश्नस्त है। कफिपत्तज शूल में शिखभस्म, महूरभस्म या माक्षिकभस्म धृत से दे। वातकफज शूल में शखबटी और करव्जादि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए।

त्रिदोषज ज्ञूल-चिकित्सा

- १ इसमे तीनो दोषो की दृष्टि से त्रिदोषहर चिकित्सा करनी चाहिए।
- २ शाखमस्म योग—शाखभस्म, कालानमक, शुद्ध हीग, सोठ, मरिच और पीपर इनको समभाग लेकर चूर्ण बना ले। १-२ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३ बार सुखोज्य जल से प्रयोग करे।
- २. मण्डूरावलेह—गोमूत्र मे शुद्ध किये गये पुराने मण्डूर की भस्म के बरावर त्रिफला का चूर्ण मिलावे। १ ग्राम की मात्रा लेकर विषम मात्रा मे मधु और धी मिलाकर खिलाना चाहिए।
- ४ एरण्डद्वादशक क्वाय—एरण्ड वीज की (अन्तर्जिह्वा निकाली हुई) गिरी, एरण्डपूल, छोटीकटेरी, वडीकटेरी, गोखरू, मुद्गपर्णी, मापपर्णी, शालिपर्णी, पृश्तिपर्णी (२ भाग) और गन्ने की जड, इनका क्वाथ बनाकर जवाखार पिलाने से निदोपंज शूल शान्त हो जाता है।
- ५. शुद्ध वच्छनाग, वच, सोठ, भुनी हीग और सेंधानमक, इन सबको समभाग में मिलाकर चूणें करे, फिर चूणें के समान गुड मिलाकर १-१ रत्ती की गोली वना लें, इनमे से १-१ गोली ३ बार देने से सब प्रकार के शूल शान्त होते हैं।

आमज शूल-चिकित्सा

- आमज शूल मे कफज शूल के समान⁹ वमन कराना चाहिए।
- २. रुग्ण की स्थिति के अनुसार उसे उपवास करावे अथवा लघु भोजन दे।
- ३ आमपाचनार्थ—(चतु सम चूर्णं) अजवायन, सेंघानमक, भूनी छोटी हर और सोठ के समभाग का चूर्णं ४-४ ग्राम, ३-३ घण्टे पर ४ वार सुस्रोण्ण जल हे दे। अथवा—
- ४. वित्रकमूल, पिपरामूल, एरण्डमूल, सोठ और धनियाँ के समभाग का विधिवत् क्वार्थ बनाकर उसमें भुनी हींग, विडनमक तथा अनार का रस मिलाकर पिलाने से आमशूल कष्ट होता है।

१. आमञ्जूने क्रियाकार्या कफञ्जूलिनाशिनी । श्रेषमामहरं सर्वे यद्यदग्निविवर्धनम् ॥ मै० र०

५ आमितरेचनापं —एरण्डतैल, पश्चसकार या नारायण चूर्ण रोगी के कोष्ट के बलानुसार मात्रा में मुखोष्ण जल से दे।

इ. सीम्य प्रकृति के रोगी को अधिक तीक्ष्ण औषध न देकर नीचू की शिकञ्जी, संजीवनी वटी, अम्बिनीकुमार या आनन्दर्भरय रस दे।

७. तीवावस्या मे दाराद्राव, क्रव्याद या अग्निक्मार का प्रयोग करे।

८ हिंगुतुम्बुवीि चूर्णे—घुँद हीग, तुम्बुल, सीठ, गरिच, पीपर, भूनी लजवायन, चीता की जड, भूनी छोटी हरें, यवधार, मञ्जीसार, सँधानमक सभी का गमभाग में बारीक चूर्ण कर छान ले । ३ पाम की मात्रा स्कोष्ण जल से ३-४ वार प्रतिदिन थे ।

९ एरण्डतेल ६० ग्राम, लहनुन का स्वरस ६० ग्राम, धुद्ध होग १० ग्राम और मेंघानमक २० ग्राम लेकर सभी की मिला लें। ५ ग्राम की माना में अणादर के अनुपान से प्रयोग करे।

१०. धुद्वोधकरस, वद्यक्षार, जूलगत्रकेनरी, गनाक यटी, रमीनादि यटी, र उत्तम आमपाचन बीपधें है।

व्यवस्थापत्र

१ प्रात गाल ७ वजे

शूलविञ्चणी वटी २ गोणी १ मात्रा

एरण्डस्नेहादि योग ६ ग्राम के माथ गरम जल से।

२. प्रात ८ वजे

चित्रकादि पवाय ५० मि० सी०

३. भोजनोत्तर २ वार

हिगुतुम्बुर्वादि नूनं ६ घाम र मात्रा

गरम जल मे।

४ २ वजे दिन और ६ वजे शाम

घसवटी ४ गोली

२ मात्रा

चतु सम चूणं ३-३ ग्राम के साथ गरम जल रो।

५ रात में सोते वक्त

पन्त्रसकार ६ ग्राम

१ मात्रा

गरम जल से।

पथ्यापथ्य

कफज शूल के समान पथ्यापथ्य जाने ।

परिणामशूल-चिकित्सा चिकित्सासूत्र^१

- १ परिणामशूल के शमन के लिए सबसे पहले लंघन करावे।
- २ रोगी के वल आदि का विचार कर वमन कराना चाहिए।
- ३. तिक्त एव मधुररसात्मक रेचन द्रव्य खिलाकर विरेचन करावे।
- ४. तत्पश्चात् कोष्ठ की शुद्धि के लिए निस्हवस्ति का प्रयोग करे।
- ५ वातोल्बण मे स्नेहमय उपचार करे।
- ६. पित्तोल्बण मे विरेचन करावे एव शीतोपचार करे।
- ७ कफोल्बण मे वमन करावे और उष्ण तथा तिक्त आदि रसो से युक्त द्रव्यो के प्रयोग से चिकित्सा करे।
 - ८ द्वन्द्वज मे दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए।
 - ९. त्रिदोषज मे तीनो दोषो की मिश्रित चिकित्सा करे।
 - १०. शारीरिक और मानसिक दुष्टि से विश्राम कराना चाहिए।
- ११. आमाशयगत दोष मे वमन तथा लघन, पच्यमानाशयगत दोष मे विरेचन तथा निरूह्नस्त और पक्वाशयगत दोष मे अनुवासनवस्ति देनी चाहिए।

औषघ-चिकित्सा

- १. आमाशय की अम्लता और उग्रता के शमनार्थं शम्बूक भस्म, शख भस्म या वराट भस्म का प्रयोग करना चाहिए।
- २ स्निग्ध द्रव्यो का प्रयोग करना उत्तम है एवं औषधों के अनुपान के रूप में तथा जी के सत्तु में घी मिलाकर सेवन करना लाभकर है।
- ३. इसमे शूलविष्यणी वटी, सूतशेखर रस, धात्री लौह, सप्तामृत लौह, नारिकेल खण्ड, तिलादि मोदक, विडगादि मोदक, तारामण्डूर और विद्याधराश्र रस का प्रयोग लाभप्रद होता है।
- ४. शम्बूक (घोघा) भस्म १ ग्राम को १ तोला घी मे मिलाकर खिलाने के बाद गरम जल पिलाने से शूल मे तत्काल लाभ होता है।
- ५ शख भस्म, सेंधानमक, सोठ, मरिच, पीपर और घी मे भुनी हींग, इन्हें समभाग लेकर खूब घोटकर मिला ले। २-३ ग्राम की मात्रा मे आधे-आधे घण्टे पर २-३ बार देने से शीझ लाभ होता है। अनुपान के रूप मे गरम जल देवे।

वमन लहुन तिक्तमधुरैश्च विरेचनम् । वस्तिकर्म पर चात्र पक्तिश्क् लोपशान्तये ॥ वातर्ज् स्नेह्योगेन पित्तज रेचनादिना । कफज वमनावैश्च पक्तिश्क् सुपाचरेत ॥ यो० र०

२. वमनं तिक्तमधुरै विरेकश्चात्र शस्यते । वर्स्तयश्च हिता. शूले परिणामसमुद्रमवे ॥ मै० र०

६ शुन्हों सीन्याक-मोठ, नानी तिन और गुड़ समझाय में (कुल निषय १५ प्राम) लेकर कूट कर २०० ग्राम दूध तथा ३०० ग्राम जल मिलाकर पकावे। जब हुध मात्र दोप बचे तो उतार छानकर पिनावे।

इते लगातार ८-१० दिन तक प्रति थित २ बार विन्ताने से भगकर परिणामन्

७ पटोलादि स्वाय-परतन, ऑगला, हुई, बहेरा, नीम मी गीनी छाट, दाना काढा मधु मिलाकर पीने ने परिणामनूट छाटा हो जाता है।

रवयस्थापत्र

१. प्रात-साय
धात्री शेष्ठ २ पाम
पून्य विश्वी गरी १ प्राम
प्रम्य प्रामम्म १ प्राम
नीवू में गर्वन से । प्रीम—२ मात्रा
२ अपराह् २ बले दिन
नास्त्रिकायण्ड २० पाम

गा

र्वावले गामुग्स्ता२ अदय दूधमान ७७ से।

- ३ भोजनोत्तर २ वार अविपत्तिकर पूर्ण ६ ग्राम मुलोग्ण ज्ञुल में। योग—२ माना
- ४. रात में मोते नगय त्रिपाना नूर्ण ५ पाम जन्मे। १ मात्रा
- ५ दिन मे ४-५ बार यनानीवाटव पूर्ण २-२ ग्राम विना अनुपान नूमना।

पथ्य

१ गेहूँ, जी या पुराने चावल का मण्ड बनाकर घी-धीनी मिलाकर घोडा-धोडा कई बार पिलाना चाहिए।

र घी, मिश्री और दूध का प्रयोग, औषध या आहार में साथ फरते रहना लामकारक है।

रे गेहूँ-जी के मिले बाटे की रोटी और दूघ उत्तम पथ्य है।

४ मलाईदार दही के साथ जी तथा मटर का सत्तू खिलाने से और एकमात्र यही पथ्य देने से परिणामशूल शीघ्र शान्त होता है।

५. जो का सत्तू मटर की पतली दाल में मिलाकर पीने से शूल शीघ्र शान्त हो जाता है।

६. पीने के लिए गर्म करके ठंडा किया जल अथवा नारियल का पानी देना चाहिए।

७. रोग मे सन्तोषप्रद लाभ होने पर दो सप्ताह तक रोटी-दूध खिलाकर तब फिर शाको का प्रयोग करना चाहिए। जैसे—परवल, सहिजन, करेला, मूली, चौराई, बथुका, चने का शाक और वैगन खाना लाभकर है।

८. आंवले का मुरव्या या चूर्ण किसी भी रूप मे खाना हितकर है।

९. पका आम, मुनक्का, चिरौंजी, सेव, कागजी नीवू आदि फल उत्तम हैं।

१० मासार्थी रोगी को जगली पशु-पक्षियो का मासरस देना चाहिए।

अपध्य

व्यायाम, मैथुन, मद्य, उहद, चना, कटु पदार्थ (तेल, मिर्चा, गरम मसाला, अचार, चटनी आदि) का सेवन नहीं करना चाहिए। मल-मूत्र, निद्रा, वमन, छीं आदि के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। विरुद्ध भोजन, अजींग भोजन, विषम और गरिष्ठ भोजन निषद्ध है। चिन्ता-शोक-क्रोध आदि का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। रात्रि-जागरण, रूक्ष एवं कषाय पदार्थ, शीतल भोजन और सूर्य के ताप में घूमना मना है।

अन्नद्रवशूल-चिकित्सा र

अन्नद्रवश्ल में पित्त आने तक वमन और कफ आने तक विधिवत् विरेचन कराना चाहिए। आमाशय तथा पक्वाशय के शुद्ध हो जाने पर यह शूल शान्त हो जाता है। इसमे परिणामशूल की तरह चिकित्सा और पथ्य-व्यवस्था करे। दुग्धाहार पर रखे।

पार्श्वशूल-चिकित्सा

१ इस शूल में कफ और वात का सम्बन्ध रहता है, अत कफवातहर चिकित्सा करनी चाहिए।

२ पुष्करमूलादि चूर्णं—पोहकरमूल, शुद्ध हीग, सोचरनमक, विडनमक, सेधानमक, तुम्बुल और हरें का वक्कल समभाग लेकर चूर्ण कर छानकर ३ ग्राम की मात्रा मे सुखोष्ण जल से दिन मे ३ बार देने से पार्क, हृदय तथा वस्तिशूल् मे लाभ होता है।

पित्तान्त वमनं कृत्वा कफान्तश्च विरेचनम् ।
 कामपक्वाशये शुद्धे गच्छत्यन्नद्रव शमम् ॥
 कन्नद्रवे च तत्कार्य पिक्तशूले यदीरितम् ।
 क्षीरमेवान्न संसैच्यं नित्यमन्नविवर्जितम् ॥ च० द०

३ प्लीहोदर अधिकार का पद्यसपृत अपया केवल पृत २० ग्राम ऐकर उसके है ग्राम गुद्ध हीय मिलाकर पिलावा पाहिए। अनुपान में मुखोच्य दुव्य देना पाहिए।

४. दिलौरा नीवू के बीज का पूर्ण र प्राम की मात्रा में दूध से दे।

५. एरण्डतैल २० ग्राम की माना में मध, दर्ग के तोड अववा दूध या गांतरम के साथ विस्तान चाहिए।

६ लोवाती भी जह का महत्व १० ग्राम हेनार तिल्तैल विद्याक्तर गरमकार यमन्यों पर लेप करने ने पार्यस्य नस्ट होता है।

७ हिपुद्रिग्तर पूप ३ प्राम उत्पोदक में दिन में ३ नार देवे ।

८ कामजी नीव के १ वर्ष परमय रम के माम ५ ग्राम भी एवं १ ग्राम संघानमक विज्ञाकर गरमकर विकास माहिए।

९. महिनन की कार के ५० प्राम क्याय में ३ प्राम यवामार और १० प्राम मध् मिलाकर पीना पारिए।

य्यवस्थापत्र

१ ३-३ पष्टे पर १ बार

उहमीरियान रंग है प्राम भूगाराध्य है प्राम भूगभगम <u>१ पाम</u> गोग—४ माना

आर्देक स्वरम और मधु से ।

२. भोजनोनर २ बार

दशमूलाग्य्ड <u>३० पाम</u> २ मात्रा

समा जा मिलाकर पीना।

३ अभ्यग पीटित स्थान पर

मुलगजेन्द्र तैल रागाना ।

फुक्षिश्ल-चिकित्सा

१ रोगो के वल का विचारकर यमन अथवा लघा कराना चाहिए। उसके बाद पेया-विलेपी लाहि के क्रम से पथ्य देना चाहिए।

र धान के लावा की पेया बनाकर उसमे अनार का रस, मट्ठा, हीन और सेंघानमक मिलाकर पिलाना चाहिए।

रे. नीवू आदि अम्त द्रव्य एव पश्चकोल का पूर्ण मिलाकर पेया पिलाने से अग्नि प्रदीस होती है।

, ४ नागरादि क्याथ—सोठ, अजवायन, चन्य, विजीरा नीवू के वीज, हीग, सोचरनमक, विटनमक, विधारा, एरण्डमूल की छाल, वही कटेरी और छोटी कटेरी

समभाग लेवे। हीग और दोनो नमक अलग रखें, इनके अतिरिक्त अन्य द्रव्यों का मिलित २५ ग्राम लेकर विधिवत् क्वाथ बनाकर आधा ग्राम शुद्ध हीग और सौर्वेचल नमक १ ग्राम तथा विडनमक १ ग्राम डालकर पीने से कुक्षिशूल नष्ट हो जाता है।

५. विरेचनार्थ--किंग्ण व्यक्ति के बले तथा दोष आदि का विचारकर वचादि चूर्ण ४-५ ग्राम की मात्रा में सुखोष्ण जल से देना चाहिए।

वचाि चूर्ण — बच, कूठ, अतीस, हर्रे का छिलका और इन्द्रजी प्रत्येक १०-१० ग्राम लेकर चूर्ण करें, फिर उसमे तोचरनमक ५ ग्राम तथा हीग ३ ग्राम मिला लें।

ं ६. कुक्षिशूल होने पर शाल्वण आदि उपनाहस्वेद, स्नेहसेक, धान्याम्ल से परिसेचन एव वातनाशक नवाथ से भरे टब मे अवगाहन करावे तथा अन्य शूलनाशक उपाय भी करे।

व्यवस्थापत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४ बार
 शिवाक्षारपावन चूर्ण ८ ग्राम
 शिक्षमस्म १ ग्राम
 सज्जीखार (सोडा बाईकार्व) ४ ग्राम
 योग—४ मात्रा

सुखोष्ण जल से।
२ भोजन के ५ मिनट पूर्व
हिंग्वादि वटी २ गोली चूसना।

३ भोजनोत्तर २ बार कुमार्यासन २५ मि० ली० समान जल मिलाकर पीना।

हृदयशूल-चिकित्सा चिकित्सासूत्र

१ हृदयशूलजनक कारणो का परित्याग करना चाहिए। जैसे—व्यागाम, परिश्रम, साहस, अत्युष्ण-गुरु-कटु-तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन, वेगविधारण तथा चिन्ता-शोक-भय आदि को छोडना इस्का प्रथम उपचार है।

२ रोगी को विश्राम, ब्रह्मचर्य, धैर्य और ज्ञान्ति का पालन करना चाहिए।

३ भोजन नियन्त्रित होना चाहिए। खट्टे पदार्थ, कषाय रसवाले द्रव्य और अति भोजन त्याज्य हैं।

४ सशोधन कराना चाहिए। रोगी के शरीर-बल, दोष आदि का विचार कर यथोचित सशोधन करे।

५ सज्ञामन उपचार दोष और प्रकृति का विचार कर करना चाहिए।

६ बायु को खिछकता में पुरवरमून, विजीश नीमू ने मून की छाज, मोठ, कजूर, हर्ने और एक, इसको मनभाग केक्ट्र ६० वाम औराछ को घोगूने वाछ में चतुर्यादायाच्य बगाव बनाकर महलान, एउ और मेंछानमक मिनाकर प्राप्त माग विलावे।

७ विलाधिका में मधुर प्रत्यों ने शिद्ध पूछ या भी का प्रयोग करे। भारता, यम्मार के कल कोर मुन्हरी के दशक में भी और भी शी शिवाक कियाना छनाम है।

८ रणाधिका में मना द्वारः योधा करावर विशोध में। जन, यरियार, रास्ता, मोठ, हरें, पुरकरमून, छोनी इन्हायकी और विशासक इनके समभाग का भूषे कर र-र अम की माना सर्वेतनाम सुनोतन कर ने देना पाहिए।

९. श्रीवत घोष-- रार्जुन प्रसं, र युना र्थी पाष, तिवृदयापार पूर्ण, प्रयूत-विद्य धोर, पुरराम पूर्व, भागना, हुण्यापार, हुद्दोवरशाया, प्रभावत प्रदी, विदेश्वर रव, सर्जुनावरिष्ट, ये प्रविद्य गोग एतम श्रीवधी है।

स्पवस्थापथ

१ ४-४ एन्टे गर ४ वार

हरणांत्र ५०० मि० छा० प्रशामिक्टी ५०० मि० छा० भ्रामम्म ५०० मि० छा० स्मिनिद्दर ५०० मि० छा० योग ४ मोना

अर्जुन पूज १ ग्राम पीन्सिनी मिलायक ।

२ भं। तत्र के पूत्र

िशदि यही २ गोशी गुमना ।

३. भी नोसर --

अर्थुनाद्धारिक्ट ३० वाम र मात्रा

समान क्छ में।

४. शत में ममनाकंर पूज ३ जाम जल से।

षस्तिशूल-चिकित्सा चिकित्सा-सूत्र

9 यह रोग प्रापु के प्रकोष में शोता है और मल या मूप के वेग को रोवने से युवित वायु विस्त में जाकर फैंड जाती है, जिससे वस्ति, यदाण एव नाभि में झूल तथा मंत्र मूह की रकावट होती है।

२ अत मूत्र और मह को प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना चारिए। उत्तरवस्ति, निम्ह्यिन और अनुभावनयस्ति दी जानी पाहिए। प्रयत्न तथा रेनन आँपवी की प्रयोग करना चाहिए।

- ३. वायु का अनुलीमन, फलवर्ति का प्रयोग और स्वेदन करे।
- ४. मलप्रवर्तेक आहार-विहार, द्रवप्रधान भोजन, जैसे—दूध की लंस्सी पिलाना उत्तम है।
 - ५ पीडित स्थान का मर्दन, स्नेहन, स्वेदन करना लाभदायक है।

चिकित्सा

- १ पचतृणमूल ३० ग्राम को कूटकर १२० मि० ली० हूछ और ५०० मि० ली० पानी डालकर दुग्धावशिष्ट पाक करे, फिर चुटकी भर छोटी लाइची का चूर्ण डालकर पिलावे। अथवा—
- २ पलाश के फूल, कलमी सोरा और चूहे की मेंगनी पीसकर वस्ति स्थान पर लेप करना चाहिए।
 - ३ जवाखार और मिश्री १-१ ग्राम पीसकर पिलाना चाहिए।
 - ४. ककडी के बीज की ठण्डई बनाकर पिलाना चाहिए।
- ५. वायु के अनुलोमनार्थं—हिंगुद्धिक्तर चूर्णं, शिवाक्षारपाचन चूर्णं, नारायण चूर्णं, हिंग्वादि चूर्णं, नाराच चूर्णं, हिंग्वष्टक चूर्णं मे से सुविधानुसार प्रयोग करना चाहिए।
 - ६ क्रूरकोष्ठ होने पर इच्छाभेदी रस का प्रयोग करे।

पंच्य

स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, मूत्रविरेचन, वस्ति, फर्न्चित, अभ्यग, पाचन, मूत्रल तथा वातानुलोमन स्राहार-विहार का सेवन हितकर है। घी, एरण्ड तैल, हीग, सनार, सतरा, मुसम्मी, मुनक्का, परवल, व्युआ, छोटी मूली, सेंघानमक, पुराना चावल, जी की दलिया सादि पथ्य हैं।

सपथ्य

मल मूत्र का वेग रोकना, रूक्ष भोजन, रात्रि-जागरण, मैंदे के पदार्थ, चाय, तेन शराब, मास, अधिक खट्टे-तीखे पदार्थ, दालों का प्रयोग और क्रोध, चिन्ता आदि मनोविकार का त्याग करना चाहिए।

मूत्रज शूल-चिकित्सा

- १ वस्ति मे मूत्र के सचित होने से मूत्रशूल होता है। इसमें वायु का प्रकोप होता है, अत वातानुलोगन तथा मूत्रप्रवर्तन उपचार करना चाहिए।
 - २ इसमे वस्तिशूल मे कहे गये उपचार करने से लाभ होता है।
 - ३. स्नेहन, स्वेदन, स्नेहिवरेचन और उत्तरवस्ति का प्रयोग करे।
 - ४ वातहर एव मूत्र-विरेचन के सभी उपाय करने चाहिए।
- ५ गोक्षुरादि गुग्गुलू, पुनर्नवादि क्वाय, वरुणादि क्वाय, तृषपचमूल क्वाय, चन्दनासव, चन्द्रप्रभा वटी, इनका प्रयोग लाभप्रद होता है।

विट्शूल-चिकित्सा

- १ विट्शूल मे रोगजनक कारणो का परित्याग कर दोष-नाशक चिकित्सा करनी चाहिए।
 - २. स्नेहन, स्वेदन, वमन तथा विरेचन के द्वारा सजोधन करे।
 - ३ निरूह और अनुवासनवस्ति का प्रयोग कर कोष्ठ का शोधन करे।
- ४. आहार-विहार और औषध की ऐसी योजना करनी चाहिए, जिससे मल-मूत्र तथा अधोवायु का प्रवर्तन हो जावे।

५ फलवर्ति, हिंग्वादि वर्ति या आगारघूमादि वर्ति का प्रयोग करना चाहिए। हिंग्वादि चूर्ण, नाराच रस या इच्छाभेदी रस का प्रयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए।

अविपाकज शूल-चिकित्सा

मन्दाग्निवाला व्यक्ति जब अधिक भोजन कर लेता है, तो वह भोजन स्थिर हो जाता है तथा प्रकुपित वायु उसे घेर लेती है, जिससे वह अपनव अन्न तीव्र कूल उत्पन्न करता है। अतएव इसे अन्नदोपसमुद्भव कूल कहते हैं।

इसमे वमन कराना चाहिए तथा फलवित आदि के प्रयोग से कोष्ठ का शोधन करना चाहिए। अपनव अन्न के पाचनार्थ दीपन-पाचन औषध दे। नीवूद्राय, शंखद्राव, अग्निकुमार रस, सजीवनी वटी, हिंग्वादि चूर्ण, शिवाक्षारपाचन चूर्ण, काकायन वटी, हिंग्वादि वटी, रसोनादि वटी, सिंजकाक्षार आदि का प्रयोग करना चाहिए। सद्य शूलशमनार्थ, गरम जल की थैली से या बोतल से स्वेदन करना चाहिए। आमज शूल की चिकित्सा मे कहे गये उपचार लाभप्रद होते हैं।

द्वादश अध्याय

गुल्मरोग

' परिचय — गुल्म शन्द का अर्थ गुच्छा या गोलाकार पदार्थ होता है। जैसे झरवेर की छोटी-छोटी झाडी होती है, कटवाँसी मे छोटे-छोटे वाँस के वृक्ष परस्पर एक-दूसरे से जकडे होते हैं, गन्ने के पीधे एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यूज या सरकडे झुरमुट के रूप मे होते हैं, वृक्षो मे वाझी लग जाती है और उसका गुच्छा वन जाता है तथा लताओ की कई जातियाँ एक-दूसरे की शाखा से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार उदरगत महास्रोत के भीतर की वायु अर्थात् भोजन के परिपाक से उत्पन्न वायवीय पदार्थ पित्त अर्थात् विभिन्न अम्ल का क्षारप्रधान पाचकरस एव विद्या अन्न और कफ अर्थात् आम तथा अन्य पिच्छिल एव सान्द्र पदार्थ आदि का अनुचित रूप से किसी स्थान पर सिचत होकर एक गोले के आकार मे प्रतीत होना गुल्म है। पूर्वोक्त सिचत पदार्थों के कारण वायु धुभित होकर अन्त्र की स्वाभाविक गित मे अनियमितता उत्पन्न कर देती है तथा सच्चय स्थान के पास सकोच उत्पन्न कर विशिष्ट पदार्थ को और अधिक सिचत होने मे सहायक होती है।

अपने-अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हुए दोप हृदय और वस्ति के मध्यप्रदेश अर्थात समस्त उदरगुहा में स्थानसभ्रय कर वायु की अधिकता से सन्वरणशील तथा वायु की अल्पता होने पर अचल (एक स्थान में स्थित) एवं वायु के विषम स्वभाव से कभी बढ़ने और कभी घटने वाली गोल ग्रन्थि को गुल्म कहते हैं, जिसमे उदर का वाह्य भाग रूक्ष तथा कृष्ण-अरुणवर्ण शिराओं के तन्तुओं के जाल से सर्वतः व्याप्त होता है।

गुल्म शब्द सघात या समूह या झुरमुट या जकडी हुई पित्यों के झोझ (जैसे माटे (पीले चीटे) बहुत सी पित्तयों को एक साथ उलझाकर एक गोल गुच्छ बनाकर उममे रहते हैं) के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसी आकृति सादृश्य के आधार पर इस रोग का गुल्म नामकरण किया गया है।

गुल्म की निरुक्ति

गुडचते। 'गुड वेब्टने' रक्षणे (तु० प० से०) बाहुलकान्सक्। डच्योरेकत्वम्। (अमरकोष ३।४२ 'गुल्मा रुक्स्तम्बसेनाश्व' पर रामाश्रमी टीका) 'गुडवेब्टने' धातु से मक् प्रत्यय करके और ड के स्थान मे म रजकर गुल्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ बाँधना होता है। गुल्मरोग पिण्डाकार होने के ही कारण गुल्म कहा जाता है—

१ इद्रस्त्थोरन्तरे य्रन्थि सचारी यदि वाऽचल । चयापचयवान् वृत्त स गुल्म इति कीर्नित ॥ स्व० उ० ४२।४ तथा—रूक्षकृष्णारुणसिरातन्तुजालगवाक्षित । अ० ह० नि० ११।३२

'स पिण्डितत्वात् गुल्म इत्यभिघीयते'—च० नि० ३।७।
गुल्म शब्द की निरुक्ति तीन प्रकार से की जाती है—

(१) प्रकोपग्रस्त होने से खुट्ध हुआ वायु गुल्मरोग का मूल कारण होता है, इसलिए इस रोग को गुल्म कहते है। गुल्म शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति कां आधार सुश्रुत का यह श्लोक है—

> गुपितानिलम् लत्वाद् गूढम्लोदयादपि । गुल्मवद् वा विशालत्वाद् गुल्म इत्यभिधीयते ॥ सु० उ० ४२।५

कक्त श्लोक के गुपित शब्द से 'गु' अनिल मे 'ल' और मूल से 'म' अक्षर ग्रहण करके गुल्म बना है। इस कथन से यह सूचित किया गया है, कि गुल्म का मूल गुपित या गुपित वायु है।

- (२) दूसरी निकित्त गूढमूल अर्थात् पृथ्वी के भीतर जिनके मूल या कन्द छिपे होते हैं, ऐसे भूमि के भीतर वैठनेवाले कन्दों की तरह जिसकी उत्पत्ति हैं, उसे गुल्म कहा जाता है। इस निकित्त में गूढ शब्द का 'गु' ह्रस्व मात्रा करके मूल शब्द से क्रम को विपरीत का हलन्त 'ल्' और 'म' का अध्याहार कर गुल्म शब्द वनता है।
- (३) गुल्म शब्द का अयं है—मनुष्यो का झुण्ड, वनस्पितयो की परस्पर शासाओ की सन्नद्धता का होना, जैसे—वांस या अरवेरा आदि। इसके समान यह रोग जकडन से होता है और पिण्डित एव विशाल होता है, अत इसकी सजा 'गुल्म' है।

गुल्म का स्थान

- १ गुल्म का प्रधान स्थान उदर है।
- २ वस्ति-समीपस्य उदर का भाग तथा स्वय वस्ति भी गुल्म का स्थान है।
- ३. स्त्रियो का गर्भाशय भी गुल्म का स्थान है।
- ४ चरक तथा सुश्रुत ने गुल्म की उत्पत्ति के पाँच स्थान बतलाये हैं?-
- 9 हृदय-प्रदेश, २ नाभि-प्रदेश, ३ वस्ति-प्रदेश, ४ उदर का दक्षिण पार्क और ५ उदर का वाम पार्क।

वक्तव्य—(१) यहाँ हृदयप्रदेश से उदर के हृदय-समीपस्थं ऊर्ध्वप्रदेश का ग्रहण करना चाहिए। (२) नाभि मे उदर का मध्यप्रदेश समझना चाहिए। (३) वस्ति से उदर के अधोभाग का ग्रहण करना चाहिए। (४-५) पाद्यं शब्द से फुप्फुस के वाम उदर पाश्विक प्रनेश और दक्षिण उदर पाश्विक प्रदेश का ग्रहण करना चाहिए।

श्रुचम इति लतादिगिहितरथानिवशेषे गुल्मन्यपदेश ।
 तत्थाहृदयात सिक्कतपरिगिण्टतदोपेऽपि गुल्मसक्षेत्याहु ॥

अ० ६० नि० १११८ पर टिप्पणी में चढ़्त
र (क) वग्ती न नाम्या इदि पार्श्वयोगी म्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पद्ध । च० चि० ५
(ख) पद्म गुल्माश्रया नृणा पार्श्वद्वन्नामिवस्तय ॥ सु० ७० ४२

रं० का० दि०

प्राचीन आचार्यों ने उदर के ऊर्घ्वं, मध्य, अध और दो-पाइवं यह पाँच विभाग कर उनकी क्रमश हृदय, नाभि, बस्ति और पाइवं (वाम तथा दक्षिण) सज्ञा स्थिर कर दी है।

आधुनिक विद्वान् उदर को नव भागो मे विभक्त करते हैं ठठवं उदरप्रदेश को— १ दक्षिण आनुपाश्चिक प्रदेश, २ हृदयाद्यरिक प्रदेश, ३ वाम आनुपाश्चिक प्रदेश, मध्य उदर प्रदेश को—४ दक्षिण कटिपाश्चिक प्रदेश, ५. पारिनाभिक प्रदेश, ६. वाम कटिपाश्चिक प्रदेश एव अद्य उदर प्रदेश को—७. दक्षिण वक्षणोत्तरिक प्रदेश, ८. अधिवस्तिक प्रदेश, ९. वाम वक्षणोत्तरिक प्रदेश, इस प्रकार नव भाग मानते हैं। अतएव सम्पूण उदर गुल्म का स्थान है।

गुल्म के प्रकार और संख्या

गुल्म पाँच प्रकार का होता है--- १. वातज गुल्म २. पित्तज गुल्म ३ कफज गुल्म ४ त्रिदोपज (निचय) गुल्म और ५ रक्तज गुल्म।

इनमे प्रथम चार स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं, किन्तु रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में ही होता है।

वक्तक्य-आचार्य चरक ने निदानस्थान मे गुल्म के ५ भेद कहे हैं, किन्तु चिकित्सास्थान मे ३ इन्द्रज गुल्मो का भी उल्लेख किया है। र

द्वन्द्वज गुल्मो का भेद-कथन मे पाठ न करने का कारण यह है, कि इनका ससर्गं (दो दोयो का सयोग होना) सिम्मिलित दोयो के अनुरूप (प्रकृतिसमसमवेत) होता है और दोषानुसार ही उनके लक्षण तथा उनकी चिकित्सा होती है। अत द्वन्द्वज गुल्मो मे कोई लक्षण एव चिकित्सा का अन्तर न होकर दोषानुकूल लक्षण और चिकित्सा होने के कारण उनका पृथक् उल्लेख नही किया गया है।

रक्तज गूल्म के दो प्रकार³

१ रक्तज गुल्म कहने से स्त्रियों को होने वाला गुल्म ही समझा जाता है, परन्तु इससे भिन्न द्यातुरूप रक्तज गुल्म भी होता है, जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में होता है।

२ आधातादि कारणो से शरीर के बाह्य अथवा आभ्यन्तर भागो मे रत्तस्राव होकर जो त्वचा आदि के आवरण मे रक्तसँचय होता है, सभवत. प्राचीनो ने उसे धातुज रक्तगुल्म माना है।

८. (क) इह खलु पच्च गुल्मा भवन्ति, तद्यथा—वातगुल्म , पित्तगुरम , छेष्मगुल्म , निचय-गुल्म , शोणितगुल्म इति । च० नि० गुल्मनि०

⁽ख) स व्यस्तैर्जावते दोषै समस्तैरिप चोच्छ्ति । पुरुषाणा तथा स्त्रीणा होयो रक्तेन चापर ॥ सु० ड० ४२

२ निमित्तिलिङ्गान्युपलम्य गुरमे दिदोपने दोषवलावल च । व्यामिश्रलिङ्गानपरांस्तु गुरमास्त्रीनादिशेदौपधकरपनार्थम् ॥ च० चि० ५

इ स्त्रीणामार्तवजी गुल्मो न पुसामुपजायते । अन्यस्त्वसुरभवो गुल्म स्त्रीणा पुसा च जायते ॥ मा० नि० गुल्म ३ पर मधुकोश

इस धातुरूप रक्तज गुल्म का पित्तज गुल्म मे समावेश हो जाता है, सम्भवत इसी क्तज गुल्म मे आचार्य चरक ने रक्तावसेचन का विधान किया है।

गुल्म का सामान्य निदान

मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित हुए वात आदि दोप कोष्ठ के अन्दर (उदर है विभिन्न प्रदेशों में) ग्रन्थि के समान पाँच प्रकार के गुल्मों को उत्पन्न करते हैं।

गुल्म का पूर्वरुप

अधिक डकार आना, मलावरोध होना, पेट भरा मालूम पडना, शक्ति का ह्यास होना, आँतो मे आवाज होते रहना, उदर मे गुडगुडाहट, उदर मे वायु भर जाना, अपच होना, ये लक्षण गुल्म के पूर्वरूप हैं।

गुल्म का सामान्य लक्षण

भोजन मे अरुनि, मल-मूत्र तथा अपान वायु का कठिनाई मे निकलना, आंतो मे गुडगुडाहट होना, उदर मे आनाह होना और ऊपर की ओर डकारो का आते रहना, ये लक्षण सभी गुल्मो मे सामान्य रूप से पाये जाते हैं।

वक्तव्य-आचार्य वाग्भट ने अन्तर्गुल्म तथा वाह्य गुल्म के नाम से दो विशेष गुल्म भेदो का वर्णन किया है।

अन्तर्गुल्म का लक्षण

जब गुल्म अन्दर मे गहराई तक होता है, तब उसे अन्तर्गुल्म कहते हैं। इसमें विस्ति मे, कुक्षि मे, हृदय-प्रदेश में और प्लीह-प्रदेश में वेदना होती है तथा जठरानि मन्द हो जाती है एवं शारीरिक वल और वर्ण का हास हो जाता है। इसमें मल-मूत्र आदि के वेग भी कम हो जाते हैं।

बाह्य गुल्म का लक्षण

जव वाहर के अगो में त्वचा आदि के नीचे गुल्म होता है, तो उसे बाह्य गुल्म कहते हैं। इसमें कोष्ठ के अनयवों में अधिक पीड़ा नहीं होती है। गुल्मस्थान की त्वचा विवर्ण हो जाती है तथा वाहर के भाग में उभार (ऊँचाई) दिखलाई देती है।

१ तृष्णाज्यरपरीदाहशूलस्वेदाग्निमार्दवै.। गुल्मिनामरुची चापि रक्तमेवावसेचयेत् ॥ च० चि० ५

२ दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारिवहारत । कुर्वन्ति पञ्चषा गुरम कोष्ठान्तर्यन्थिरूपिणम् ॥ मा० नि०

३ उद्गारवाहुल्यपुरीपवन्धतृष्त्यक्षमत्वान्त्रविकृजनानि । आटोपमाध्मानमपक्तिशक्तिरासम्रगुल्मस्य वदन्ति विह्नम् ॥ अट म० नि०११

४. अरुचि कुच्यूविण्मूत्रवातताऽन्त्रविकुजनम् । आनाहश्चीर्ध्ववातस्यं सर्वेगुल्मेषु लक्षयेम् ॥ मा० नि०

५ गुरुमेऽन्तराश्रये वन्तिकुक्षिद्धत्प्लीहवेदना । अग्निवर्णवरुश्रशो वेगाना चाप्रवर्तनम् ॥ अ० मं० नि० ११

६ अतो विपर्थयो बाह्ये कोष्ठाङ्गेषु तु नातिरुक्। वैवण्यमवकाशस्य बहिरुन्नतताऽधिकम् ॥ स० सं० नि० ११

गुल्म की सामान्य सम्प्राप्ति

रक्तगुल्म को छोडकर वाकी चार गुल्मो की सम्प्राप्ति सामान्यत निम्न प्रकार से है-

गुन्म एक वातदोप-प्रधान रोग है। कफज एव पित्तज गुल्मो मे भी प्रकुपित हुए वात के साथ स्वतन्त्रतया प्रकुपित कफ तथा पित्त का अनुबन्ध हुआ करता है।

जय प्रकृपित हुआ वायु पित्त और कफ तथा मल से आवृत होता है, तब वह कोष्ठ में आश्रय करके और रूक्षता के कारण पिण्डित होकर अपने स्थान (पक्वाशय) में स्वतन्य (केवल) तथा अन्य (कफ-पित्त) के स्थान (आमाशय और पच्य-मानाशय) में परतन्य (तत्स्थानीय दोप कफ तथा पित्त से मिला हुआ) अपूर्त होते हुए भी पिण्डाकार को प्राप्त होकर मूर्ते हुप धारण कर 'गुल्म' उत्पन्न करता है।"

सम्प्राप्ति

प्रधानत वातप्रकीपक आहार-विहार—वात का म्वतन्त्र या परतन्त्र प्रकीप

पववाशय में आमाशय या पच्यमानाशय में

पववाशय में अमाशय या पच्यमानाशय में

पववाशय में अम्बं, मध्य, अधः या दोनो पाश्व में

पिण्डित होकर व्याप्त प्रदेश को पीडित करना

। गुल्म की उत्पत्ति

वातज गुल्म का निदान

खाने-पीने में रूक्ष पदार्थ का अनियमित अथवा अधिक मात्रा में सेवन करना, विरुद्ध चेप्टा करना (जैसे अपने से वलवान् व्यक्ति के साथ कुश्ती लड़ना या ऊँचे-नीचे स्थान से कूदना आदि), अपानवायु या मल-मूत्रादि के वेगो को रोकना, अत्यधिक शोक करना, चोट लग जाना, विरेचन आदि कर्नों में मन्त्र का अत्यधिक क्षय हो जाना एवं अधिक उपवास करना, ये सब वातज गुल्म के कारण होने हैं।

१ (क) स प्रकृषितो वायुर्महास्रोनोऽनुप्रविष्य रौक्ष्यात्यां ठनीभृतमाण्डल्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति, हृदि वन्तौ पार्थयानीभ्या वा म शूलमुपजनयति अन्धीश्रानेकविवान्, पिण्डितश्चाविष्ठते, म पिण्डितस्वाद् 'गुन्भ' उत्यमिथीयने । घ० ति० ३।७

⁽स) कर्शनात् कफ निट् पित्तेर्गार्गस्यावरणेन वा।
वायु कृताश्रय कोष्ठे रीक्ष्यात् कािठन्यमागतः ॥
स्वतन्त्र स्वाश्रये दृष्ट परनन्त्र पराश्रये॥
पिण्डिनस्वाद्रमूर्वाऽपि मूर्नरािव मंश्रित।
गुल्म इत्युच्यते विस्ति नािग हलाार्थसश्रय॥ जिल्हा निर्व ११

> रूथानपान विपगानिमात्र विनेष्टिन नगविनिग्रहश्च । । शोकोऽभिषातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नना चानिलगुरमहेतु ॥ च० चि० ५।९

(Abdomnal abscess) का रूप धारण कर सकता है। एवन्त्र पैत्तिक गुल्म के कारणभूत अम्ल, उष्ण, विदाही आदि पदार्थ एव पित्त चिरकाल तक के सपकें से अन्त्रकला में क्षोभ तथा व्रणोत्पत्ति भी कर सकत हैं और मास-शोणित दुष्टि से उस क्षत में तथा समीपस्थ भागों में व्रणशोध या विद्रधि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

कफज गुल्म का निदान

शीतल, भारी और चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करना, शारीरिक श्रम के कार्यों का न करना, अधिक मात्रा में छक्कर खाना-पीना और दिन मे शयन करना, ये सब कफल गुल्म के कारण हैं।

कफज गुल्म के लक्षण

कफज गुल्म मे शरीर गीले वस्त्र सैं, ढँका हुआ सा सकुचित रहता है, शीत लग-कर ज्वर होता है अगो मे थकावट होती है, निचली आती है, खाँसी, भोजन में अरुचि और शरीर मे भारीपन होता है। रोगी का शरीर शीतल रहता है, गुल्म स्थान मे पीडा कम होती है, गुल्म का आकार कठिन और उभरा हुआ होता है। ये सब कफज गुल्म के लक्षण हैं। 2

वक्तव्य — कफज गुल्म में सिश्चत पदार्थ के चिरकाल तक एक स्थान पर रकते से अधिक सान्द्र या कठोर तथा समीपस्य अवयव से ससक्त होने से ग्रन्थि या अर्बुद का रूप हो सकता है। इसी अभिप्राय से आचार्य चरक ने इसमे विम्लापन, अग्निकमें आदि द्वारा चिकित्सा करने का आदेश दिया है।

त्रिदोषज गुल्म के निदान और लक्षण

जब तीनो दोप प्रकुपित हो जाते हैं, तो वे त्रिदोपज गुल्म के कारण होते हैं।
लक्षण—जिस गुल्म मे भयकर पीडा, अधिक जलन, पत्थर के समान कठिनता
और उभार होता है, जिसमे शीध्र ही पाक होता है और दारणता होती है, जोमनोवल, शरीरवल तथा अग्निबल का हास कर देता है, उसे त्रिदोपज गुल्म कहा
जाता है। यह गुल्म असाध्य होता है। 3

वक्तव्य-त्रिदोषज गुल्म दो प्रकार का होता है-

१. प्रकृतिसमसमवेत और २. विकृतिविषमसमवेत । इनमे प्रथम प्रकृतिसमसमवेत साह्य होता है। उसी की चिकित्सा के लिये सुश्रुत ने कहा है—'सिन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषच्नो विधिहित ।' अर्थात् सिन्निपातज गुल्म मे त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। दूसरा विकृतिविषमसमवेत सदैव असाध्य होता है।

१ शीतं गुरुस्निग्धमचेष्टन च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च । गुरुमस्य देतु कफसम्भवस्य ॥ च० चि० ५।१४

२ स्तैभिरयशीतज्वरगात्रसादहरूलासकासारुचिगौरवाणि । शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफारमकस्य ॥ च० चि० ५।१५

३ महारुजं दाहपरीतमश्मवद् धनोन्नत शीव्रविदाहि दारुणम्। मन शरीराग्निवलापहारिण त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेष ॥ च० चि० ५।१७

रक्तज गुल्म का निदान

नवीन प्रसव होते पर, गर्भगाव या गर्भपात होने पर अपवा आर्तवप्रवृत्तिकारा में जो हंत्री गिष्या आहार-विहार करती है, उसका गर्भागवगत प्रकृपित यागु रक्त को अवबद्ध कर पीडा और यह से युक्त गुल्म को उत्पन्न महत्त्रा है।

साचार्य घरम ने कहा है, कि प्रमुक्ताल में भोजन न करने से, भय से, रूध आहार विहार में, मल-पूत्रांदि वेर्णके के रोक्तों में, रक्तरतम्मक आहार-विहार या सोपछों के नेयन से, यमन करने में और मौनियोध के पारण स्त्रियों को रक्तल गूनम होता है।

रक्तज गुल्म के रूक्षण

जो गुल्म विष्ट ने रूप में ही देर से स्पादन करता है अर्पात् गतिमात होता है, हममें हाप पैर लादि अगो का कपालत नहीं अतीत होता। स्पादनकाल में पीटा होती है, जिसमें गर्भ के ममात नभी लक्षण होते हैं। जैसे—

रबोध्यरोध, गुग की पाण्डुता, कोडो तथा क्तनपण्डकों की कृष्णता, कतों में स्तन्य पा प्रादुर्भाव, नेतो म क्यापता, मुक्तां, ह्रस्यान, शरीर की कृशता, क्षतों में पकापट, रोह्द (रोगप्रभाववत विविध प्रकार के बाहाय-वितार की इच्छा) पाद-गीय, योनि का विस्तार, विशापदेश में रोगराणि का उद्धार आदि स्थाण होते हैं।

यह वातपायरीपञ्च रक्ता गुन्म स्थिमो में ही होता है। इसकी विवित्सा देशमें महीना बीतो पर ही कर में कर में शाहित में

यक्तस्य—प्रमय के याद पाणीम या पंतालीम दित का ममय नत प्रमयकाल (Involution period) महनाना है। इक्त अविध में मर्भावय अपनी प्रमुत अवस्था मो प्राप्त कर नेता है, इमिन्य प्रमुता न्यों की इतो दिनों तक मनी देगनाइ करनी पाती है। पथ्य आहार-दिशार का ही मेदन कराया जाता है। यदि प्रमुता ह्यी गर्भावय के अपने प्राहितक रूप में होने के पूर्व ही अपन्य मेयन फरने लगे, तो उमकी गर्भावय कि अपने प्राहितक रूप में होने के पूर्व ही अपन्य मेयन फरने लगे, तो उमकी गर्भावय कि अपने प्राहितक रूप में होने प्रमुत्त के मुन की वन्द कर देती है, जिससे गर्भावय भन्नी मौति स्वच्छ नहीं हो पाता और गर्भावयिक फला से स्वृत रक्त यही एक इसिक्ट विण्डित होने स्मता है और प्रति माम उमकी रुद्धि होनी आरम्म हो जाती है। आचार्य उन्हण के अनुमार ६ माम प्यस्त का गर्भ आमगर्भ कहनता है, तीन मास तक के गर्म के गिरने को गर्भयाव (Abortion) और तीसरे तथा सातवें महीने के

स रीधिर स्त्रीभर एव गुस्मो माने व्यनीते दरामे चिकित्स्य ॥ च० चि० ५।१९

१. (फ) नयमगाऽदिनभागनाया या जामगर्म विस्कृति या। नायुद्धि नम्या परिगृद्धा रक्तं करीति ग्रहमं समज सदाह्य ॥ पेजम्य निर्देन समान िर्द्धा

⁽ग) ग्रहावनाहारतया भयेन विरूप्तणैर्वेगविनिम्नदेश । संगम्मनोत्केयानयीनिटीपेर्गुरम नित्रय रक्तभवीज्यपुपैति ॥ च० चि० ५११८ २ य ग्पन्दन पिण्टन एव नाद्गिक्षाण मद्यस्य समगर्भनिद्व ।

मध्य में गर्भ के गिरने को गर्भपात (Miscarriage) कहते हैं। गर्भ की उक्त दोनो अवस्थाएँ आम ही हैं। गर्भाशय की दृष्टि से नवप्रसव, आमगर्भपात तथा आतंव का निर्हरण, इन तीनो अवस्थाओं में बहुत साम्य है। अत इन तीनो अवस्थाओं में अपथ्य सेवन के परिणामस्वरूप रक्तज गुल्म हो सकता है।

असाच्य गुल्म के लक्षण

जो गुल्म क्रमश वढते हुए सम्पूर्ण उदर-प्रदेश मे व्याप्त हो जावे, जो धातुगत होकर अपनी जह जमा ले, जो सिराजाल से आबद्ध हो, जो कल्लुआ की पीठ की तरह समुन्नत हो, जिसमे रोगी दुर्बलता, अरुचि, मिचली, खाँसी, वमन, वेचैनी, ज्वर, प्यास, तन्द्रा तथा प्रतिश्याय से पीडित हो, वह गुल्म असाध्य होता है।

जिस रोगी को ज्वर हो, वमन एवं अतिसार हो तथा जिसके हृदय-प्रदेश, नाभि-प्रदेश हाथ तथा पैरों में सूजन आ गई हो, ऐसे गुल्म के रोगी का गुल्म असाध्य होता है।

श्वास, जदरशूल, तृष्णा, भोजन मे अरुचि, गुल्म की ग्रन्थि का सहसा लूप हो जाना और अत्यधिक दुवेंलता होना, इन लक्षणों के होने पर रुग्ण का गुल्म असाध्य हो जाता है।

पक्व गुल्म के लक्षण

गुल्म जब पक जाता है, तब दवाने पर दवता है और छोडने पर ऊँचा हो जाता है। शूल आदि वेदना कम हो जाती हैं। त्वचा का रग काला हो जाता है। गुल्म को दबाने पर पानी से भरे मशक को दबाने जैसा प्रतीत होता है।

ऐसे गुल्म की चिकित्सा पक्व विद्रधि के समान तत्काल करनी चाहिए तथा उसमें से रक्त और पूर्य को निकाल कर शोधन-रोपण आदि व्रणोपचार करना चाहिए।

अपक्व गुल्म के लक्षण

कठिन आकारवाला, भारी, मास के भीतर आश्रयवाला, मूल वर्णवाला और जो स्थिर गुल्म हो, उसे अपक्व जानना चाहिए।

पच्यमान या विदह्यमान गुल्म के लक्षण

दाह होना, शूल होना, अग्नि से जलाने के समान वेदना होना, निद्रानाश, बेचैनी

१. (क) च० चि० पारह९-१७१

⁽खं) श्वास शूर्लं पिपासाऽन्नविद्वेशी अन्यिमृढता । जायते दुर्बललं च गुलिमनो मरणाय वै ॥ सु० छ० ३३

२. विदाहरूक्षणे गुल्मे बहिरतुङ्गे समुत्रते । श्यावे सरक्तपर्यन्ते सरपर्शे वित्तिसित्रमे ॥ निपोडितोन्नते स्तन्धे मुप्ते तत्पार्थपीटनात् । तत्रेव पिण्डिते शूले सम्पनवं गुल्ममादिशेत् ॥ च० चि० ५।४२-४३

३ गुरु कठिनसस्थानो गूडमांसान्तराश्रयः। अविवर्णः स्थिरक्षेव श्चपक्वो गुल्म उच्यते॥ च० चि० ५।४०

सौर ताप, इन लक्षणों से पुक्त गुल्म को पन्यमान या विवासमान जानना चाहिए। उसे पकाने के लिए सेक आदि उपचार करना चाहिए।

आस्यन्तर पच्यमान गुल्म के लक्षण

यदि गुल्म का पाक भीतरी भाग में हो रहा हो, तो बाहरी भाग में पच्यमान गुल्म के लक्षण के अनुरूप ही रममें भी वही लक्षण होता है। विदेश मण में अन्तर्भाग में पच्यमान गुल्म में ह्यायप्रदेश और उदरप्रदेश में शोग एवं वाहा भाग के पच्यमान गुल्म में शोग बाहर पार्य में निकला होता है।

जाम्यन्तर पक्व गुल्म के रूप

जब भीतरी भाग में गुरुम पर जाता है, तब अन्त स्थ सोतों में गलेंड उराप गर पूर्य को कपर की खोर में यमन द्वारा तथा अधीमांग में मल द्वारा बाहर निकालने समता है।

रक्तगुल्म और गर्भ का सापेक (भेदक, डिफरेन्शियल) निदान*

रत्तल गुल्म

- १. यह विण्ड-सङ्ग ब्रसारार होता है।
- २ इनमें सपूर्ण पिण्डाकार गुहम पा स्पदन दोता है।
- यह अवययरित नामि के नीचे सचानन करता है।
- ४. गुल्म की रुद्धि मन्द-मन्द होती है।
- ५ गुल्म-वृद्धि की कोई अवस्या नही है।
- ६ इसमे अकारण ज्यर-दाह आदि होते हैं।

गभं

- गह अग-प्रतागवान् होता है। स्पर्धं परीक्षा करने पर गर्भं के निर, पृष्ठ, उदर, गविम, वाहु वादि अवगव स्पर्धंगम्य होते है।
- २. इनमे हम्न-पाद आदि पृथक्-पृथक् अाययो में भी स्पन्दन होता है।
- ३. यह एक स्थान से अन्य स्थान में समस्त अवयवी के साथ सनरण करता है।
- ४ गर्भं की एदि क्रम-विशेष से प्रति दिन होती रहती है।
- ५ गर्भ प्रत्येक मास में एक निर्धारित अवस्था विशेष को प्राप्त करता रहता है।
- ६ गिभणी के ज्वर, दाह आदि उत्पन्न होने के मुख कारण होते हैं।

१ दाह्य्लातिमद्शोभस्यप्ननाशारतिज्वरैः । विद्यमान जानीयाद् गुल्म तगुपनाह्येष ॥ प० चि० ५।४१

२ धन्तर्मागस्य चाप्येतत् पच्यमानस्य लक्षणम् । इत्कोटश्नताऽन्न स्थे चिह स्थे पार्थनिर्गति ॥ च० चि० ५।४५

३ पक्त. स्रोतिसि सहक्लेच मजत्यूध्यमधोऽपि वा । च० चि० ५।४६

४. काश्यपसंहिता ।

- इसमें देर से कदाचित् गुल्म के स्थान
 परिवर्तन के कारण स्पन्दन होता है।
- ८ इसमे सशूल स्पन्दन होता है।
- ९. इसमे केवल गुल्म की ही अभिवृद्धि होती है।
- १० यह दस मास के बाद भी बना रह सकता है।
- ७ गर्म मे शीघ्र शीघ्र जीवन-लक्षण रूप स्पन्दन होता रहता है।
- ८. इसके स्पन्दन में शूल का अभाव होता है।
- गमं की स्थिति में गमंदृद्धि के साथ समस्त जदर मे दृद्धि होती है।
- पर यह समाप्त हो जाता है।

गुल्म और अन्तिवद्रिध का सापेक्ष निदान

ये दोनो रोग परस्पर बहुत अश में समान हैं। दोनो के स्थान एक हैं, दोष समान हैं और कारण समान हैं। गुल्म में देर से पाक होता है या नहीं होता है, किन्तु विद्रिधि में शीघ्र विदाह या पाक होता है। विद्रिधि का आश्रयभूत रक्तधातु है और रक्तधातु के दूषित होने पर विद्रिधि शीघ्र पक जाती है।

गुल्म के अन्तराश्रित होने से वस्ति, कुक्षि, हृदय और प्लीहा आदि मे वेदना वनी रहती है। जठराग्नि, वर्ण और वल का स्नास हो जाता है तथा अद्योवायु, मल-मूत्र आदि वेगो की सम्यक् प्रवृत्ति नहीं होती।

विद्रधि के रक्तधातु के आश्रित बाह्य परिवेश में होने से जठराग्नि, वर्ण और वल का अधिक ह्रास नहीं होता। वेगों की प्रवृत्ति में वाधा नहीं होती और वस्ति, उदर एव हुदय आदि प्रदेशों में अतिशूल नहीं होता।

यद्यपि गुल्म और विद्रिधि इन दोनों के लक्षण अनेक अशो में विपरीत हैं, तथापि 'पाक हो जाना' इस लक्षण के दोनों में प्रविष्ट होने से अनेक आचार्यों ने अन्तर्विद्रिधि को गुल्म से पृथक् नहीं माना है। उनके अनुसार गुल्म जब अकने लगता है, तब विरेचन, लेन, विम्लापन आदि और पक जाने पर पाटन-शोधन-रोपण आदि उपचार करने चाहिए।

सुश्रुत ने गुल्म को न पकनेवाला और विद्रधि को पकनेवाला बतलाया है, और यही इन दोनो का प्रधान भेदक लक्षण माना है।

गुल्म और विद्विधि के भेदक लक्षण

गुल्म

- १ गुल्म का मूल नही होता।
- २. इसमे दोष ही स्वय गुल्मवत् होकर रोग उत्पन्न करते हैं।
- ३. गुल्म का पाक नही होता।

विद्रधि

- १ विद्रिधि मे रस-रक्तादि मूल होते हैं।
- २. विद्रिधि का आश्रय मास एव रक्त होता है।
- ३ विद्रधि का पाक होता है।

१ न निवन्थोऽस्ति गुल्मस्य विद्रिधि सनिवन्धन ।
 गुल्माकारा स्वय दोषा विद्रिधिर्मोसशोणिते ॥

गुल्म का सामान्य चिकित्सासूत्र

गुल्मरोग वातप्रधान होता है। इसमे अन्य दोष स्वप्रकोपक कारणो से प्रकुपित होकर वातप्रकोप सहकृत होकर ही गुल्मरोगजनक होते हैं। अत. सभी गुल्मो मे वात की चिकित्सा प्रमुख रूप से करनी चाहिए। वात के प्रकोप पर विजय प्राप्त कर छेने पर अन्य दोपो की चिकित्सा आसान हो जाती है।

गुल्म को , चिकित्सा के एकादश सूत्र

१ स्नेहन, २. स्वेदन, ३. निरूह, ४. अनुवासन, ५ विरेपन, ६ वमन, ७ लघन, ८ वृहण, ९ शमन, १०. रक्तमोक्षण और ११ अग्निकमं, ये गुल्म के ११ प्रकार के उपचार साधन हैं।

१ स्तेहन और स्वेदन — सर्वप्रथम वातनाशक गौपघो से पकाये गये (नारायण आदि) तैल का पान करावे। वातहर ग्वाय या दूध में डालकर तैल का पान कराना चाहिए। स्तेहयुक्त भोजन, स्तेह का अभ्यञ्च एव स्तेहवस्ति के प्रयोग से स्तेहन करे। स्तेहन से रोगी का महास्रोत कोमल होता है। स्तेहन से महास्रोत स्थ गुल्म या विवद्ध मल की गाँठें भी कोमल हो जाती हैं। स्तेहन के लिए दूध में एरण्डतैल मिलाकर दें। एरण्डतैल में हरीतकी चूणं, सर्जिकाक्षार (सोटा-वाईकार्व) या कूठ का चूणं मिलाया जा सकता है।

तैलपान, तैलाभ्यग एव स्निग्ध अन्नाहार द्वारा रोगी का स्नेहन करके कुम्भी-स्वेद (वोतल या रवर की यैली मे गवाय भरकर स्वेदन करना), पिण्डस्वेद (गरम भात को कपडे मे वाँधकर सेंकना), इिंटकास्वेद या काल्यणस्वेद की औपधो को पीसकर गरमकर बाँध कर उपनाह स्वेद करना चाहिए। गेहूँ के आटे की या तोसी की पुल्टिस वाँधकर सेंकना भी लाभकर है।

इस प्रकार के स्वेद से वायु के उग्र प्रकोप का शमन तथा महास्रोत की मृदुता होने एव विवन्ध के टूट जाने से गुल्मरोग, दूर हो जाता है।

विवरानुचरी प्रन्थिरप्सु वद्सुदको यथा। ण्यम्प्रकारो ग्रुहमस्तु तस्मात् पाक न गच्छति॥ मांसशोणितवाहुस्यात् पाकं गच्छति विद्रिषि । मांशशोणितष्टीनस्वातः ग्रुहम पाक न गच्छति॥ ग्रुहमस्तिष्ठति दोपे स्वे विद्रिषमांसशोणिते।

विद्रिधि पच्यते तम्मात् गुल्मश्चापि न पच्यते ॥ सु० नि० ९

१ रनेइनं रवेदन चेव निरूद्मनुवासनम् । विरेक्षवमने घोभे ल्हुमनं गृहण तथा । शमनं चायसेक च शोणितस्याग्निकर्मं च । कारयेदिति गुल्मानां यथारम्भ चिकित्सितम् ॥

२ गुल्मेप्वात्ययिके कर्मणि वातिचिकित्सित प्रणयेष्य—स्तेष्टस्वेदी वातदरी स्तेष्टसिद्धतं च मृदु-विरेचनं वस्तीश्च । अल्पण्यवणमभुराश्च रसान् युक्त्याऽवचारयेष्ठ । मारुते ष्ट्युपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्यो दोषो नियन्त गुल्मेष्विति ।

मवति चात्र—गुरिमनामनिल्ञशान्तिरुपायै सर्वशो विधिवदाचरितन्या । मारुते सवजितेऽन्यमुदीणै दोषमरुपमिष कर्म निहन्यात् ॥ च० नि० ३

३ स्रोतसा मार्देव कृत्वा जिस्वा मारुतमुख्यणम् । भित्वा विवन्ध गुरुमस्य स्वेदो गुरुममपोद्दति ॥ च० चि० ५।२३ २ नाभि से ऊर्ध्वं आमाशयस्थ गुल्मों में स्नेहपानं कराना, पक्वाशयगत गुल्म में विस्ति देना तथा उदर के अन्य (जठराश्रित) गुल्मों में स्नेहपान एवं विस्तिप्रयोग उत्तम है।

३. लघन, दीपन, उष्ण, वातानुलोमन और वृहण औषघ तथा अन्नपान सर्वविध गुल्मरोगियो के लिए हितकर है । २

४ गुल्मरोग को नष्ट करने के लिए स्नेहन और स्वेदन के वाद वस्ति देना सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि वस्तिकर्म वायु को उसके प्रधान स्थान (पक्वाशय) में जीतकर शीघ्र ही गुल्म को दूर कर देता है। इसलिए बारम्बार निरूह तथा अनुवासन वस्ति का विधिवत् प्रयोग करने से वातज, पित्तज और कफज गुल्म शान्त हो जाते हैं।

५ रक्तमोक्षण — गुल्मपीडित स्थान पर जलौका आदि द्वारा रक्तमोक्षण, बाहु के मध्य मे सिराव्यद्य द्वारा रक्तमोक्षण और स्वेदन तथा वात का अनुलोमन उपचार करना, सभी प्रकार के गुल्मों में प्रशस्त है। ४

६ जठराग्नि-सन्धुक्षण — जठराग्नि के मन्द होने पर गुल्मरोग बढता है और उसके तीव्र होने पर शान्त होता है, अत पाचन की क्षमता के अनुसार स्निग्ध तथा उष्णगुण-प्रधान एव लघु शोजन करना चाहिए। भोजन न तो पूरा भरपेट खाना चाहिए और न ही उपवास करना चाहिए।

वातज गुल्म का चिकित्सासूत्र

9 बाचार्यं चरक ने वातज गुल्म के चिकित्सासूत्र के रूप मे स्नेहन, स्वेदन, घृतपान, वस्तिप्रयोग, चूणं, वृहण गृटिका का प्रयोग, वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण करने का निर्देश दिया है।

१ स्नेहपानं हितं गुरुमे विशेषेणोर्ध्वनाभिजे । पक्ताशयगते वस्तिरुभयं जठराश्रये ॥ अ० दृ० चि० १४

२. ल्रङ्घन दीपन स्थिमुर्ण वातानुलोमनम् । बृहण् च भवेदन्नं तदित सर्वगुलिमनाम् ॥ यो० र०

३ वस्तिकर्म पर विद्याद् गुरमध्न तद्धि मारुतम् । स्वस्थाने प्रथम जित्वा सद्यो गुरममपोद्दति ॥ तस्मादमीक्ष्णशो गुरमा निरूदै सानुवासने । प्रयुज्यमाने शाम्यन्ति वातिपत्तकपात्मका ॥ च० चि० ५।१००-१०१

४. (क) गुल्मस्थाने रक्तमोक्षो बाहुमध्ये सिरान्यभं। स्वेदानुलोमनं चैव प्रशस्तं सर्वेगुल्मिनाम्॥

⁽ख) गुरुमो यद्यनिकादीनां कृते सम्यग्भिषग्जिते । न प्रशास्यति रक्तस्य सोऽवसेकात्प्रशास्यति ॥ च० चि० ५।३२

५ मन्देऽग्नी वर्षते दीप्ते चाग्नी प्रशाम्यति। तस्मान्ना नातिसीहित्यं कुर्यान्नाति विलङ्घनग् ॥ च० चि० ५।११२

^{&#}x27; ६ स्नेह स्वेदो सांधर्नस्तिश्चूर्णानि इहणं गुटिका । वमनविरेकौ मोक्ष क्षतजस्य च वातगुरुमवताम् ॥ च० चि० ५।१८३

२ वातज गुल्म मे रूक्ष अन्न (चना-मनका-जी आदि) का सेवन एक प्रमुख कारण होता है, अत रुग्ण को स्नेहपान कराना चाहिए। स्नेहयुक्त भोजन (चने-जी के सत्तू मे पर्याप्त घी-चीनी मिलाकर) देना चाहिए। स्नेह का अभ्यग, निरूह तथा अनुवासनवस्ति द्वारा स्नेहन कराना चाहिए, तदनन्तर स्वेदन करना चाहिए।

३ गुल्म नाभि के ऊर्घ्वंभाग मे हो, तो स्नेह का पान के रूप मे प्रयोग, नाभि के नीचे पनवाशय मे हो तो वस्ति के रूप मे स्नेह का प्रयोग और यदि दोनो स्थानों मे हो तो स्नेहपान तथा वस्ति, इन दोनों का प्रयोग करना चाहिए।

४ बार वार स्नेहपान और वस्ति के पिणामस्वरूप अग्नि के प्रदीप्त होने पर जब पुरीप (मल) और वायु की रुकावट दूर हो जावे तो पुन विवन्ध न हो एतदयं उसे स्निग्ध, उष्ण एवं वृहण अन्नपान देना चाहिए।

५ स्नेहन और स्वेदन से यदि कफ या पित्त के लक्षण उत्पन्न हो जायें, तो वमन-विरेचन कराकर उन्हें शान्त करना चाहिए।

६ वस्तिवर्ग वातज गुल्म को सद्या नष्ट करता है, क्योकि वह वात के मूल स्थान मे पनवाशयगत वात का संशोधन कर देता है।

वातज गुल्म में औषघ

१. घृत

श्रूपणादि घृत, पट्पल घृत, हिड्गुसीवर्चलादि घृत, ह्युपादि घृत, पिप्पलादि घृत, नीलिन्यादि घृत—इन घृतो को १०-२० ग्राम की मात्रा मे मण्ड या वार्ली आदि में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए या अनार के रस, विजीरानीवू के रस से बनी पेया आदि मे रोगी की रुचि के अनुमार प्रयोग करे।

२ दुग्ध

छिजका रहित लहसुन के २५ ग्राम करक को ४०० ग्राम दूध और १६०० ग्राम जल मे पकावे तथा दूधमात्र शेप रहने पर छानकर पिलावे।

दीप्तेऽग्नी वातिके गुरमे विवन्धेऽनिलवर्णसो । यहणान्यत्रपानानि स्निग्धोग्णानि प्रयोजयेत् ॥ च० नि० ५।२५

२. भोजनाम्यअने पानैनिरूदे. सानुवामने । स्निग्धस्य भिपना स्वेद कर्तन्यो गुल्मशान्तये॥ न० चि० ५।२२

२ स्नेहपानं हित गुल्मे विशेषेणोध्वैनाभिजे । पक्वाशयगते वस्तिकभयं जठगश्रये ॥ अ० ४० वि० १४

३ पुन पुन स्नेहपान निरुद्धा सानुवामना । प्रयोज्या वातगुरमेषु कफवित्तानुरक्षिणा ॥ च० चि० ५।२६

४ (क) वातगुरमे कको वृद्धो इत्वाडिग्नमरुनि यदि । दृष्ताम गौरव तन्द्रा जनयेदृष्तिरोत्तु तम् ॥ च० चि० ५।२०

⁽ स) पित्त वा यदि संवृद्धं मन्ताप वानगुन्मिन । पुर्याद्विरेच्य स भवेत् सस्नेद्देरानुलोगिकै ॥ २० (२० ४।२० ५ विन्तिकमे परं विद्यात् गुरमध्न । २० चि० ५।१००

१. एरण्डतैल, २. मद्य का ऊपरी स्वच्छ भाग, ३ गोमूत्र, ३. तैलपश्वक ४. काञ्जी और ५ जवाखार इन पाँची को रोगी के बल के अनुसार मात्रा मे मिलाकर प्रयोग करे। जी के बाटे का घी मे बना हलवा या घी मिला जी का सत् ४. स्निग्धवाटच खिलाकर, पिप्पली चूर्ण डालकर निर्मित मूग का यूष या मूली का स्वरस पिलाना चाहिए। जवाखार मिले लघुपचमूल के क्वाथ मे शिलाजीत मिलाकर ५ शिलाजतु-प्रयोग प्रयोग करे। बिजौरा नीबू का रस, घृतभृष्ट हीग, खट्टे अनार का रस, ६ सुरामण्ड योग कालानमक और सेंधानमक को सुरामण्ड मे डालकर पीने से वातज गुल्म पीडा का शमन होता है। पूर्वोक्त घृतो के योग चरक० चि० ५ में हैं, उन योगों में कथित ७ं चूर्णं औषधो का मिलित चूर्ण बनाकर प्रयोग करना गुल्मनाशक है। हिंग्वादिचूणं, शटचादि चूणं और नागरादि योग का प्रयोग करे। मूर्गा, मोर, तीतर, क्रीश्व, बटेर का यथोपलब्ध मासरस, ८. मासरस अगहनी का भात, मदिरा और घृत, ये पथ्य हैं। काकायनवटी, शूलविज्ञणी, महायोगराज गुग्गुलु, गुल्मकालानल, ९ अन्य योग अग्निक्मार रस, क्रव्याद रस, वज्रक्षार, हिंग्वप्टक चूर्ण, लवण-

वातज गुल्म की आवस्थिकी चिकित्सा

चाहिए ।

भास्कर चूर्ण, नारायण चूर्ण आदि का यथायोग्य प्रयोग करना

१ यदि वातज गुल्म मे कफ और वात प्राय शान्त किये जा चुके हो, परन्तु पित्त तथा रक्त प्रकुषित हो गये हो, तो उनमे से जो अधिक प्रकुषित हो, उसकी चिकित्सा करे, किन्तु इस बात की सावधानी रखे, कि वायु के प्रकोप की वृद्धि किसी भी प्रकार न हो।

२ कफप्रकोप—यदि वातज गुल्म मे कफ वढकर अग्निमान्द्य, अरुचि, मिचली, भारीपन और तन्द्रा उत्पन्न करे, तो वमन कराकर कफ को निकाल देना चाहिए।

३. पित्तप्रकोप — यदि वातज गुल्म मे पित्त वढकर सन्ताप उत्पन्न करे, तो उसे विरेचनकारक घृत या तैल को पिलाकर विरेचन करावे।

४ रक्तमोक्षण—यदि वातज गुल्मरोग समुचित चिकित्सा करने पर भी ठीक न हो रहा हो, तो वह गुल्म श्रृग, जोक आदि द्वारा रक्तमोक्षण करने से शान्त ही जाता है।

५ घत का अभ्यास—रक्षमोक्षण करने से मुरझाये हुए रोगी को जागल पशु-पक्षियों का मासरस खिलाकर तृष्त और आश्वस्त करे, तदनन्तर शेय दोष या कष्ट को दूर करने के लिए प्रतिदिन उचित मात्रा में धृतपान करावे।

वातज गुल्म मे व्यवस्थापत्र

१ प्रात काल ७ वजे

हिंगुसौवर्चेलादि छत २० ग्राम ५० ग्राम गरम दूध में मिलाकर पीना।

२. प्रात ८ वजे व सायं ५ वजे

शूलविष्णिंगे वटी ४ गोली

गुल्मकालानल दे ग्राम

सर्गिकाक्षार १ ग्राम

जल से । — योग—२ मात्रा

३ भोजन के प्रथम ग्रास मे दोनो समय

हिंग्वष्टक चूर्णं <u>६ ग्राम</u> योग--- र मात्रा

घी मिलाकर खाना।

४. भोजनोत्तर दोनो समय

कुमार्यासव <u>५० ग्राम</u> योग—२ मात्रा

वरावर जल से पीना।

५ रात मे सोते समय पचसकार चूर्ण <u>५ ग्राम</u> गरम जल से । १ मात्रा

पित्तज गुल्म का चिकित्सासूत्र

- १ पित्तज गुल्म मे तिक्तरसवाले द्रव्यो के कल्क एव क्वाथ से पकाया हुआ छत और दूछ पिलावे।
 - २ विरेचन कारक औषध का प्रयोग करे तथा निरूहवस्ति दे।
 - ३. यदि गुल्म पक गया हो तो शस्त्रकर्म करे।
- ४ आभ्यन्तर गुल्म पककर फूट गया हो, तो उसका शोधन करे और शमन प्रयोग करे।
 - ५ रोगी को आश्वामन दे और धैयं बँघावे।
 - ६ आवश्यकतानुसार उपनाह स्वेद और रक्तमोक्षण करे।

१ सिंप सितक्तिसिद्धं क्षीरं प्रस्नभनं निरूहाश्च ।
रक्तस्य चावमेचनमाश्वासगसशमनयोगा ॥
चपनाइन मश्चम्त्रं पक्वस्याभ्यन्तरप्रभिन्नस्य ।
्रसंशोधनसंशमने वित्तप्रभवस्य गुल्मस्य ॥ च० चि० ५।१८४-१८५

- ७ पनवाशयस्य पित्तज गुल्म मे तिक्त द्रव्यों के कल्क से युक्त दूध की वस्ति देक उसका निर्हरण करे।
- ८ चरक के उदररोगाधिकार मे विणत तिल्वक घृत का पान कराकर विरेच करावे। र
- ९. तृष्णा, ज्वर, दाह, शूल, स्वेद, मन्दाग्ति और अरुचि होने पर पित्तज गुल मे रक्तमोक्षण कराना चाहिए।
- १० यदि रक्त और पित्त के अधिकं मात्रा मे वढ जाने के कारण अथवा उचित चिकित्सा न होने के कारण गुल्म में विदाह (पाकोन्मुखता) हो, तो ऐसी स्थित है शस्त्रकर्म करना चाहिए।

. पित्तज गुल्म मे-औषघ

- १ स्निग्ध तथा उष्ण द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न गुल्म मे स्नसन कराना चाहिए।
 जैसे—अमलतास के फल के गूदे का क्वाथ स्नसन है।
- २ रूक्ष एव उष्ण द्रव्यो के सेवन से उत्पन्न गुल्मरोग मे पित्तशामक औपधो से सिद्ध घृत का पान कराना चाहिए। "
- ३ घीकुवार का स्वरस (गूदा) २० ग्राम, गोष्टत ५ ग्राम, त्रिकटु चूर्ण १ ग्राम और सेंघानमक १ ग्राम मिलाकर पीने से पित्तज गुल्म नब्ट हो जाता है।
- ४. घृत—रोहिण्यादि घृत, त्रायमाणादि घृत, आमलकादि घृत, द्राक्षादि घृत, वासादि घृत,

इन घृतो को रोगी के जठराग्नि वल के अनुसार उचित मात्रा मे दूध में मिलाकर सेवन करावे।

- ५ क्वाथ २० ग्राम त्रायमाणा को १०० ग्राम जल मे अष्टमाशावशिष्ट क्वाथ कर छानकर ५० ग्राम दूध मिलाकर पीने के लिए देवे।
- - ७ केबीला का चूर्ण ३ ग्राम मे मधु मिलाकर चटाना चाहिए।

१ पित्त वा पित्तगुरुमं वा हात्वा पक्वाशयस्यितम् । कारुवितिहरित् सथ- सितिकै क्षीरक्स्तिभि ॥ च० चि० ५।३४

२ भिषगग्निवलापेश्री सर्पिषा तैल्वकेन वा। च० चि० ५।३५

३. तृष्णाज्यरपरीदाहशू छरवेटाग्निमार्दवे । गुलिमनामरुनौ चापि रक्तमेवावसेचयेत् ॥ च० चि० ५।३६

४ रक्तिपत्तातिवृद्धत्वात् क्रियामनुपलभ्य च । यदि गुल्मो विद्षेति शस्त्र तत्र भिपग्जितम् ॥ च० चि० ५।३९ तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकार क्रियाविषी । वैद्याना क्रुतयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे ॥ च० चि० ५।४४

स्तम्धोणोनोदिते गुल्मे पैत्तिके स्नसनं हिनम् ।
 स्क्क्षोणोन तु सम्भूते सापं प्रश्नमनं परम् ॥ च० चि० ५।३३

८. अध्यक्ष —िपत्तज गुल्म मे दाह के शमनार्थ छत का या चन्दनादि तेल का या मुलहठी के क्वाय और कल्क से सिद्ध छत का अभ्यग करना चाहिए।

९ पित्तज गुल्म मे यदि आमदोष का अनुबन्ध हो अथवा आम, कफ और वात का सम्बन्ध हो, तो लघन कराने के बाद यवागू और खडयूप के प्रयोग से जठरानि को प्रज्वलित करे।

१०. भोज्य द्रव्य — शालि चावल, जागल पशु-पक्षियो का मासरस, गाय और वकरी का दूध, खजूर, आँवला, मुनक्का एव फालसा का प्रयोग जब चाहे करे। पीने के लिए वरियार या लघुपचमूल को डालकर पडगपरिभाषा के अनुसार सिद्ध किये गये जल का प्रयोग करना चाहिए।

१९ सिद्धयोग—दन्ती हरीतकी, गुल्मकुठार रस, प्रवालपचामृत, लवगादि चूर्णं अविपत्तिकर चूर्णं, कुमार्यासव, रोहीतकारिष्ट आदि का प्रयोग रोगी की प्रकृति आदि का विचार कर उचित मात्रा मे करना चाहिए।

पित्तज गुल्म मे व्यवस्थापत्र

१ प्रात -साय

गुल्मकालानल दे ग्राम मुक्ताशुक्ति भस्म दे ग्राम २ मात्रा

विफला चूर्ण २ ग्राम के साथ जल से।

२ ९ वजे व २ वजे दिन

लवगादि चूर्ण ६ ग्राम जलसे। र मात्रा

३ भोजनोत्तर २ बार

कुमार्यासव

२५ मि॰ ली॰ १ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

४. रात मे सोते समय

अविपत्तिकर चूर्णे ३ ग्राम उष्णोदक से। १ मात्रा

५ दाह-शमनार्थं

शीतल जल का सस्पर्श

या शतधीत घूत का अभ्यग

या चन्दनादि तैल का अनुलेपन

१ आमान्वये पित्तगुरुमे सामे वा कफवातिके। यवागूमि खडेयूँपे. सन्धुक्योऽग्निर्विलक्किते॥ च० चि० ५।१३५ २१ का० कि०

कफज गुल्म का चिकित्सासूत्र

कफज गुल्म मे स्नेहन, स्वेदन, भेदन, लघन, वमन, विरेचन, घृतपान, वस्ति-प्रयोग, गुटिका, चूर्ण, अरिष्ट और क्षार का प्रयोग करना चाहिए। इनसे लाभ न होने पर अन्त मे रक्तमोक्षण करने के बाद अग्नि से दाह करना चाहिए।

कफज गुल्म की आवस्थिक चिकित्सा

१. यदि रोगी की जठराग्नि मन्द हो, उदर में मन्द-मन्द पीडा हो, कोष्ठ में भारीपन और जकडाहट हो, अक्चि तथा ऊबकाई आती हो, तो ऐसे रोगी को वमन करावे। यदि रोगी वमन के योग्य न हो, तो लंघन कराना चाहिए।

२ लघन, वमन और स्वेदन द्वारा अग्नि के समृद्ध हो जाने पर यवकार, सोठ, मरिच, पीपर डालकर विधिवत् निर्मित छत का सेवन कराना चाहिए। ⁵

३ वसन या उपवास कराने के बाद आहार-विहार में उष्ण द्रव्यों का ही प्रयोग कराना चाहिए। साथ ही लघु गुण और तिक्त रस वाली औषधों से सिद्ध जल में पकाये गये आहार का सेवन कराना चाहिए।

४ यदि कफज गुल्म आनाह और विबन्ध के साथ कठिन और उठा हुआ हो, तो युक्तिपूर्वक स्वेदन करने के पश्चात् गुल्म के विलयन का प्रयास करे।

५. जब स्वेदन बादि उपचारों से कफज गुल्म अपने स्थान से विचलित हो गया हो, तो विरेचन द्वारा अथवा दशमूल क्वाथ में स्नेह मिलाकर उसकी वस्ति देकर शोधन करे।

६. जब कफज गुल्म मे मन्दाग्नि, अद्योवायु की रुकावट और आमाशय मे स्निग्धता हो, तो गुल्मनाशक वटी, चूर्ण और क्वाथो का प्रयोग करे।

७ जब कफज गुल्म का मूल दृढ और गम्भीर हो, उसका अधिक प्रदेश में

१ स्नेद्दः स्वेदो मेदो ल्ह्वनमुल्लेखन विरेक्तश्च । सिंववेस्तिगुटिकाचूर्णमरिष्टाश्च सक्षारा ॥ गुल्मस्यान्ते दाह कफनस्याग्रेऽपनीतरक्तस्य । व० वि० ५।१८६-१८७

२ मन्दोऽग्निर्वेदना मन्दा ग्रहस्तिमितकोष्ठता । सोक्लेशा चारुचिर्यस्य स ग्रहमी वमनोपग ॥ च० चि० ५।४९-५०

श्रुवनोहलेखने स्वेदे कृतेजनी सम्प्रधुक्षिते ॥
 कफगुल्मी पिवेत काले सक्षारकडक घृतम् । च० चि० ५।५२

४ जण्णैरेवोपचर्यश्च कृते वमनलङ्घने ॥ योज्यश्चाहारसंसर्गो मेषजै कडितिक्तके । च० चि० ५।५०

५. सानाहं सविवन्धं च गुल्मं कठिनमुन्नतम् ।
दृष्ट्वादौ स्वेदयेद्युक्तया स्विन्न च विल्येद्रिषक् ॥ च० चि० ५।५१

६ स्थानादणसत ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचने । सस्तेहैवंस्तिभिर्वाऽपि शोधयेद् दाशमूलिके ॥ व० चि० ५।५३

७. मन्देऽग्नावृतिले मूढे ज्ञात्वा सरूनेद्दमाश्चयम् । गुटिकाचूर्णनिर्युद्दाः प्रयोज्या कफगुरिमनोम् ॥ च० चि० ५।५४

विस्तार हो, कठोर, जकडाहटयुक्त तथा भारी हो, तो उसे क्षार-प्रयोग, अरिष्ट-पान एव दाह-कर्म से शान्त करे।

८ कफज गुल्म मे कफदोष की प्रधानता, कफप्रकृति गुल्म की स्थिरता और श्रृष्ट्य हेमन्त या शिशिर एव रोगी के बल तथा दोष-प्रमाण का विचार कर क्षार का प्रयोग करना चाहिए। व

९ शरीर, वल और दोषों की वृद्धि तथा हास को जाननेवाला चिकित्सक कफज गुल्म में एक-दो या तीन दिन का अन्तर देकर वार-वार क्षार का प्रयोग करे। क्यों कि मास, दूध और घृत का सेवन करने वाले कफज गुल्म के रोगियों के लिए किया गया क्षार का प्रयोग अपने क्षरणकारक स्वभाव से मधुर और स्निग्ध कफ को छाँट-छाँट कर अधोमार्ग से वाहर निकाल देता है।

१०. कफज गुल्म का जो रोगी स्निग्ध आहार करता हो, अग्नि मन्द हो, अग्नि हो, मद्यपान उसके अनुकूल पडता हो, तो उसके अर्ध्वं -अध -मार्ग की शुद्धि के लिए अरिष्ट पिलाना चाहिए।

कफज गुल्म में विशिष्ट उपचार

शस्त्रकर्म—वमन के योग्य कफज गुल्म के रोगी को स्नेहन-स्वेदन करने के बाद वमन करावे। इन कमों से जब गुल्म मे शिथिलता था जाय, तो एक छोटे घड़े में सूखी घास या पुआल डालकर उसे जला दे और जल जाने के बाद उसे निकाल कर गुल्म के स्थान पर घड़े को औं घा रख दे। जब गुल्म घड़े के मुख के भीतर सग्रहीत हो जाय तो घड़े को हटा दे। फिर गुल्म के मूलभाग मे एक छोटा वस्त्र कसकर बंध दे और गुल्म के प्रमाण को जानने वाला वैद्य उसका भेदन कर देवे। उसके बाद गुल्म की लम्बाई-चौडाई के अनुसार लगाये गये चीरे से विमार्ग, अजपद और आदर्श इनमें से जो उपलब्ध हो, उससे दबा-दबाकर गुल्मस्थल के कफ-रक्त आदि विकार को हटा दे। तदनन्तर ब्रणोपचार करना चाहिए।

इस शस्त्रकर्म को करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए, कि अन्त्र और हृदय

१ कृतमूलं महावास्तु कठिनं स्तिमितं गुरुम् । जयेरकफकृत गुरुम क्षारारिष्टारिनकर्मभि ॥ च० चि० ५।५५

२ दोषप्रकृतिगुरुमतुँयोग बुद्ध्वा कफोल्वणे । वरुदोषप्रमाणक स्चार गुरुमे प्रयोजयेस् ॥ च० चि० ५।५६

एकान्तरं द्वयन्तरं ना त्र्यह िश्रम्य ना पुन ।
 श्रिरनरुदोपाणां वृद्धिक्षपणकोनिद ।
 श्रेरेमाण मधुरं रिनग्धं मासक्षीरघृताशिन ।
 छित्ना छित्वाऽऽशयात् क्षार क्षरत्वात् क्षारयत्यध ॥ च० चि० ५।५७-५८

४ मन्देऽग्नावरुची सास्म्ये मद्ये सस्नेहमश्नताम् । प्रयोज्या मार्गेशुद्धधर्थमरिष्टा कफगुल्मिनाम् ॥ च० चि० ५।५९

का शस्त्र से स्पर्श न हो, क्योंकि ये मर्मस्थान हैं और इन पर शस्त्राघात होने से प्राण जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अथवा—

पेवींबार लोहपात्र से स्वेदन कफगुल्म के रोगी के गुल्म के स्थान पर काला तिल, एरण्ड की गुद्दी, तीसी का बीज और सरसो पीसकर लेप कर देने के बाद उस पर गरम किये हुए लोहे के पात्र की पेंदी से स्वेदन करना चाहिए। यह ध्यान रहे, कि स्वचा न जलने पाये।

कफज गुल्म में औषघ

- १ बृहत्पश्वमूल का क्वाथ अथवा मुनक्का से निर्मित सुरा के पान से कफज गुल्म मे लाभ होता है।
- २. अजवायन ३ ग्राम और कालानमक ३ ग्राम मिलाकर तक्र ३००-४०० मि० ली० पिलाने से मल-मूत्र की शुद्धि एव जठराग्नि के प्रदीप्त होने से गुल्म का नाश होता है।
- ३. अजवायन, भूनी हीग, सेंधानमक, जवाखार और कालानमक तथा हरें के समभाग का चूर्ण ३ ग्राम की मात्रा में मद्य के साथ देना लाभकर होता है। इसे आवश्यतानुसार प्रतिदिन ३-४ बार देना चाहिए।
- ४ सोठ का चूर्ण ३ ग्राम और कलमीसोरा १ ग्राम मिलाकर सेवन करने से गुल्म नष्ट होता है।
- ५ सर्जिकाक्षार २ ग्राम मे ६ ग्राम गुड मिलाकर गरम जल से दिन मे ३-४ बार देने से कफज गुल्म नष्ट हो जाता है।

सिद्ध योग

दशमूलीघृत, भल्लातकादि घृत, क्षीरषट्पलघृत, मिश्रक स्नेह, दन्तीहरीतकी, गृहमकुठार, शूलविज्ञणी, जम्बीरद्राव, वज्रक्षार, वडवानल रस, कुमार्यासव, क्रव्याद रस और अग्निकुमार रस आदि का प्रयोग रुग्ण की रोगावस्था के अनुसार करना चाहिए।

१ वमन वमनार्हाय प्रदचात कफ्युल्मिने ।
स्निधन्वित्रशरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते ॥
परिवेष्टय प्रदोप्तास्तु बन्वजानथवा कुशान् ।
मिषक् कुन्मे समावाप्य गुल्म घटमुखे न्यसेत् ॥
सङ्गृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत् ।
वस्त्रान्तरं तत कृत्वा भिन्धाद् गुल्म प्रमाणवित् ।
विमार्गाजपदादश्र्यं यालामं प्रपीडयेत् ।
मृद्गीयाद् गुल्ममेवकं न त्वन्त्रहृद्यं स्मृशेत् ॥ च० चि० ५।१३७ १४०

२ तिलेरण्डातसीबीजसपंपे परिलिप्य च । इलेष्मगुरुममय, पात्रे, सुखोप्णे स्वेदयद् भिषक् ॥ च० चि० ५।१४१

व्यवस्था-पत्र

१ प्रातः-साय

धीरपट्पल एत

२० प्राम

तिबद्ध पूर्ण

२ ग्राम १ माना

लज्यायन ने नवाप या गरम क्षके के साप।

२ ९ बजे प्रात य २ बजे मपराह्य

तिबाधारपापन पूर्ण ६ प्राम

जल से।

२ माना

३ भोजन के बाद २ बार

पुमार्गमय

२५ याग

१ मात्रा

ममान जल मिलाकर पीना । ४ रात में ग्रीत समार नारायण पूर्ण ४ प्राम गरम लल से ।

इन्द्रज गुल्म चिकित्सा

9 इन्डज गुहन प्रकृतिगम-मगवामारका होते हैं। अतः उनमे यो सम्मिल्स योगी मी चिकितसा की जाती है। विकेस--

२. यात-पित्तन गुल्म में यातन सया पित्तन गुल्म की मस्मिलित चिहित्सा की जानी है। इसमें सबद्वादि बर्च का प्रयोग विधेष उपयोगी है।

३. वात-मफल गुल्म में यातज एवं मफल गुल्म की मिश्रित विकित्सा की जाती है। इसमें हिग्वादि चूलें या हिग्वादि चटी का विदेश रूप से प्रयोग होता है। गुल्मकालानल रस हरें के जुलें के माथ देना चाहिए।

४ पित्त-फफज गुरम में पित्तज बोर कफज गुरम की संयुक्त चिकिस्सा की जाती है। इसमें प्रवालपंचामृत विदोष छाभकर है।

समिपातज गुल्म चिकित्सा

१ यद्यपि सन्निपातज गुरम असाध्य कहा गया है, फिर भी रोगी जब तक जीवित रहे, चिक्तिसा अवस्य करनी चाहिए।

१ (क) व्यामिश्रिलिहानपरांस्तु ग्रहमाखीनादिशेदीपथकल्पनार्थम् । च० चि० ५

⁽ ख) व्यामिश्रदीपे व्यामिश्र एप एव मियाक्तम । च० चि० ५।६४

२. (क) यानदुच्छ्वसिति घाणी यावद् भेषजमित च। वानधिकित्सा कराच्या देवस्य कुटिला गति॥

⁽ख) सुन्निपातोद्भवे गुरुमे निदीपध्नो विधिदित । भै० र०

सिद्ध योग—काकायन वटी २-२ गोली ४ बार ऊँटनी के दूध के साथ देने से लाभ होता है।

वज्रक्षार या गुल्मकालानल का उचित मात्रा मे प्रयोग करना फलप्रद होता है। वचादि चूणें, अभयादि वटी और दन्तीहरीतकी का प्रयोग उपयोगी है। इसी प्रकार नागेश्वर रस, गुल्मशादूंल रस, प्राणवल्लभ रस का प्रयोग उपयुक्त है। त्रिदोषज गुल्म मे उक्त औषघो के साथ वर्षणादि क्वाथ (शा० स०) पिलाना अधिक कल्याण-कारक है।

रक्तज गुल्म का चिकित्सासूत्र

- 9. रक्तज गुल्म की चिकित्सा १० महीने के बाद करे, जिससे गर्भ होने का सन्देह मिट जाय और रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुखसाध्य होता है—'रक्तगुल्मे पुराणत्व सुखसाध्यस्य लक्षणम्'—इस उक्ति का बनुसरण भी हो जाय।
- रं रुग्णा का स्नेहन-स्वेदन कराकर एरण्ड तैल या चरकीक्त मिश्रकस्नेह का स्निग्ध विरेचन देवे।
- ३. गुल्म को शिथिल करने के लिए उपयुक्त मात्रा मे पलाशक्षारघृत का प्रयोग करे।
- ४ लहसुन, त्रिकदु, यवक्षार युक्त तीक्ष्ण मद्य और मछली आदि का प्रयोग करावे।
- ५. योनि-विशोधनार्थं पलाशक्षार और सेंहुड के दूध की भावना देकर योनि में सिधरी मछली रखे।
- ६. गुल्मभेदनार्थं दूध, गोमूत्र और क्षार से युक्त दशमूल क्वाथ की उत्तरविस्ति देनी चाहिए।
- ७ रक्त के प्रवृत्त हो जाने पर पथ्य मे भात और मासरस देना चाहिए। पीने के लिए नई सुरा देनी चाहिए।
 - ८ अधिक रक्तस्राव होने लगे तो रक्तिपत्तनाशक उपचार करना चाहिए।
- ९. रक्त की अतिप्रवृत्ति से उत्पन्न वातप्रकोप मे वातनाशक घत-तैल का अभ्यग करे। भोजन मे मासरस का प्रयोग करे और भोजन के पूर्व अम्लद्रव्य से सिद्ध घत का पान करना चाहिए।
 - १० रक्तप्रवाह अधिक हो, तो उसे तुरन्त वन्द करने का उपाय करे।
 - ११ हृदय-बलवर्धंक औषघो का प्रयोग करे।
 - १२ रक्तवरोधार्यं तिक्तद्रव्य-साधित जीवनीयघृत की उत्तरवस्ति दे।
 - १३ रूझ, विदाही अन्नपान, व्यायाम, मैथुन और चिन्ता से रोगी को मुक्त रखे।
- १४ यदि ज्वर, अरुचि, श्वास, कास, शोथ, कृशता आदि, जो रक्तज गुल्म के जपद्भव हैं, इनमें से कोई हो जावे, तो उसके अधिकार की औषधो का प्रयोग करे।

रक्तज गुल्म की चिकित्सा

१ चित्रकमूल, पिपरामूल, करंज की छाल, देवदाए बुरादा और भारंगी के समभाग का ३ प्राम पूर्ण काले तिल के २५ प्राम पूर्ण और गुढ के साथ प्रतिदिन प्रात, साथ, मध्याह साने से रक्तज गुल्म नष्ट हो जाता है।

२ रज प्रवर्तक नवाय—५० प्राम काला तिल हेकर गवाय बनाकर, उसमे २५ प्राम पुराना गुड, २ प्राम त्रिकटु पूर्ण, ३ प्राम भुनी होग और ३ ग्राम भारगी पूर्ण मिलाकर प्रतिदिन प्रात काल रोबन करने से रक्तगुल्म का रक्त योनिद्वार से बाहर निकल जाता है।

इसके सेवन से इका मामिक सुल जाता है और कटियूल एव गर्भासयमूल समाप्त हो जाता है।

३ गोरसमुण्डो के फूल ३ ग्राम, वदालोचन ३ ग्राम और मिश्री का पूर्ण ३ ग्राम तथा मधु ३ ग्राम मिलाकर प्रात न्याय देते रहने से रक्तज गुल्म एवं गर्भादाय विकार दूर होते हैं।

सिद्ध औषध योग

१. स्तुहीसीर गुटिका (रसतन्त्रसार) २-२ गोली सबेरे, दोवहर, ज्ञाम जल से दे। रोगिणो को पका पपीता प्रतिदिन १ किलो २-३ बार मे लिलावे। इस प्रयोग के लगातार ३-४ माह करने से रक्तज गुल्म नष्ट हो जाता है।

२ पत्थानन रस (निकित्मातत्त्वप्रदीव भाग २) १ गोली प्रतिदिन प्रात औवले के रस या इमली के पत्ते के रस के साथ दें। भोजन के साथ दही-मट्ठा देना आवश्यक है।

रे प्राणवल्लम रस (चि०त०प्र०) १-२ गोली रुग्णा के दारीर-बल के अनुसार मधु से दे।

४. दन्त्यादि गुटिका, पलादाग्रन, गुल्मकुठार और फुमार्यामय का प्रयोग रक्तगुल्मनाग्रक है।

बाह्य उपचार

१. रज प्रवर्तनी वर्ति (र० त० मा०) को योनि मे घारण करने से रज स्नाव होकर रक्तज गुल्म नष्ट हो जाता है।

र भुने हुए तिल को यूहर के दूध में ३ घण्टे खरलकर वर्ति वनाकर या भुने हुए तिल और पलाश की राख को गुरु की चासनी में मिला वर्ति बनाकर योनि में धारण करने से रक्तगुल्म फूटकर रक्तस्राव होने लगता है।

रे सूबर या मछली के पित्त में छोटे कपडे के दुकडे को मिगोकर योनिमुख में धारण करने से रक्तस्राव होकर गुल्म दूर होता है।

अधिक रक्तस्राव होने पर

१ नागकेसर, कमलकेसर और खूनखरावा का चूर्ण १--१ ग्राम, २० ग्राम मक्खन और मिश्री १० ग्राम मिलाकर देने से रक्तस्राव वन्द हो जाता है। २ सिंघाडे का भूर्ण १० ग्राम और मिश्री मिलाकर गोदुग्ध से दिन में ३-४ बार देना चाहिए।

सिद्ध औषध

बोलबद्धरस, प्रवालिपष्टी, शखभस्म, शुक्तिमस्म, चन्द्रकला रस, दूर्वादि धृत, सूतशेखर रस, इनका उचित मात्रा मे मिश्री-मक्खन या दूध के साथ प्रयोग करना चाहिए।

व्यवस्था-पत्र

 प्रात , साय, मध्याह्न स्नुहीक्षीर गृटिका २–२ गोली

जल से।

अथवा

रज प्रवर्तनी वटी ३ गोली

काकायन वटी ६ गोली

शूलविष्त्रणी वटी <u>६ गोली</u> ३ मात्रा

.

रज प्रवर्तक क्वाय से।

२ भोजन के पूर्व २ बार

हिग्वादि चूर्ण ६ ग्राम

२ मात्रा

उष्णोदक से।

३. भोजनोत्तर २ बार

कुमार्यासव २५ ग्राम

समान जल मिलाकर पीना।

४. रात में सोते समय

वैश्वानर चूर्ण ५ ग्राम

उष्णोदक से ।

सामान्य पथ्य

एक वर्षं का पुराना अगहनी चावल, जो, गेहूँ की दिल्या, अरहर या मूगकी दाल का यूष, कुल्यी का यूष, पपीता पका यदि कच्चा हो तो सब्जी, वयुआ, पतली मूली, वैगन, सिहजन की फली, सूरण, जागल पशु-पिक्षयों का मास, लहसुन, अदरक, कागजी नीबू, हीग, सोठ, मरिच, पीपर, अजवायन, जीरा, मगरैला, आंवला, पोदीना, गाय या वकरी का दूध या महा, उष्ण, लघु, अग्निप्रदीपक और वातानुलोमन आहार गुल्मो में पथ्य है।

विशिष्ट पथ्य

वातज गुल्म मे पुराना जी, गेहूँ और अगहनी का चावल, जगली तीतर, गोर, मुर्गा और बटेर का मांस, घृत, गुरु, स्निग्ध तथा उष्ण आहार पथ्य है।

पित्तज गुल्म मे पुराना अगहनी चायल, भूग की दाल, परवल, अगूर, मुनक्का, किसमिस, राजूर, अनार, बकरी या गाय का दूध, गन्ने का रस, अविले का मुख्या, हरें का मुख्या, गरम करके शीतल किया हुआ जल और मधुर पदार्थ पथ्य है।

कफल गुल्म मे पुरानां वगहनी चायल, पुराना साठी चायल, पुराना जी, गेहूँ, बुलची या मूग का यूप, पतली मूली, जगली पद्म पक्षियों का मास, तक्र, बदरक, सार, कटु एव तिक्त रस याले पदार्थ पच्य हैं। अजवायन, विजीरा नीवू, पुरानी सुरा, ये सब हितकर हैं।

रक्तज गुल्म में पित्त के समान इमका पथ्य है। तिल, धार, मदा (तीक्षण), गृह, तैल, मछनी, मिचं, जांगल मांस एव उष्ण बाहार पथ्य है। रक्तरताव में रक्त-पित्तवत् उपचार पथ्य है।

अपध्य

वातप्रकोपक आहार, विरुद्ध भोजन, घुष्क मांस, मटर, सेम, रूक्ष अप्न, अरवी आदि कन्दराक, घुष्क रााक, अधिक धीसल जल पीना, मल-मूत्र तथा अधी वायु के वेग को रोकना, रात्रिजागरण, अधिक परिश्रम, अधिक भैथुन, वमन कराना और अधारणीय वेगों को धारण करना आदि अपन्य हैं।

त्रयोदश अध्याय क्रमिरोग, अर्शरोग एवं रक्तार्श

कृमि शब्द का निवंचन

'क्रीणाति हिनस्ति इति कृमि । कृमि शब्द की उत्पत्ति 'कृब् हिसायाम्' (क्रयादिगण-सिद्धान्तकीमुदी) धातु से है, जिसका अर्थं मारना या घातक प्रभाव डालना है।

आचार्य यास्की ने कृमि शब्द का निर्वचन ३ प्रकार से किया है-

- (१) क्रव्ये मेद्यति (इति कृमि) अर्थात् कच्चे मास (क्रव्य) में पुष्ट (मेदन) होने वाला।
- (२) क्रमतेर्वा स्यात् सरणकर्मेण, अर्थात् सरक कर चलने वाला। 'क्रमु पाद-विक्षेपे' (भ्वादिगण-सिद्धान्तकौमुदी) घातु से कृमि शब्द बना है।
- (३) कामतेर्वा, अर्थात् इच्छा क्रने वाला । 'कमु कान्ती' (भ्वादिगण) घातु से कृमि शब्द बना हैं । यहाँ कान्ति का अर्थ इच्छा है ।

अथवंवेद मे कृमि-वर्णन

अथर्ववेद मे कृमियो के पचासो नाम ऐसे हैं, जिनसे कृमियो के कार्य, रूप-रग आदि का ज्ञान होता है। जैसे---

•	•	
अत्रिण	अथर्ववेद ६।३२।३	भक्षण करने वाले कृमि ।
अन्वान्त्र्य	,, २।३१।४	र्वांतो मे रहने वाले।
असृक्पावा	,, २।२५।३	रक्त पीने वाला । ¯
उदुम्बल	,, ८१६१९७	मारक।
एजल्क	,, ५।२३।७	कँपाने वाला ।
यातुमान्	,, १।७।४	पीडा देने वाला ।
शीर्षंण्य	,, रा३११४	शिर मे रहने वाला आदि।

ऐसे और भी अनेक कृमियो का वर्णन है, जो जल, दूध, भोज्य पदार्थ आदि में निवास करते हैं एव मानव-देह मे रोग की उत्पत्ति करते हैं। इन कृमियो का सूर्यकिरण, अग्नि, गुग्गुलू, पीलू, धातकी, जटामासी, कूठ, पीपर, वट आदि से विनाश होना बतलाया गया है। यह वर्णन ८० ऋचाओं में किया गया है।

१ निरुक्त ६।१२

२. (क) यो मा पिशाचो अशने ददम्म-अथवै० ५।२९।६

⁽ख) क्षारे मा मन्ये यतमो ददम्म- ,, ५।२९।७

⁽ग) ये अन्नेषु विविध्यति पात्रेषु पिबतो जनान्—यज्जु० १६।३२

⁽ घ) अथो संतीन कङ्कत —ऋग्वेद १।१९१।१

⁽ ङ) शृङ्गात् कुल्मलान्निखोचमह विषम्—अथवै० ४।६।५

कृमि-विषयक आप्तोपवेश

अयर्वेदेद में कृमियों के लिए राक्षस, रक्ष, पिशाच, यातु, यातुधान, किमिदी, गन्धवं, अप्सरा आदि राव्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के व्याख्यान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये शब्द कृमि के पर्याय हैं। जैसे—

रस या राक्षत: 'रक्षो रक्षितव्यमस्माद् रहित क्षणोति इति वा रात्रौ नक्षत इति वा' (निक्त ४।१८) अर्थात् इतसे वचना चाहिए। यह एकान्त मे मारता है और रात्रि मे चलता है।

पिशाच : 'पिशित मांसमाचामित इति पिशाच' (वाचस्पत्य कोप) अर्थात् कच्चे मांस को स्नाता है।

बातु : 'यातु गन्ता गमनशील ' अर्घात् चलनेवाला फ़र्मि ।

यातुष्ठान : 'यातु वेदना दधित इति यातुष्ठाना ' यातना या पीडा पहुँचानेवाले कृमि ।

किमिदी : 'किम् इदानीमिति चरते' (निरुक्त ६।११) छिद्रान्येषण करने-वाला—मौकापरस्त पिद्युन कृमि ।

गन्धर्व ' 'अघो गन्धेन वा रूपेण वा गन्धर्वाप्सरसभ्रवन्ति' (दातपयन्नाह्मण ९।४।९।४) गन्ध पर या सुन्दर रूप पर लुब्ध होनेवाले कृमि ।

अप्तरा : 'अप्सु सरन्तीति अप्सरसं' (शतपथ० १०।५।२।२०) 'अप्सरा अप्सारिणी भवति' (निरुक्त ५।१३) जल मे सञ्चरण करनेवाले कृमि ।

उक्त सन्दर्भों पर विचार करने से यह विश्वास होता है, कि सहस्रो वर्ष पूर्व प्राचीन महिषयों को कृमिज रोगों का पूर्ण ज्ञान था। वे दृश्य और सूक्ष्म होने से अदृश्य इन दोनों कृमियों को जानते रहे हैं। वर्तमान में अणुवीक्षण यन्त्र से सूक्ष्म कृमि भी दृश्य हो गये हैं। रक्त के अन्तर्गत पाये जानेवाले कृमियों को माइक्रोस्कीप से देखकर मलेरिया, फाइलेरिया आदि अनेक प्रकार के सक्रामक रोगों के जनक जीवाणु या विषाणु पहचाने जाते हैं।

सहिता-प्रन्थों में स्वतन्त्र रूप से कृमिज रोगों के निदान और चिकित्सा के अध्याय हैं। प्रकीण (विखरे हुए) कृमिजन्य रोगों का भी वर्णन उपलब्ध होता है। विस्तृत अध्ययन के इच्छुक जिज्ञासुओं को अघोलिखित ग्रन्थों के सन्दर्भों को देखना चाहिए।

सन्दर्भ प्रन्थ

चरकसिहता सूत्रस्थान अध्याय १७ मे कृमिज शिर शूल एव कृमिज हृदयरोग।

- ,, ,, ,, १९ मे बीस कृमि जातियाँ।
- ,, विमानस्थान ,, ७ मे विस्तृत कृमिवर्णन ।
- ,, चिकित्सास्थान ,, २६ मे कृमिज हृदयरोग एव शिरोरोग का वणन । सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र ,, ५४ मे कृमिरोग निदान-चिकित्सा है ।

अष्टाङ्गहृदय निदानस्थान ,, १४ मे कृमिरोग का निदान है।

- ,, विकित्सास्थान ,, २० मे कृमि विकित्सा है।
- ,, उत्तरतन्त्र ,, २४ मे कृमिज शिरोरीग चिकित्सा है।

माधवनिदान के कृमिनिदानप्र० मे हृदयरोग निदान और शिरोरोग निदान में कृमिज हृद्रोग एव कृमिज शिरोरोग वर्णन ।

कृमियों के प्रकार

चरक ै	सुश्रुत	वाग्भट
(क) कर्मभेद से-२	(क) कारणभेद से३	(क) स्थानभेद से-२
१ सहज (प्रकृत)	१. कफज	१ बाह्य
२ वैकारिक	२ पुरीषज	२ आभ्यन्तर
(ख) स्थानभेद से२	३. रक्तज	(ख) निदानभेद से-४
१ बाह्य	(ख) नामभेद से-२०	१ मलज (वाह्यमलज)
२ आभ्यन्तर	बीस प्रकार	२. कफज
(ग) कारणभेद से-४	नोट-सुश्रुत ने बाह्य-	३. रक्तज
१. पुरीषज	आभ्यन्तर भेद नही	४. पुरीषज
२ कफज	माना है।	(ग) नामभेद से-२०
३. रक्तज	1	वीस प्रकार
४. मलज		
(घ) नामभेद से-२०		
बीस प्रकार		

संहिता-प्रन्थों से कृमियो के नाम और उनकी संख्या

चरकसहिता ^२ बाह्यकृमि	सूत्र १९	सुश्रुतसहिता उ०त० ५४ बाह्यक्रमि	अष्टाङ्गहृदय निवा बाह्यकृमि	न १४
युका			यूका	
 पिपीलिका	२		लिक्षा	7
रक्तज कृमि		रक्तजृष्टमि	रक्तज कृमि	
केशाद		केशाद	केशाद	

१ इह खल्विनवेश ! विश्वतिविधाः किमय पूर्वमुदिष्टा नानाविधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहः जेम्य । ते पुन प्रकृतिभिभिष्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति, तथथा—पुरीवजा, श्रेष्मणाः, शोणितजा, मलजाश्चेति । चरक० विमान० अ० ७


अत्र चक्रपाणि , अन्यत्र सङ्जेभ्य इत्यनेन शरीरसङ्जास्त्ववैकारिका विशतेरप्यधिका मवन्तीति

दर्शयति ।
 २. 'विश्वति कृमिजातय इति यूका पिपीलिकाश्चिति द्विषा बहिमँलजा, केशादा लोमादा लोमादी लोमादीपा सीरसा कीदुम्बरा जन्तुमातरश्चेति पट् शोणितजा, अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादाश्चरवे दर्भपुष्पाः सीगन्धिका महागुदाश्चेति सप्त कफजा, क्रकेश्का मकेश्का लेलिहाः सश्कात सीग्ररा दाश्चेति पञ्च पुरीपजा । वरक० सत्त० १९

लोमाद	1	रोमाद	í	लोमविघ्वस	
लोमद्वीप		नदाद	1	उदुम्बर	
सौरस	1	दन्ताद		लोमद्वीप	
बौदुम्बर		किविकश		सौरस	
जन्तुमाता	Ę	कुष्ठज और परिनर्प	9	जन्तुमाता	Ę
कफज कृमि		कफज कृमि	1	कफज कृमि	
अन्त्राद		दर्भपुष्प	- 1	अन्त्राद	
उदरावे प्ट	1	महायुष्प	Ì	उदरावेप्ट ,	
हृदयाद		प्रलून		हृदयाद	
चुरु	I	निपिट	- (महागुद	
दर्भपुष्प		पिपीलिका		चु रु	
सौगन्धिक		दारुण	Ę	दर्भेकुसुम	
महागुद	v			सुगन्ध	હ
पुरीयन कृमि		पुरीयज कृमि		पुरीयज कृमि	
ककेरक		अजवा	- [क्रकेरक	
मकेरक		विजवा	1	मनेच्य	
लेलिह		किप्य		सीसुराद	
सञ्जलक		चिप्य	1	सलून	
सोसुराद	4 70	गण्टूपद	1	लेलिह	4
	२०	चु रु			२०
		हिमु ख	৬		
			२०		

आचारं चरक ने कहा है, कि जिन २० प्रकार के विभिन्न कारणो से उत्पन्न कृमियों का वर्णन (चरक० सूत्र० अ० १९ में) किया गया है, वे कृमियां सहज कृमियों के अतिरिक्त हैं (अन्यत्र सहजेम्य)। चक्रपाणि ने कहा है, कि घरीर के साथ उत्पन्न कृमियां रोगोत्पादक नहीं होतीं, वे अवैकारिक होती हैं। ये कृमियां घरीरधारक होती है, अतएव रोगाधिकार में सहज कृमियों का उच्छेच्च नहीं किया गया है। मधुकोषकार ने भी यही मत व्यक्त किया है, कि चूंकि वे अवैकारिक हैं इसलिए कृमिज रोग-वर्णन के प्रसङ्ग में उनका नाम नहीं लिया गया—'ते चावै-कारिकत्वेन रोगाधिकार नोच्यन्ते'। इस प्रकार मूलकप से कृमियों का वर्गीकरण निम्नाइत है—

१ 'इह खरवग्निवेश ! विश्वतिविधा क्रिमय पूर्वमुद्दिष्टा नानाविधेन प्रविभागेनान्यन्न सहजेम्य ते पुन प्रकृतिभिभिद्यमानश्चतुर्विधा भवन्ति'। च० वि० ७



परिचय —शरीर के बाहरी मल से एवं स्वेद आदि से उत्पन्न होनेवाले कृमियो को बाह्य (मलज) कृमि कहते हैं।

निदान—शरीर की त्वचा को स्वच्छ न करने से, स्नान नहीं करने से, उबटन या साबुन आदि लगाकर अगो को रगडकर साफ न रखने से या मिलन वस्त्र धारण करने से त्वचा में या वालों में कृमियों की उत्पत्ति होती है। स्वच्छता का अभाव इसका प्रमुख निदान है।

स्थान—शिर के बाल, दाढी-मूँछ के वाल, रोम या रोमकूप, पलक या वरौनी के बाल, काँख के बाल और गन्दे पहने गये वस्त्र इन बाह्य कृमियों के निवास-स्थान हैं।

संस्थान या आकृति—ये बहुत छोटे होते हैं। कोई तिल के आकार के और अनेक पैरवाले कृमि होते हैं।

वर्ण-ये कृमि कोई काले और कोई खेत वर्ण के होते है।

नाम-इनका नाम यूका (जूएँ) और पिपीलिका या लीख है।

प्रभाव या लक्षण—खुजली होना, चकत्ते होना, ददोरे पड जाना, गाँठें होना या फुन्सी निकलना कृमियो का प्रभाव है। दाँतो मे कृमि होने से दन्तपूय, शूल और

१ क्रिमयस्तु द्विधा शोक्ता वाद्याभ्यन्तरभेदत ।
बिद्यन्तकारास्विद्युजन्मभेदाश्चतुर्विधा ॥
नामतो विद्यतिविधा बाद्यास्तत्र मलोङ्गवा ॥ अष्टाङ्गद्द० निदान १४

सडन होकर दाँत खोखले हो जाते है। गुदाप्रदेश में होने से गुदा में खुजली, पिडका और दाह होता है। बालों के मूल में कृमि होने से वहाँ के बाल झड जाते हैं और इन्द्रजुप्त (टुनकी) हो जाता है।

बाह्यकृमि-चिकित्सा चिकित्सासूत्र

 अपकर्षण अर्घात् त्वचा, वाल या आक्रान्त स्थान से खीचकर कृमियो को निकालना चाहिए।

२ प्रकृतिविधात अर्थात् बाहार-विहार, जो कृमियो के अनुकूल पहते हैं—
जैसे मधुर एवं अम्ल पदार्थों का खाना, गुड और मिठाई खाना, शवंत-लस्सी
आदि पीना, मालपूबा या पकौडी आदि खाना, स्नान न करना, मिलन वस्त्र
धारण करना और दिन मे सोना इत्यादि—इन सबके विपरीत रस-गुण वाले कटु,
तिक्त और कपायरस-प्रधान भोज्य तथा पेय का प्रयोग करना, शरीर पर इन्ही
रसोवाले द्रज्यों का लेप करना, अम्यग करना और कटु-तिक्त-कपाय द्रज्यों के क्वाय
से शरीर का परिमार्जन या स्नान करना चाहिए।

३ निदान परिवर्जन अर्थात् जिन कारणो से बाह्यकृमि उत्पन्न होते हैं, उन कारणो का परित्याग करना चाहिए। मृजा-परिवर्जन (स्वच्छता न रसना) बाह्यकृमि का प्रमुख निदान है, इसलिए इसे छोडकर दारीर की त्वचा, रोम, बाल और धारण किये जानेवाले वस्त्रो की सावधानी से सफाई करनी चाहिए। स्नान नियमित रूप से करना चाहिए। शिर के बाल, कक्षा, दाँत, कान आदि को स्वच्छ रखना चाहिए।

चिकित्सा

- 9 घतूरे के पत्तों के रस अथवा पान के पत्तों के रम को पारा या कपूर मिलाकर एक कपडे के दुकडे पर लेप करें और उस कपडें को शिर पर बाँघकर रात में सो जावे। प्रात काल वालों को घोने पर सब यूका या लीख मरकर निकल जाते हैं।
- २. पलामवीज, इन्द्रजी, वायविटग, चिरायता और नीम के सूसे पत्ते समभाग लेकर धतूरे के पत्रस्वरस के माथ पीसकर अन्यग या छेप करने से त्वचा या वालो के कृमि नष्ट हो जाते हैं।
- ३ विदङ्ग तैल-कडवा तेल २५० ग्राम, गोमूण ४ लीटर और वायविहग, गन्धक तथा मन शिला प्रत्येक २५ ग्राम का कृत्क डालकर विधिवत् पकाये गये तेल को शिर मे लगाने से यूना और लीख नष्ट हो जाते हैं।
- ४ धुस्तूर तैल-धतूरे के पचाङ्ग कां कल्क २५० ग्राम, सरसो का तेल १ लीटर और घतूरे के पत्ते का रस ४ लीटर डालकर पकाये हुए तेल की मालिका से वालो के जुँए, लीख तथा त्वचा के कृमि नष्ट हो जाते हैं।
 - ५ राल का धुँआ देने से घर मे मनिखयाँ नही रहती है।

- ६ करञ्जतैल, निम्वतैल और कडवी तरोई का कल्क एक में मिलाकर लेप करने से शिर या त्वचा के कृमि नष्ट हो जाते हैं।
- ७ वच को पीसकर वालों में लेप करने से यूका या लीख नष्ट होते हैं। इसी दृष्टि से जटा-जूट रखनेवाले साघुजन अपनी जटा में वच का दुकड़ा गाँधते हैं।
 - ८ निम्बवीज पीसकर अभ्यग करने से कृमि नष्ट हो जाते हैं।
- ९ दन्तकृमि मे फटकारी (रेंगनी) अथवा इन्द्रवारुणी के फल को घी में पीसकर निर्धूम अग्नि पर डालकर नली द्वारा दौत मे धुँआ लगाने से दौती के कृमि नष्ट हो जाते हैं।
- १०. इन्द्रवारुणी (इन्द्रायन) की जह या कहवी तरोई के फल को चन्दन की तरह पीसकर गुदा के बाहर लेप करने से गुदा की खुजली, सूजन और पीडा नष्ट होती है।
- ११. वालको की गुदा मे कृमिज कण्डू होने पर घुस्तूर तेल, विडंग तेल या जैतून का तेल लगाना चाहिए।
 - १२. वायविडभ को पीसकर लेप करने गुदा की कण्डू मिटती है।
- १३ कृमिध्न माहेश्वर घूप—राई, सरसो, नमक, गूगल, कुदरू, वच, वायविढंग और नीम के पत्ते समभाग लेकर कूटकर रख ले। १०-१० ग्राम लेकर अग्नि मे डालने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सूक्ष्म कृमियाँ भाग जाती हैं।
- 9 अपराजित धूप--गूगल, अगर, रोहिसघास, नीम के पत्ते, मदार के पत्ते, वच और राल तथा दारुहल्दी के समभाग चूर्ण को आग पर रखकर धुँआ देने से कृमि नष्ट हो जाते हैं।
- १५. लाक्षावि धूप—लाक्षा, मिलावा, श्वेतचन्दन, सफेद अपराजिता, अर्जुन का ,फूल, वायविडग, राल और गूगल इनको समभाग लेकर कूटकर रख लेवे। इसका धुँमा देने से साँप, चूहे, मच्छर, खटमल, जुँए, लीख आदि नष्ट हो जाते हैं या स्थान छोडकर भाग जाते हैं।

आभ्यन्तर कृमि

आभ्यन्तर कृमियो मे-- १ रक्तज, २ कफज और ३ पुरीषज इन तीन प्रकार की कृमियो की गणना की जाती है।

रक्तज कृमि

निवान—रक्तज कृमियों के उत्पन्न होने का कारण कुछ के ही समान है। वात-पित-कफ, ये तीनो दोप और त्वचा, लसीका, रक्त और मास, ये चार दूष्य—ये सात सामूहिक रूप से कुछ के जनक सिन्नकृष्ट निदान हैं।

१ शोणितजानां तु खल्ज कुछै समान समुत्थानम् । च० वि० ७।११

२ सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिविकृतिमापन्नानि भवन्ति । तद्यथा—त्रयो दोषा वातिपिर क्षेष्माण प्रकोपणविकृता , दूष्याश्च शरीरधातवस्त्वरूमासशोणितचतुर्या दोषोपघातविकृता इति । च० नि० ५।३

विरुद्ध आहार रिक्तज कृमियों का प्रमुख कारण होता है। शरीर की धातुओं के विषय हो जाते हैं। ऐसे द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुणविरुद्ध होते हैं, जैसे—दूध के साथ मछली को नहीं खाना चाहिए। क्यों कि ये दोनों मधुर रस, मधुर विपाक और महा-अभिष्यन्दी हैं। दोनों क्रमश शीत और उष्णवीर्य होने से विरुद्धवीर्य हैं, अतएव ये रक्त को दूषित करने वाले होते हैं और महा-अभिष्यन्दी होने के कारण दोष, धातु और मल के मार्गों को अवरुद्ध करने वाले होते हैं।

इसी प्रकार संयोगविरुद्ध, संस्फारविरुद्ध, देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, भाष्राविरुद्ध, प्रकृतिविरुद्ध, सात्म्यविरुद्ध और स्वभावविरुद्ध (उडद, सर्पपशाक, भेड का दूध) आहार का सेवन रक्तज कृमि का जनक होता है।

अजीण की स्थिति में भोजन करने से और पत्ते वाले शाकों के अधिक सेवन से रक्तज कृमि उत्पन्न होते हैं। र

स्यान - इनका स्यान रक्तवाहिनी सिरा-धमनियाँ हैं।

संस्थान या आफ़ति--ये सूक्ष्म, गोल और पाद रहित होते हैं। कुछ कृमि ऐसे होते हैं, जो अति सूक्ष्म होने से अदृश्य होते हैं।

वर्ण-ये ताम्र जैसे लाल रंग के होते है और कुछ कृमि कृष्ण वर्ण के चिकने और चपटे होते हैं।

नाम—नामत ये सख्या में छह होते हैं—१. केशाद—केशो को खा जाने वाले, २ लोमाद—रोमो को खा जाने वाले, ३ लोमादीप—रोगो के मूल में आश्रय लेने वाले, ४ औदुम्बर—गूलर जैसी गाँठ में पैदा होने वाले तथा ५ तन्तुमाता—एक विशेष जाति के जन्तु (मिक्षका) के बैठने से उत्पन्न होने वाले।

प्रभाव — केश, श्मश्रु (दाढ़ी), लोम, पक्ष्म (वरौनी) और नख का गिराना कृमियों का प्रभाव है। जब ये कृमि व्रण में होते हैं, तो रोमान्त, खुजली, सूई चुभाने जैसी वेदना और आक्रान्त स्थान में रेंगने जैसा अनुभव होता है। जब ये अधिक बढ जाते हैं, तब त्वचा, सिरा, स्नायु, मास और तक्णास्थियों (Cartilage) को खा जाते हैं। ये कुष्ठ उत्पन्न करते हैं तथा रक्त को आश्रय बनाकर होने वाले विसर्प, पिडका, कोठ, चमंदल आदि रोगों को पैदा करते हैं। ४

१ वैरोधिक आहार परिभाषा—'देहधातुप्रत्यनीकभूतानि द्रव्याणि देहधातुभिविरोधमापद्यन्ते, परस्परगुणविरुद्धानि कानिचित्, कानिचित् सयोगात्, संस्कारादपराणि, देशकालमात्रादिभिश्चा पराणि तथा स्वमानादपराणि'। चरक० सूत्र० २६।८१

२ विरुद्धाजीर्णशासाचे शोणितोत्था भवन्ति हि । सुश्रुत० उ० त० १४।१८

३ स्थान—रक्तवाहिन्यो धमन्य, संस्थानम्—अणवो वृत्ताश्चापादाश्च, सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्त्यदृश्या, वर्णं —ताम्र, नामानि—केशादा, छोमादा, छोमादा, सीरसा, भीदुम्बरा, जन्तुमातरश्चेति। च० वि० ७।११

४ ''प्रभाव —केशरमश्रुनखलोमपद्मापध्वस , त्रणगतानां च द्दर्पकण्डूतोदसंसर्पणानि, अति-चृद्धानां च त्वक्सिरास्नायुमांसत्तरुणास्थिमक्षणमिति । चरक० वि० ७।११

२२ का० दि०

चिकित्सा—रक्तज कृमियो की चिकित्सा कुष्ठरोग के समान करनी चाहिए। चरकसहिता में चिकित्सास्थान के सातवें अध्याय में कुष्ठ-चिकित्सा का वर्णन है।

सुश्रुताचार्य ने भी रक्तज कृमियो तथा तज्जन्य रोगो की कुष्ठवत् चिकित्सा बतलायी है। विशेषकर कृमियो तथा तज्जन्य रोगो को नष्ट करने के लिए सुरसादिगण की औषधियों के कल्क, स्वरम और क्वाय का अभ्यग, पान, भोज्य पदार्थ का निर्माण और स्नान में प्रयोग करने का उपदेश किया है।

१. अपकर्षण २ प्रकृति-विधात और ३ निदानपरिवर्जन करना चाहिए। यथावश्यक संशोधन और संशमन उपचार भी करणीय है।

कफज कृमि २

निवान—कफज कृमि दूध, गुड, तिल, मछली, आनूप मास, पिसे हुए चने या उदद के बने पक्षीडे या बडे, गीर, बर्रे के तेल मे बने पदार्थ खाने से, अबीर्ण रहने पर भोजन करने से, सडे-गले भोजन, दूषित पदार्थ युक्त भोजन, विरुद्ध भोजन और असात्म्य भोजन से उत्पन्न होते हैं। दही, सिरका आदि खाने से भी कफज कृमि उत्पन्न होते हैं। 3

स्थात—इनका स्थान आमाशय है। ये कृमि वढ कर आमाशय से ऊपर की ओर सरक कर चले जाते हैं। कदाचित् ऊपर-नीचे दोनो तरफ चलने लगते हैं।

संस्थान या आकृति—इनमे से कोई मोटे चमडे की डोरी के आकार के, कोई गोलाकार लम्बे केंचुए के समान सफेद या ताम्रवर्ण के होते हैं और कोई सूक्ष्मकृमि पतले लम्बे डोरे की तरह क्वेतवर्ण के होते हैं।

वर्ण-कोई क्वेतवर्ण के और कोई तिंव जैसी ठाठी ठिये होते हैं।

नाम-9. अन्त्राद-अन्त्रों को खा जाने वाले, जो अन्त्रों में क्षत कर देते हैं,
जैसा कि आन्त्रिक ज्वर और अन्त्रक्षय में क्षत हो जाता है।

२. उदराद-उदर (आमाशय) को खाने वाले।

सुरसादिन्तु सर्वेषु सर्वथैनोपयोजयेत् ॥ स० चि० ५४।३८ एव स० ह० चि० २० सुरसादिगण—काली व सफंद तुलसी, मरुवा, अर्जन (तुकमरियान), रोहिष्यास, सगन्य पास, वनतुलसी, दवना, कसौदी, नकछिकनी, चिचिडा, वायविडग, कट्फल, काली व भेत निर्मुष्टी (मेउड), गोरखमुण्डी, मूबाकणी, मारगी, जलपिप्पली, काकमाची और कुचला।

सुरसादिगंणी होष कफहत क्रमिस्दन । सुश्रुत० स० ७।३८

^{&#}x27;षट् ते कुष्ठैककर्माणः'। अष्टाङ्गहः० नि० १४।५२

^{&#}x27;रक्ताधिष्ठानजान् प्रायो विकारान् जनयन्ति ते'। स् विव ५४

१ (क) 'चिकित्सितमप्येषां कुछै. समानम्'। चरक० वि० ७।११

⁽ख) रक्तनानां प्रतीकारं कुर्यात् कुष्ठनिकित्सितात् ।

२. चर्क० विमान० ७।१२

३ मांसमत्त्यगुडक्षीरदिधशुक्तै कफोद्भवा । सु० उ० ५४।१७

४ (क) कफादामाश्चरे जाता मृद्धा सर्पन्ति सर्वत.। अ० इ० नि० १४।४७

⁽ ख) ते प्रवर्षमानास्तूर्ध्वमधो वा विसर्पन्खुभयतो वा । च० वि० ७।१२

- ३. हृदयचर-हृदय को खा जाने वाले, जैसे कि कृमिज हृद्रोग मे ।
- ४. महागुद।
- ५ चुरु--आहार रस को चुराने वाले।
- ६ दर्भपृष्य-कृश के फूल जैसे।
- ७ सौगन्धिक—ये नासागत या शिरोगत होते हैं।

प्रभाव या लक्षण—जी मिचलाना, मुख से पानी छूटना, अरुचि, अपच, ज्वर, मूच्छी, जम्भाई आना, पीनस होना, बार-वार छीक आना, उदर मे वायु या मलाव-रोध के कारण तनाव होना, अगी मे जकडन होना, वमन होना, शरीर का दुवला होना और शरीर का रूझ होना, ये कफज कृमि के लक्षण हैं।

पुरोबज कृमि

निवान—आचार्य चरक-ने इनका निदान कफज कृमियों के समान बतलाया है। उडद के बने पदार्थ—दही-वडा जादि खाने से, पीसकर या पिट्टी बनाकर बेसन आदि से निर्मित आहार खाने से, दालों के अधिक खाने से और पत्तें वाले शाक अधिक खाने से पुरीषज कृमि उत्पन्न होते हैं।

अम्लरस वाले पदार्थ, नमकीन पदार्थ और गुड डालकर बने पदार्थ या गुड के खाने से भी पुरीषज कृमि होते हैं। 3

स्थान—इनका स्थान पक्वाशय है। जब ये अधिक नढे हुए होते हैं तो नीचे गृदा की ओर रेंगते हैं, परन्तु जब ये कृमि आमाशय की ओर आ जाते हैं, तब उस आक्रान्त व्यक्ति के डकार और निश्वास मे पुरीष की-सी गन्ध आती है।

सस्थान या आकृति और वर्णं—कुछ कृमि सूक्ष्म और गोलाकार क्वेतवर्ण के ऊन जैसे होते हैं, कुछ कृमि मोटे, गोलाकार और काले, नीले, हरे या पीले वर्ण के होते हैं।

नाम-१. ककेरक और २. मकेरक—ये आहार रस की चुराने व खाने वाले होते हैं। ३ सीसुराद, ४ लेलिइ (चाटने वाले) और ५ सजूलक (जूल-जनक)—ये पाँच नाम पुरीषज कृमियों के हैं।

प्रभाव या लक्षण—पतले दस्त होना, शरीर का दुवला होना, त्वचा का रूखा होना और रोमान्व होना इनका लक्षण है। ये उदर मे शूल, विष्टम्भ, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि और गुदा मे खुजली उत्पन्न करते हैं। ये कृमि रोगी की गुदा मे सूई चुभाने जैसी पीडा और खुजली उत्पन्न करते हुए वहाँ स्थिर हो जाते हैं। जब उनमे हुषें होता है, तो वे वार वार गृदा से वाहर निकलते हैं।

१ इल्लासमास्यस्रवणमविपाकमरीचकम् । मुर्च्छाच्छिदिज्वरानाहकार्यक्षवश्रुपीनसान् ॥ थ० इ० नि० १४।५०

२ माषपिष्टान्नविदलपर्णशाकी पुरीषजा । सु० ड० अ० ५४।१७

३. मधुरान्नगुडक्षीरदिधसक्तुनवीदने ।

शक्रजा बहुविद्धान्यपर्णशाकोलकादिभि । म० नि० १४।५६

४ (क) श्र्लाग्निमान्चपाण्डुत्विवष्टम्मवलसङ्ख्यः । प्रसेकारुचिद्वद्दोगिवङ्भेदास्तु पुरीवजे ॥ ग्रु• ७० ५४।१०

वक्तव्य

पुरीषज तथा कफज कृमि को आन्त्रिक कृमि (Intestinal worms) कह सकते हैं। इस श्रेणी मे चार प्रकार की कृमियां आ सकती हैं—-१. अकुशमुख कृमि (Hook worm), २. गण्डूपद कृमि (Round worm), ३ स्फीत कृमि (Tape worm) और ४ सूत्र कृमि (Thread worm)। इन सबका निवास-स्थान महास्रोत है।

 अंकुशमुख कृमि—इसे ही अन्त्राद कृमि कहते हैं और इनसे आक्रान्त व्यक्ति के मल में इसके अण्डे पाये जाते हैं। ये अण्डे गीली भूमि में पडे रहकर दो-तीन दिन में लार्वा का रूप पकड लेते हैं। बाद में इनका और भी रूपान्तर होता है। इस अवस्था मे वे तीन-वार मास तक जीवित रह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर नगे पैर जाता है, तो ये लार्चे या इल्लियां उसकी पैर की त्वचा के द्वारा अन्दर प्रविष्ट होकर लसीकावाहिनियो या सिराओ द्वारा हृदय के दक्षिण निलय मे पहुँच जाती हैं। वहाँ से रक्त द्वारा फुप्फुस तथा फुप्फुस से कण्ठनाडी (Trachea), अन्नप्रणाली (Oesophagus) तथा अन्ततोगत्वा अपने निर्दिष्ट स्थान पन्धमानाशय (Duodenum) मे आकर ठहर जाती हैं। दो सप्ताह मे इनके आकार मे वृद्धि हो जाती है एव लगभग चार सताह मे पूर्ण पुष्ट हो जाती हैं। यहाँ रहकर स्त्रीकृमि गर्भवती होकर अण्डे देती है, जो कि मल द्वारा निकलकर पुन पूर्वोक्त प्रकार से अपना स्वरूप धारण करके उपसर्ग या संक्रमण में सहायता करती हैं। इन कृमियो का मुख अकुश के समान होता है और इन अकुशो के द्वारा ये अन्त्र की दीवार में चिपकी रहती हैं तथा रक्त का पान भी करती रहती हैं। जिसके फलस्वरूप रक्तक्षय होकर पाण्डुता हो जाती है। तब रक्त मे शोणाश (Haemoglobin) की अत्यधिक कमी हो जाती है एव रक्तकणों की सख्या बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हृदयप्रदेश मे पीडा, श्वासकृष्छ्ता, विवर्णता तथा मुख और शरीर मे रूक्षता हो जाती है।

(२) गण्डूपद कृमि (Round work)—इसे महागुद भी कहते हैं। इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को जबर रहता है, जो अनियत या सन्तत स्वरूप का भी हो सकता है। यह प्राय बच्चो में होता है। रात्रि में सोते समय दाँत कीरना (बजाना) इसका मुख्य लक्षण है। रोगी व्यक्ति के मल से निकले हुए अण्डों से पुक्त खाद्य प्यापं के सेवन से स्वस्थ व्यक्ति के अन्तर में ये पहुँच जाती हैं। आमाजय के अम्लरस से उनके ऊपर का आवरण गल जाता है, तब ये स्वतन्त्र होकर यकृत में होते हुए सिरा द्वारा हृदय में और वहाँ से अकुशमुख कृमि की ही भाँति फुल्फुस में जाकर पुट्ट होती हैं। वहाँ से पुन आमाजय में आकर वे अन्तर में प्रविष्ट होती हैं। यहाँ

⁽ स्त्र') विड्मेदश्र्लविष्टम्मकाश्यंपारुष्यपाण्डुता । रोमध्योग्निसदनं गुदकण्ड्विमार्गमा ॥ अ० ६० नि० १४।५६ १' ५० ड० त० अ० ५४।६ पर मायुर्वेदतस्वदीपिका टीका का विमर्श ।

इनकी वृद्धि होती है और वृद्धि प्राप्त कर ये परिपक्वावस्था को प्राप्त होती हैं। ये अत्यन्त चश्वल और गतिशील होती हैं। प्राय अन्य मे कुण्डली गारकर रहती हैं। ये पतले दस्त होना, उदरशूल, अतिसार, वमन आदि अनेक लक्षणों को उत्पाप्त करती हैं। कभी-कभी मल के साथ गुदमागं से वाहर निकल आती है। कभी-कभी आगाशय में पहुँचकर उत्वलेश और वमन उत्पन्न करती हैं और कभी वमन के नाथ जाहर भी निकलती हैं। ये अन्य के भीतर अण्डे देकर नवीन कृमियों को जन्म देती हैं। ये अण्डे मल के साथ वाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति में उपसर्ग का कारण वनती हैं। कभी-कभी ये कुण्डलित होकर अन्य-छिद्र को ही पूर्णतया वन्द कर देती हैं, जिस्से वद्यगुदोदर या अन्यावरोध (Intestinal obstruction) हो सकता है। कदारित् पित्तवाहिनी में अवरोध उत्पन्न करके ये कामला रोग (Jaundice) की भी उत्पत्ति करती हैं।

- (३) स्फीतकृमि (Tape worm) या उवरावेष्ट यह फृमि ८-१० फीट लम्बी तथा फीते के समान चौडी और चिपटी होती है। यह अपने गोल शिर मे स्थित विडिंगो (अकुशो) द्वारा अन्य मे चिपकी रहती हैं। इसके परीर मे छोटे-छोटे अनेक पर्व होते हैं। इसके परिपक्व होने पर जब अन्तिम ४-६ पर्व मल द्वारा बाहर निकलते हैं, तो उनके आकार कद्दू (लौकी) के बीज के समान होते हैं। इस कृमि की उपस्थित से पेट में दर्व, वमन, मन्दाग्नि या भस्मक रोग तथा पाण्डु आदि रोगो के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसका उपसर्ग द्वित शुकर-मास खानेवालों में होता है।
- (४) सूत्र या तन्तुकृषि (Thread worm) या चुर-ये कृषि वीजाकुर या सूत्र की भौति श्वेत होती हैं। ये बहुत छोटी लगभग आधे जो के वरायर लम्सी होती हैं। ये प्राय वच्चों में होती हैं तथा रात्रि में गुदा से बाहर निकलती हैं। इनके प्रकोप से गुदा में खुजली होती है। कभी-कभी प्रवाहिका, गुदभ्रश, शय्यासूत्र और प्रतिश्याय आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं।

कृमिरोग का सामान्य निदान

अजीणं रहने पर भोजन करना, नित्यप्रति भीठे एव खट्टे पदार्थों को खाते रहना, लस्सी-शर्वत आदि का अधिक प्रेम के साथ सेवन करना, उटद आदि के आटे मे वने पदार्थ खाना, मीठे मालपूआ आदि खाना, गुड का ज्यादे खाना, व्यायाम न करना, दिन मे सोना, सयोगविरुद्ध, मात्राविरुद्ध, देश-काल आदि के विरुद्ध भोजन करना, ये कारण कृमियो को उत्पन्न करते हैं।

विशिष्ट निवान

9 पुरीषज — उडद तथा उडद के बने पदायं, पिष्टमय पदायं, दाल और पत्ते वाले शाको के अधिक सेवन से पुरीपज कृमि उत्पन्न होती हैं।

१ अजीर्णमीजी मधुराम्छनित्यो द्रवर्षिय पिष्टगुडोपमीका। व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धमुक् संलभते कृपीस्तु॥ माधवनि०

२. कफज — मास, उडद, गुड, दूध-दही और तेल के अधिक सेवन से कफज कृमि उत्पन्न होती हैं।

३. रक्तज कृमि—विरुद्ध भोजन, अजीर्ण होना या अजीर्ण रहने पर पुन भोजन करना और शाक आदि का अधिक सेवन करना रक्तज कृमियो को उत्पन्न करता है।

सामान्य लक्षण

ज्वर, शरीर के रग का फीका पड जाना, विवर्णता, शूल, हृदय के रोग, अगों मे शिथिलता, भ्रम (चनकर आना), भोजन मे अरुचि और अतिसार होना (वार-बार पतले दस्त होना) ये लक्षण आभ्यन्तर कृमियो के उत्पन्न होने के सूचक हैं।

सामान्य सम्प्राप्ति

दोष--कफप्रधान (त्रिदोष)।

दूष्य---रस, रक्त।

स्रोतस्-अन्नवह, पुरीषवह, रक्तवह।

अधिष्ठान-आमाशय, पक्वाशय, सिरा + धमनी ।

- १ कफज--आमाशय।
- २. पुरीषज-पनवाशय।
- ३. रक्तज—सिरा एव धमनी।

चिफित्सासूत्र

(१) रक्तज कृमियो का चिकित्सासूत्र कुष्ठरोग के चिकित्सासूत्र की तरह जानना चाहिए। जैसे कुष्ठरोग त्रिदोषज होता है, उसी तरह रक्तज कृमिरोग भी त्रिदोषज होता है। अते रुक्षणो के आधार पर दोषो का वलाबल जानकर चिकित्सा करनी चाहिए।

वात की प्रधानता में घृतपान, कफ की प्रधानता में वमन और पित्त की प्रधानता में विरेचन देना चाहिए।

- (२) कफज कृमियो मे विशेष रूप से शिरोविरेचन, नस्य, वमन और निदान-परिवर्जन पूर्वेक शमन चिकित्सा करे।
- (३) पुरीषज कृमियो मे विशेषकर वस्ति तथा विरेचन का प्रयोग करना चाहिए।
 - १. माषपिष्टाञ्चविद्ववर्णशाके पुरीषजा । मांसमाषगुदक्षीरद्धितेले कफोद्भवा ॥ विरुद्धाजीर्णशाकाषै शोणितोत्था मवन्ति हि ॥ सुशुत्त० ७० ५४।१७–१८
 - २. क्वरो विवर्णता शूळ हृद्रोग सदन भ्रम । भक्तद्वेषोऽतिसारश्च सञ्चातक्वमिलक्षणम् ॥ सुश्रुत० ७० ५४।१९
 - ३ (क) रक्तजानां प्रतीकारं कुर्यात कुष्ठचिकित्सितात्।
 - (ख) शिरोविरेकं वमनं शमनं कफजन्मसु ।
 - (ग) पुरीषजेषु सुतरां दद्याद् वस्तिविरेचने । अ० ह० उ० ५४

आचार्य चरक ने सामान्यत सभी कृमियो की चिकित्सा मे त्रिसूत्री सिद्धान्त अपनाने का निर्देश किया है—१. अपकर्पण, २ प्रकृति-विघात और ३ निदान-परिवर्णन ।

१. अपकर्षण—आभ्यन्तर कृमियो का अपकर्षण चार प्रकार से किया जाता है। कृमिघ्न औषघो के प्रयोग से कृमियो को निर्जीव अथवा वेहोश करने के प्रधात् सशोघन उपचार करके बाहर निकाला जाता है।

अपकर्षण के चार प्रकार - 9 शिरोविरेचन (नस्य) का प्रयोग शिरोगत कृमिज रोगो में किया जाता है। २ वमन का प्रयोग आमाशयगत कफज कृमिरोग में किया जाता है। ३. विरेचन का प्रयोग पुरीपज कृमिरोग में मलाशय-शोधनायं किया जाता है। एवच ४. आस्थापन (निरूह्वस्ति) का भी प्रयोग मलज कृमियों को निकालने के लिए होता है।

इन चारो प्रयोगों में कृमिष्न और शोधनकारक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इन सबके प्रयोग का उद्देश्य कृमियों का उन-उन स्थानों से अपकर्षण करना है।

२ प्रकृतिविधात³—कृमि जिस तरह के आहार-विहार या परिस्थिति या वातावरण से पलते हैं, उस परिस्थिति या वातावरण को नष्ट कर देना चाहिए। जिससे वर्तमानकाल मे रहने वाले कृमि तो नष्ट ही हो जायें और साथ ही भविष्य मे उनके पुन उत्पन्न होने की सभावना न रहे। एतदथं कटु-तिक्त-कवाय रस वाले द्रव्यो का खाने, पीने, स्नान, उवटन आदि मे प्रयोग करना चाहिए तथा कफ-विकार नाशक और पुरीपकृमि-प्रतिपेधक औषध एव कर्म करने चाहिए, जो कृमिजनन की प्रकृति को ही विनष्ट कर दे। क्षारीय द्रव्य और उष्ण उपचार प्रकृतिविधात करते हैं।

३ निदानपरिवर्जन ४ — कृमिरोग के जो कारण वतलाये गये हैं, जैसे — मधुर-अम्ल-द्रव-गुड-वडा-पकौडा आदि का आहार और दिवाशयन, व्यायाम न करना-आदि विहार—इन सवका परित्याग करना चाहिए।

छोटे वच्चे और सगर्भा औरतें भी मिट्टी खाती हैं, जिससे कृमि होते हैं, उन्हें भी फुसला-समझाकर इस कृमिजनक आदत को छुडवा देवे।

१ सर्वेक्वभीणामपकर्पणमेवादित कार्ये, तत प्रकृतिविद्यात , अनन्तरं निदानोक्तानां भावाना-मनुप्रमेवनमिति । स्थानगतानां तु कृमीणां भेपजेनापकर्पणं न्यायत , तत्त्वतुर्विधं तद्यथा— शिरोविरेचनं, वमनं, विरेचनम् आस्थापन च, इत्यपकर्पणविधि । चरक० विमान० ७१९

२ तच्चतुर्विधं, तद्यथा—शिरोविरेचनं, वमनं विरेचनम् आस्थापनम् इति अपकर्पणविधि ।

३ प्रकृतिविधातस्तु एपां कडु तिक्त कपाय क्षारीव्यानां द्रव्याणामुपयोगो यच्चान्यदिष किश्चित् इलेष्मपुरीषप्रत्यनीकभूतं तत् (सेवनीयं) स्यात् । चरक० वि० ७

४ अनन्तरं निदानोक्तानां भावानाम् अनुपसेवनमिति यदुक्तं निदानविधी तस्य विवर्जनं तथाप्रायाणां चान्येपां चापरेपां द्रव्याणामिति । च० वि० ७

चिकित्सा (शिर, हृवय, नासिका आदि के कृमियो की)

- 9. आचार्यं चरक ने कफज कृषियों की चिकित्सा करने में अधिक मात्रा में नस्य (शिरोविरेचन), वमन तथा शमन के लिए औषध-प्रयोग करना बतलाया है।
- २. शोषांद कृमि—शिर को खाने वाले कृमि जब बढ जायें और शिर के भीतर चलते हुए जान पड़ें तो शिर का स्नेहन-स्वेदन करके (चरक० सूत्र० अ०२ मे कथित) 'अपामागंतण्डुलादि शिरोविरेचन' का प्रधमन नस्य देकर शिरोविरेचन कराना चाहिए। र
- ३. प्रधमन नस्य—अश्व के पुरीय का रस निचोडकर उसे ठीक से सुखाकर, उसमें वायविडग के क्वाथ की तीन बार भावना देकर सुखाकर रख ले। इस चूर्ण का नासिका में प्रधमन नस्य देने से शिरोगत कृमि तथा कृमिज शिरोग नब्ट होते हैं। प्रधमन का वर्ष नस्य को नासिका में फूँकना है। इ
- ४ अञ्जन आदि—शिर, हृदय, नासिका, कान और नेत्र आदि में स्थित कृमियों को नष्ट करने के लिए विशेषरूप से निर्मित नेत्राञ्जन, नस्य, अवपीड नस्य (किसी द्रव को नाक में टपकाना), गण्डूष और कवल का प्रयोग करना चाहिए।
- ५. रोमाद या केशाद एवं दन्ताद कृमि—रोम या केश को खाने वाले कृमियो की चिकित्सा इन्द्रलुप्तरोग-नाशक उपचार से करे। जैसे—हाथीदाँत के बुरादे को निर्धूम अग्नि युक्त चूल्हे पर तने के ऊपर रखकर मिट्टी के सकीरे से ढँक दे और जब वह जल कर कोयला वन जाय तो उसे समभाग रसींत के साथ रगड कर मिला दे। इसके लेप से झडे हुए बाल पुन उग आते हैं।
- ६. आचार्य वारमट ने कहा है, कि कृमिज शिरोरोग मे रोगी को रक्त का नस्य देवे, क्यों कि रक्त की गन्ध से मदोन्मत्त होकर कृमि मूच्छित हो जाते हैं। जब रुग्ण को कट्फल चूर्ण या मरिच चूर्ण का क्रमश नस्य और धूप दिया जाता है, तो कृमियाँ नाक से या मुखमार्ग से बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद कडवे तेल का या नीम के तेल का अथवा हिंगोट के तेल का अलग-अलग नस्य देते रहे।

१ मात्राधिकं पुन शिरोविरेचवमनोपशमनभूयिष्ठं तेष्वीषधेषु श्लेष्मजानां कृमीणां चिकित्सितं - कार्यम् । चरक० विमान० ७१२७

२ यदि पुनरस्यातिप्रवृद्धान् शीर्यादीन् कृमीन् मन्येत शिरस्येवाभिसर्पत कदाचिद्द, तत स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाध विरेचयेदपामार्गतण्डुलादिना शिरोविरेचनेन । च० वि० ७।२०

३. शकृद्रसं तुरङ्गस्य सुशुष्कं भावयेदिति । निष्क्वायेन विदङ्गानां चूर्णे प्रथमनन्तु तद् ॥ सु० उ० ५४।३५

४. शिरोहद्माणकर्णाक्षिसंश्रितांश्च पृथग् विधान् । विशेषणाञ्जनैनेस्यैरवर्णाडेश्च साधयेत् । ग्रु० उ० ५४।३४

५ इन्द्रज्ञप्तविधिश्चापि विधेयो रोममोजिषु । दन्तादीनां समुद्दिष्टं विधानं मुख्रोगिकम् ॥ सु० ७० ५४।३८

इ. कृमिने शोणित नस्य तेन मूर्च्छन्ति जन्तव । न मत्ता शोणितगन्थेन निर्यान्ति प्राणवक्त्रयो ॥

कफन एवं पुरीषज कृमियो की सामान्य चिकित्सा

१ कफज या पुरीषज कृमियों को नष्ट करने की इच्छा से रोगी को ६-७ दिन तक सुरसादि गण की औषधों के कल्क और क्वाय से सिद्ध घृत का पान कराकर स्नेहन कराना चाहिए। फिर रोगी का स्वेदन करना चाहिए। यदि अगले दिन रोगी का संशोधन (वमन-विरेचन या वस्ति) अभीष्ट हो तो, पूर्व दिन को प्रात तथा सायकाल उसे दूध, दंही, गुड, तिल, मछली, खीर आदि से युक्त भोजन कराना चाहिए। इससे कृमियों का उभाड हो जाता है और वे चलायमान होकर कोष्ठ के मध्य में आ जाती हैं। दूसरे दिन रोगी की धारीरिक एव मानसिक स्थिति को देखकर यदि वह संशोधन योग्य हो, तो उसे तीक्ष्ण औषध पान कराकर चमन करावे।

वमन कराने के पूर्व स्नेहपान, अभ्यग तथा वाष्यस्वेदन करने से दोषों का क्लेदन, द्रवीकरण और कोष्ठाभिगमन होता हैं। गन्ने का रस, मासरस या दूध आकष्ठ पिला करके रोगी के बलाबल का विचार कर, वमनकारक औषध (यष्टीमधु के क्वाथ में १०-१५ ग्राम मदनफल का वारीक चूणें या यह चूणें मधु के साथ) देना चाहिए। यदि वमन न हो, तो रोगी अपनी अंगुली से गले के भीतर स्पशं कर वेग प्रवृत्त करें अथवा परिचारक अपनी अगुलियों में मदनफल चूणें और मधु का प्रलेप कर रोगी के गले में भीतर स्पशं करें। वस्तुत यह कार्य पचकमं-दक्ष चिकित्सक की देख-रेख में ही करना उचित है।

- (२) वमन कराने के बाद, अतितीक्ष्ण विरेचनकारक औषध—इच्छाभेदी रस आदि देकर विरेचन कराना चाहिए। र
- (३) विरेचन के वाद जी, बेर का फल, कुलथी और सुरसादि गण की औषधो को समान प्रमाण मे लेकर क्वाथ बनावें, क्वाथ का चतुर्थांश तैल और तैल का चतुर्थांश विडग एव सुरसादि गण का कल्क डालकर तैल पकावे और उसमे सेंधानमक मिलाकर आस्थापनवस्ति दें। इस तैल के साथ कृमिष्न औषधो का क्वाथ एवं कल्क मिला लें।
- (४) बास्थापनवस्ति के बाहर निकल जाने पर रोगी को सुखोब्ण जल से स्नान कराकर, विडग-पलाशबीज-इन्द्रजी-नागरमोथा आदि कृमिष्न कौषधो के क्वाथ मे यवागू या कृशरा बनाकर खिलाना चाहिए।

सुतीक्ष्णनस्यष्माम्यां कुर्यान्निहर्रणं तत ।

कडिनिम्बेद्गुदीपीछतेलं नस्यं पृथक्-मृथक् ॥ अ० ह० उ० २४।१५-१७ १ प्वामन्यतमं शास्त्रा निवांसु स्निग्धमातुरम् ।

म्रुरसादिविपक्वेन सर्पिषा वान्तमादित ॥ विरेचयेत् तीक्ष्णतरैयोगैरास्थापयेच तम् ॥ मुस्रुत० ७० ५४।२१

२. विरेचयेत् तीक्ष्णतरे । सु० उ० ५४।२१

शस्थापयेच तम्।

⁽क) यनकोलकुलत्यानां सुरसादेर्गणस्य च। विडक्स्स्नेहयुक्तेन क्वाथेन लवणेन च॥ सु० ७० ५४।२१--२२

(५) उसके अनन्तर यव-कोल (बेर)-कुलथी-विडग और सुरसादिगण की औषघो के क्वाथ तथा कल्क से सिद्ध तैल की अनुवासनवस्ति देनी चाहिए।

आचार्य चरक^र ने एक ही दिन में वमन, विरेचन और आस्थापन वस्ति देने के लिए कहा है, जब कि रोगी यह सब सहन करने के योग्य प्रतीत हो।

कृमिनाशक योग

(१) कृपिन्न चूर्णं—१ करञ्ज की गिरी, २ पलाश के बीज, ३.देशी अजवायन, ४ कबीला और ५.विडग सब बरावर लेकर महीन चूर्णं बना ले।

मात्रा तथा प्रयोग—३ ग्राम, दिन मे ३ वार समान गुड मिलाकर सुखोष्ण जल से ३ दिन तक देकर, तीसरे दिन रात मे सोते वक्त १ कप दूध में १०० ग्राम एरण्ड मिलाकर पिलावे।

वक्तव्य — कृमियों को गुड अत्यन्त प्रिय होता है। जब गुड उदर में जाता है तो आमाशय या अन्त्र की कृमियाँ उस पर टूट पडती हैं, आँतों की दीवार छोडकर बीच में चली आती हैं और कटु-तिक्त-कषायरस प्रधान औषध के सपकें से वे मृत या मूच्छित हो जाती हैं तथा दस्तावर दवा देने पर उदर से बाहर निकल जाती हैं।

- (२) पारसीयादि चूर्ण-- १ पारसीक अजवायान, २. नागरमोथा, ३ पीपर, ४ काकडासिंगी, ५ वायविडग और ६ अतीस सभी का समभाग मे चूर्ण। मात्रा ३ ग्राम दिन मे ३ वार गुड के साथ जल से।
- (३) विडगादि चूर्ण-१ वायविडग, २. सेंघानमक, ३ जवाखार, ४. कवीला, ५ पलाशबीज, ६ अजवायन और ७. हर्रा सभी का समभाग मे चूर्ण। मात्रा ४-६ ग्राम दिन मे ३ बार गुड के साथ जल से।
- (४) भद्रमुस्तादि क्वाय—१ नागरमोथा, २ मूषाकर्णी, ३ पलाशवीज, ४. वायविडग, ५. अनार की छाल, ६ खुरासानी अजवायन, ७ सुपारी, ८. देवदाह, ९ सिहजन के बीज, १० हर्रा, ११ बहेडा, १२. आंवला, १३ खैरसार, १४ नीम की छाल और १५ इन्द्रजी, सब समभाग लेकर भूसा की तरह कूटें। २५ ग्राम दवा साधा लीटर जल मे औंटायें, जब चौथाई बचे तो छानकर गुड डालकर रोज सबेरे पिलावें।
- (५) कृषिमुद्गर रस—१ शुद्ध पारद १० ग्राम, २ शुद्ध गन्धक २० ग्राम, ३ अजवायन ३० ग्राम, ४ वायविडग ४० ग्राम, ५. शुद्ध कुचला ५० ग्राम और ६ पलाशबीज ६० ग्राम लेकर खरल कर २५० मिलीग्राम की गोली बना ले। मात्रा—१-२ गोली नागरमोथा के क्वाथ से दिन मे ३ बार। इसे ३ दिन तक देकर चौथे दिन जुलाव दे। यह सभी प्रकार की कृमियों के विकार मे लाभप्रद है।

⁽ख) प्रत्यागते निरूहे तु नर् स्नातं सुखाम्बुना ।

युञ्ज्यात् कृभिष्नेरशने ॥ छ० ७० ५४।२३ १ तत शीव्र भिषम्बर । स्नेहेनोक्तेन चैनन्तु योजयेत्स्नेहबस्तिना ॥ छ० ७० ५४।२४ २. चरक० वि० ७।१६

- (६) कृषिकुठार रस—१ कपूर ८ भाग, २ इन्द्रजी, ३ त्रायमाणा, ४. अजवायन, ५. वायविडग, ६. घुद्ध हिंगुल, ७. घुद्ध वच्छनाग और ८. नागकेशर १—१ भाग लेकर सबको मिलाकर भूगराज के रस मे ६ घण्टे खरल कर सुखा ले। फिर सबके बराबर, ९ पलाश बीज का चूणें मिलाकर, मूषाकर्णी और ब्राह्मी के रस की १—१ भावना देकर २—२ रत्ती की गोली बना ले। दिन मे ३ बार १—१ गोली ३ दिन तक मधु से देकर चौथे दिन जुलाब देने से कृमि गिर जाते हैं।
- (७) अकुशमुख कृमि (Hook worm)—स्वर्णसीरी (भडभाड) के जह , की छाल का कल्क ३ ग्राम और ५ दाने काली मिर्च का चूर्ण समान गुड मिलाकर, दिन मे ऐसी ३ मात्रा, तीन दिन तक देकर चौथे दिन प्रात इच्छाभेदी रस २ रत्ती शर्वत के साथ पिलाने से विरेचन होकर कृमियां बाहर निकल जाती हैं।
 - (८) गण्डूपद कृमि . महागुवा (Round worm)—१ पलाशवीज चूर्ण ४ ग्राम गृड के शर्वत मे घोलकर सवेरे-शाम पिलाना चाहिए अथवा २ देशी अजवायन का ३ ग्राम चूर्ण समान गृड के साथ १-२ सप्ताह तक देने से कृमियो की परम्परा समाप्त हो जाती है। तीसरे दिन रात मे कोई दस्तावर दवा भी देते रहना चाहिए।
 - (९) स्फीतकृति: सवरावेष्टा (Tape worm)—वायविडग चूर्ण ३ ग्राम समान भाग गुड से दिन मे ३ वार अथवा २ अनारदाने के बीज का चूर्ण और गुड प्रत्येक ३-३ ग्राम दिन मे ३ वार कुछ दिनो तक देने से ये नष्ट हो जाती हैं।
 - (१०) तन्तुकृति: चुर (Thread worm) कवीला का चूर्ण २-३ ग्राम बराबर गृड के साथ दिन में ३ वार तक देते रहने से ये कृषि वाहर निकल जाती हैं।
 - (१९) कृष्मिद्य और रेचक द्रव्य—उदर की कृष्मियों को मारकर बाहर निकालने वाली औषघों में तीन द्रव्य प्रमुख हैं—१ कबीला—यह कृष्मिद्य और रेचक है। इसे ४-५ ग्राम की मात्रा में बराबर गुंड के साथ मिलाकर दिया जाता है। २ इन्द्रायण—यह अतिविरेचक और कृष्मिद्य है। जलोदर और शोथ में इसके प्रयोग से जलाश निकलकर रोग का शमन होता है। इसका चूणं ३-४ ग्राम देना चाहिए। ३. उशारेवन्व—यह तीच्र विरेचक और कृष्मिद्य है। इसकी मात्रा १००-२०० मि० ग्रा० है। इसे शर्वत में देना चाहिए। इनको खिलाने-पिलाने के बाद मुख में लाइची रखवावे।
 - (१२) कफन और पुरीषज कृमिनाशक एकल द्रम्य—१. करञ्ज, २ अजवायन, ३ पलाशबीज, ४ वायविडग, ५ सिहजनबीज, ६ कवीला, ७. कचूर, ८. भिलावा, ९. कुचला, १० डीकामाली, ११ नीमबीज, १२ सिन्दुवार, १३ मूपाकर्णी, १४ अपामागं, १५ धतूरा, १६ इन्द्रजी, १७ सुपारी, १८ कालीमिचं, १९. मालकागनी, २०. अनारदानाबीज इत्यादि । इन औषधियो का प्रयोग कृमियो को नष्ट करने और गिराने के लिए किया जाता है । मात्रा और अनुपान रोगी की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का विचार कर देवे ।
 - (१३) रक्त, त्वचा, श्लैष्मिककला और लसीका प्रन्थियों मे स्थित कृमियों की बौषयें—१ रसकपूर, २ पारद, ३. गन्धक, ४ हिंगुल, ५ हरताल, ६. स्वर्ण,

- ७ ताम्र, ८ कासीस, ९ बाकुची, १० दालचीनी, ११ छितवन, १२ सरफोका, , १३ खदिर, १४. गुग्गुल, १५ जित्रकमूल, १६ नीम इत्यादि । इनका प्रयोग करते समय रसौषधियो का शोधन करना आवश्यक है। मात्रा का निर्धारण रोग और रोगी के अनुसार करें।
 - (१४) क्रिमिन्न तथा क्रिमिविकार-नाशक औषधें—१. स्वर्णभस्म, २ कासीस-भस्म, ३ शुक्तिभस्म, ४. शसभस्म, ५ मुक्ताभस्म, ६ प्रवालभस्म, ७ वराटभस्म, ८ टकण, ९ निम्ब, १० रसोन, ११ छितवन, १२ इन्द्रजी, इत्यादि द्रव्य कृमियो को तथा कृमिज विकारों को दूर करते हैं।
 - (१५) प्रसिद्ध सिद्ध औषध्योग—१ भद्रमुस्तादि क्वाथ, २ पारसीयादि चूर्ण, ३ विडगादि चूर्ण, ४ कृमिमुद्गर रस, ५ कृमिकालानल, ६. कीटारि रस, ७ कृमिकुठार रस, ८ विडगारिष्ट, ९ मुस्तकारिष्ट इत्यादि। इनकी मात्रा रोगी के अनुसार निश्चित करें।
 - (१६) कृमिज पचन विकार (अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी आदि में)—पारद-घटित पर्पटीयोग, हिंगुलभस्म, शखभस्म, इन्द्रजी आदि औषध रोगानुसार प्रयोग करें।
 - (१७) कोष्ठबद्धता—हरीतकीचूर्ण, निशोय, नीलगिरी तैल, एलुआ, सप्तपर्ण, शिवाक्षारपाचन चूर्ण आदि देवें।
 - (१८) कृमिज ज्वर—वगभस्म २ रत्ती तथा विडग चूर्ण २ ग्राम को मधु से दें। ज्वरकेशरी या अग्नितुण्डी अथवा सुदर्शन चूर्ण का प्रयोग हितकर है।
 - (१९) विवन्ध—इच्छाभेदी रस, अश्वकचुकी रस या नारायण चूर्ण उचित मात्रा मे देवें।
 - (२०) कृषित पाण्डु—नवायस लीह १-१ ग्राम सवेरे-शाम अथवा ताप्यादि लीह उचित मात्रा मे विडग चूर्ण २ ग्राम के साथ दें। एक महीने तक बिना व्यवधान के यह देते रहें।
 - (२१) कृमि-उत्पत्ति एव विकार-श्रमनार्थ-वृहद् योगराजगुग्गुलु, अग्नितुण्डी-वटी, सजीवनीवटी और वंग भस्म का यथायोग्य मात्रा और अनुपान से प्रयोग करें।
 - (२२) क्रुमिज जीर्णेज्वर—लघुवसन्तमालती, सुदर्शन चूर्णे या नारायण चूर्णे का प्रयोग दीर्घकाल तक करना चाहिए।
 - (२३) संक्रमणिनरोधार्यं औषघं—सक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी के थूक, कफ, मलमूत्र और वस्त्र आदि से निकले हुए कीटाणु, श्वासोच्छ्वास-क्रिया द्वारा बाहर आये
 हुए कीटाणु और वातावरण मे घूमनेवाले कीटाणुओं को नष्ट करने तथा ग्रह के
 वायुमण्डल को शुद्ध बनाने के लिए औषघं—१. पारद, २ गन्धक, ३. लोहवान,
 ४ गूगल, ५ धतूर, ६. निम्बपत्र, ७ कपूर, ८ नीलगिरी-तैल, ९. तारपीन,
 १० पिपरामेण्ट, ११. नमक, १२ कासीस, १३ कार्बोलिक एसिड और १४ मिट्टी
 का तेल आदि।
 - (२४) दुर्गन्धनाशक औषधें—१. तारपीन का तेल, २ फिनायल, ३ कार्बोलिक एसिड, ४. सूर्य का ताप, ५ अग्नि, ६. गूगल और ७ राल आदि की घूप दे।

- (२५) पुनराक्रमण-निवारणार्थ औषधें—१. सप्तपर्णं का सत्त्व, २ सोमल, ३ हरताल, ४ रसकपूर, ५ सुवर्णभस्म, ६ हिंगुल, ७ गूगल आदि औषधें कीटाणु के बीज को नष्ट कर रोगो का निर्मूलन करती हैं।
- (२६) रक्तल कृमिनाञ्चक विशिष्ट औषधें—१ गन्धक, २ मजीठ ३. चोप-चीनी, ४. सत्यानाञ्ची, ५ खैरछाल, ६ सप्तपणें, ७ त्रिफला, ८ मुण्डी, ९ सारिवा, १० उशवा, ११ अमलतास, १२ अनन्तमूल आदि।
- (२७) बाह्यक्रिमनाशक औषधें—१. मुर्दाशख, २ रसकपूर, ३. कपूर, ४ सोहागा, ५ तूतिया, ६. गन्धक, ७ कत्था, ८ गोमूत्र, ९ नीलगिरि तैल, १०. चक्कबड, ११ कासमदं, १२ निम्बपचाग, १३ वायविडग, १४ चमेली के पत्ते, १५ स्वर्णक्षीरी आदि।

घ्यवस्था-पत्र

१. ३-३ घण्टे पर ४ बार

कृमिमुद्गर रस
 १ ग्राम

कृमिघ्न चूणं
 १ ग्राम

समान गुड के साथ। योग ४ मात्रा

भोजन के पूर्व २ बार

यवानीषाडव चूणं
 ६ ग्राम

विना अनुपान। योग २ मात्रा

३. भोजनींतर, २ वार

विडगारिष्ट ५० मि० ली० समान जल से। योग २ मात्रा

४ रात्रि में आरोग्यवर्धनी वटी <u>१ ग्राम</u> उष्णोदक से १ मात्रा

पथ्य—पुराना गेहूँ, जी, चावल, मूग, बरहर, परवल, करेला, वयुआ, जवायन, लहसुन, हीग, सरसो का तेल, कच्चा केला, निम्बपल, हरीतकी, मिरका, गोमूल, कटु-तिक्त एव कषाय रस वाले पदार्थ पथ्य हैं।

अपथ्य-दूष्ट, मास, घृत, दही, पत्तेवाले शाक, खट्टे-मीठे पदार्थ, मिठाई, उहद, लस्सी आदि द्रव पदार्थ, शीतल जल और दिन मे सोना अपथ्य है। र

अर्श-बवासीर : होमोराइड्स अथवा पाइल्स

परिचय-गुदा की सिरायें फूल जाती हैं और उस सूजन को अर्थ³ कहते हैं।

१ प्रस्यह कडकं तिक्तं भोजनं कफनाशनम् । कुर्माणां नाशन रुच्यमग्निसन्दीपनं परम् ॥ भे र

२ क्षीराणि मांसानि घृतानि चैव दधीनि शाकानि च पर्णवन्ति । समासतोऽन्लान् मधुरान् हिमाश्च क्रमीन् जिघांसुः परिवर्जयेत् ॥ सुश्रुत उ० ५४

३. गुदबिजानां त्वर्शासि इति संशातन्त्रेऽस्मिन् । चर्क० चि० १४।६

Į

सिराओं की मध्य दीवार मासतन्तुओं से बनी होती है। मल को जब बाहर निकालने के लिए प्रवाहण की क्रिया से जोर लगाना पडता है या मल शुष्क होता है तो दबाव पडने पर मासतन्तुओं से बनी दीवार के कमजोर होने कारण सिराओं के अग्रभाग में रक्त का सन्वय होने से वह फूल जाता है, वही अर्झ है।

आचार्य चरक ने गुदविलयों में होनवाले मस्से या अकुर को अर्का माना है। कुछ विद्वान् गुदविल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र को भी अर्घ का स्थान मानते हैं, जैसे— शिश्न (मूत्रेन्द्रिय), योनि, गला, मुख, नासिका, कान, नेत्रों के वर्ष (पल्ले) और त्वचा में उत्पन्न होने वाले मासाकुर भी अर्घ कहलाते हैं।

सहज अर्श के स्वरूप—कोई छोटे या बहे, लम्बे या कम लम्बे, कोई गोल या ऊँचे नीचे, या भीतर मे टेढे या बाहर मे टेढे, या जटा की तरह परस्पर मिले हुए, कोई भीतर की ओर मुखवाले और इन अर्शों का वर्ण वातादि दोषों के सम्बन्ध के अनुसार होता है। है

दोषज अशों के स्वरूप: वातज अर्श—इसके मस्से सूखे, मिलन, साँवले या लाल वर्ण के, कहे, खुरदरे, कर्कोटक (खेखसा) के फल के समान सूक्ष्म कटको से ढके हुए वक्र, तीखे, विभिन्न आकृतिवाले, बिम्बीफल (शिवलिङ्गी के फल), खजूर, बेर था कपास के फल जैसे, कोई-कोई कदम्ब के फूल के समान कण्टकवाले या कोई सरसो से बीज जैसे होते हैं। 3

पित्तज अर्श — इसके मस्से नीले मुखाग्रवाले, लाल, पीले या काले रग के होते हैं। इनसे तरल अल्प रक्तस्नाव होता है। ये मस्से दुर्गन्धयुक्त, पतले, मुलायम और लटके हुए होते हैं। ये बनावट मे सुगो की जीभ के समान और वर्ण मे यकृत्खण्ड या जोक के मुख के समान होते हैं। ध

कफज अर्श —ये मस्से मोटे मूलवाले, घने, मन्द पीडावाले, घनेत वर्ण के, उठे हुए, स्थूल, चिकने, कठोर, गोल, वजनी, स्थिर, पिच्छिल (चिपचिपे), निश्चल, घलक्षण और प्रियस्पर्शी होते हैं। इनकी रचना करीर, कटहल की गुठली या गो के स्तान के समान होती है।

अर्श शब्द का निर्वचन—यह रोग रोगाक्रान्त व्यक्ति को शत्रु की तरह सताता है, उसे पीडा पहुँचाता है या घातक होता है, इसलिए इसे अर्श कहते हैं—'अरिवर्

१ केचित्तु भूयांसमेव देशमुर्पादशन्त्यर्शंसां—िशिश्तमपत्यपथ गलतालुमुखनासिकाकर्णाक्षि वर्त्मानि त्वक् चेति । चरक० चि० १४।६

२ चर्कः चि० १४।७। ३ अ० हः नि० स० ७।

४ पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रमा । तन्वस्नस्नाविणो विस्नास्तनवो मृदव स्थ्या ॥ शुक्तिह्वायक्करखण्डजलीकोवनत्रसंत्रिभा ॥ अ० ६० नि० अ० ७

५ इलेष्मोल्बणा महामूला धना मन्दरन सिता । उत्सन्नोपिनत स्निग्ध स्तब्ध वृत्त-गुरु स्थिरा ॥ पिच्छिला स्तिमिता इल्इणा कण्ड्वाढ्या स्पर्शनप्रिया । करीरपनसास्थ्यामास्तथा गोस्तनसन्निमा ॥ अ० द्दृ० नि० ७।३७ ३८

(शत्रुवत्) प्राणान् ऋणाति हिनस्ति इति अशं ।' 'पृशोदरादिगणपाठान्नि इक्तिमाहु ' (मधुकोप टीका) । यह शब्द 'अरि' और हिंसार्थक 'ऋ' (क्रघादिगण) धातु के योग से बना है ।

अशं: एक महागद—आवार्य वाग्मटी ने कहा है कि गुदविल में होनेवाले मास-कील (कांटी के-से मासाकुर) गुदमार्ग का अवरोध (क्कावट) करके प्राणियों को शत्रु के समान पीडित करते हैं, इसीलिए ये अशं कहलाते हैं। इसी से वाग्मट एव सुख्त ने अशं की गणना आठ दुष्टिकित्स्य महारोगों में की है?। इसका एक नाम दुर्नाम भी है। इसकी कसक और पीडा की दुष्हता के कारण ही इसका अन्वर्धक नाम पडा है। अशं को महागद कहने का तारप्य यह है, कि यह वडा ही कष्टसाध्य (दुष्टिकित्स्य) होता है और जैसे कोई हिंसक वडी क्रूरता तथा निदंयता के साथ किसी को सताता है, उसी तरह यह अति तीय पीडादायक महारोग है।

सर्शं का अधिष्ठात—गुदा की तीन विलयों को अर्श का अधिष्ठान कहा गया है, जहाँ बर्शं की स्थित रहती है। वृहदन्य के अन्तिम भाग को गुद (Rectum) कहते हैं। इसकी लम्बाई साढे चार (४३) अगुल होती है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर क्रमश प्रवाहणी, विसर्जनी और सवरणी नाम की तीन विलयों होती हैं। इन तीनों के नाम इनके काम के आधार पर दिये गये हैं, जैसे—१ जिसके शिष्टलं होने से मल का प्रवाहण होता है, उसका नाम प्रवाहणी है—'प्रवाहयित इति प्रवाहणी'। २. जो गुदमाग गुदनलिका को चौडा करके मल को बाहर निकालने वाला होता है, उसका नाम विसर्जनी है—'विष्टुजित इति विसर्जनी'। ३ गुदनलिका का वह भाग जो सकुचित रहकर मल को रोके रहता है, उसका नाम सवरणी है—'सवुणीति इति सवरणी'।

इनकी लम्बाई का प्रमाण इस प्रकार है-

9 प्रवाहणी १३ अगुल, २ विसर्जनी १३ अगुल, ३ सवरणी १ अगुल, ४ इन विलयों के अतिरिक्त गुदौष्ठ होता है, जिसकी लम्बाई ३ अगुल है। इस प्रकार सपूर्ण गुदा की लम्बाई साढे चार अगुल हो जाती है।

सुश्रुताचार्य ने इन विलयों का वर्णन करते हुए वतलाया है, कि उक्त तीनो विलयों मिलकर चार अगुल लम्बी, एक अगुल टेढी उभरी हुई एव शख के घुमावदार

१ अरिवत् प्राणिनो मासकीलका विश्वसन्ति यत् । अर्शिम तस्मादुच्यन्ते गुद्रमागैनिरोधत ॥ अ० ४० नि० ७।१

र (क) वातव्याध्यवमरीकुष्ठमेहोदरभगन्दरा । अर्शीम ब्रह्णीत्यष्टी महारोगा सुदुस्तरा ॥ अ० ६० नि० ८।३०

⁽ख) वातच्याथि प्रमेहश्च कुष्टमर्शी मगन्दरम् । सदमरी मृदगर्भश्च तथेवीदरमष्टमम् । सप्टावेते प्रकृत्येव दुश्चिकित्त्या मद्दागदा ॥ सु० स्० ३३।४-५

३ अशीस पट् प्रकाराणि विद्याद् गुदवलित्रये । मा० नि० तथा च० चि० १४।६

४ तत्र स्थूजन्त्रप्रिवद्धमर्थपञ्चाह्गुलं गुदमाहु । तस्मिन् वलयस्तिस्रोऽभ्यद्बीह्गुलान्तर-सम्भूता प्रवाहणी विसर्जनी सवरणी चेति । सु० नि० २।५

४. सिरायें गुदा की लम्बाई में स्थित रहती हैं, जब कि आन्त्र के अन्य भागों में सिराओं की दिशा अनुप्रस्थ रहती है। इस प्रकार गुदा की सिराओं में रक्त के रुकने का प्रकन ही नहीं है।

वर्श का पूर्वरूप

मन्दाग्नि, विष्टम्भ, रानो मे थकावट, पिण्डलियो मे ऐंठन, चक्कर आना, आगशैथिल्य; नेत्रो पर शोथ, पुरीषभेद या पुरीपरोध, अधोवायु-नि सरण या अपानवायु
का प्रतिलोम होना, अपानवायु का मलाशय मे घूमकर पीडा पैदा करना और गुदा
में कैची से काटने जैसी वेदना उत्पन्न कर आवाज के साथ निकलना, अन्त्र मे
गुडगुडाहट, अन्त्रकूजन, कृशता, डकार अधिक आना, बहुमूत्र, पुरीपाल्पता, अरोचक,
धुंआसी डकार, खट्टी डकार, शिर शूल, पृष्ठशूल, उर शूल, आलस्य, त्वचा मे वर्णभिन्नता, तन्द्रा, इन्द्रिय-दौर्वेल्य, क्रोध होना, रोगो की कष्टसाध्यता और प्रहणीरोग, पाण्डुरोग, गुल्मरोग तथा उदररोग की आशका होना। ये सभी अर्शरोग के
पूर्वेष्ट्य हैं।

अर्श का सामान्य लक्षण

अशं के उत्पन्न होने पर पूर्वरूप में कहे गये छक्षण जब व्यक्त हो जाते हैं, तो वे अशं के रूप या छक्षण हो जाते हैं। जब गुदा में अशं उत्पन्न हो जाता है, तब अपानवायु अशं के होने पर गुदा का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण बाहर नही निकल पाती है और ऊपर की ओर लौट जाती है।

वह पूरे शरीर में फैले हुए तथा सभी इन्द्रियो मे व्याप्त वात-पित्त-कफ के पन्द्रह भेदो को प्रकृपित और क्षुब्ध कर देती है। वह मूत्र, पुरीप, रस-रक्त आदि धातुओं और आमाशय आदि आशयों को भी क्षुब्ध कर देती है, जिससे पाचन-संस्थान की समस्त क्रियाएँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आक्रान्त व्यक्ति की जठराग्नि मन्द हो जाती है।

पाचकारिन के मन्द होने से रोगी व्यक्ति के आहार का समुचित पाचन नहीं होता और वह आहार रोगी का पोषण नहीं कर पाता है, जिसके परिणामस्वरूप अर्श का रोगी अतिकृश हो जाता है।

रोगी उत्साहहीन, दीन, क्षीण, कान्तिहीन, त्वचा-रक्त-मास-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र और सत्त्व इन आठ सारो से हीन, छायाहीन, कृमिभक्षित (दीमक से चाट

१. (क) ष० ह० नि० ७१५-२०

⁽स) विष्टम्मोऽत्रस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोपः एव च।
काश्यंमुद्गारवाहुल्यं सिवयसादोऽल्पविट्कता ॥
ग्रहणीदोषपाण्ड्वर्तेराशङ्का चोदरस्य च।
पूर्वंरूपाणि निर्दिष्टान्यशैसामभिष्टद्वये ॥ च० चि० १४।२१--२२

२. रतान्येव विवर्धन्ते जातेषु इतनामसु । अ० ६० ७।२०

जाती है, जो कदाचित् पूर्णरूप से गदा के आध्यन्तरिक भाग मे और कभी वाह्य-माम्यन्तर दोनो भागो मे होती है।

नवीन चिकित्साशास्त्रियों ने कतिपय विशेष कारण बतलाये हैं--

- १ आन्त्र का अधिकाश रक्त प्रतिहारिणी महासिरा के द्वारा यक्त मे जाता है। उदर मे अर्बुद आदि के दबाव या यक्त मे शोध होने से इसमे अवरोध होने पर क्यं की उत्पत्ति होती है।^२
- २. मलावरोध का निरन्तर बना रहना अर्श का एक विशेष कारण है। यह शिकायत औरतो में विशेष पायी जाती है, क्यों कि वे लज्जाशील होने के कारण या व्यस्तता के कारण अथवा शौचालय की सुविधा न होने से मल-प्रवृत्ति के वेग को रोकती रहती हैं।3
- ३ अस्यधिक मद्यपान करने से परम्परया प्रतिहारिणी सिरा मे अवरोध होने से अर्थ की उत्पत्ति होती है। है
- ४ एक स्थान पर अधिक समय तक बैठना या बालस्यवश कोई श्रम न करना भी अशंका कारण होता है।
- ५ शीतल आसन पर बैठना, मुलायम गहा, सगभैता, श्रोणिगत अर्बुद बादि भी अशें को उत्पन्न करने मे कारण हैं।
- ६. पहले बतलाये गये कारणों से इन सिराओं पर दबाव क्यों पडता है, इसमें अधोलिखित ४ हेत हैं---
- १ इन सिराओं को आश्रय देने के लिए इनके चारो और कोई कठिन घातु नही होती।
 - २. इन सिराओं में कपाट नहीं होते, जो रक्त को आगे जाने से रोकें।
- ३ ये सिरायें उपक्लेष्मल त्वचा के शिथिल तन्तुओं में रहती हैं, अत सर्वप्रयम दबाव इन्हीं पर पहता है।
- 1 Haemorrhoids or piles are varicose rectal veins. This varicosity forms a swelling of variable size which may be altogether within the anus (internal piles) or partly internal and partly external

(Savill's Medicine)

- 2 Portal obstruction is itself a cause of piles
- 3 Habitual constipation is undoubtedly the most common cause of haemorrhoids particulary in women
- 4 Alchohol causes portal congestion and thus becomes a cause of piles
 - 5 Sedentary occupation and difficient exercise.
- 6 Various local conditions such as sitting on a cold or soft cushions which constrict the inferior haemorrhoidal veins, utenn displacement, pregnancy, carcinoma and other tumours of the rectum (Savill's Medicine) or pelvis may cause piles

४. सिरायों गुदा की लम्बाई में स्थित रहती हैं, जब कि आन्त्र के अन्य भागों में सिराओं की दिशा अनुप्रस्थ रहती है। इस प्रकार गुदा की सिराओं में रक्त के रुकने का प्रश्न ही नहीं है।

वर्श का पूर्वरूप

मन्दाग्नि, विष्टम्भ, रानो मे थकावट, पिण्डलियो मे ऐंठन, चक्कर आना, अगशैथिल्य; नेत्रो पर शोथ, पुरीषभेद या पुरीषरोध, अधोवायु-नि सरण या अपानवायु
का प्रतिलोम होना, अपानवायु का मलाशय मे घूमकर पीडा पैदा करना और गुदा
में कैची से काटने जैसी वेदना उत्पन्न कर आवाज के साथ निकलना, अन्त्र मे
गुडगुडाहट, अन्त्रकूजन, कृशता, डकार अधिक आना, बहुमूत्र, पुरीषाल्पता, अरोचक,
धुँआसी डकार, खट्टी डकार, शिर शूल, पृष्ठशूल, उर शूल, आलस्य, त्वचा मे वर्णभिन्नता, तन्द्रा, इन्द्रिय-दौर्वेल्य, क्रोध होना, रोगो की कष्टसाध्यता और ग्रहणीरोग, पाण्डुरोग, गुल्मरोग तथा उदररोग की आशका होना। ये सभी अशंरोग के
पूर्वेष्ट्य हैं।

वर्श का सामान्य सक्षण

अर्श के उत्पन्न होने पर पूर्वरूप में कहे गये लक्षण जब व्यक्त हो जाते हैं, तो वे अर्श के रूप या लक्षण हो जाते हैं। जब गुदा में अर्श उत्पन्न हो जाता है, तब अपानवायु अर्श के होने पर गुदा का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाती है और ऊपर की ओर लौट जाती है।

वह पूरे शरीर में फैले हुए तथा सभी इन्द्रियों में ज्याप्त वात-पित्त-कफ के पन्द्रह भेदों को प्रकुपित और क्षुच्छ कर देती है। वह मूत्र, पुरीष, रस-रक्त आदि छातुओं और आमाशय आदि आशयों को भी क्षुच्छ कर देती है, जिससे पाचन-संस्थान की समस्त क्रियाएँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आक्रान्त व्यक्ति की जठराग्नि मन्द हो जाती है।

पाचकाग्नि के मन्द होने से रोगी व्यक्ति के आहार का समुचित पाचन नहीं होता और वह आहार रोगी का पोषण नहीं कर पाता है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थ का रोगी अतिकृश हो जाता है।

रोगी उत्साहहीन, दीन, क्षीण, कान्तिहीन, त्वचा-रक्त-मास-मेद-अस्य-मज्जा-धुक्र और सत्त्व इन आठ सारो से हीन, छायाहीन, कृमिमक्षित (दीमक से चाट

१. (क) अ० ६० नि० ७१५-२०

⁽ख) विष्टम्मोऽत्रस्य दौर्बस्यं कुक्षेराटोफ् एव च। कार्व्यमुद्गारवाहुल्यं सिक्थसादोऽल्पविट्कता॥ ग्रहणीदोषपाण्ड्वर्तेराशङ्का चोदरस्य च। पृबंक्ष्पाणि निर्दिष्टान्यर्श्वसामभिष्टद्वये॥ च० चि० १४।२१--२२

२. रतान्येव विवर्धन्ते जातेषु इतनामसु । अ० ६० ७।२०

लिये गये) वृक्ष की तरह नि सार तथा मर्गों को पीडित करनेवाले उपद्रवों से ग्रस्त हो जाता है।

रुग्ण व्यक्ति कास-प्यास-मुखर्वेरस्य-श्वास-पीनस तथा इन्द्रियो की शक्ति से हीनता, अगमर्द-वमन-छीक-शोथ-ज्वर-नपुसकता-बिधरता-तिमिररोग-शर्करा-अश्मरी-स्वर-क्षीणता-स्वरभग और चिन्ता से ग्रस्त होता है। उसे बार-बार थूक आता है, भोजन मे रुचि नहीं होती, उसके सभी पोरो मे, अस्थियो मे, हूदय मे, नामि मे, (अन्त्र मे) गुद मे तथा वक्षण मे वेदना होती है।

रोगी की गुदा से चावल के घोवन जैसी पिच्छा (लुआबदार आँव) आती है, पुरीष कभी बँघा, कभी ढीला, कभी सूर्खा, कभी गीला, कभी पका और कभी कचा आता है। पुरीष का वर्ण कभी श्वेत, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल और पिच्छिल (चिपचिपा) होता है।

आधुनिक चिकित्सा-वैज्ञानिको ने अर्श के निम्नाकित लक्षण वतलाये हैं---

- १. मल के अन्दर रक्त की उपस्थिति।
- २ मलत्याग के समय पीडा, जो मलत्याग के बाद भी कुछ देर तक बनी रहती है।
 - ३. कोष्ठबद्धता या कन्जियत-यह अर्श का स्वाभाविक प्रतीक लक्षण है।
 - ४. गुदा के चारो ओरं लालिमा होना।

५ अन्य सार्वदेहिक लक्षण-जैसे शिरोवेदना, मूर्च्छा, शरीर का क्षीण होना तथा मल के साथ रक्त अधिक निकल जाने से अतिशय रक्ताल्पता होना आदि।

निवानार्थंकर रोग—जिस प्रकार निदान रोग की उत्पत्ति करता है, उसी प्रकार एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करने के कारण निदानार्थंकर कहलाता है। वैसे ही अतिसार और ग्रहणीरोग अर्थं को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये दोनो रोग अर्थ के प्रति निदानार्थंकर हैं।

वातज अर्श का निवान

कसैले, कड़वे या तिक्त एवं रूक्ष, शीत, लघु गुणयुक्त पदार्थों का आहार, अत्यल्प या समय वीत जाने पर या अल्प मान्ना मे भोजन करना, तीक्ष्ण मद्य का सेवन, अति मैथुन, उपवास करना, शीतल प्रदेश से रहना, काल का शीतल होना, अधिक व्यायाम करना, शोक करना, वायु का सीधे स्पर्श होना और धूप लगना, ये वातज अर्श के कारण होते हैं।

यद्यपि धूप में उष्णगुण होता है, फिर भी अपनी विलक्षण रूक्षता के कारण वागु की दृद्धि करने से वातार्श का कारण होता है। ³

१. अ० हु० नि० ७।२१-२८ तथा च० चि० १४।८

२ अर्शोऽतिसारग्रहणीविकारा प्रायेण चान्योन्यनिदानभूता । स० ६० चि० ८।१६४

इ. च० चि० १४।१२-१३

वातज अर्श का लक्षण

सार्ववैहिक लक्षण—शिर-पार्व-अंस-किट-ऊर और वक्षण मे अधिक पीडा, छीक-हकार-विष्टम्म-हृदयरोग-अरुचि-कास-श्वास-विषमाग्नि-कर्णनाद और श्रम होना, गुल्म-प्लीहोदर, तथा अष्ठीला (Recto-vasicular tumour) होने की सभावना होना और त्वचा-नख-मुख-नेश्र-मूत्र एव मल मे कालापन।

मल-गाँठदार-अल्प-फेनिल-पिच्छिल एव बँघा हुआ होता है, जो पीडा के साथ जोर से प्रवाहण करने (कुथन या काँखने) पर निकल पाता है।

पित्तन वर्श का निदान

कटु-अम्ल-लवण एवं उष्ण पदार्थों का सेवन, व्यायाम-अग्नि-धूप का सेवन, उष्ण देश-ऋतु, क्रोध-मद्यपान-ईर्ष्या, विदाही-तीक्ष्ण-उष्णगुण युक्त अस-पान और औषध का सेवन, ये पित्तज अशें के कारण हैं।

पित्तन अशं के लक्षण

सार्वर्वेहिक लक्षण—दाह-पाक-ज्वर-स्वेद-तृष्णा-मूर्च्छा-अरुचि और मोह (इन्द्रिय-शक्तिशैथित्य) ये लक्षण होते हैं। त्वचा-नख-मुख-मूत्र और पुरीष हरे, पीले या हरिद्रा वर्ण के होते है।

मल-द्रव-उष्ण एव नील-पीत या रक्त वर्ण का आमयुक्त निकलता है।3

फफज अर्श का निदान

मद्युर-स्निग्ध-शीतल-नमकीन-अम्ल और गुरु गुणयुक्त पदार्थों का सेवन, व्यायाम का त्याग, दिवाशयन, मुलायम आसन या विस्तर पर वैठना-सोना, पूर्वी वायु का सेवन, शीतल देश-काल और चिन्ता से रहित होना, ये सब कफल अर्श के कारण हैं।

फफन अर्श का लक्षण

सार्ववैहिक लक्षण—वक्षण-प्रदेश मे जकडन, गुदा-मूत्राशय-नाभि मे पीहा, श्वास-कास-मिचली-लालाप्रसेक-अरुचि-पीनस-मूत्रकृच्छू, शिर मे भारीपन, शीतज्वर, न् नपुसकता, अग्निमान्द्य, वमन एव आमबहुल रोगी (अतीसार-प्रहणी आदि) का होना, ये कफज अर्श के लक्षण हैं। इसमे त्वचा-नख-मुख-मूत्र और मल, ये पाण्डुवण तथा स्निग्ध (चिकने) होते हैं।

मल-वसा (चर्वी) और कफ जैसा मल प्रवाहण करने पर निकलता है।

त्रिदोषज अर्श का निदान और छक्षण

निदान — त्रिदोषज अर्श को उत्पन्न करने वाले वे ही कारण हैं, जो तीनो दोषो से होने वाले अर्श के अलग-अलग कहे गये हैं।

74 m

१ अ० इ० नि० ७।३१-३४

२ च० चि० १४।१५-१६।

३ स० इ.० नि० ७।३६--३७।

४ च० चि० १४।१८-१९।

५ म० ६० नि० ७।३९-४२।

लक्षण-इसमे त्रिदोषज अशों के लक्षण होते हैं।

द्वन्द्वज अर्श के निवान और लक्षण

निदान—इसमे जो दो दोष मिले होते हैं, उनके उत्पादक कारण ही इसके भी निदान होते हैं।

लक्षण-जिन दो दोषों की अधिकता से यह होता है, उसमें उन्हीं दोनो दोषों के अनुसार पूर्वोक्त लक्षण होते हैं। र

सहज अशं का निदान

कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही अर्थ की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसका कारण गुदविल का निर्माण करने वाले गर्भोत्पादक बीज के एकदेश की विकृति हैं। उत्तर गुद और अधर गुद की उत्पत्ति मातृबीज से होती है, अत मातृबीज के गुदनिर्मापक अश की विकृति ही सहज अशंका निदान है। है,

सहज अर्श के लक्षण

सहज बर्श का रोगी कृशकाय होता है। वह अल्पाहारी, उभरी हुई सिराओं वाला, अल्प सन्तान वाला, भीणवीर्य, भीणस्वर, क्रोधी, मन्दाग्नि वाला, अल्प प्राण (निवंल) और परम आलसी होता है। वह नासिका-शिर-नेत्र और कान के रोगो से पीडित रहता है। उसकी आंतो मे अव्यक्त शब्द और गुडगुडाहट होती है। वह हृदयरोग तथा अरुचि से ग्रस्त रहता है।

रक्ताशं का निदान और लक्षण

निदान-पित्ताशें में बतलाये गये निदान ही इसके उत्पादक कारण होते हैं। अत इसका निदान अलग विणत नहीं है।

मस्से—रक्तार्श के मस्से पित्तार्श के मस्सो की आकृति के समान होते हैं। ये मस्से वट की जटा के प्ररोहो जैसे लाल अथवा गुञ्जा (रत्ती फल) जैसे या मूँगा जैसे लाल होते हैं। जब उन मस्सो पर कठोर पुरीष का दबाव पडता है तब उनसे दृषित उष्ण रक्त निकलता है।

देहिक लक्षण—रक्त के अधिक निकल जाने से रोगी का वर्ण मेढक जैसा पीला हो जाता है। वह रक्तक्षयजनित कब्टो से पीढित हो जाता है। आँखे फीकी पड जाती हैं। कभी-कभी सर्वाङ्गकोय हो जाता है। आसकब्ट होता है, हृदय की गित तीव्र होती है, पूच्छी होने का भय रहता है, तन्द्रा, भ्रम, वेचैनी, चिडचिडापन, निद्रानाश, मानसिक अवसाद, निर्वलता, उत्साहहीनता और ओज क्षय हो जाता है प्य रोगी की सभी इन्द्रियाँ व्याकुल हो जाती हैं।

१ माधवनिदान। २ स० ह० नि० ७४२।

३ तत्र हेतु सहोत्यानां वित्रवीनोपतप्तता। स० ६० नि० ७१६; च० चि० १४।५ एवं च० शा० ३।६।

४ स० नि० रा१६।

वक्तव्य-पित्तार्श मे पुरीप पतला हो जाता है और रक्तार्श मे पुरीप गाढा होता है। यही दोनो का मेदक लक्षण है।

अर्श एक सर्वशरीर कष्टकर त्रिदोषज रोग^२

अशं के उत्पत्तिकाल मे पञ्चात्मा वायु (१ प्राण २ उदान ३. समान ४. व्यान ५. अपान), पञ्चात्मा पित्त (१. पाचक २. रजक ३ भ्राजक ४ आलोचक ५. साधक) तथा पञ्चात्मा कफ (१ क्लेटक २ अवलम्बक ३. बोधक ४ तपंक ५ क्लेपक) ये सभी तथा गुदा की तीनो वलियाँ (१ प्रवाहणी २. विसर्जनी ३ सवरणी) प्रकृपित हो जाती हैं, इसलिये अशं के मस्से परम दु खदायी, अनेक रोगों के जनक तथा सपूर्ण शरीर की कष्ट पहुँचाने वाले और अतीय फट्टसाध्य होते हैं।

सम्प्राप्ति

अपने प्रकोपक कारणो से प्रकुपित हुए वात बादि दोव त्वचा, मास, मेद और रक्त को दूवित कर शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेकर उनके द्वारा नीचे जाकर गुदा की विलयों को दूवित कर उनमें मास के अकुर उत्पन्न कर देते हैं। उन मासाकुरों को अर्थ कहते हैं।

मन्दाग्नि वाले व्यक्ति मे यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है। ये मासाकुर (मस्से) तृण, काष्ठ, परवर, ढेला, वस्त्र इत्यादि की रगड से अथवा शीतल जल के अधिक स्पर्श से वढ जाते हैं। 3

सम्प्राप्ति-चक्र

प्रदोप-प्रकोपक आहार-विहार
|
प्रदोप-प्रकोप
|
त्वचा-रक्त-मास-भेद दूपण
|
दोपो का गुदा मे स्थानसश्रय
|
गुदविल मे मासाकुर की उत्पत्ति
|
अर्था रोग

ववासीर, हीमोराइड्स या पाइल्स (Haemorroids or piles)

१. अ० ६० नि० ७४३-४५

२. पञ्चात्मा मारुत पित्त कफो गुदविलत्रयम् । सर्वं एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ तस्मादशांसि दु खानि बहुन्याधिकराणि च । सर्वदेद्दोपतापीनि प्राय कृष्कृतमानि च ॥ च० चि० १४।२४--२५

३ (क) दोपास्त्वङ्गांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाक्तृतीन् । मांसाद्कुरानपानादी कुर्वन्त्यर्शासि तान्त्रगुः ॥ अ० ६० नि० ७।२ (ख) ग्रुश्रुत निदानस्थान २।४

वोष-दूष्य-अधिष्ठान आवि---

- १ बोष—वातप्रधान त्रिदोष ।
- २ बूष्य-त्वचा, रक्त, मास, मेद।
- ३. अधिष्ठान--गुदवलि-त्रय ।
- ४ स्रोतस-रक्तवह, मासवह।
- ५. स्रोतोदुष्टि रूक्षण—सग, विवन्ध।
- ६ आशय--आमपक्वाशयोत्थ रोग।
- ७. रोग प्रकार-चिरकारी रोग।

अर्श का वारण उपद्रव-उदावतं

ख्क एव सग्राही पदार्थों के सेवन से मलांशय में प्रकुपित प्रबल अपान वायु अघोवाही स्रोतस् (गुद) में अवरोध उत्पन्न कर पुरीय को सुखा देता है और मूंत्र तथा पुरीय की प्रवृत्ति में भीषण क्कावट 'पैदा कर देता है। जिससे उदर, हृदय, पाइवें एव पीठ में तीन्न वेदना, आहमान, उदर में ऐंठन, मिचली और गुदा में कैंवी से काटने जैसी पीडा होती है। वस्ति में अधिक शूल होता है, कपोल पर शोथ होता है और डकार आने लगती है। तत्पश्चात् छर्दि, अविच, ज्वर, हृद्रोग, ग्रहणी विकार आदि तथा नाना प्रकार के वातज आक्षेप-प्रभृति रोग भीषण रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। यह 'उदावतं' रोग अर्शरोग का बडा दारुण उपद्रव है।

साध्यासाध्यता

सुखसाध्य अर्श — जो अर्श बाहर की (सवरणी) विल में आश्रित होते हैं, किसी एक दोष की प्रधानता से उत्पन्न हुए होते हैं और एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होते, वे सुखसाच्य होते हैं। ³

कुच्छ्रसाध्य अर्श—जो अर्श दो दोषो की प्रधानता से होते हैं, दूसरी (विसर्जनी) विल मे आश्रित होते हैं और एक वर्ष से अधिक पुराने होते हैं, वे अर्श कुच्छ्रसाध्य होते हैं। 3

असाध्य अर्श--जो अर्श सहज होते हैं, तीनो दोषो से उत्पन्न होते हैं और भीतर की (प्रवाहणी) विल मे उत्पन्न हुए होते हैं, वे अर्श असाध्य होते हैं। ध

१ स० ह० नि० ७।४६-५२

२. बाह्यायां तु वस्त्री जातान्येकदोषोल्बणानि च । अर्शासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ अ० इ.० नि० ७।५५

३ इन्द्रजानि दितीयायां वली यान्याभितानि च । कुच्छूसाध्यानि तान्याहु परिसदत्सराणि च ॥ अ० ६० नि० ७।५४

४ सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाम्यन्तरे वली । स्थितानि तान्यसाध्यानि ॥ स० ह० नि० ७।५१ सथा च० चि० १४।२८

उपहरणित सतायता—(१) जित रोगी के हाप पर-मुता-मामि-मुदा सीर सन्डकोधों में सीय ही लीर हुएय तथा पार्ट में सूल ही, उमे अनाम मगर्स । (२) हुदय एवं पार्च में सूल, इन्द्रियमिक-सीमता, यमन, सगों में गीमा, उचर, मृत्या तथा मुदा का पक माना, में मारक कराय है। (३) जिम करों के पोगी की कृत्या की अधिकता, भीजन में सर्व तथा सूल में स्वाकुलता ही, जिस्सी मुना में मिथिक साल-साय हुआ हो और जो जीप तथा क्यांगार में पीटिश हो, हिसे की में। का करों को मी के तिए पात्रक होता है।

याच हरां—(१) कमान्य न्यामं वे दुता शी पर भी पति सीर्म का मनी-बन उत्तम हो, नटरानि प्रदीत हो कोर सारीरिक दल स्मृद्धि उत्तम हो, भी र संगेष याच्य होता है।

(२) यदि संगो की धानु समाधिक है और विक्रिया के अनुत्याद (१. उट २ शोषध्या ३. विकारक नया ४, शंगी) क्यों सपने मुला में सपन हो नया शोही की स्टरानि प्रयोग हो, तो ऐसी नियति स समास्य क्यों की साल्य हो आगा है।

•	
मापेस	निशा
रस्तातं १. वर्षे रा द्वित्वम विन्मा । २. वर्मुक एव पुरुषोशा में मुश्ले	रस्यानियार १. सर्ग मा इतिहास मही विशेषा ।
जनस्यत निर्मते । के. मनत्यान के पूर्व या प्रसाद रहा प्रदर्शि होती है।	२. महने प्राध्यित गरी गहेव । १ मण में बिका हुए। १० भारत है ।
४ मत्यांग के समय गुरा ने पीष्टा रोवी है। ५ मण बेंघा हुआ एवं प्राय कहा रोवा है।	४. महायाम के सबय मुदा म प्राय पीड़ा मही होती है। ५. मन पमना शिक्टमा है।
	en e

रसारा

- १ रोग का पुराना इतिहास विकेशा।
- २. रक्तप्रवृति गुदमार्गं ने ही होती है।

रस पिश

- १. पूराना प्रविद्या गही विदेश ।
- २. गुदा, मुल, गागिका आदि से बी रक्त गिकल मक्ता है।
- र इस्ते पादे गुरा नाम्यां गुदे इपणयोग्यया । शीयो दुरवार्थनार्थं च यरवाग्राच्यीऽर्शाती हि छ ॥ इस्पार्थनार्थं सम्मोदद्दछदिरकस्य राष्ट्यरः ।
- रूपा ग्रदस्य पायः सिदानुगुद्दजागुरम् ॥ प० पि० १४।२६-२७ २. . . . याप्यन्वेजन्त्रस्थादिमि ॥ स० ४० मि० ७।५३
- है. शैक्तवादायुषस्त्रानि चतुष्पादमगन्ति । याप्यन्ते सीमकायाग्ने. प्रस्थान्येयाग्यतोऽज्यथा ॥ ५० वि० १४।२८

- ३. अंगुलि व गुदपरीक्षा से मस्से मिलेंगे।
- ४. रक्तप्रवृत्ति मलत्याग के पूर्व या प्रश्नात् होगी।
- ५ मलत्याग मे अत्यधिक पीडा होती है।
- ६ रोगी को प्राय विवन्ध रहता है।
- ७ रक्तमिश्रित अन्न को कुत्तायाकीमा खासकताहै, रक्त गुद्ध होताहै।
- ८ इसके रक्त से रगा हुआ वस्त्र धोने पर स्वच्छ हो जायेगा।
- ९ रक्त की मात्रा कम निकलती है।

- ३. मस्से नही मिलेंगे।
- ४. मलत्याग के विना भी रक्तप्रवृत्ति हो सकती है।
- ५ इसमें पीडा नही होती।
- ६ इसमे विवन्ध का सम्बन्ध नही है।
- ७. रक्तमिश्रित अन्न को कीआ या कुत्ता नहीं खाता है, रक्त दूषित होता है।
- ८ इसके रक्त का दाग नही घुलेगा।
- । ९ रक्ते की मात्रा अधिक निकलती है।

दोषनिरपेक्ष अशं के लक्षणों के दो प्रकार

१. स्थानिक—इसमे मलावरोध, विष्टम्भ, आटोप, मन्दाग्नि, उद्गारवाहुल्य, गुदपरिकर्तन, रक्तस्राव और वेदना आदि लक्षण होते हैं।

२ सार्वदेहिक — रक्तस्रावजन्य रक्ताल्पता, पाण्डुरोग का प्रादुर्भाव, आंतो में मल का सडना, मलप्रभावज तन्द्रा, कास, श्वास, हृदयद्रव और दुर्वेलता आदि लक्षण होते हैं।

अर्शरोग को चिकित्सा

अर्श की चिकित्सा के चार प्रकार हैं— 9. औषध से, २. शस्त्र से काटना, ३. क्षार से जलाना और ४. अग्नि से जलाना । इनमे तीन कमें शस्त्र, क्षार एव अग्नि का प्रयोग शल्य-चिकित्सक का क्षेत्र है। आचार्य चरक (जो आयुर्वेदीय कायचिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता हैं) उक्त तीनो कमों को उत्तम नहीं मानते। क्योंकि उनसे अनेक प्रकार के उपद्रव होने का भयद्भर अवसर होता है और अशों के पुन उत्पन्न होने की सभावना बनी रहती है।

शस्त्रकर्म-क्षारकर्न, या अग्निकर्म से भ्रश होने से पुस्त्वशक्ति का नाश, गूदा में शोथ, पुरीष के वेग की एकावट, आध्मान, दारुण शूल, अगो में व्यथा, रक्त का अतिस्राव होना, मासाकुर का पुन निकलना, अशें के छेदन में हुए व्रण के भर जाने पर गुदा में क्लेद, गुदभ्रश अथवा शस्त्र-क्षार-अग्नि के विभ्रम से मृत्यु भी सभावित है। अतः चरकाचार्य ने अशें के समूल नाश के लिए सुखपूर्वक किये जाने योग्य अदारुण औषध-चिकित्सा का उपदेश किया है।

चिकित्सासूत्र

सभी अर्शों मे---

१ अर्शनिक कारण (आहार-बिहार) का परित्याग।

१ च० चि० १४।३३-३७

	२. पुरीप, वायु, पित्त और कफ का अनुलोमन
	अर्थात् स्वमार्ग-गमन का प्रयत्न करना।
	३. वायु का अनुलोमन फरना ।
	४ विवन्ध को दूर फरना।
	५. जठराग्नि को प्रदीप्त करना ।
	६ उक्त कार्यों में सहायक जीपघ, अन्नपान
	और बाहार-विहार का सेवन करना।
	. ७. दीघता और सावधानी पूर्वक विकित्सा ^र ।
	८ दोपानुसार भीपध-सिद्ध दूध का प्रयोग ।
वातज अर्श में	१. स्नेहन-स्वेदन ।
	२. वमन, विरेचन, आस्यापन और अनुवागन
	वस्ति का वावस्यकतानुसार प्रयोग करना।
पित्तज वर्श मे	१. विरंचन देना ।
कफज लदाँ मे	१. यगन कराना ।
	२ आद्रेक और कुलघी का विविध प्रयोग।
रक्तज वर्ध में	१ मधमन चिकित्मा फरना।
द्वन्द्वज अर्शे मे	१ दोषानुसार मिश्रित चिकित्ता करना ।
त्रिदोपज वर्षं मे	१ त्रिदोपशामक चिकित्सा फरना।
	२. त्रिदोपहर भौषधिनद्ध भजाक्षीर गा प्रयोग। ³
उदावतं ^४ होने पर	१ जनुवासनवस्ति का प्रयोग, अथवा
	२. निम्ह्वस्ति का प्रयोग ।
रक्तस्राव में—	१ रक्तपित्त के समान उपचार व औपध आदि।
1	

१ (क) यद् वायोरानुलोम्याय यद्गिनश्लकृद्धये। अन्नपानीपभद्रन्यं तद् सेथ्यं नित्यमर्शमे,॥

(ख) यदती विपरीतं स्यान्निदाने यच्च दक्षितम् । गुदनामिपरीतेन तत् सेर्व्यं न कदाचन ॥ चरक चि० १४।२४७-४८

(ग) भित्वा विवन्धाननुलोमनाय यन्गारतस्याऽग्निवलाय यच्च । तद्वपानीपथमशंसेन सेन्य विवज्ये विपरीतमस्मार ॥

(प) सन्नेऽनले सन्ति न सन्ति दीप्ते रक्षेदतम्तेषु विशेषतोऽग्निम् ।

ग० ए० चि० ८।१६३-६४

२ सर्वेषां प्रश्नमे यत्नमाशु सुर्याद् विचक्षणः। तान्याशु हि गुदं वद्ष्या सुर्युर्षेदगुदोदरम् ॥ च० चि० १४।३२ ३ सुश्रुत० चि० ६।१६

४ उदावर्तपरीताये ये चास्यर्थं विरूक्षिता । विलोमवाता श्र्लार्तास्तेष्विष्टमनुवासनम् ॥ निरूहं वा प्रयुक्षीत सक्षीरं पाख्रमूलिकम् । समूत्रस्तेहलवर्णं कल्केयुंकां फलादिमि ॥ छ० ह० चि० ८।८९ तथा ९३

कायचिकित्सा

मलावरोध मे— वात-कफ की प्रधानता वाले अर्थ मे—

- १ विबन्धनाशक चिकित्सा ।
- १ तक्र का प्रयोग या तक्रकल्प करना।

चिकित्साकर्म की सुममता के लिए अर्श को दो प्रकार का माना गया है— १ शुब्कार्श और २ आर्द्रार्श (रक्तार्श)

शुष्काशं में---

- १ अभ्यङ्ग, स्वेदन, धूपन, अवगाहन, प्रलेप।
- २. रक्तस्रावण, दीपन और पाचन प्रयोग।
- ३. अपानवायु और पुरीष का अनुलोमन।
- ४ औषधसिद्ध घृत का प्रयोग, तक्र-प्रयोग, उत्तम अरिष्ट तथा सिद्ध औषध प्रयोग।
- रक्ताशं मे---
- ९ रक्तस्राव का अवरोध करना, एतदथं क्वाथ-कल्क-स्नेह का प्रयोग।
- २. प्रतिसारण, अवगाहन, प्रदेह, परिषेचन एव रक्तरोधक जीषध तथा आहार।

शुष्कार्श-चिकित्सा

बाह्य उपचार

- (१) अभ्यङ्ग-जब अशं में स्तव्यता, शोय और शूल हो, तो चित्रक-जवाखार और बेल की छाल के कल्क से सिद्ध तेल की मालिश करे और इस तेल का अवसेचन करे—रूई चुभोकर मस्से पर रखे। इसी प्रकार सर्प की, बिलार की, ऊँट की या सूजर की चर्ची का अभ्यग और अवसेचन करना चाहिए।
- (२) स्वेदन: पिण्डस्वेद—१ जो के सत्तू में पिण्डी बनने लायक मात्रा में तेल-घी मिलाकर पोटली बनाकर उससे स्वेदन करे या २ घोडवच और सौंफ को पीसकर तेल मिलाकर, पोटली बनाकर स्वेदन करे अथवा ३. तिल का कल्क और घान की भूसी मिलाकर बनाये गये पिण्ड से स्वेदन करे अथवा ४. कूठ के कल्क एव क्वाथ से सिद्ध तैल का अभ्यग कर, ईट गरम कर के या अजवायन की पोटली से या गाजर पीसकर बनायी गयी पोटली से स्वेदन करे। ५. गोबर के पिण्ड से या गदहे या घोडे की लीद के पिण्ड से स्वेदन करे।
- (३) अवसेचन--अरुस, मदार, एरण्ड और बेल की पत्तियों का क्वाथ बनाकर, कुछ-कुछ गरम रहने पर उससे मस्सों को घोना चाहिए या उसका आबदस्त लेना चाहिए।
- (४) अवगाहन यदि रोगी की शूल होता हो, तो तैल की मालिश करके, उसे बेर की पत्ती या बेल की पत्ती के सुझोष्ण क्वाय को या मट्ठे को या गोमूत्र को टब मे भर कर उसमे बैठावे, जिसमें रोगी का गुदहार डूबा रहे।

(५) धूपन-रोगी के गुद-प्रदेश में सूझर की वर्बी या साँप की वर्बी की मालिश कर अर्थ पर धूपन करना चाहिए। धूपनाथ देवदाली (बन्दाल) का प्रयोग उत्तम है।

धूपन द्रश्य — अर्क मूल की छाल, शमी के पत्ते, मनुष्य के केश, सर्प की फेंचुली और विलार का चाम, इन सबको कूटकर घी मिला ले।

प्रयोग—रोगी को एक ऐसी कुर्सी या स्टूल पर वैठावे जिसके वीच मे गुदहार से कुछ वडा छिद्र हो। इस्टूल छोटे पाये का हो और चारो ओर से ढँका हो, एक ओर कुछ खुला हो। स्टूल के नीचे एक कडाही या परई मे जलते हुए अगारे पर घोडा- थोडा धूपन द्रव्य डालते रहे। इस वात की सावधानी वर्तनी चाहिए, कि धुँआ मस्से पर लगे। हाथी की लीद, घी और राल को मिलाकर धूपन करना उत्तम है।

- (६) लेप—9 हल्दी के चूर्ण को सेंहुड के दूध मे मिलाकर मस्से पर लेप करे या २ पीपर, चित्रकमूल, कालीनिशोध, तूर्तिया, कबूतर की विष्ठा, हल्दी का चूर्ण और गुड, इन सबको पीसकर मस्से पर लेप करे या ३. शिरीप बीज, कूठ, पीपर, सेंघानमक, गुड, मदार का दूध, सेंहुड का दूध और हर्रा-बहेडा-आंवला का चूर्ण एक में पीसकर मस्से पर लेप करे।
- (७) उपनाह (पुल्टिस)—१ भाग, मुकुरींद्या की पत्ती और महुआ के फूल को पानी में पीसकर टिकिया बनाकर गरम कर मस्से पर बाँद्यना चाहिए या २ काले तिल को पीसकर पोटली बनाकर हल्का गरम कर सेंक कर मस्से पर बाँद्ये अथवा ३. एरण्डमूल, देवदारु बुरादा, रास्ना और गुलहठी सब समभाग और गेहूँ की दिलया सबके बराबर मिला दूध में पकाकर गाढा कर ले, फिर पोटली बनाकर सुखोष्ण सेंक कर पुल्टिस बाँद्ये।
- (८) वित्यारण—देवदाली (वन्दाल) के जाल और मूल को पीसकर उसमें समभाग जवाखार, गुङ्जावीज, सूरण और नया पेठा (कूप्माण्ड) का बीजचूर्ण मिलाकर वत्ती वनाकर, गुदा में घी या तेल लगाकर भीतर प्रवेश करावे।
- (९) पिचुवारण—कासीसादि तैल अगवा पिप्पल्यादि तैल को रूई मे डाल फ़ाहा वनाकर गुदा मे घारण करावे।

वक्तव्य — उक्त वाह्य उपचार जो अभ्यग से लेकर पिचुद्यारण-पर्यन्त कहे गये हैं, वे अर्थ मे होनेवाली स्तव्यता, शोथ, खुजली और वेदना को शान्त करते हैं। इनके प्रयोग से अर्थ मे रक्त निकल जाता है, जिससे अर्थ रोग ठीक हो जाता है, किन्तु यदि रक्त दुष्ट हुआ रहता है, तब उक्त उपचारों से रोगशमन नहीं होता। ऐसी स्थिति मे शुष्कार्थ से रक्त निकाल देना चाहिए।

(१०) रक्तमोक्षण—रक्तमोक्षण-कर्म जलीकाओ द्वारा तथा शस्त्रो द्वारा वेधन आदि करके एव सूई प्रविष्ट करके करना चाहिए। रक्तमोक्षण वार-वार करना चाहिए। यह कार्य शल्यविद् चिकित्सक द्वारा कराना चाहिए और उनके प्रयोग के साथ निर्धारित पूर्वकर्म, प्रधानकर्म तथा पश्चात् कर्म का पालन करना चाहिए।

शुकार्श में आभ्यन्तर प्रयोग

- १ कोष्ठिमुद्धि के लिए—प्रात काल नारायण चूर्ण अथवा त्रिफला चूर्ण या गुलकन्द ८-१० ग्राम की मात्रा में सुखोष्ण जल से सेवन करे।
- २. एरण्डतैल अथवा अलसी तैल २५-५० ग्राम सुखोष्ण दूध के साथ रात मे पीने से अन्त्र में स्निग्धता होने से मलावरोध दूर हो जाता है।
- ३ रात्रि में सोते समय निशोथ का चूर्ण ६-८ ग्राम समभाग में त्रिफला चूर्ण के साथ सुखोष्ण जल से ले।
- ४. भोजन के पूर्व भुनी हुई छोटी हर्रे का चूर्ण ६ ग्राम, १० ग्राम गुड के साथ लेना चाहिए।
- ५. पाचनार्थं--- त्र्यूषणादि चूर्णं (च० चि० १४) की ४ ग्राम की मात्रा गरम जल से प्रात -साय लेवे।
- ६ विजय चूर्ण-६ ग्राम की मात्रा मे प्रातः-सायं गरम जल से या एरण्डतैल से लेना चाहिए।
- ७. लवणभास्कर चूर्ण-४ ग्राम की मात्रा मे मट्ठे के साथ प्रात साय लेते रहना चाहिए।
- ८ काला तिल ५० ग्राम और ५० ग्राम मक्खन या दही की साढी को चवाकर २१ दिन तक खाने से मस्से नष्ट हो जाते हैं।
- ९. चित्रकमूल, हाऊबेर और घी मे भूनी हींग के सममाग चूर्ण को १-२ ग्राम की मात्रा में प्रात -साय लेवे।
- १० पंचकोल—(चाभ-चीता-सोठ-पीपर-पिपरामूल समभाग) चूर्ण ३-४ ग्राम प्रतिदिन प्रात-सार्य मट्ठे से सेवन करे।
- ११ भोजन के प्रथम ग्रास के साथ हिंग्वष्टक या हिंग्वादि चूर्ण ३ ग्राम घी मिलाकर सेवन करे।
- १२ काला तिल २५ ग्राम और १ नग भिलावा को कूटकर समभाग मे गुड मिलाकर खिलाना चाहिए। स्मरण रहे कि इस योग को खाते समय पहले और वाद मे ६-६ ग्राम घी चाट लेना चाहिए।
- १३ सींठ और चित्रकमूल का चूर्ण ३ ग्राम की मात्रा मे प्रात:-साय सुखोष्ण जल से लेना चाहिए।
- १४ सूरण को पुटपाक (ऊपर २ अगुल मोटी मिट्टी का लेप कर अग्नि में पकाकार) विधि से भर्ता बनाकर नीबू, तेल और सेंधानमक मिलाकर खाना चाहिए। यह हितकर है।
 - १५. बैंगन का भर्ता बनाकर तेल-नमक डालकर खाना चाहिए।
 - १६. तक्कप्रयोग चित्रक के मूल की छाल को पीसकर मिट्टी के बढे पात्र

१ (क) त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्मं प्रलेपयेत्। तक्र वा दिथ वा तत्र जातमश्रोंहरं पिनेत्॥

(कडाही, निदया या तौला) के भीतरी भाग मे लेप करे और उसमे दूध डालकर दही जमावे। उस दही को मयकर मट्ठा बनाकर पीने से अर्श नष्ट हो जाता है।

१७ जिस रोगी की जठराग्नि अत्यन्त मन्द हो, उसे केवल तक्र का ही सेवन करावे। रोगी एव रोग तथा शीत-उष्ण काल का विचारकर १ सप्ताह, १० दिन, १५ दिन या १ माह तक तक्र पिलावे अथवा दिन मे तक्र दे और रात मे धान के लावा के सत्त को तक्र मे लेई की तरह बनाकर सेंधा या कालानमक मिलाकर खिलावे।

१८ त्रिविष्य तक-(१) रूक-जिसमे से मनखन निकाल लिया गया हो। (२) अर्घोद्धृत स्नेह-जिसमे से आधा मनखन निकाला गया हो। (३) सस्नेह-जिसमें से मनखन न निकाला गया हो। इनका प्रयोग वातादि दोप और रोगी की अग्नि तथा वल का विचार कर करना चाहिए।

१९ तक-सेवन से विलक्षण फल--तक्र के लगातार सेवन के फलस्वरूप नष्ट हो गये अर्श के अकुर पुन नहीं उत्पन्न होते।

२०. वाचायं चरक ने तक और विज्ञक को श्रेट्ठतम वहाँनाहाक माना है— (१) वे कहते हैं, कि 'निरन्तर तक का सेवन ग्रहणीविकार, सर्वाङ्गिधाय, वर्षे तथा घृतव्यापत्ति (वर्जीणं वादि) का प्रधमन करनेवाले उपचारों में श्रेष्ठ है।' (२) 'जो द्रव्य दीपन, पाचन एव गुदशोय, वर्षो और धूल को धान्त करनेवाले हैं, उनमें चित्रकमूल श्रेष्ठ है।'

२१ तकारिष्ट (च० चि० १४।७२-७५)—यह अग्नि को प्रदीत करता है, मोजन मे रुचि उत्पन्न करता है, शरीर का वर्ण निसारता है एव कफ तया वात का अनुलोमन करता है। गुदशोय, खुजली और पीड़ा को शान्त करता है और वल को बढाता है।

प्रयोग—इसे जब भी सेवन किया जाय, तब शरीर-वल, अग्नि और दोप के अनुमार उचित मात्रा मे पीना चाहिए या अकेले ही प्रात -मध्याह्न-सायं पीना चाहिए।

⁽ स) अत्यर्थमृदुकायाग्नेस्तकमेगावचारयेष । सायं वा लाजसक्तूनां दणाद तकावलेहिकाम् ॥

⁽ग) रूक्षमर्थोब्वत्तेष्टं यतश्चानुद्धृतं पृतम्। तक्षं दोपारिनवलवित् त्रिविध तस् प्रयोजयेत्॥

⁽भ) इतानि न प्ररोहन्ति तक्षेण गुदजानि तु। नातस्रेथ्मविकाराणां शतं चापि नियतंते। नास्ति तकात्परं किश्चिदौपभं कफनातजे॥

च० चि० रे४।७६-७७, ७९, ८४-८५, ८८

१ (क) तकाभ्यासो ग्रहणीदीपशीकाशीं घृतव्यापरप्रशमनानाम् ।

⁽ ख) चित्रकमूलं दीपनीयपाचनीयगुदशोफाशं शूलहराणाम् । च० स० २५।४०

⁽ग) न तकसेवी व्यथते कदाचित न तकदम्धा प्रभवन्ति रोगाः। यथा सराणाममृत सुखाय तथा नराणां सुवि तक्रमाहु ॥ भावप्रकाश

⁽ घ) वातरुष्मार्श्वतां तकात् परं नास्तीद्द भेपजम् । च० चि० १४।७७

२२ मल्लातक—वाग्मटाचायं ने अशं के शमनायं (शुष्काशं में) भिलावे को श्रेष्ठतम श्रेष्ठ कहा है। इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। १-१ अदद भिलावा सवेरे-शाम खिलावे। भिलावे को सरौते से ४-६ दुकड़ा काट कर पान के वीडे मे रखकर चूसे। इसके पहले मुख के भीतर ६ ग्राम घी लगा ले और चूसने के बाद भी मुख मे घी लगा ले। चूसते समय मुख को बन्द रखे। एक सप्ताह तक १-१ और बाद मे २-२-भिलावे लेते रहे, जब तक कि लाभ न हो जावे। भिलावे को सरौते से काटते समय हाथों में , घी लगा ले। एक-डेढ महीने तक भिलावा खिलाना चाहिए।

२३. पेया, यूष, यथायू और पेय जल—पीपर, पिपरामूल, चित्रकमूल, गजपीपर, सोठ, जीरा, धनियाँ, तुम्बुर, बेल की गुद्दी, काकडार्सिगी और पाठा, इनके कल्क से सिद्ध पेया, यूष और जल का प्रयोग करे।

२४. अनुलोमन योग (१)—अजवायन, सोठ, पाठा, खट्टे अनार का रस, गुड, महा और सेंघानमक एक में मिलाकर पिलाने से वायु एव मल की प्रवृत्ति होती है। (२) वायु एव मल के विबन्ध को दूर करने के लिए—पिप्पल्यादि घृत, चव्यादि घृत या नागरादि घृत (सभी च० चि० १४) का २०-२५ ग्राम की मात्रा आहार में या पेय पदार्थ मे प्रयोग करना चाहिए।

२५. अनुपान—रोगी की प्रकृति के अनुसार मिंदरा, गन्ने के रस से बनाया सीघु, महा, तुषोदक, दही का पानी, गरम या शीतल जल या धनियाँ व सोठ डालकर पकाया गया जल देना चाहिए।

२६ भोजनोत्तर पीने के लिए-अभयारिष्ट, दन्त्यरिष्ट, द्राक्षासव या फलारिष्ट २०-२५ मि० ली० समान जल के साथ देना चाहिए।

२७ प्रक्षालन—भाग की पत्तियों को जल में पकाकर आधा जल वचने पर छान ले और इस सुखोष्ण जल से मस्से और गुद को प्रक्षालित करना चाहिए।

सिद्ध योग

१. ब्योषादिचूणँ^२ ३-६ ग्राम या लवणोत्तमादि चूणँ³ ३-६ ग्राम या विजय चूणँ³ ३-६ ग्राम सुखोष्ण जल से दिन मे ३ बार दे।

१ मल्लातकोऽर्श स (गरेषु हेम)। घ० इ० उ० ४०।४९ मल्लातक प्रयोग—देखें च० चि• १ (पाद २ में) शुष्केषु मल्लातकमग्रथमुक्तं भैषच्यमाद्रेषु तु वत्सकत्वक्। सर्वेषु सर्वर्तुषु कालशेयमर्श सु बस्यं च मलापह च॥ घ० इ० चि० ८।१६२

२ व्योषाग्न्यरुष्कर्विडङ्गतिलाभयानां चूर्णं गुडेन सहितं तु सदोपयोज्यम् । दुर्नामकुष्ठगरशोधशकुद्विबन्धानग्नेजयत्यवृक्तां कुमिपाण्डुतां च ॥ मै० र०

३ लवणोत्तमविष्ठकिल्क्षयवान् विरिवल्बमहापिचुमर्दयुतान् । पिव सप्तदिनं मथिताछलितान् यदि मदितुमिच्छिस पायुरुहान् ॥ मै० र०

४ इन्यात्तयाशोधमशीसि च मगन्दरम् । मै० र०

```
२. वृहत् सूरणमोदक
                         १०-१५ ग्राम सुखोब्ण जल से दिन मे ३ बार या
    बाहुशाल गुड<sup>३</sup>
                          ६-१२ ग्राम सुखोष्ण जल से दिन मे ३ वार या
    काकायन मोदक 3
                          ६-१२ ग्राम सुखोष्ण जल से दिन मे ३ वार दें।
 ३ प्राणदा गुटिका४
                                  ग्राम सुखोब्ण जल से प्रात -साय या
    काकायन वटी
                          है-१ प्राम
    अर्शोघनी वटी
                          ३०० मि० ग्रा०
                                                                 ž i
    ( अायु० सा० स )
 ४. चन्यादि घृत
                          १०-२० ग्राम
                                             द्रध मे
                                                                 या
    नागरादि घृत
                          90-70
                                                                 या
    पिप्पल्यादि घृत <sup>८</sup>
                          90-20
                                                                 दें।
 ५. अर्श कुठार रस र
                           ३०० मि० ग्रा०
                                             गरम जल से
                                                                या
    अगस्तिमोदक<sup>90</sup>
                                  ग्राम
                                                                 या
    भल्लातकादि मोदक
                           २-३ ग्राम
                                               दूध से
                                                                 देवे।
नोट--आवश्यकतानुसार एक या अनेक योगी का प्रयोग करें।
```

व्यवस्थापत्र

१ दिन मे ३ वार

वाहुशाल गुह १० ग्राम

१ मात्रा

सुखोष्ण जल से ।

२ भोजन के तुरन्त पूर्व

काकायन वटी १-२ गोली जल से ।

या

भोजन के प्रथम ग्रास मे

हिंग्वष्टक चूर्ण ३ ग्राम

१ मात्रा

षी मिलाकर।

१ प्रमवित शस्त्रक्षाराग्निभिविनाप्यशंसामेप.। भै० र०

२ दुर्नामारियब्राशु दृष्टो वारसहस्रश । मै० र०

व मिविवनतमिति प्रोक्तं श्रेष्ठमञ्जीविकारिणाम् । भै० र०

४ इन्यादशीक्षि सर्वाणि सहजान्यस्र जान्यपि । भे० र०

५ अर्थोहदरोगशमनी । मै० र०

६ शक्रद्वातानुकोम्यार्थम् । च० चि० १४

७ अर्थासि ग्रहणीदोर्ग । च० चि० १४

८ महण्यशीविकारध्नम् । च० चि० १४

९ सर्वरीगकुछान्तक । मै० र०

१०. शोफाशोंग्रहणीदोशकासोदावर्तनाशनान् । मै० र०

३. भोजनोत्तर २ बार अभयारिष्ट⁹

२५ मि० ली० १ मात्रा

समान जल के साथ पीना।

४ रात में सोते समय

आरोग्यवर्धनी वटी

१ ग्राम

सुखोष्ण दूध से ।

या

वैश्वानर अथवा— शिवादशक चूर्णं ६ ग्राम उष्णोकद से ।

५. मस्से पर---

कासीसादि तैल की मालिश।

पथ्य

पुराना अगहनी चावल, साठी का चावल, गेहूँ, जौ, कुलथी, अरहर, मूग की दाल, परवल, करेला, नेनुआ, मूली, लोनी, मकोय की पत्ती, बयुआ, तिनपितया, कचूर की पत्ती, गाजर, आँवला, अजीर, मुनक्का, गुलकन्द, अजवायन, जीरा, धनिया, हीग, लहसुन, वैगन का भर्ता, मट्टा, किशमिश, पपीता और घी का सेवन करना हितकर है।

अपथ्य

मटर, चना, मक्का, बाजरा, सावाँ, कोदो, महुआ, सेम, वहा, कोहहा, आलू, अरुई, भिण्डी, अचार, भरवा मरचा, गरम मसाला तथा गरिष्ठ भोजन करना अहित-कर है। घोडा, ऊँट या हाथी की सवारी, घोडजक वाला इक्का और वैलगाडी पर यात्रा करना अहितकर है। आरामतलवी और मल-मूत्र आदि के वेगो को रोकना हानिकर है।

रक्तार्श-चिकित्सा विशिष्ट चिकित्सासूत्र

- १ पूर्वोक्त चिकित्सासूत्र के निर्देशानुसार उपचार करे।
- २ पित्त तथा कफ की अधिकता वाले रक्तार्श मे वमन एव विरेचन करावे।
- ३. रोगी के वल के अनुसार उसे उपवास करावे।
- ४. जब तक दुष्ट मलिन रक्त का स्नाव हो, तब तक उसे न रोके।
- ५ दुष्ट रक्त के निकल जाने पर रक्तस्राव की रोकने का उपाय करे।

१ अर्शासि नाशयेच्छोप्रं तयाष्टाबुदराणि च । क्वॉमूत्रविवन्धको विह्नं सन्दीपयेत परम् ॥ मै० र०

- ६. रक्तावरोध, अग्निदीपन और दोष-पाचनार्थ तिक्त द्रव्यो का प्रयोग करे।
- ७ क्षीणदोष एव वातप्रधान रक्ताशें मे पान, अभ्यग तथा वस्ति मे स्नेह का प्रयोग करे।

८. रोगी के अग्निबल की अपेक्षा कर बारी-बारी से मधुर-अम्ल एव शीत-उष्ण

९ यदि रक्ताशं मे वार्त या कफ का अनुबन्ध न हो, तो पित्त की प्रधानता से ग्रीष्म ऋतु मे होने वाले अर्श के रक्तस्राव को निश्चय ही बन्द करे।

१० रोगी ऐसे आहार-विहार, पेय पदार्थ और औषध का सेवन करे, जो मलावरोध तोडकर, वायु का अनुलोमन कर अग्नि के बल को बढावे।

99. यदि रक्तार्श में बात का अनुबन्ध हो, तो स्निग्ध और शीतल आहार-विहार, पान एवं औषध का सेवन करावे।

१२. यदि कफ का अनुबन्ध हो, तो रूक्ष एव शीतल आहार-विहार, पान और औषध का सेवन करावे।

रक्तार्श मे बाह्य उपचार

- १ दाहुशमन-शतधीत घृत या जात्यादि घृत को गुदा मे और मस्से पर लगावे।
- २ धूपन--राल के चूणें में सरसो का तेल मिलाकर, आग पर छोडकर, मस्से पर धुंआ लगावे।
 - ३ लेप—तीता नेनुआ को पीसकर मस्से पर लेप करना चाहिए।
- ४ परिषेचन-मुलहठी, बट, पीपर, पाकड, गूलर और महुआ की छाल, बेर की छाल, अक्स की पत्ती, घाय का फूल, यवासा, अर्जुन की छाल और नीम की छाल का क्वाय वनार्कर मस्सो पर सुखोष्ण घारा गिरावे और इस क्वाय से मानदस्त लेवे।

५ अवगाहन—रक्तस्राव अधिक होता हो, तो मुलहठी, खश, पदुमकाठ, लाल-चन्दन, कुश और काश के समभाग के क्वाय को टब मे रख कर उसमे रोगी को बैठावे, जिसमे गुद-प्रदेश क्वाथ मे डूबा रहे।

६ धाराऽवसेचन—रक्तस्राव यदि वन्द न हो रहा हो, तो रोगी को ओंधे मुँह लिटाकर गुदा पर शतधीत घृत का लेप कर बर्फ का पानी या ठडे जल की धारा गिरावे। फिर गुदा को केले के पत्ते से ढँककर पखे से ठण्डी हवा देवे।

७ प्रतिसारण—गुदा मे दाह और क्लेद हो, तो १ राल और घृत या २ लाल तथा सफेद चन्दन घिसकर या ३. रसौत और घृत अथवा ४ कालातिल और मुलहठी अथवा ५ निम्वपत्रफेन और घृत मिलाकर गुदा तथा मस्से पर धीरे-धीरे मालिश करनी चाहिए।

८ कल्कघारण — नीलकमल, लाजवन्ती, मोचरस, श्वेतचन्दन, बेल की गुही और लोध की छाल तथा गूलर की छाल को समभाग लेकर, बहुत वारीक पीसकर

१ भिला विवन्धाननुलोमनाय यन्मारतस्याग्निवलाय यच्च । तदश्रपानौषधमशैसेन सेन्धं विवन्धं विपरीतमस्मात् ॥ स० ६० चि० ८।१६६

वर्फं के पानी से तर कर महीन कपडे में रखकर लुगदी बनाकर, औंछे मुँह लेटे हुए रोगी की गुदा में घारण करावे।

वाम्यन्तर चिकित्सा

- 9. तर्पण-यदि बाह्य शीतल उपचारों से रक्तस्राव न रुके, तो स्निग्ध एव उष्ण पेया, यवागू अथवा मासरस का आहार देकर रोगी को संतृप्त करना चाहिए।
- २. रक्तमाव से उत्पन्न दुवेंलता को दूर करने के लिए रोगी को भोजन के पूर्व तथा प्रमात् अधिक से अधिक जितना वृह खा-पी सके, उतनी मात्रा में मिश्री मिलाकर घी खिलावे या पिलावे।
- ३ वातप्रधान रक्ताशं मे सुखोष्ण घी से अनुवासन वस्ति देनी चाहिए अथवा सफल पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए।
- ४. पिच्छावस्ति—यह पिच्छायुक्त (लसदार) द्रव्यो से दी जाती है। इसका उद्देश्य शरीर से निकलने वाले पिच्छास्राव को तथा शुद्ध रक्त के स्नाव को रोकना है। यह सम्राही वस्ति है।
- ५. अर्शरोगी के पिच्छासाव में हीबेरादि घृत और सुनिषणक घृत का भोज्य पदार्थों के साथ या दूध मे प्रयोग करना अतिशय लाभकारी होता है। (इनका पाठ चरकसिहता-चिकित्सास्थान के चौदहवें अध्याय मे है)।
- ं ६. कफप्रधान रक्ताशं मे चिरायता, सोठ, जवासा, लालचन्दन, दारुहल्दी, नीम की छाल और खश का क्वाथ पिलाना चाहिए।
- ७. चूर्ण कोरया की छाल, इन्द्रजो, रसींत और अतीस के समभाग का चूर्ण २-२ ग्राम की तीन मात्रा चावल के धोवन से देवे।
- ८. लोघ, तिल, मोचरस, मजीठ, लालचन्दन तथा कमल्गट्टा, इनके समभाग का चूर्ण ३-३ ग्राम की तीन मात्रा शीतल जल से दे।
- ९ चन्दनादि श्वाय—लालचन्दन-बुरादा, चिरायता, जवासा, सोठ, इन्द्रजी, कोरया की छाल, खश, अनार के फल का छिलका, नीम की छाल, दारुहत्दी, लजैनी, अतीस और रसौत, सबको समभाग लेकर भूसा की तरह कूट ले। ५० ग्राम दवा को १ लीटर जल मे पकावे, चतुर्थांश वचे तो छान ले। इसे ३ भाग कर प्रात, साय तथा मध्याह्न चीनी मिलाकर पीना चाहिए। यह शीघ्र लाभ करता है।
- १० सञ्जिष्ठादि चूर्ण--मजीठ, कमलगट्टा, मोचरस, लोघ, कालीतिल, ध्वेत-चन्दन, लज्जावन्ती, राल, धावा का फूल, फूलप्रियगु और वेल की गिरी, सभी का

6

१ जवासा, कुश और कास (राही) के मूळ, सेमळ के फूळ, वट-गूळर-पीपर के नये कोमळ पत्ते १००--१०० ग्राम लेकर कुचळकर १ लीटर दूध तथा १ लीटर जळ में पकाबे, जव मात्र दूध बचे तो छान ले। फिर मोचरस, मजीठ, लाळचन्दन, कमळगट्टा, फूलप्रियंग्र, इन्द्रजी और कमळ की केशर १०--१० ग्राम वारीक पीसकर मिला लेने तथा मधु, धी और चीनी उचित मात्रा में मिलाकर वस्ति देने। यह पिच्छावस्ति प्रवाहिका, गुदर्भश, रक्तस्राव और ज्वर को नष्ट करती है।

समभाग में चूर्ण ३-३ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३ बार शीतल जल से या बकरी के दूध से देवे।

99 9 कोरया की छाल, २ बेलफल, ३. चित्रकमूल छाल, ४ सींठ, ५ अतीस, ६ धमासा, ७. दारुहल्दी, ८ बच, ९. हर्रा और १० चव्य—इन दश द्रव्यों की आचार्य चरक ने अर्कोष्टन कहा है। इन सबके समभाग का चूर्ण ३-३ ग्राम, दिन में ३ बार जल से देवे अथवा इनका क्वाथ बनाकर सबेरे शाम पिलावे। (च० सू० ४)।

१२ कोरया (वत्सक) की छाल का चूर्ण या क्वाय का प्रयोग रक्ताशं की श्रेष्ठ बौषध है। इसी प्रकार तक का सेवन भी रक्ताशं की उत्तम औषध है। वह बलकारक और दोषनाशक होता है। वाग्मटाचायं ने इनकी प्रशसा की है।

१३. मुदलादि रसिक्रया और मुदलावलेह—ये दोनों रक्ताशें मे निश्चित लामकर हैं। इनका योग वाग्मट (अ० ह० चि०८) का है। इनमे से किसी एक का १०--१० प्राम की मात्रा में दूध के साथ दिन में ३ बार प्रयोग करना चाहिए।

१४ रक्तस्राव में क्षीरपाक^र विधि से मोचरस³ का प्रयोग उत्तम है।

९५ बकरी का दूध या पञ्चगुणजल-सिद्ध गोदुग्ध^४ उत्तम पथ्य है ।

१६ १. कालातिल २० ग्राम और मक्खन २० ग्राम या २. नागकेशर (असली) ३ ग्राम, मक्खन २० ग्राम, मिश्री १० ग्राम अथवा ३. दही की साढी से मयकर बनाये गये मट्ठे को इच्छानुसार पीने के निरन्तर अभ्यास से रक्तार्श ठीक हो जाता है। प

१७ मोचरस १ ग्राम, नागकेशर असली १ ग्राम, स्वर्णगैरिक १ ग्राम और चीनी ३ ग्राम लेकर मिलावे एवं इसकी ३ मात्रा बनाकर प्रातः-सायं-मध्याह्न दूध या जल से देवे।

१८. कुकुरोंघा का स्वरस या अनार के कोमल पत्तों का स्वरस या गेंदा के पत्तों का रस १५ ग्राम की मात्रा में चीनी मिलाकर दिन में ३ बार पिलाने से रक्तार्श में लाम होता है।

१९. रीठा के फल के वक्कल को तवे पर रखकर जलाई गयी काली राख, सफेद कत्या, स्वर्णगैरिक, रसींत और संगजराहत की भस्म या पिष्टी, इन सबको समभाग में लेकर मिला लें। ३ ग्राम की मात्रा में चीनी मिलाकर मलाई या मक्खन के साथ दिन में ३ बार दें।

शुब्तेषु मल्लातकमम्प्रयमुक्तं मेषज्यमार्देषु तु वत्सकत्वक् । सर्वेषु सर्वर्तुषु कालशेयमर्शः सु बन्यं च मलापद्दं च ॥ अ० हृ० चि० ८

२ द्रव्यादष्टगुणं स्वीरं सीरात्तोयं चतुर्गुणम् । स्वीरावशेष कर्तव्यः सीरपाके स्वय विधिः ॥ परिभाषा-प्रदीप

३ विशेषतो विट्पथसम्प्रवृत्ते पयो मत मोचरसेन सिद्धम् । च० चि० ४

४. छार्ग पय स्यात् परमं प्रयोगे गव्य शृत पञ्चगुणे जले वा । च० चि० ४

५ नवनीतितिकाम्यासात् केश्वरनवनीतशकराम्यासात् । दिभसरमिथताम्यासात् अर्श्वास्यपयान्ति रक्तानि ॥ च० चि० १४।२१०

२० अर्झोब्नी वटी—नीम के बीज की गुद्दी, वकायन के बीज की गुद्दी और खूनखराबा—तीनो २-२ भाग, नृणकान्त मणि (कहरवा) पिष्टी १ भाग तथा खुद रसींत ६ भाग लेकर पीसकर ५०० मि० ग्रां० की गोलियाँ बनावें। १-२ गोली दिन मे ३ बार शीतल जल से देवे।

२१ शोणितागंल रस—अभ्रक भस्म ५ ग्राम, रसौंत ५ ग्राम, शुद्ध खपैर ५ ग्राम, शुद्ध फिटकरी २६ ग्राम, रक्तचन्दन चूर्ण १० ग्राम, स्वर्णगैरिक १० ग्राम, रसिन्दूर १० ग्राम और वेर या पीपल की लाक्षा १० ग्राम लेकर घोटकर रसौंत के जल की भावना देकर ३०० मि० ग्रा० की गोली बनावे। दिन मे ३ वार २-२ गोली जल से खिलाना चाहिए।

२२. पृथक्-पृथक् प्रयोग-योग्य द्रव्यो मे--१. कोरया की छाल, २ वेल सोठ ३ मोचरस, ४ कालातिल, ५ कुकुरींद्या, ६ मोस्कुर्स, ७. नागकेशर, ८ सोनागे इ., ९ लाक्षा, १० फिटकरी, ११. खूनखराबा (दम्मुल सखबैन), १२. लोद्य और १३. रसौत—ये उत्तम लाभदायक औषघ हैं।

२३ पलाण्ड् — पेया मे, यूष में, शाक मे या किसी भी खाद्य पदार्थ मे या अकेले ही सहन योग्य मात्रा मे प्याज का दीर्घकाल तक सेवन करते रहने से रक्तसाव तथा उदरवायु-विकार शान्त हो जाता है।

२४ रक्ताशं मे शूल होने पर^२—इन्द्रजी, कोरया की छाल, नागकेशर, नील-कमल, पठानीलोध और घाय के फूल समभाग के कल्क से सिद्ध किये हुए घृत का खाने-पीने मे प्रयोग करना अतीव हितकर है।

सिद्धयोग

१ नित्योदित रस	🕽 ग्राम की १–२ गोली घी लगाकर	प्रात -साय
अर्बंकुठार रस	या रै ग्राम की १–२ गोली गुलकन्द के साथ	प्रात -साय
जातीफलादि वटी	या २५० मि० ग्रा० ५ ग्राम तिल और	
	१० ग्राम मक्खन के साथ	प्रात -साय प्रात -साय
२. बोलबद्ध रस	५०० मि० ग्रा०	MIN MIN
बोलपर्पटी शखोदर रस	५०० मि० ग्रा० गुलकन्द से २०० मि० ग्रा० मक्खन-मिश्री से दिव	प्रात -साय न मे ३ वार

१ रसखडयूपयनागूसयोगतः केनछोऽधना जयति । रक्तमतिनतैमान नार्तं च पछाण्डुरुपयुक्तः ॥ च० चि० १४।२०८

२ कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोध्रधातकीकल्कै । सिंद्ध छूतं विषेय कूळे रक्ताशेंसां भिषता॥ च० चि० १४।१९७

क्रमिरोग, अर्शरोग तथा रक्तार्श

दिन में ३ वार ४ ग्राम जल से ३ समशक्र चूर्ण या दिन मे ३ बार लवणोत्तमादि चूर्णं, ४ ग्राम जल से या २ ग्राम जल से दिन मे ३ वार पुष्यानुग चूर्णं दिन मे ३ बार ४. चन्द्रप्रभावटी १ ग्राम दूध से या दिन मे ३ वार १ ग्राम दूध से वृहद् योगराजगुग्गुल् या १ ग्राम दूध से दिन मे ३ बार योगराज रस २०० मि० ग्रा० गुलकन्द से दिन में ३ वार ५ चन्द्रकला रस ३०० मि० ग्रा० गुलकन्द से दिन मे ३ बार कामदुघा रस नवायस लीह ५०० मि० ग्रा० मधु से दिन मे ३ बार नोट-उपयोगिता का विचार कर एक या अनेक योगो का प्रयोग करें।

व्यवस्थापत्र

१. दिन मे ३ बार शखोदर रस ६०० मि० ग्रा० तृणकान्त पिष्टी ५०० मि० ग्रा० अर्शोघ्नी वटी योग---३ मात्रा नागकेशर चूर्ण १ ग्राम और मधु से। २ भोजन के पूर्व २ बार 'समशर्कर चूर्ण ४ ग्राम जल से। २ मात्रा ३. भोजनोत्तर २ बार **उशीरास**व ४० मि० ग्रा० २ मात्रा समान जल के साथ पीना। ४. रात मे सोते समय तालीशादि चूर्ण ४ ग्राम जल से। १ मात्रा

कायचिकित्सा

अथवा

विजय चूर्ण <u>२ ग्रोम</u> जल से। <u>१ मात्रा</u>

अशंरोग का संक्षिप्त उपक्रम

रोगावस्था	कर्म	प्रयोगविधि
शोथ-शूल स्तव्धता	अभ्यग	चित्रक तैल, शूकरवसा, तिलतैल आदि
	स्वेदन	यव-माष-कुलथी की पोटली से या
		वच-सौंफ-महुआ की पोटली से
	परिषेचन	अरुस-अर्क-विल्वपत्र के क्वाय से
•		स्वेदन व परिषेचन
	अ्वगाहन	गनियार—सहिजन के क्वाथ या गो- मूत्र में
शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष,	रक्तमोक्षण	जोक लगाकर, शस्त्र या सुई से
अभ्यग लेप आदि से		
शमन न होने पर		
उदावतं, विबन्ध एव	अनुवासन	पिप्पल्यादि तैल ४ औंस से
प्रतिलोम वायु में	c c	
गुदशोष और शूल एव	निरूहवस्ति	दशमूल क्वाथ मे तैल एव नमक
पिच्छास्राव मे स्रावी अर्श पित्त-कफ-		मिलाकर
स्रावा अशापत्त-कफ- प्रधानदोष	शोधन	हरीतकी या निशोथ से विरेचन
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	अभ्यग, आभ्य-	पूर्वोक्त के अनुसार
रक्त और वात का प्रधानता हो तो	न्तर-स्नेहन	त्रवारक क अञ्चलार
अवानता हा ता	अनुवासन	
रक्त और पित्त की	परिषेचन	मुलहठी, पैचवल्कल, बेर, पटोल, बच,
प्रबलता में		अरुस, अर्जुन या नीम की छाल
		के क्वाय से ।
रक्तस्रावाधिक्य मे	अवगाहन	पचतृणमूल क्वाथ, कमल, मुलहठी,
	·	पदुमकाठ, चन्दन के क्वाथ में।
रक्तस्राव-निरोधार्थं	पिच्छावस्ति	जवासा, कुश, कास, आवला के क्वाय
		से या वट, गूलर, पीपल के
		कोमलपत्रो से बने क्वाय से या
		मोचरस के क्वाय में सैल
-	l l	मिलाकर ।

कृमिरोग, अर्शरोग तथा रक्तार्श

ाह में	लेपन	शतधौत घृत लेपन, बफं के पानी की
ोथ-शूल-जनहन मे	स्वेदन ['] परिषेचन	धारा गिराना । भाँग की पत्ती की पोटली से सेंकना या उसके पत्ते के क्वाथ से सुस्रोष्ण
हुष्कार्श एवं रक्तार्श मे	• औषध-सेवन	प्रक्षालन । भर्त्लातक के योग, कोरया के बने योग तथा कुटजादि रसक्रिया आदि ।

प्य

पुराना वासमती चावल, साठी का चावल, गेहूँ की दिलया, मूग, अरहर मसूर ही दालों का यूष, बकरी या गायं का दूध, दही की साढ़ी, मक्खन, मलाई, गोष्ठत, ग्युआ, चौलाई, कचनार का फूल, सेमर का फूल, पतली मूली, प्याज, दुढ़ी, तेनपितया, कच्ची गूलर, कच्चा केला, मधुर और अम्ल रसवाले द्रव्यों का बारी-गरी से सेवन, अनार, सन्तरा, मुसम्मी, सिघाडा, मुनक्का, किसमिश, आंवला तथा ग्रीतवीयं सौम्य आहार-विहार पथ्य हैं।

वपध्य

मल-मूत्रादि वेगो का धारण, घोडे आदि की सवारी करना, स्त्री-समागम, पका आम, पका केला, पका बेल, गरम मसाले, कन्दशाक, उकडू बैठना, अरवी, बंडा, कोहडा, बोडा, सेम, अचार, मरचा, भारी और विबन्धकारक पदार्थ खाना, सरसों का शाक, विरुद्ध भोजन, कटु-अम्ल और लवण रसवाले पदार्थों का अतिसेवन तथा मद्यपान आदि वर्जित है।

चतुर्दश अध्याय मूत्रकुच्छ्र, मूत्राघात तथा अभ्मरी मूत्रकुच्छ्

(Painful Micturation of Dysurea)

परिचय-अत्यन्त कष्ट के साथ मूत्रत्याग होने को मूत्रक्रच्छ्र कहते हैं। इस रोग मे वस्ति मे मूत्र रहता है और रोगी मूत्रत्याग भी करना चाहता है, किन्तु मूत्रमागं मे कही रुकावट होने के कारण पेशाव करने में तकलीफ होती है।

मूत्रकृष्छ्र शब्द का निर्वचन—'मूत्रप्रसवणे' धातु से घन् प्रत्यय करने पर 'मूत्र' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है—प्रसाव होना या धार से चूना। 'कृती छेदने' धातु से 'रक्' प्रत्यय तथा 'छ' आदेश होने पर कृष्छ्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ है— शरीर मे पीडा होना। कष्ट, कृष्छ्र और आभील, ये तीनो शब्द शरीर की पीडा के अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं।

इस प्रकार 'मूत्र का अत्यन्त पीडा के साथ निकलना मूत्रकुच्छ्र है'। 'यत्र रोगे कुच्छ्रेण (पीडापूर्वक) मूत्र्यते, तत् मूत्रकुच्छ्रम्' यह निकक्ति है।

अथर्ववेद के प्रथमकाण्ड के दूसरे और तीसरे सूक्त मे मूत्रकुच्छ्र या मूत्रावरोध का वर्णन है, जिसमे कहा गया है—हे रोगातंं तेरा जो मूत्र दोनो गवीनियो मे, आंतो मे और वस्ति (मूत्राशय) मे सचित है, वह सब वाहर निकल जावे'।

अौषध — अथवंवेद के (१।२।१-४ तथा १।३।१-५) मन्त्रों में मूत्रक्रुच्छ्रनाशक अौषध के रूप में शरकाण्ड (सरकण्ड — मूज या राडी) का उल्लेख हैं। भावप्रकाश-निघण्टु में शरकाण्ड को मूत्रकृच्छ्र-नाशक — 'मूत्रकृच्छ्राक्षिरोगनुत्' कहा गया है। पचतृणमूल मूत्रकृच्छ्र की प्रसिद्ध दवा है, जिसका क्वाथ पिलाने से मूत्र होता है। उसमें भी 'शर' का पाठ है।

१. मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दु खेन प्रवृत्ति ---मूत्रकृच्छ्म् । (मधुकीष)

२ मूत्र्यते इति मूत्रम्। 'मूत्रप्रस्रवणे' (चु॰ उ॰ से॰) घष् (३।३।१९)।

अमरकोष रामाश्रमी २।६।६७

३ कुन्तित इति कुच्छ्म्। 'क्रुती छेदने' (तुदादि प० से०) क्रुतेरछ कूच (उ० स्०२।२१) इति रक् छक्ष। अमरकोष-रामाश्रमीटीका १।९।३

४ मूत्रे कुच्छूमत्र, इति मूत्रकुच्छूम् । अमर० रामाश्रमी २।६।५६


५ यदान्त्रेषु गवीन्योर्थद् वस्ताविधसंश्रितम्। एवा ते मूत्रं मुच्यतां वहिर्वालिति॥

६. कुश काश शरो दर्भ इक्षुच्चेव तृणोद्भवम् । पञ्चतृणभिति ख्यातम् ।

एक मन्त्र मे यह कहा गया है—'हम शरकाण्ड के पिता (मेघ) को जानते हैं और उसकी माता पृथिवी को भी जानते हैं'। ज्ञातन्य है कि वर्षाऋतु मे शरकाण्ड (मूँज-राडी) अधिक फैलता तथा वढता है। अतः मेघ को पिता और पृथिवी को माता कहा गया है।

सामान्य निदान

9 अधिक व्यायाम, २ तीक्ष्ण औषध, ३. रूक्ष पदार्थ, ४. अति मद्यपान, ५. तेज चलनेवाले घोडे आदि की पीठ पर नित्य सवारी करना, ६. जलेचर पशु-पिक्षयो के मास का सेवन करना, ७ पहले किये गये भोजन के विना पचे पुन भोजन करना और ८ अजीणं होना—इन सब कारणो से आठ प्रकार के मूत्रकृच्छ होते हैं।



बक्तव्य चरक ने शकृत्ज मूत्रकृच्छ्र के बदले शुक्रज मूत्रकृच्छ्र कहा है। सुभुत ने अश्मरीज मूत्रकृच्छ्र मे शुक्रज मूत्रकृच्छ्र का समावेश किया है। चरक ने शकृत्ज मूत्रकृच्छ्र का वातज मूत्रकृच्छ्र मे समावेश किया है। माधव ने शकराज मूत्रकृच्छ्र का अश्मरीज मूत्रकृच्छ्र मे समावेश किया है।

मूत्रकुच्छ के कारणो को तीन श्रेणियों मे विमक्त कर सकते हैं-


- १ भूत्राशयगत कारण—इस श्रेणी में मूत्राशयगत नहमरी, अर्बुद, तीय या जीणं मूत्राशयकलाशोय (Actute or chronic chystitis), फिरङ्की खञ्जता (Tabes dorsalis), योपापस्मार (Hysteria) या सूत्रकृमियो (Thread worms) का उपसर्ग, ये कारण आते हैं।
- २ मूत्रप्रणालीगत कारण मूत्रप्रसेकशोथ (Urethritis), श्रीपसर्गिक मेह (Gonorrhoea) तथा शिश्नगत मूत्रमार्गं मे उपसकीच (Urethral stricture) इन कारणो से मूत्रमार्गं मे अवरोध हो जाता है।
- ३ अन्य कारण—पौरुष-प्रनिय (Prostate gland) की वृद्धि तथा अर्थ से भी मूत्रकुच्छ्र होता है। जिन तीक्ष्ण खाद्य-पेय या औषधो का द्रव मूत्रमागं से निकलता है, वे सभी मूत्रकुच्छ्रजनक कारण होते हैं। दाहकारक पदार्थ या तीक्ष्ण मद्य का पान करना भी मूत्रकुच्छ्र के कारणो मे समाविष्ट है।

विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं भृरिधायसम् ।
 विद्यो द्यस्य मातर् पृथिवी भृरिवपसम् ॥

सम्प्राप्ति

अपने-अपने प्रकोपक कारणो से प्रकुपित वात आदि दोष पृथक्-पृथक् अथवा एक साथ जब वस्ति में पहुँचकर मूत्रमागं में सकोच, दबाव या क्षोभ आदि उत्पन्न करते हैं, तब मूत्रत्याग करते समय रोगी को कष्ट होता है और इसी परिस्थिति को मूत्रकुच्छ्र कहते हैं।

- १ व्यायाम, तीव्रगतिपशुपृष्ठयान आदि विहार
- २ तीक्ष्ण, रूक्ष अन्न, आनूपमास, अति मद्यपान
- ३. अध्यशन और अजीर्ण
- ४. अभिघात आदि आगन्तुक कारण
- ५ वातवर्धक आहार-विहार



दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १ दोष--वातप्रधान त्रिदोष ।
- २ दूष्य-मूत्र, जल।
- ३. अधिष्ठान—वस्ति एवं मूत्रमार्गे ।

सामान्य लक्षण

कष्ट के साथ कक-क्क कर, थोडा-योड़ा और बार-बार पेशाब होता है। विशिष्ट स्थल

(१) वातज मूत्रकुच्छ्-

- वंक्षण, वस्ति और मूत्रेन्द्रिय मे तीक वेदना ।
- २. बार-बार और थोडा-थोडा मूत्रत्याग होना।
- ३. रोगी पीडित प्रदेशों को मलता या दबाता है।

(२) पित्तब सूत्रकुच्छ्र-

- १ मुष्क, सूत्रेन्द्रिय तथा वस्ति में दाह।
- २. वार-वार, पीला या लाल और थोडा मुत्रत्याग ।
- ३. पीडा एवं दाहयुक्त अत्युष्ण सूत्र ।

(३) कफज सूत्रकुच्छ्—

- १ वस्ति, अण्डकोष और मूत्रेन्द्रिय मे भारीपन।
- २. वस्ति, अण्डकोष और मूत्रेन्द्रिय में शोय।
- ३ पिच्छिल, स्निग्ध, शुक्लवणं तथा शीत मूत्र।

(४) सन्निपातज मूत्रकुच्छ्—

- १ इसमे सभी दोषों के लक्षण मिलते हैं।
- २ यह प्रकृतिसमवायारब्ध होता है, अत लक्षणो मे वैचित्र्य नहीं।
- ३ मूत्रप्रवृत्ति अतिकव्टमय होती है और यह कव्टसाध्य होता है।

(५) अभिघातज मूत्रकृच्छ्—

मूत्रवाही स्रोतो में आभ्यन्तर शाल्य से अथवा बाह्य आघात लगने से क्षत होने पर भयकर मूत्रकृच्छ्ररोग उत्पन्न होता है। आघात से विस्त मे क्षत हो जाता है और उससे रक्त निकलता है। जब रक्त वहाँ जम जाता है और वह मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है, तब अतिशय पीडा होती है, विस्त फूल जाती है और उसमे भारीपन मालूम पडता है। जब रक्त बाहर निकल जाता है, तो हलकापन मालूम होता है। इसमे बातज मूत्रकृच्छ्र के समान लक्षण होते हैं।

(६) शक्कद्विघातज मूत्रकृच्छ्---

पुरीष के वेग को रोकने से अपानवायु विलोमगति होकर उदर मे आष्मान, वातज शूल तथा मुत्रावरोध कर देता है।

(७) अश्मरोज मूत्रकुच्छ्—

अश्मरी जब मूत्रमागं मे गित करती है, तब बहुत बेदना होती है। वायु जब अश्मरी को तोड देता है, तो उसके दुकले शर्करा कहलाते हैं। जब यह शर्करा मूत्रमागं से बाहर निकलती है, तो उसकी गितशीलता से बहुत शूल होता है। हृदयशूल, हस्त-पादकम्प, कुक्षि एव वस्ति में शूल, मूल्छों और दारुण मूत्रक्रल्ड्र होता है।

(८) शुक्रन मूत्रकृच्छ्—

अपने स्थान से च्युत हुआ शुक्र जब दोषों के प्रकोप से मूत्रमार्ग में अवरुद्ध हो जाता है, तो उम समय वंक्षणसन्धि, वस्ति तथा शिश्न में वेदना होती है। रोगी शुक्रसहित मूत्रत्याग करता है और मूत्र निकलने में वडा कष्ट होता है।

अश्मरी और शर्करा की समानता और भेद

अश्मरी और शर्करा के निदान तथा लक्षण समान हैं, किन्तु इन दोनो मे यह विशेषता है कि अश्मरी को ही पित्त से परिपाचित और वायु से शुष्क हो जाने के कारण तथा कफरूपी जोडनेवाली वस्तु के नष्ट हो जाने पर (जो छोटे-छोटे कणो के रूप मे वाहर निकलती है) शर्करा कहते हैं।

मूत्र के वेग के साथ शर्करा के वाहर निकल जाने पर वेदना तब तक शान्त रहती है, जब तक कि अन्य शर्करा मूत्रवहस्रोत के मुख को फिर से अवरुद्ध न कर दे।

१ शरीर के अन्दर पीडा पहुँ चानेवाली बाध्य था आभ्यन्तर वस्तु को शस्य कहा जाता है— अनिप्रवृद्धं मलदोषज वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानाम् । . यद् किञ्चिदावाधकरं शरीरे तस्तवमेव प्रवदन्ति शस्यम्॥ (डल्ह्ण)

मूत्रकृच्छ्रको सामान्य चिकित्सा

- १. व्यायाम, तीक्ष्ण वस्तु सेवन आदि सभी तरह के निदान का त्याग करे।
- २ अभ्यंग, स्नेहन, निरूहवस्ति, उपनाहस्वेद, उत्तरवस्ति, परिषेक आदि दोषानुसार करना चाहिए ।
- ३. मूत्रल औषध—तालमसाना, गोखरू, शतावर, सेमलपुष्प, पञ्चतृण, श्वेतचन्दन, शीतलिमर्च, कुलधी, गुग्गुल् आदि एव समभाग दूध और जल, लस्सी, शर्वत, ईसवगोल की भूसी आदि पिलावे।
- ४ निवाये जल के टब मे बैठावे या वृक्कस्थान पर हीग का लेप या पलासपुष्प का लेप या कलमी सोरा और नौसादर के समभाग को जल मे विलीन कर उसकी कपडे की पट्टी नाभि के ऊपर बार-बार रखें। वृक्को पर नारायण सेल की मालिश करे।
- ५ सूत्रविरजनीय (चरक० सू०४)—१. श्वेताभ, २ श्वेत, ३ नील और ४. सौगन्धिक कमल, ५. मुलहठी, ६. पियङ्गु ७ धाय के फूल, ८ कुमुद, ९. रक्त-कमल. इनका क्वाथ दिन मे ३ वार पिलावे।
- ६. मूत्रविरेचनीय (चरक० सू०४)—१. वझा, २ गोखरू, ३ अगस्त्यपुष्प, ४ अपामार्गमूल, ५ पाषाणभेद, ६. दर्भ, ७ कुश, ८ काश, ९. शर और १०. इत्कट (वनजयन्ती), इनका क्वाथ दिन् मे ४-५ बार पिलावे।
- ७ दुरालभादि नवाथ, पुनर्नवादिमण नवाथ, स्थिरादिगण नवाथ, एलादिचूणं, गोक्षुरादि गुग्गुलु, चन्द्रकलारस, तारकेश्वर, चन्द्रनासव, सारिवाद्यासव और उशीरासव आदि का वावश्यकतानुसार प्रयोग करे।

(१) वातज मूत्रकृच्छ्र-चिकित्सा चिकित्सासूत्र

- १ वातज मूत्रकृच्छ्र मे महानारायण तैल, महामाष तैल, सैन्धवादि तैल अर्थवा महामरिचादि तैल का अभ्यग करना चाहिए।
 - २ महानारायण तैल को २० मि० ली० दूध मे सबेरे-शाम पिलावे।
 - ३ वातघ्न द्रव्यो से सिद्ध तैलो की अनुवासनवस्ति देवे 1
 - ४ वातच्न तैलो की उत्तरवस्ति देनी चाहिए।
- ५ कटि-प्रदेश, वक्षण-प्रदेश मे एव नाभि के नीचे वातव्न तैलो या क्वायो से परिवेक करना चाहिए।

चिकित्सा

१ पुनर्नवादि मिश्रक स्नेह--गदहपुर्ना, एरण्डमूल, शतावर, पत्तूर (चन्दन का भेद), काली गदहपुर्ना, वरिक्षार का मूल, पापाणभेद, दोनो पञ्चमूल, कुलथी,

१ प्रकाइमभेदकशिलाजतुपिप्पलीना चूर्णानि तण्डुलजलैखेलितानि पीत्वा । यदा गुडेन सहितानवलिए चैतान् आसन्नमृत्युरिप जीवति मूत्रकृच्छ्री ॥ मै० र०

खट्टी वेर और जी, इनके क्वाथ और कल्क से सेंघानमक डालकर, तिलतैल, शूकरवसा, ऋक्षवसा और घृत मिलाकर स्नेहपाक करे। इसे रोगी और रोग के वल के अनुसार १०-२० ग्राम की मात्रा मे प्रात -साय दूध मे पिलाना चाहिए।

- २. गोंखरू का क्वाय १०० मि० ली० की मात्रा मे २ ग्राम जवाखार मिलाकर दिन में ३ बार पिलावे।
 - ३. जवाखार १ ग्राम और चीनी १ ग्राम मिलाकर ३ बार जल से दे।
- ४. अमृतादि मवाय गुरुच, सोठ, आँवला, असगन्ध और गोखरू का यवाय १०० मि० ली० पिलाना चाहिए।
 - ५ पाषाणभेवादि क्वाय तया त्रिकण्टकादि क्वाय पिलाना चाहिए।
 - ६ एलादि चुर्ण--१-२ ग्राम तण्डुलोदक से दिन मे ३ वार दे।
- ७ श्वेतपर्पटी-१-२ ग्राम की मात्रा चीनी मिलाकर दिन मे ३-४ बार जल से दे।
- ८ दाडिमयोग—खट्टा अनारदाना, सोठ, भुना सफेद जीरा और सेंधानमक, इनके समभाग का चूर्ण २-२ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३ बार दे।
- ९ सुकुमारकुमार घृत या त्रिकण्टकादि घृत ५-१० ग्राम की मात्रा दूध मे मिलाकर प्रात -साय देवे।

घ्यवस्थापश्र

१ प्रातः-सायम् मूत्रकृष्छान्तक रस २०० मि० ग्रा० मधुसे। २ मात्रा २ ८ वजे प्रात अमृतादि क्वाथ १०० मि० ली० पीना । १ मात्रा ३. अपराह्म त्रिकण्टकादि घृत १५ ग्राम दूध मे पीना। १ मात्रा ४ ९ वजे तथा ४ वजे दिन श्वेतपपंटी ६ग्राम २ मात्रा

चीनी के शवंत से पीना।

(२) पित्तज मूत्रकृच्छृ-चिकित्सा चिकित्सासूत्र

9 शीतल द्रव्यो के क्वाथ से परिषेक और किसी टव मे भरकर रोगी का अवगाहन करावे।

- २. क्वेतचन्दन आदि शीतल द्रव्यो का वस्ति-स्थान मे प्रदेह लगावे।
- ३. शीतल वस्ति दे तथा विरेचन करावे।
- ४. शतावर-गोखरू से सिद्ध दूध पिलावे।
- ५. ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार आहार-विहार की योजना करे।

चिकित्सा

- १ अगूर का रस या मुनक्के का क्वाथ पिलावे अथवा विदारीकन्द का स्वरस या
 गन्ने का रस पिलावे । इसे दिन मे ३-४ बार पिलावे ।
- २. वासाघृत अथवा शतावर्यादि घृत (रक्तिपत्तिधिकार) १०-१५ ग्राम की मात्रा मे दूध में मिलाकर २ बार पिलावे।
- ३ श्रतावर्याद क्वाथ—शतावर, काश, कुश, गोखरू, विदारीकन्द, शालिधान का मूल, ईस का मूल और कशेरू, इन सबको समभाग लेकर क्वाथ बना शीतल कर चीनी मिलाकर पिलावे।
- ४. एवारबीजावि चूर्ण ककडी का बीज, मुलहठी, देवदार, इन्हें चावल के पानी से पीसकर पिलावे या चूर्ण बनाकर तण्डुलोदक से देवे।
- ५ एवरिबोजादि पेय ककडी-खीरा-कुसुम्भ का बीज, नागकेशर और अरुस की पत्ती, इनका १०० मि० ली० शीतल क्वाथ चींनी मिलाकर पिलाना चाहिए।
- ६ वृह्द् धात्र्यादि क्वाय--- १०० मि० ली० मे २० ग्राम चीनी मिलाकर सबेरे-शाम पीने को देवे ।
 - ७ आंवले का चूर्ण ३ ग्राम ठडे जल से दिन मे ३-४ बार दे।

व्यवस्थापत्र

१ प्रात-साय

चन्द्रकलारस ५०० मि० ग्रा० २ मात्रा

र्थावले का चूर्ण ३ ग्राम के साथ दे।

२ ९ बजे पूर्वाह्स

शतावर्यादि क्वाथ १०० मि० ली० पिलावे ।

३ अपराह्य ३ बजे

शतावर्यादि घृत १०-२० ग्राम चीनी मिले दूध से दे।

४, १२ बजे और ६ बजे

क्वेतपर्पटी <u>६ ग्राम</u> २ मात्रा

चीनी मिलाकर जल से।

मूत्रकुच्छ्र, सूत्राघात तथा अश्मरी

(३) कफज मूत्रकृच्छ्र-चिकित्सा चिकित्सासूत्र

- १. क्षार, उल्ल और तीक्ल औषध तथा अन्नपान का सेवन करावे।
- २ स्वेदन कराना चाहिए।
- ३ वमन और निरूहवस्ति का प्रयोग करे।
- ४. तक्र डालकर तिक्त औपधो से सिद्ध तैल का अभ्यग और पान कराना चाहिए।

चिकित्सा

- १. व्योषादि चूर्णं --- २ ग्राम की मात्रा सबेरे-शाम मधु से चटाकर गोमूत्र पिलाना चाहिए।
- २ छोटी इलायची का चूर्ण ५०० मि० ग्रा० खिलाकर केले के मूल का पानी या गोमूत्र या मद्य पिलावे।
 - ३ प्रवाल भस्म २५० मि० ग्रा० चावल के घोवन से प्रतिदिन ३ वार दे।
- ४ शितिवार (सुलवारी) के वीज का चूर्ण २ ग्राम की मात्रा मे मट्ठे के साथ प्रात -साय दे।
- ५ सप्तच्छवादि ववाय छितवन, अमलतास गूदा, करमीशाक, धव, करञ्ज और कोरया की छाल तथा गुरुच, इनका १०० मि० ली० ववाय सवेरे-शाम पिलावे।
- ६. सप्तच्छदादि गण की औषघो से अर्घाविशिष्ट जल पकाकर, उसमे यवागू वनाकर खिलावे।
 - ७ 'वृहद् गोसुराद्यवलेह--५-१० ग्राम सवेरे-शाम खिलावे ।

व्यवस्थापत्र

9 प्रात -साय

मूत्रकृच्छ्रान्तक रस

२ मात्रा

अथवा—

त्रिनेत्र रस

५०० मि० ग्रा०

२ मात्रा

२ मात्रा

अपामार्गपत्र-कल्क मिश्रित तक्र से।

२५ का० हि०

कायचिकित्सा

३. २ बजे व ५ बजे दिन , ६ ग्राम चीनी मिलाकर जल मे। २ मात्रा

त्रिदोषज मूत्रकुच्छ्

- १. वातप्रधान में वस्ति देनी चाहिए।
- २. पित्तप्रधान मे विरेचन दें।
- ३ कफप्रधान मे वमन करावें।
- ४ **बृहत्यादि क्वाय ५०** मि० ली० मे २५० मि० ग्रा० की मात्रा मे शिलाजीत मिलाकर प्रात -साय पिलावे ।
 - ५ गन्ने के रस मे आवले का स्वरस या चूर्ण मिलाकर सबेरे-शाम पिलावे।
- ६ वरणादि क्वाय—वर्ग की छाल, गोसल बीज, मुलहठी, कुलथी, कुश, काश, शर, दर्भ और गन्ने का मूल, इन सबको समभाग लेकर २५ ग्राम दवा को १ लीटर जल मे पकावे, चौथाई बचने पर छानकर २५ ग्राम चीनी और १ ग्राम जवासार मिलाकर सबेरे-शाम पिलाना चाहिए। यह उत्तम योग है।
 - ७ वरण या सिहजन की छाल का क्वाथ गुड मिलाकर प्रात -साय पिलावे।

ष्यवस्थापत्र

१ दिन मे ३ बार तारकेश्वर रस

१ ग्राम
३ मात्रा

गूलर के फल के ५ ग्राम चूर्ण और मधुसे।

२ भोजन के बाद

उशीरासव या चन्दनासव २० मि० ली० समान जल से पीना। 9 मात्रा

३. बजे दिन और रात मे

गोक्षुरादि गुग्गुलु २ ग्राम जल से। २ मात्रा

. (५) शल्याभिघातज सूत्रकृच्छ्र

- १. सद्योत्रण की तरह उपचार-व्यवस्था करनी चाहिए।
- २ शुद्ध स्फुटिका २५० मि० ग्रा० और शुद्ध शिलाजीत २५० मि० ग्रा० मिलाकर अमृतादि क्वाथ देवे ।
- ३. जीवननीयगण अष्टवर्ग, मुलहुठी, जीवन्ती, मूगपर्णी, माषपर्णी, इनका कल्क या चूर्ण दूध मे मिलाकर प्रयोग करे।

१ अध्वर्गं सयष्टीको जीवन्ती मुद्गपर्णिका। माषपणी गणोऽयन्तु जीवनीय इति स्मृत ॥ परिमापा-प्रदीप

- ४ विदारीकन्द का स्वरस या चूर्ण २ ग्राम गन्ने के रस से २ गार दे।
- ५ नीलकमल और करोरू प्रत्येक २-२ प्राम पीसकर घीनी मिलाकर पिलावे।
- ६. भवष्ट्रावि घृत ५-१० याम दूध मे प्रात -सायं दे।
- ७ यदि रक्त निकलता हो, तो शतावर और गोगरू १०-१० ग्राम का करूक डालकर क्षीरपाक-विधि से पकाया हुआ दूध सबेरे-शाम पिलावे ।
- ८ ज्ञीजितस्यापनकवाय मधु, मुलहठी, नागकेतार, सेमर की गोट, मिट्टी का ठिकडा, लोछ, गेरू, प्रियमु, शवकर और धान का लावा, इन सबका पूर्ण बनाकर र ग्राम की मात्रा तण्डुलोदक से दिन मे ३ बार दे।
 - ९ चमेली के पत्ते का यवाय मधु मिलाकर सबेरे-शाम पिलावे।

(६) शकृद् विघातज मूत्रकृच्छ्र

- १. अभ्यंग, स्वेदन तया वातानुलोमन उपचार करे।
- २. विरेचनायं फलवर्ति एव वस्ति का प्रयोग करे।
- ३. एरण्डतैल आदि का स्निग्ध विरेचन देना चाहिए।
- ४. उपनाह स्वेदन करना हितकर है।
- ५ वातज मूत्रकृच्छु की तरह वातानुलीमन चिकित्ता करे।
- ६ हिगुद्धिरतरादि चूर्ण-हींग १ भाग, वच २ माग, नित्रकमूल छाल ४ भाग, क्रुट ८ भाग, मज्जीखार १६ भाग, वायविर्दंग ३२ भाग-इन सबका क्षपटछन पूर्ण बनाकर ३ थाम की मात्रा दिन में २ बार सुसीच्या जल में दे।
- ७ बवादि चूर्ण-- उच, हरें, चित्रकमूल की छाल, जवासार, पीपर और अतीस, इनका सममाग का चूर्ण ३-३ ग्राम की मात्रा में ४ वार तक सुखोष्ण जल से दे।

(७) अश्मरी-शर्कराज मूत्रकृच्छ्

इसकी चिकित्सा नागे अदमरी रोग में देखें।

(८) शुक्रज मूत्रकृच्छ्र

- १ युद शिलाजीत ५०० मि० ग्रा० तथा चीनी ५ ग्राम मिलाफर दशमूल के मनाय से सबेरे-शाम दे।
 - २. शतावयादि क्वाथ १०० मि० ली० चीनी मिलाकर २ यार पिलावे।
 - ३ स्त्री समीग करने से लाम होता है।
- ४. एलादि बताय—छोटी इलायची, पीपल, मुलहठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोसक और एरण्डमूल, इनका नवाय १०० मि० ली० सबेरे-शाम पिलावे।

(९) रक्तज मूत्रकृच्छ्

- १ इसकी चिकित्सा पूर्वोक्त पैतिक मूत्रक्रच्छ्र की सरह करे।
- १ शतावरीगोक्षुरकै मृतं वा मृतं पयो वाडम्यथ पणिनीभि । च० चि० ४ (रक्तिपिचि०) २ शोणितस्थापनी दशको महाकपाय —मधु मधुक-रुधिर-मीचरस-मृत्कपाल-लोध-नीरिक-प्रियङ्गु शर्करा-लाजा इति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति । च० स्० ४

- २. गन्ने का रस पिलाना और खीरा खिलाना लाभकर है।
- ३. दुरालभादि वदाथ--धमासा, पाषाणभेद, हर्रे, छोटी कटेरी, मुलहठी और धनियां के समभाग का क्वाथ १०० मि० ली० चीनी मिलाकर प्रात -साथ पिलावे।
 - ४. अविला और रसौत का क्वाथ पिलावे।
 - ५ शतावर और गोखरू से क्षीरपाक-विधि से पकाया हुआ दूध पिलावे।
- ६. उत्पलादि चूर्ण, पुष्यानुग चूर्णं या मधुकाद्यवलेह (सभी स्त्री-रोगाधिकार— भै० र०) का प्रयोग उत्तम लाभकर है।
- ७. भोजनोत्तर उशीरासव या लौघ्रासव २० मि० ली० समान जल के साथ पीने के लिए देवे।

पध्य

पुराना अगहनी चावल, जागल पशु-पक्षियो का मास, मूग का यूष, शक्कर, मट्ठा, गोदुग्ध, पेठा, परवल, खरबूजा, ककडी, खीरा, खजूर, नारियल, चौलाई, आंवला, घी, कपूर—ये सब पथ्य हैं।

अपय्य

मद्यपान, परिश्रम, मैथुन, हाथी-घोडे की सवारी, ऊँट की सवारी, विरुद्ध भोजन, विषम भोजन, ताम्बूल, मछली, नमक, अदरक, तेल मे पकाये गये पदार्थ जैसे पकौडी आदि, तिल का तिलकुट, उदद, लालमिचं, विदाही और रूक्ष द्रव्य तथा खटाई खाना अपध्य है।

मूत्राघात परिचय और निर्वजन

जिस रोग मे मूत्रत्याग करने ने रुकावट अथवा अवरोध उत्पन्न होता है, उसे मूत्राघात कहते हैं। आचार्य डल्हण ने मूत्राघात का अर्थ मूत्रावरोध किया है—'मूत्राघातो मूत्रावरोध'। मधुकोष टीका मे मूत्रनिगंमन मे अतिशय विबन्ध होना मूत्राघात का विशेष लक्षण वतलाया गया है।

मूत्र - अधात = मूत्राघात । प्रस्नवण (पतली घार से बहना) अर्थं की 'मूत्र' धातु से मूत्र शब्द बना है और आ-उपसग्यूवंक हिंसार्थंक 'हन्' धातु से आघात शब्द बना है। इस प्रकार मूत्राघात का अर्थं है—मूत्रस्राव का रुक जाना, अवरोध होना अथवा विबन्ध होना।

यहाँ मूत्राघात और मूत्रकृच्छ्र के विभेदक लक्षणे द्रष्टव्य हैं---

भूत्रकृष्छ में मूत्रत्याग करने मे अत्यधिक कष्ट होता है, किन्तु विबन्ध
 क्वावट) अल्प रहता है अर्थात् मूत्रत्याग बूँद-बूँद अपेर अधिक कष्ट से होता है।

१. मूत्रकुच्छ्मूत्राघातयोखार्यं विशेषः —मूत्रकुच्छ्रे कुच्छ्र्वमितशयितम् , ईपदिवन्ध , मृत्राधाते तु विवन्धो बळवान्, कुच्छ्र्वमस्पमिति । मधुकोप ।

२. मूत्राधात मे मूत्र का विवन्ध अधिक होता है, किन्तु फुन्स्ट्रता (कप्ट) बल्प होती है।

वक्तव्य-आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिको ने गूत्रापात श्रीर गूत्रावरोध के लिए अलग-जलग नामकरण किये हैं और इन दोनो से अलग तीसरा गूत्रकृष्णु है—

- १ मुत्रापात Suppression of the urine—इतमे गून कम बनता है।
- २ मुत्रावरोध · Retention of the urine—इसमे मूत्र एक जाता है।
- ३ मूत्रकृच्छ . Dysurca-इसमे वूँद-बूँर कर कष्ट के साथ मूत्र निकलसा है।

मुत्राघात का सामान्य निदान

मल-मूत्र-अपानवायु आदि के येगो को रोकने से, पुरीय युक्क के थेग रोको थे, तीरण औषध या अन्न-पान के सेवन ने तपा रूझ पदार्थों के सेवन से कुपित दूए यात-प्रधान तीनो दोय वातकुण्डलिका वादि सेरह प्रकार के मूत्रापातो को उत्पन्न करते हैं।

सन्दर्भ प्रत्य--

- १ घरकसहिता-सिद्धिस्यान अ०९।
- २ सुध्रुतसहिता-उत्तरतन्त्र व० ५८।
- ३. बप्टाङ्गहृदय निदानस्थान अ०९।
- ४. ,, चिकित्सास्यान अ० ११ ।
- ५. माधवनिदान मूत्रापातनिदान ।

मूत्रघात के तेरह प्रकार या भेद

- १ वातकुण्टलिका-Spasmodic stricture
- २ अष्टीला—Inlarged prostate
- ने वातवस्ति—Retention of urine
- ४ मुत्रातील—Incontinence of urine
- ५. मूत्रजठर-Distended bladder.
- ६. मुत्रोत्सङ्ग -- Stricture of urethra
- ७ सूत्रसय—Anurca or suppression of urine
- ८ मूत्रप्रन्य—Inlarged prostate or tumour of the bladder or stone obstructing the bladder neck.
- ९ सूत्रपुक-Stagnation of semen
- १०. उष्णवात--- Urinary infection
- 99 विड्विघात—Retention of urine due to severe constipation or rectovesical fistulla

१ जायन्ते कुिततेदोंपेम्याघातास्त्रयोदश । प्रायो मुत्रविधाताचैनतिकुण्डलिकादय ॥

१२ मूत्रसाद—Scanty urination, oliguria

१३ वस्तिकुण्डल-Atonic condition of the bladder

वक्तव्य-चरकाचार्यं और माधवकर ने १३ प्रकार के मूत्राघातो का वर्णन किया है, किन्तु सुश्रुत तथा वाग्भट ने वस्तिकुण्डल को नहीं माना है। इस प्रकार वे १२ मूत्राघात मानते हैं।

सम्प्राप्ति

यह एक दारुण व्याधि है, जो दो अवस्थाओं में होती है--- १ मूत्र का निर्माण न होना और २ मूत्र की प्रवृत्ति न हो पाना । इसके तीन मुख्य कारण हैं---

9 वृक्को की विकृति के कारण मूत्र का निर्माण न होना—वृक्क की विभिन्न विकृतियों मे मूत्र बन ही नहीं पाता। वृक्कों से मूत्र छनता ही नहीं है, परिणाम-स्वरूप मूत्राघात हो जाता है। इस अवस्था मे रोगी के मुख तथा पैरों में शोथ मिलता है।

२. वस्ति की मासपेशियों में सकोचशक्ति का अभाव होना—यदि मूत्र-निर्माण हो भी रहा हो तो भी और वस्ति में सकोचन शक्ति अल्प हो गई हो तब भी मूत्र-त्याग नहीं होता। वस्ति की मासपेशी शिथिल हो जाती है, फलत मूत्र वस्ति में एकत्रित हो जाता है, जिससे वस्ति फूल जाती है। वस्ति-प्रदेश में सगर्भा के जैसा उभार दीखता है। वस्ति तथा किंट में वेदना होती है।

३ गवीनियो अथवा मूत्रमार्ग मे किसी भी प्रकार का अवरोध होना—यदि अहमरी गवीनियो मे फँस जाय तो वृक्को मे बना हुआ मूत्र गवीनियो से वस्ति में नही आ सकता। जिससे ऊपर की ओर मूत्र का दबाव बढ जाता है और वेदना होती है। आघात से या अन्य कारणो से मूत्रपथ मे शोथ हो जाने से तथा पौरूष-ग्रित्थ की वृद्धि से दबाव पडने के कारण भी मूत्रत्याग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति मे वस्ति-प्रदेश मे शूल होता है।

सम्प्राप्ति-चन्न वृक्को की विकृति—वृक्कशोथ विस्त की विकृति—विस्तर्शैथिल्य ग्वीनियो और सूत्रमार्ग मे अवरोध—शोय, अक्ष्मरी पौरुषप्रन्थि का दवाव—पौरुषप्रन्थिवृद्धि वात-विद्-सूत्राधवरोध स्था, तीक्षण पदार्थ-सेवन स्वान स्

बत्तरय — विकृति की दृष्टि से १३ मूत्रापातों मे ११ मूत्रापात ऐते हैं, जिनमें मूत्र का सभाव तो नहीं होता, अपितु अवरोध हो जाता है; जब कि २ मूत्रापात ऐते हैं, जिनमें मूत्र का सभाव हो जाता है, जैसे—१. मूत्रसाद और २. मूत्रसाय । बाकी जो ग्यारह हैं, उनमें मूत्र का अवरोध होने से थे मूत्रापात कहनाते हैं।

बाधुनिक विकित्सा वैज्ञानिको ने मूचयह-सस्पान की पिकृतियों के कारणों का विशेष ब्यापक बध्ययन किया है। उनमें से मूचकुछ्ट, मूचापात और मूचध्य के

विषय मे विज्ञामुक्षी को ज्ञानसवर्धन करना चाहिए।

(१) बात कुण्डलिका—एस पदार्घों के अधिक सेवन अपा मूत्र-वेग को रोकने से विगुण हुआ बावु मूत्र को रोकते हुए जुण्डलाकार सचार करता है। इससे पीडा के साथ घोडी मात्रा में मूत्रत्याग होता है। इस भयदूर रूप में कप्टदायक व्याधि को वात कुण्डलिका कहते हैं।

वक्तव्य—इम स्थिति को उद्वेष्टनात्मगढ मकोच (Spasmodic stricture)

कहते हैं।

Dysuria

(Painful micturation)

- 1 Urethral · Acute urethritis, gonorrhoea, balanitis
- 2 Prostatic Acute gonococcal prostatitis, carcinoma
- 3 Bladder diseasas. Acute cystitis, bladder-stone.
- 4 Gynecological and rectal. Fibroids, carcinoma.

Retention of urine

- 1. Urethral causes Stricture of calculus
- 2 Prostatic Congestion or inflammation
- 3 Bladder Atony due to over distension
- 4 Post-operative
- 5 Post-anaesthetic After spinal anaesthesia
- 6 Neurological Spinal cord lesion.
- 7 Psychogenic Nervousness

Oliguria

(Diminished output of urine)

- 1 Physiological Humidity, environment, work
- 2 Poor intake of fluids
- 3 Loss of fluids Dehydration.
- 4 Excess of sugar and sait in diet.
- 5 Cardiac Congestive failure, left ventricular failure.
- 6 Renal Acute nephritis, collagen disease, uraemia, blackwater fever
- 7 Drugs Sulfonamides, mercury.
- 8 Vascular Thrombosis of renal artery or of inferior vena cava.

- (२) अष्ठीला—वस्ति-प्रदेश मे कुपित हुआ वागु वस्ति तथा गुदा मे आध्मान उत्पन्न करता हुआ अष्ठीला (पत्यर का लोढ़ा) के समान चल और उभरी हुई प्रन्थि को उत्पन्न करता है, इसे अष्ठीला कहते हैं। इससे मल तथा मूत्र के मार्ग मे अवरोध तथा तीव्र पीडा होती है।
- (३) वातयस्ति—जब कोई बुद्धिहीन ज्यक्ति मूत्र के वेग को रोकता है, तव विस्ति-स्थित वायु प्रकुषित होकर वस्ति के मुख मे बवरोध पैदा कर देती है। इससे मूत्रत्याग पूर्णरूपेण रुक जाता है और वस्ति तयां कुक्षि-प्रदेश मे पीडा होती है। इस क्रुच्छूसाध्य रोग को वातवस्ति कहते हैं।
- (४) मूत्रातीत—यैंदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक मूत्र-प्रवृत्ति के वेग को रोकता है, तो मूत्रत्याग करने पर उसका मूत्र जल्दी नही उतरता है। यदि उतरता भी है, तो बहुत धीरे-धीरे मूत्रसाव होता है। इमे मूत्रातीत कहते हैं।
- (५) मूत्रजठर—मूत्र-त्याग करने का वेग होने पर जो व्यक्ति उस वेग को रोक देता है, उसे उदावतं हो जाने के कारण वस्ति-स्थित अपानवायु प्रकुपित होकर उसके उदर को वायु से भर देती है और नाभि के नीचे तीव्र वेदना युक्त आध्मान उत्पन्न कर देती है। वस्ति के अधोभाग (वस्तिमुख) मे अवरोध उत्पन्न करने वाले इस रोग को मूत्रजठर कहते हैं।
- (६) मूत्रोत्सङ्ग---मूत्रत्याग करते हुए मनुष्य का मूत्र प्रवृत्त होकर भी विस्त, शिश्ननाल या शिश्नमणि मे एक जाता है अयवा जोर लगाने पर रक्तयुक्त आता है या धीरे-धीरे अत्यल्प मात्रा मे पीडा या विना पीडा के ही निकलता है। विगुण वायु से उत्पन्न इक्ष रोग को मूत्रोत्सङ्ग कहते हैं।
- (७) मूत्रसय्— रूझ प्रकृति एव क्षीण शरीर वाले व्यक्ति के वस्ति मे पित्त और वायु प्रकृपित होकर मूत्र का क्षय, पीडा और दाह उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग को मूत्रक्षय कहते हैं।
- (८) मूत्रप्रन्य जब कोई गोल, स्थिर तथा छोटी ग्रन्थि वस्तिमुल के अन्दर अकस्मात् अश्मरी के समान पीडा देने वाली हो जाती है, तब उसे मूत्रप्रन्थि कहते हैं।
- (९) मूत्रशुक्र मूत्र-प्रवृत्ति का वेग उठने पर (विना मूत्रत्याग किये) स्त्री के साथ सभीग करने वाले पुरुष की वायु प्रकृषित हो जाती है। अपने स्थान से च्युत किन्तु अवरुद्ध हुआ शुक्र मूत्रत्याग के पूर्व अथवा वाद में निकलता है, जिससे मूत्र चूने के पानी के समान होता है। इसे मूत्रशुक्ष रोग कहते हैं।
- (१०) उद्यावात अधिक व्यायाम, अधिक पैदल चलने तथा तेज धूप लगने से प्रकुपित हुआ वायु पित्त सिहत वस्ति में स्थित होकर वस्ति, मेढ़ तथा गुद-प्रदेश में दाह उत्पन्न करता है। जिससे हरिद्रावर्ण या रक्तमिश्रित मूत्र या केवल रक्त का ही स्नाव होता है। मूत्र का त्याग कव्ट के साथ और वार-वार करना पडता है। इस रोग को उद्यावात कहते हैं।

वक्तव्य — यह अवस्था सामान्यत मूत्राशयकलाशोध (Cystitis) अथवा मूत्रप्रसेकशोथ (Urethritis) के कारण होती है। यह शोथ प्रमेह के गोलाणु (Gonococci) या दूसरे उपसर्गों से हो सकता है। यह कोय प्राय. पूर्यमेह गोलाणु से ही होता है या दूसरे उपसर्गों से भी हो सकता है। उष्णवात शब्द से चिकित्सक पूर्यमेह (Gonorrhoea) का ही ग्रहण करते है।

- (१९) मूत्रसाद —यदि पित्त अथवा कफ पृथक् पृथक् या दोनो सिम्मिलित रूप में प्रकुषित वायु द्वारा गाढे हो जाते हैं, तो रोगी किंटनता से पीत-रक्त या क्वेत एव घना दाहयुक्त शुष्क (अल्प जल युक्त) मूत्र का त्याग करता है। वह मूत्र क्षस्चूणें या गोरोचन के वर्ण सदृश तथा सपूर्ण दोपो के वर्णों के समान होता है। इसे मूत्रसाद कहते हैं।
- (१२) विड्विधात रूझ तथा दुवंल व्यक्ति का मल जब वायु से उदावृत (विलोम) होकर मूत्रमागं मे पहुँच जाता है, तो रोगी मल से युक्त अथवा मल की गन्ध वाले मूत्र का पीडा के साथ त्याग करता है। ऐसी स्थिति को विड्विधात कहते हैं।
- (१३) बिस्तकुण्डल—जल्दी-जल्दी चलने से, कूदने से, अधिक परिश्रम करने से तथा चोट लगने से दवाव के कारण विस्त अपने स्थान से उलट कर या ऊपर उठ कर गमें के समान स्थूल प्रतीत होती है। इस अवस्था मे विस्त मे घूल, स्पन्दन तथा दाह होता है, मूत्र बूँद क्रूँद करके निकलता है, किन्तु विस्त के दवाने पर मूत्र की आरा निकल पडती है। शरीर जकड जाता है और ऐंठन सदृश पीडा होती है। इस रोग को विस्तकुण्डल कहते हैं। यह रोग शस्त्र व विष अथवा विष मे बुझे हुए शस्त्र के समान भयद्भर होता है। इसमे वायु की प्रवलता रहती है और साधारण बुद्धि का व्यक्ति इसकी चिकित्मा नहीं कर सकता।

वस्तिकुण्डल रोग मे वित्त का अनुबन्ध होने पर दाह, शूल तथा मूत्र मे विवर्णता आ जाती है। कफ का अनुबन्ध होने पर शरीर मे भारीपन और शोध होता है एव मूत्र चिकना, गाढा तथा सफेद आता है।

वक्तव्य—इसे एटॉनिक कण्डीशन आफ दी ब्लैंडर (Atonic condition of the bladder) कह सकते हैं।

वस्तिकुण्डल की साध्यासाध्यता

पित्त की प्रवलता होने पर तथा कफ के द्वारा मूत्रमार्ग मे अवरोध होने पर यह रोग असाध्य होता है।

जब मूत्रमार्ग बन्द न हो अथवा वस्ति कुण्डलीकृत (ऍठन या सकोच के कारण बन्द) न हो, रोगी को तृष्णा, मूच्छा तथा श्वास के लक्षण न हो, तो वस्तिकुण्डल रोग साध्य होता है।

सर्वविय सूत्राघात का चिकित्सा-सूत्र

१ मूत्राघात के रोगी का स्तेहन और स्वेदन करके एरण्ड तैल आदि का स्निग्ध विरेचन देना चाहिए।

- २. मूत्राघात मे आस्थापनवस्ति, अनुवासनवस्ति और उत्तरवस्नि का प्रयोग करना विशेष हितकर है।
- ३ जिन औषघो का प्रयोग मूत्रकृच्छ्र मे किया जाता है, उन्ही औषघो को , अधिक शक्तिशाली बनाकर दोषानुसार प्रयोग करना चाहिए।
- ४. रोगी की प्रकृति और बल तथा रोगबल एव दोष का विचार कर मूत्रल कषाय, कल्क, घृत, दुग्ध, अवलेह आदि का प्रयोग करे।
 - ५. रोगजनक सभी कारणों का परित्याग करना चाहिए।
 - े६ क्षार, मद्य और आसव आदि मूत्रल औषघो का प्रयोग करे।
- ७ यह वातप्रधान रोग हैं, इसलिए वातानुलोमन और उदावर्तहर औषधयोगो का प्रयोग करना चाहिए।
- ८. वातज मूत्राघातो (१. वातकुण्डलिका, २. अष्टीला, ३ वातवस्ति, ४. मूत्र-जठर, ५ मूत्रोत्सग, ६ विड्विघात, ७ वस्तिकुण्डल और ८ मूत्रशुक्र) मे वातनाशक बलातैल एव नारायण तैल का अभ्यग करके नामि के निचले भाग पर पिण्डस्वेद करे, परिषेचन करे तथा वातघ्न सुखोष्ण क्वाथ भरे टब में अवगाहन करावे।
- ९. मिश्रकस्तेह (च० चि० २६) का पीने, भोजन के साथ खाने एव उपनाह-स्वेद आदि मे प्रयोग करना अति हितकर है।
- १० सुरा मे पर्याप्त कालानमक मिलाकर पिलाना चाहिए। मात्रा का निर्धारण रोगी के बलानुसार करे।
- ११. पित्तप्रधान सूत्राघातो (१ उष्णवात, २ मूत्रसाद एव ३ मूत्रक्षय) में शीतल पित्तघ्न क्वाथ का अवसेचन, शीतल द्रव्यो का नाभि पर लेपन तथा शीतल क्वाथ मे अवगाहन करावे।

१२ शतावर, गोखरू, विदारीकन्द, कशेरू और पंचतृणमूल के क्वाथ मे चीनी मिलाकर १०० मि० ली० की मात्रा दिन मे ३-४ बार पिलावे।

१३ अरुस के पत्ते, खीरा-ककडी और कुसुम्म के बीज और केशर का शर्वत अंगूर के रस के साथ पिलावे।

१४ ककडी बीज, मुलहठी और दारुहत्दी का चूर्ण या क्वाथ पिलावे।

१५ कफल मूत्राघातो (१ मूत्रग्रन्थि, २. मूत्रातीत) मे वमन एव् स्वेदन करावे। भोजन मे तीक्ष्ण, उष्ण और कटु पदार्थी का प्रयोग करे।

१६ जी की दलिया या रोटी, जवाखार तथा तक्र का सेवन करावे।

१७ छोटी इलायची का चूर्ण आधा ग्राम, आंवले के रस या मद्य के सा सेवन करावे।

९८ प्रवालपिष्टी २५० मि० ग्रा० तण्डुलोदक से ३ बार दे।

१९ धव, छितवन की छाल, कोरया की छाल, अमलतास, गुरुच, कुटकी, छोत्र इलायची और करञ्ज का क्वाथ मधु मिलाकर पिलावे तथा इसी क्वाथ मे व पेया पिलावे। २०. सभी मूत्राघातो मे मूत्रविरजनीय, मूत्रशोधनीय और मूत्रविरेचनीय द्रव्यो का प्रयोग चूर्ण या क्वाथ के रूप मे करना चाहिए।

२१. मृत्राध्य और पेडू पर लेप, अवसेचन बादि वाह्य उपचार करे।

सामान्य चिकित्सा

बाह्य उपचार

- १. वस्तिस्थान पर राई, फ्लाश्के फूल और चूहे की मेगनी को पीसकर लेप करना चाहिए।
 - २ कुन्दरू लता की जड को पानी मे पीसकर पेडू पर लेप करे।
 - ३ बनचौलाई को पीसकर गरम कर लेप करना चाहिए।
 - ४. बेखसा का लेप लगाना या गरम करके सेंकना लाभकर है।
 - ५. केवल गरम जल या सुखोष्ण तैल की धारा पेडू पर गिराना लाभकर है।
 - ६. लिङ्ग के छिद्र मे पिसा हुआ कपूर ३०० मि० ग्रा० रखना चाहिए।
- ७ यदि उक्त कषाय सफल न हो तो मूत्रशलाका (कैथेटर) लगाकर मूत्र निकालना चाहिए।

आम्यन्तर उपचार

- ९. ककडी के वीज २५ ग्राम तथा सेंघानमक २५ ग्राम मिलाकर २०० मि० ली॰ काञ्जी के साथ पीने से मूलविवन्ध दूर होता है।
- २ पेठे के २५ ग्राम स्वरस मे है ग्राम जवाखार और १० ग्राम गुड मिलाकर पिलावे।
 - ३. पाषाणभेद के पत्ते २५ ग्राम पीसकर मट्ठे के साथ पिलाना चाहिए।
 - ४ अशोक के वीज का २० ग्राम चूर्ण शीतल जल के साथ सेवन करावे।
- ५ छोटी इलायची का चूर्ण है ग्राम और सोठ का चूर्ण है ग्राम मिलाकर अनार का रस १ चम्मच तथा मधु के साथ दिन मे ३ बार देना चाहिए।
 - ६ शुद्ध शिलाजीत 🖁 ग्राम्, शक्कर १ ग्राम मिलाकर दशमूल क्वाय से पिलावे ।
 - ७ वरणादि ववाथ या तृणपंचमूल ववाथ या पुनर्नवाष्टक ववाथ पिलावे ।
 - ८ उद्योरावि चूर्ण (योगरत्नाकर) ५ ग्राम दिन मे ३ बार मधु से देवे।
- ९ शतावर्याद योग (यो० र०)—शतावर, गोखरू पचाग, भुँई आँवला पचाग सममाग का क्वाथ ५० मि० ली०, यवक्षार १ ग्राम, कलमीसोरा २ ग्राम और भुना चौकिया सुहागा ३०० मि० ग्रा० एकत्र कर पीने से प्रवल मूत्राघात में शीझ लाभ होता है।
- १० बीरतर्वादि क्वाथ (शा० स०) वीरतरु (सरपत की जह), बाँदा (बाँझी), अरुस के पत्ते, पीले और नीले फूल की कटसरैया, कुश, दर्भ (बडा कुश), नरसल, मौलिश्री का फूल, अरणी की छाल, मूर्वा, पावाणभेद, सोनापाठा, गोखरू, विचिडे की जह, कमलपुष्प और ब्राह्मी, इनके समभाग का क्वाथ मूत्रकृच्छू, मूत्राधात तथा अरुमरी-नाशक है।

कायचिकित्सा

सिद्ध योग

- गोसुरावि गुग्गुलु १-१ ग्राम दिन मे ३ वार दूध या जल से देवे ।
- २ चन्त्रप्रभा वटी १ ग्राम, शीतल मिर्च चूण १ ग्राम और गोक्षुरादि क्वाय से २ बार।
 - ३ गोक्षुराद्यवलेह २५ ग्राम, दूध से प्रात -साय देना चाहिए।
 - ४. शिवा गुटिका १-२ ग्राम, दूध या शीतल जल से दिन मे २ बार देवे।
 - ५ चन्द्रकला रस २५० मि० ग्रा०, शीतल जल से सबेरे-शाम देना चाहिए।
 - ६. तारकेश्वर रस २५०-५०० मि० ग्रा०; गूलरफल चूर्ण ५ ग्राम और मधु से।
 - ७ वरुणादि लौह १-२ ग्राम, प्रात काल जल से प्रयोग करे।
 - ८ वृहद् वगेश्वर रस २००-३०० मि० ग्रा०, दिन में २ वार दूध के साथ देवे।
 - ९. सुवर्णवग-४००-५०० मि० ग्रा०, दिन मे २ बार मनखन-मिश्री के साथ।
- १०. भोजनोत्तर उशीरासव या चन्दनासव या सारिवाद्यासव २५ मि०ली० मे छोटी इलायची का चूर्ण ५०० मि० ग्रा० और आसव से दूना जल मिलाकर पिलाना चाहिए।

विशिष्ट चिकित्सा

- १ वातकुण्डलिका, अष्ठीला और वातविस्त मे शुद्ध शिलाजीत १ ग्राम, चीनी २० ग्राम और दशमूल क्वाय १०० मि० ली० प्रात -सार्य पीने से सन्तीषप्रद लाभ होता है।
- २. मूत्रगुक्र और मूत्रोत्संग मे शुद्ध शिलाजतु १ ग्राम, शुद्ध गुग्गुलू १ ग्राम, चीनी २० ग्राम और गोलह क्वाथ १०० मि० ली० मिलाकर दिन मे २ बार पिलावे।
- ३ **मूत्रातीत और मूत्रजठर** में शुद्ध शिलाजीन १ ग्राम और चीनी २० ग्राम खिलावे।
- ४ सभी मुत्राघातो मे शुद्धशिलाजीत १ ग्राम, मधु २५ ग्राम और वीरतर्वादि क्वाय १०० मि० ली० मिलाकर पिलाने से मुत्रावरोंच दूर होता है।
- ५ मूत्रग्रन्थि मे--- प्रात:-साय चन्द्रप्रभावटी १-१ ग्राम ताजा गोमूत्र १०० मि० ली० से। २. २ वजे और ५ वजे गोक्षुरादि गुग्गुलू १-१ ग्राम पुनर्नवाष्ट म्वाय १०० मि० ली० से।
 - ६. उडणवात (Gonorrhoea) या सुजाक में-
- १. उष्णवात के रोगी को पूर्ण आरोग्यप्राप्ति-पर्यन्त स्त्री-सभोग की तृष्णा सर्वथा छोड देनी चाहिए। जीने की अभिलाषा रखनेवाले रोगी को वाराङ्गना और पुश्रली स्त्री का सग छोड देना चाहिए।
 - २. इस रोग मे शोयघन, व्रणघन और मूत्रल उपचार करना चाहिए।
 - ३. वातानुलोमन औपघ एव अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए ।
- ४ चमेली के पत्ते के अथवा त्रिफला के सुखोष्ण क्वाथ मे मूत्रेन्द्रिय को हुबोकर १-१ घण्टा प्रतिदिन रखना चाहिए।

५ पिप्पली, बबूल की छाल और त्रिफला के क्वाथ मे कच्ची फिटकरी का चूणें मिलाकर उत्तरवस्ति देनी चाहिए।

६. शुद्ध फिटकरी २ ग्राम और देशी चीनी ४ ग्राम खाकर बाद मे सींफ का चूणं ३ ग्राम और छोटी लाइची का चूर्णं १ ग्राम मिलाकर बनायी गयी दूध की मीठी लस्सी है लीटर दिन मे २ बार पिलावे।

७ उष्णवातारि चूर्णं — शीतल चीनी १०० ग्राम, सगजराहतभस्म २५ ग्राम, कलमीसोरा २० ग्राम, शुद्ध फिटकरी ५ ग्राम, शुद्ध स्वणंगैरिक ५ ग्राम और राल ३०० ग्राम, सब मिलाकर चूर्णं बनावे। दिन मे ३-४ बार ४-४ ग्राम की मात्रा मे बराबर चीनी मिलाकर १ णिलास शीतल जल से पिलावे।

व्यवस्थापत्र

१. प्रात तथा साय ६ बजे कन्दर्प रस ५०० मि० ग्रा० २ मात्रा शीतलचीनी चूर्ण १ ग्राम और मधु से। २ ९ बजे व २ बजे दिन व्रणमेहहर चूर्ण दूध की लस्सी के साथ। २ मात्रा ३ भोजनोत्तर २ वार चन्दनासव ४० मि० ली० समान जल मिलाकर पीना। ४ ८ बजे व ४ बजे श्वेतपर्पटी ४ ग्राम समान मिश्री और श्वेतचन्दन चूर्णं ३ ग्राम १ गिलास शीतल जल से । ५. रात में सोते समय हिंगुद्धिरुत्तरादि चूणं ६ग्राम सुखोष्ण जल से।

पथ्य

मट्ठा, दूध, यूष, पेठा, बनार, नारियल, पुराना चावल, मूँग, ककडी, स्त्रीरा, लौकी, नेनुआ, परवल, बाँवला, कचनार का फूल, हर्रे, खजूर, पुरानी सुरा, मिश्री तथा मूत्रकुच्छ्र मे जो पथ्य कहे गये हैं, वे सब मूत्राघात मे भी पथ्य हैं।

अपय्य

विरुद्ध भोजन, व्यायाम, मार्ग चलना, परिश्रम करना, रूक्ष, विदाही और तीक्ष्ण पदार्थ, विवन्धकारक और दुर्जर पदार्थ, मूत्र-पुरीष-अपानवायु आदि का अवरोध और मैथुन, करीर खाना और वमन, ये सब अपध्य हैं।

अश्मरी रोग

परिचय — अश्मरी अत्यन्त भयन्द्वर रोग है, जो यम के समान मारक है। जब विस्त, वृक्क या गवीनि मे पत्यर के दुकड़े जैसी कोई वस्तु अटक जाती है, जिससे सूत्रावरोध होने लगता है, सूत्र गरम-गरम निकलता है, रोगाक्रान्त स्थल और उसके अगल-बगल विस्त, गवीनि या वृक्क मे भयन्द्वर पीडा होती है, तो उसे अश्मरी रोग कहते हैं। जब पित्ताशय मे पित्त कक्कर कठोर पत्थर जैमा कड़ा स्वरूप धारण कर लेता है, तब उसे पित्ताशमरी कहते हैं। जैसे गाय के पित्ताशय मे पित्त के सूखने से गोरोचन बन जाता है, उसी तरह अश्मरी भी वन जाती है।

निर्वेचन — अश्मरी शब्द की निरुक्ति या निर्वेचन इस प्रकार है — 'अश्मान राति, इति अश्मरी' [अश्मान राति। 'आतोऽनुप' (३।१।३) इति क। 'गौरादि' (४।१।४१)। अमरकोप, रामाश्रमी-टीका २।६।५६] जो पत्थर जैसा स्वरूप घारण करे वह अश्मरी है या जिसकी पत्थर जैमी रचना हो, उसे अश्मरी कहते हैं।


निवान े

- (१) वमन विरेचन बादि पश्वकर्मों के द्वारा शरीर का शोवन न करना।
- (२) मिथ्या आहार-विहार, कडी घूप मे रहना, अधिक परिश्रम करना।
- (३) मदिरा, चाय और मिठाई का अधिक सेवन करना।
- (४) दूध, साग-सन्जी, नमक तथा क्षारीय पदार्थी का कम प्रयोग करना।
- (५) कुपच्य और मल-मुत्रादि वेगो को रोकना आदि।

ਜੇਵ^੨

वात, पित्त, कफ से तीन तथा शुक्त से एक कुछ चार प्रकार की अश्मरियाँ होती हैं। प्राय सभी में कफ समवायिकारण (आधारभूत उपादान) होता है। प्राय सभी अश्मरियाँ त्रिदोषज होती हैं। दोष की अधिकता के अनुसार उसके वातज आदि भेद किये जाते हैं।

वक्तक्य — चरक ने अश्मरी को एक प्रकार का कहा है, किन्तु सुश्रुत और वाग्मट ने वात-पित्त-कफ तथा शुक्र भेद से ४ प्रकार का मानकर चारो का अलग-अलग न लक्षण एव चिकित्सा का निर्देश किया है।



१ सुश्रुत० निदान० श४

١

२ माधवनिदान।

सम्प्राप्ति


१ जव वायु वस्तिगत शुक्र, मूत्र, पित्त अथवा कफ को सुखा देती है, तो गाय के पित्ताशय मे पित्त के सूखने से बने गोरोचन के समान क्रम से अश्मरी बन जाती है।

* २ स्वप्रकोपक कारणो से प्रकृपित हुआ क्लेब्मा मूत्र के साथ मिलकर वस्ति में प्रवेश करके अक्मरी को उत्पन्न करता है।

३. जिस प्रकार नये घडे मे अति स्वच्छ जल भरने पर भी कुछ समय बाद उसमें अवक्षेप (Precipitate) या कीचड या तलछटे बैठ जाता है, उसी तरह वस्तिस्थ मूत्र में भी अक्मरी उत्पन्न हो जाती है।

४. जिस प्रकार वायु और विद्युत् की अग्नि आकाश के जल को बाँधकर ओले बनाती है, उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि (पित्त) मूत्र के साथ आये हुए कफ को बाँधकर अश्मरी बना देती है।

सम्प्राप्ति-चक्र



, बोष-दूष्य-अधिष्ठान—

- १. दोष-वातप्रधान त्रिदोष ।
- २. दूष्य--मूत्र ।
- ३. स्रोतस्---मूत्रवहस्रोतस्
- ४ अधिष्ठान-वस्ति, वृक्क, गवीनि ।
- ५ पक्वाशयोत्य रोग।

पूर्व रूप³—मूत्राशय का फूला होना, उसमे तथा उसके समीपस्य प्रदेशों मे तीव्र वेदना, मूत्र में वकरे के सदृश गन्ध आना, मूत्रकृच्छ्र, ज्वर तथा अरुचि होना, ये अश्मरी के पूर्व रूप हैं।

अश्मरी का स्वरूप और सामान्य लक्षण³

अश्मरी कदम्ब के फूल के आकार की, पत्थर की तरह कडी या कदाचित् कोमल, चिकनी और तिकोनी होती है। जब वह मूत्र के मार्ग मे आती है, तो मूत्र-

१ चरक० चि० २६।३६ तथा सुश्रुत निदान० ३।२५--२६

२ अ० ६० नि०९।

२, चरक० चि० २६।३७-३८ तथा अ० ह् ० नि० ९।

निगंमन को रोक देती है या मूत्र की अनेक घारा कर देती है और वस्ति में पीडा उत्पन्न करती है तथा सिवनी तथा लिङ्ग आदि में शूल पैदा करती है। वेदना से पीडित होकर रुग्ण व्यक्ति अपनी मूत्रेन्द्रिय को हाथों से मलने लगता है। उसे वार-वार मूत्र तथा मल का वेग उठता है। मूत्र-मार्ग से अदमरी के हट जाने पर रोगी स्वच्छ या गोमेद के समान रक्ताभ मूत्रत्याग करता है और उसे कीई कष्ट नहीं होता। यदि अदमरी की रगड से वस्ति में क्षत हो जाय, तो मूत्र में रक्त भी आने लग जाता है। अदमरी के मूत्रमार्ग में रहने पर यदि जोर लगाकर मूत्रत्याग किया जाय, तो भयन्द्रर पीडा होती है।

शर्करा का स्वरूप और लक्षण⁹

वायु के द्वारा शुष्क हो जाने से, पित्त के द्वारा परिपाचित हो जाने से और सगठित करने वाले कफ द्वारा सगठन न करने से अश्मरी वालू के कण की तरह दुकडे- दुकडे हो जाती है, तो उसे शकरा कहते हैं। वह शकरा मूत्रत्याग के समय वाहर निकलती है।

लक्षण—हृदय मे पीडा होना, कम्पन, कुक्षि मे शूल, मन्दाग्नि, मूर्च्छा और भयद्धर मूत्रकुच्छ्र होना, इसके लक्षण हैं। मूत्र के वेग के साथ धर्करा के वाहर निकल जाने पर वेदना तब तक शान्त रहती है, जब तक कि अन्य धर्करा मूत्र के मार्ग को पुन अवरुद्ध न कर दे।

वाताश्मरो का लक्षण

वातज अश्मरी मे रोगी को इतनी अधिक पीडा होती है, कि वह ओठो को दांतों से काटने लगता है और कांपता है। अपने मूत्रेन्द्रिय को हाय से पकडता है और कराहता हुआ नामि को दवाता है। वह जब अपानवायु छोडता है, तो साय-साय मलोत्सर्ग भी कर देता है। उसे वार-दार वूँद वूँद पेशाब होती है। वातज अश्मरी रक्ताभ श्यामवर्ण की होती है और उसके ऊपर कांटे उगे होते हैं जो घने होते हैं।

पिताइमरी का लक्षण

पित्तज अश्मरी होने पर वस्ति में जलन होती है और पच्यमान व्रण के समान उष्णता रहती है। वह भिलावे की गुठली के आकार की होती है। उसका वर्ण लाल, पीला या काला होता है।

कफंज अश्मरी का लक्षण

कफज अश्मरी के कारण वस्ति में सूई चुभाने जैसी वेदना होती है। उममें शीतलता और भारीपन मालूम होता है। यह अन्यों की अपेक्षा वडी और चिकनी होती है। इसका वर्ण मधु के समान अथवा खेत होता है।

१ माधवनिदान ।

२ एपाऽश्मरी मारुतभिष्नमूर्तिः स्याच्छर्करा मूत्रपथात् क्षरन्ती । व० वि० २६

३ मा० नि०।

४. मा० नि०।

उक्त दोषज अश्मरियों की साध्यता

ये दोषज अश्मरियाँ प्राय बालको को ही होती हैं। ये अश्मरियाँ आश्रय (वस्ति स्थान) और अपने आकार के लघु होने के कारण आसानी से पकडकर निकाली जा सकती हैं।

शुकाश्मरी का लक्षण

शुक्राहमरी वयस्क पुरुषों को ही होती है, यदि वे शुक्र का वेग धारण करते हैं। कामवासना की इच्छा या मैथुन करने से शुक्र अपने स्थान से चिलत हो जाता है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति उस चिलत शुक्र के वेग को रोकता है, तो वह दोनो अण्ड-कोषों के मध्य (मूत्र-प्रणाली) में ठहर जाता है। इसको वायु सुखा देती है जिससे वह शुक्र अश्मरी के तुल्य हो जाता है, जिससे वस्ति-प्रदेश में पीडा, मूत्रकृच्छ्र तथा अण्डकोषों में शोध हो जाता है। शुक्राहमरी के उत्पन्न होते ही अश्मरी के स्थान पर दवाने से ही अश्मरी विलीन हो जाती है और शुक्र मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है।

अवमरी की असाध्यता

जिस रोगी के अण्डकीय और नाभि में शोथ हो गया हो, जिसका मूत्र रक गया हो तथा वह पीडा की अधिकता से वेचैन हो एवं जिसे अश्मरी के साथ-साथ सिकता और शकरा का भी अनुवन्ध हो, उसे असाध्य समझना चाहिए।

अश्मरी के उपद्रव^र

वायु के प्रतिलोम होने पर जब शर्करा मूत्रमार्ग मे आकर अटक जाती है, तब मूत्रावरोध, मूत्रकुच्छू, दुर्बेलता, पीडा, कृशता, कुक्षिशूल, अश्वि, पाण्डु, उष्णवात, तृष्णा, हृदय पीडा और छदि आदि उपद्रव होते हैं।

चिकित्सा-सूत्र

- १. अरमरी में सामान्यत त्रिदोषशामक और शोधन चिकित्सा करनी चाहिए।
- २ स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति और उत्तरवस्ति का प्रयोग करे।
- ३ लघन, जलावगाहन, वस्ति पर प्रलेप या वस्ति पर जलघारा गिरावे।
- ४ वाताश्मरी मे वस्ति का प्रयोग करे तथा पूर्वरूप में घृतपान करावे ।.
- ५. पित्ताश्मरी में विरेचन करावे तथा पाषाणभेदादिगण का प्रयोग करे।
- ६ कफाश्मरी मे वमन और क्षार का प्रयोग करे।
- ७ अस्मरी रोग मे पाषाणभेद और कुलथी के योगों का प्रयोग करे।

१ प्रश्तनाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम्। भरमरी क्षपयत्याशु सिकता शकरान्विता ॥

२ मूनस्रोत प्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान् । दौर्वत्य सदनं काश्ये कुक्षिश्र्लमथारुचिम् ॥ पाण्डत्यमुष्णवात च तृष्णां हत्पीहनं विमम् । सु० नि० ३।१६-१७

२६ का० दि०

- ८ रोगी को निगद नामक मद्य पिलाकर रथ या घोडे पर या तेज चलनेवाली सवारी पर बैठाकर दौडाना चाहिए।
- ९ यदि उक्त क्रियाओं से लाभ न हो, अश्मरी का भेदन न हो, वह बाहर न निकले और यदि अश्मरी वडी हो, तो शल्यविद् से शल्यकमं कराना चाहिए।
- १० घृतपान, क्षारप्रयोग, कपायपान, दुग्धपान एवं उत्तरवस्ति के प्रयोग सफल न हो, तो ऐसी स्थिति मे शल्यविद् से शल्यकर्म कराना चाहिए।

सामान्य चिकित्सा

- 9. वीततविविगण (शा० स०) का उल्लेख मूत्राघात चिकित्सा में किया गया है। उसकी औषघो का क्वाथ या चूर्ण वनाकर या दूध मे पकाकर या उससे सिद्ध जल मे यवागू पकाकर या भोजन बनाकर खिलाना चाहिए।
- २ अश्मरोहर कवाय—पाषाणभेद, सागीन के फल, पपीते की जुड, शतावर, गोखल बीज, वरुण की छाल, कुशमूल, कासमूल, धान की जड, गदहपुर्ना की जड, गुरुच, विचिड की जड और खीरा का बीज १-१ भाग, जटामासी और खुरासानी अजवायन २-२ भाग लेकर, सबको जीकुट करके रख ले। इसमे से ५० ग्राम दवा को १ लीटर जल मे चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाय वना ले। इसे ४ खुराक बनावे और दिन में ४ बार ३-३ षण्टे पर पिलावे। इसंके साथ प्रत्येक बार ३०० मि० ग्रा० शिलाजीत, ३०० मि० ग्रा० क्वेतपपंटी और दे ग्राम जवाखार भी मिलाकर पिलावे।
- ३ अथकादि गण-क्षारयुक्त िष्ट्टी (रेह), सेंधानमक, हीग, शुद्ध कासीस, पुष्प कासीस, शुद्ध गुग्गुंलु, शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध तुत्य, इनका मिलित चूर्ण १ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३ बार देना चाहिए।
- ४ वरणादि क्वाय वरुण की छाल, सोठ, गोखरू बीज, मुसली, कुलथी और पचतृणमूल का क्वाय १०० मि० ली० १ ग्राम जवाखार मिलाकर २ बार रोज पिलावे।
- ५ एलाहि क्वाय-छोटी डलायची, पीपर, मुलहठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोसरू, अरूस और एरण्डमूल के समभाग के १०० मि० ली० क्वाय में शुद्ध शिलाजीत है ग्राम, मध्र ६ ग्राम और चीनी १५ ग्राम मिलाकर २ वार पिलावे।
- ६. शियु-प्रयोग—सिंहजन के मूल की छाल ५० ग्राम लेकर पीमकर, उसे घी और तेल मे भून ले। फिर उसमे आधा लीटर पानी डालकर यूष बनावे और दही का पानी उतना ही मिलावे और उसे शीतल करके सेंघानमक का चूर्ण डालकर इच्छानुसार पीने को दे।
- ७ श्रुटघाित चूर्ण छोटी इलायची, देवदारु, सेंघा-सोचर-विह-सामुद्र और जीद्भिद् ये पांचो नमक, जवाखार, कुन्दरू, पाषाणभेद, कबीला, गोखरू, कक्डोबीज, खीराबीज, विश्वकमूल की छाल, हीग, जटामासी और अजवाइन, प्रत्येक १-१ भाग, आंवला-हर्रा-बहेडा इनका निर्वीज फल २-२ भाग लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर छान ले। इसे ३-४ ग्राम की मात्रा मे अनार के रस, मद्य या यूष के साथ सबेरे-शाम दे। इसके सेवन से अश्मरी का भेदन हो जाता है।

- ८ पायाणभेवादि चूर्ण (च० चि० २६)—इस चूर्ण को ३-३ ग्राम दिन मे ३ वार देवे अथवा इस चूर्ण से चतुर्गुण छत और छत से चतुर्गुण गोमूत्र हालकर छत-पाक कर उसका प्रयोग करने से अक्मरी का भेदन और पातन हो जाता है।
- ९. अश्मरोभेदन योग—गोखरूमूल, तालमसानामूल, एरण्डमूल, छोटी कटेरी और वडी कटेरी का मूल को समान भाग में लेकर चूर्णंकर दूध में पीसकर मीठी दही के साथ पिलाना चाहिए। मात्रा—५ ग्राम।
- १०. गोखरू का बीज चूर्ण ५ ग्राम और मधु १० ग्राम बकरी या भेंड के दूध के साथ प्रात -मायं ८-१० दिनो तक सेवन करे।
- १९ वाकुची वीज ३ ग्राम और वरुण की छाल ३ ग्राम जौकुट कर किसी मिट्टी के पात्र मे १ कप पानी डाल भिगोकर सवेरे मसलकर छानकर पीना चाहिए।
- १२ एकल या संयुक्त रूप से चूर्ण या ग्वाय मे निम्नलिखित द्रव्यो का प्रयोग उत्तम है—बन्दाल (पेड को वाँझी), गोसरू, पाषाणभेद, अपामार्ग, कलमीसोरा, जवाखार, पचतृणमूल, सिहजन, पुननंवा, कुमृम्भवीज, पलाशपुष्प, लोहबान, वालमखाना, अनन्तमूल, शीतलिमचं, कुलथी, शिलाजीत, हजरलजहूदमस्म, वरुणादि गण, कपकादि गण आदि।

सिद्धयोग

- १ त्रिविकम रस ६०-१०० मि० ग्रा॰ तथा विजीरानीवू के जरु हा चूणें १ ग्राम दोनो साथ में जल से दिन में २-३ बार देना चाहिए।
 - २ पापाणवच्च रस २५० मि० ग्रा० प्रात -साय कुलयी के पवाय से दे।
 - ३. वरुणादि लौह १-२ ग्राम, कुलयी के बवाय से सबेरे-शाम दे।
- ४ त्रिनेत्र रस २५० मि० ग्रा० शीतल जल अथवा दूव, मुलहठी और सेमर के मूल से क्षीरपाक-विधि से पकाये दूध में बनी सीर के साथ २ वार।
- ५ हजरलजहूदमस्म ३०० मि० ग्रा॰, यवसार ३०० मि० ग्रा॰, चूहे की मेंगनी १ ग्राम और पुनर्नवामूल चूणें १ ग्राम के साथ मधु से २ वार दे।
 - ६ व्वेतपपॅटी है-१ ग्राम द्विगुण चीनी के साथ ३ बार देवे।
 - ७ पाषाणभेद का चूर्ण २० ग्राम दिन मे ३ वार वरुणादि ववाथ से।
- ८ चन्द्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुलु, गोक्षुराद्यवलेह का दीर्घंकाल तक प्रयोग करना हितकर हैं। रोगी के बलानुसार मात्रा देवे।

विशिष्ट चिकित्सा

वाताश्मरी

प्रात -साय पापाणभेदादि घृत की ३-४ ग्राम मात्रा वरुणादि क्वाथ मे देवे। पापाणभेदादि गण की औपधो से मिद्ध जल मे यवागू, पेया बादि बाहार सिद्ध कर खिलावे।

कायचिकित्सा

व्यवस्थापत्र

१. प्रात' पाषाणभेदाद्य घृत	२-४ ग्राम
वरुणादि क्वाथ से।	१ मात्रा
२. ९ वजे दिन	
कपकादि चूर्ण	१ ग्राम
कुलत्य क्वाय से।	१ मात्रा
३. भोजनोत्तर	
रोहीतकारिष्ट	२० मि० ली
समान जल से २ वार।	१ मात्रा
४ साय ६ वजे	
एलादि चूर्ण	३ ग्राम
कुलत्य यूष से ।	१ मात्रा
५. सोते समय	1
वैश्वानर चूर्ण	६ ग्राम
सुखोष्ण जल से।	१ मात्रा

पित्ताश्मरी

प्रात -सायं कुशादि घृत ५-१० ग्राम को एलादि क्वाथ ५० ग्राम में मिलाकर पीना एव पाषाणभेद के १०० ग्राम क्वाथ में ५०० मि० ग्रा० शिलाजीत और २० ग्राम चीनी मिलाकर दो बार पीना।

व्यवस्थापत्र

9	प्रात -साय		
	कुशादि छत	२०-४० ग्राम	
		२ मात्रा	
	पाषाणभेद के क्वाथ के साथ।		
7	९ वजे व २ बजे		
	पाषाणवज्जक	१ ग्राम	
	यवक्षार	१ ग्राम	
	जल से ।	२ मात्रा	
Ę	भोजनोत्तर २ बार		
	बरोग्यवर्धनी वटी	२ ग्राम	
	सुखोष्ण जल से ।	२ मात्रा	
8	रात मे सोते समय		
	अविपत्तिकर चूर्ण	४ ग्राम	
	जल से।	१ मात्रा	

कफाश्मरी

१ प्रातः-सायं

वरुणादि पृत

२ माना

वरुण की छाल के पवाय मे।

२ ९ वजे व २ वजे

वरणादि लीह

१ ग्राम २ माना

सहिजन की छाल के बवाय से।

३. ७ वजे शाम

त्रिविक्रम रस

२५० मि० ग्रा०

त्रुटघादि चूणं

३ ग्राम

कुलयी के यवाय से।

१ मात्रा

४. सोते समय

हिंगुद्धिरुत्तरादि चूणे

३ ग्राम

सुखोष्ण जल से।

१ मात्रा

शुकाश्मरी

१ प्रात-साय

पाषाणभिन्न रस

६०० मि० ग्रा०

शृटघादि चूणे

४ ग्राम

२ मात्रा

वरण की छाल के बवाय से।

२ ९ वजे व २ वजे

पापाणभेदादि चूर्ण

६ ग्राम

जल से।

३. रात में

२ मात्रा

चन्द्रश्रभावटी

१ ग्राम

दूध से।

१ मात्रा

वक्तव्य-आचार्यं चरक ने कहा है कि शुक्राश्मरी मे या तज्जन्य मूत्रकृच्छू मे दोर्थों का विचारकर तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए।

कार्पासमूलादि योग--कपास का मूल, पापाणभेद, वरियार का मूल, छोटी कटेरी, वडी कटेरी, गोलरू, सरिवन, पिठवन, वडी जोन्हरी का मूल, स्वेत पुनर्नवा, इन्द्रायण की जड, काली पुनर्नवा, शतावर, गुरुच और अपराजिता, इन सब की कूट कर रख ले।

वाताश्मरी में इनका क्वाथ बनाकर पिलावे। पित्ताश्मरी में इन्ही बौपधों से सिद्ध छत का पान करावे। कफाश्मरी में इन्हीं बौपधों से पडङ्गपानीय परिभापा से जल पकाकर वहीं जल पीने की दे और उसी जल से सिद्ध यवागू आदि का आहार देना चाहिए।

उपर्युक्त बौषघो से यदि शुक्राश्मरी शान्त न हो, तो रोगी को पुरानी मदिरा अथवा मधूकासव पिलाना चाहिए। पिक्षयो का मास खिलावे और शुक्राशय के शोधन के लिये वस्तियों देनी चाहिए। यहाँ वस्ति से उत्तरवस्ति समझना चाहिए। तदनन्तर वृष्य आहार एव औषध का प्रयोग कर रोगी को तृप्त करे, फिर रोगी को प्रिय तथा अनुकूल स्त्रियों के साथ सभोग करने की प्रेरणा देनी चाहिए।

पथ्य

कुलथी, मूंग, गेहूँ, पुराना चावल तथा जी, जागल पशुओ का मास, चीलाई, कूटमाण्डस्वरस, अदरक, यवक्षार, कुलथी का यूप, वरुण वृक्ष के पत्तो का शाक, पाषाणभेद, गोखरू, रेणुका और शालिपणीं आदि पथ्य हैं।

अपध्य

मूत्र या शुक्र के वेगो को रोकना, खटाई, विष्टम्मी द्रव्य, रूक्ष और गुरु भोजन तथा विरुद्ध भोजन आदि अपध्य हैं।

पश्चद्रा अध्याय

कासरोग, श्वासरोग तथा हिक्कारोग

कासरोग

परिचय—'कास' खांसी को कहते हैं। जब प्राणवायु भी उदानवायु के साथ मिलकर वेग के साथ कण्ठ से बाहर निकलती है, तब गले की खराबी से सर्दी-जुकाम होने या खर-सेवर होने से खांय खांय की घ्वनि निकलती है। कभी सूखी आवाज वाली खांसी होती है तो कभी कफ लिये हुए गीली खांसी होती है और खखारने पर कफ बाहर निकलता है। खांसी सूखी और गीली इन दोनो ही ख्पो मे होती है।

खाँसी जब पूर्व मे उत्पन्न किसी दूसरे रोग के विना हो अर्थात् स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हो, तो वह 'कासरोग' कही जाती है। खाँसी बहुत वदनाम लक्षण के रूप मे कुल्यात है, क्योंकि यह २३ रोगों में लक्षण के रूप में पायी जाती है। किसी को खाँसते हुए देखकर अनसामान्य उसे क्षय (टी० वी) का मरीज समझ वैठते हैं और दूर वैठने लगते हैं। जैसे हँसी-हँसी में झगडा बढकर मारपीट होने लगती है, वैसे ही यदि खाँसी की रोकथाम न की जाय, तो वह बढकर दमा, हिचकी, शोप, राज-यक्ष्मा, उर क्षत, रक्तिपत्त बादि दारुण रोगों को निमन्त्रित करती है। इसीलिये यह लोकोक्ति बहुप्रचेलित है—'रोग की जड खाँसी और झगडें की जड हाँसी'। रोग भी निदान के समान रोगोत्पत्ति करने वाला (निदानार्थंकर) होता है। इसका उदाहरण खाँसी है, क्योंकि इससे टी० वी० जैसे प्राणहर रोग हो सकते है—

दिवास्वापादिदोपैश्च प्रिनश्यायश्च जायते । प्रतिश्यायादयो कास कासात् सञ्जायते क्षयः ॥

कास शब्द का निर्वचन

(१) जिस रोग के होने पर गले से कुत्सित (निन्दित–विकृत) शब्द निकलता है, उसे 'कास' कहते हैं।

कासतेऽनेन । 'कासृ शब्द कुत्सायाम्' (भ्वा॰ आ॰ से॰) हलश्च (३।३।१२१) इति घव् । (अमरकोप-रामाश्रमी २।६।५२)

सुश्रुताचारं ने कहा है कि प्रकुषित वायु (प्राणवायु) मुख से बाहर निकलते समय फूटे हुए काँसे के वर्तन के गिरने जैसी कुत्सित ध्विन के साथ निकलती है, तो उसे 'कास' रोग कहते हैं। इसमे खाँसने के साथ कफ या पित्त बाहर निकलता है।

१ प्राणो इयुदानानुगत प्रदुष्ट स भिन्नकास्यस्वनतुरुयधीय । निरेति वक्त्रास्य सहसा सदीयो मनीयिभि कास इति प्रदिष्ट ॥ सु० उ० ५२।५

(२) जिस रोग मे वायु शिर के स्रोतो, यथा—कृण्ठ, स्वरयन्त्र आदि मे गतिशील होकर बाहर निकलती है, उसे 'कास' कहते हैं।

कसनात् कास: । 'कस गती' ('म्वादि०) घातु से कास शब्द बना है। कसित शिर:कण्ठादूष्ट्वं गच्छति वायुरिति कास: ।

'शुष्को वा सकफो वापि कसनात् कास उच्यते ।' (च० चि० १८।८)

वेग से गमन करनेवाली वायु को जिन-जिन स्थानो मे रुकावट का सामना करना पहता है, उस स्थान-विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज वाली खाँसी होती है।

सामान्य निदान भ

- 9 अधिक धुँआ उठने वाले वातावरण मे रहना—मुख, नाक और गले में धुँए के सहसा प्रवेश करने से उन स्थानों में फैली हुई वातवाहिनियों में क्षोभ के फलस्वरूप केन्द्र द्वारा उत्तेजना मिलने पर कासरोग उत्पन्न होता है और खाँसी आने लगती है।
- २. मुख, नाक एव कण्ठ में धूल के प्रवेश से भी क्षोभ होकर धुंबा लगने पर जैसे कास रोग होता है, उसी तरह कास हो जाता है।
 - ३. शक्ति से अधिक व्यायाम करने से वायुं की वृद्धि होने पर कास होता है।
 - ४ रूक्ष अन्न या पेय के प्रयोग से ,, ,,
 - ५. मल-मूत्र बादि के वेगो को रोकने से ,, ,, ,,
 - ६. छीक के वेग की रोकने से """"
 - ७ भोजन के किसी अश के श्वासमार्ग मे चले जाने से कास होता है।
 - ८. गलशोथ आदि आभ्यन्तर कारणो से भी कास होता है।

ग्रन्थ-सन्दर्भ

- (१) चरकसिहता चिकित्सास्थान अ० १८।
- (२) सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र अ०५२।
- (३) अष्टाङ्गहृदय निदानस्थान अ०३।
- (४) ,, ,, चिकित्सास्यान अ०३।

सामान्य संप्राप्ति

नीचे से अवरुद्ध या ऊपर की ओर धकेली गयी प्राणवायु प्राणवहस्रोतस् के ऊर्ध्वंभाग मे जाकर उदानवायु से मिलकर शिर स्थ सभी स्रोतो को पूरित करते हुए, हुनु, मन्या, नेत्र, पृष्ठ, उरपार्श्वं को पीडित करते हुए, शरीर मे आक्षेप, टूटन और वक्रता लाते हुए स्तब्धता लाकर शुष्क अथवा कफयुक्त 'कास' को उत्पन्न करती है। चूंकि इस रोग मे वायु वेगपूर्वंक पीडा के साथ निकल्ती है, अत इसे कास कहते हैं। रे

१ सुश्रुत० उ० ५२।४

२ चरक० चि० १८।६-८

यार्दकास

संप्राप्ति-चक्र

बाह्य निदान धूमोपघात आदि
आभ्यन्तर निदान प्राणनहस्रोत मे खर्वगुण्य
गलशोथादि

उदानानुगत दुष्ट प्राणवायु का

पुख से सहसा बहिर्गमन

|
शुष्ककास कफयुक्त

बोष-दूष्प-अधिष्ठान---

- १. दोष--वातप्रधान कफ।
- २ दूष्य--रस, स्वरयन्त्र ।
- ३. स्रोतस्---रसवह, प्राणवह।
- ४. अधिष्ठान---प्राणवहस्रोतस् उर कण्ठ, श्वासपथ ।
- ५ स्रोतोविकार-शोथ, सग।


सामान्य पूर्वेरूप

सभी कासो के पूर्वे रूप में मुख और गर्ले में शूक गढ जाने के समान वेदना का होना, कण्ठ में खुजली होना और भोजन का गर्ले में रुक जाना (अटकना) गर्ले और तालु में लेप लगा हुआ-सा मालूम होना, आवाज या स्वर का फटकर निकलना (वैषम्य), अरुचि और अग्निमान्द्य, ये लक्षण होते हैं।

वक्तक्य होता यह है कि मुखगह्वर और गलविल मे जी-गेहूँ के दूड (शूक)
गडने की तरह वेदना होती है। तालू और अञ्चनलिका के ऊपरी भाग ग्रसिनका मे
दोषों के प्रकोप से कण्टक की तरह अकुर वन जाते हैं। अत एव शूक के गडने
जिसी वेदना होती है। कास की उत्पत्ति में कफ भी भागीदार होता है, जिसके सूखने
से कण्ठ में खराश या खुजली होती है। दोषों के प्रकाप से गलशुण्डिका तथा ग्रसिनका
ग्रन्थि में शोथ हो जाने के कारण अञ्चमागं सकुचित हो जाता है। इस कारण से अञ्च के निगलने में कठिनाई होती है।

कास के भेव

वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयज भेद से कास पाँच प्रकार का होता है। ये कास पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर बलवान् होते हैं। यदि इनकी समुचित चिकित्सा न की जाय, तो ये क्षयज कास का रूप धारण कर लेते हैं।



वक्तव्य—इन पाँचो प्रकार के कास मे एक जराकास का भी समावेश जानना चाहिए, क्यों कि वह भी दोषप्रकोपज ही होता है, किन्तु यदि वृद्धावस्था के कारण शारीर धातुओं के क्षय की स्थिति होती है, तब वह याप्य होता है जब कि सामान्य मनुष्य का दोषज कास साध्य होता है—'स्थिवराणा जराकास सर्वो याप्य प्रकीतित'।

वातज कास के लक्षणो वाला एक विशेष कासरोग १० वर्ष से कम आयु के वच्चों में सक्रामक रूप में होता है, जिसे कुक्कुरखाँसी (Whooping cough) कहा जाता है। इसमें रोगी को घीमा-घीमा ज्वर रहने लगता है और सूखी तीव्र खाँसी आती है। वच्चा कुत्ते की तरह ठाँय-ठाँय खाँसता है और कभी-कभी कास के वेग के साथ वमन भी कर देता है। वेग आने पर खाँसी रुकती ही नहीं, मुख खुला ही रह जाता है, जीभ वाहर निकल आती है, आंखों से पानी आने लगता है, चेहरा नीला पह जाता है, सांस रुकने लगती है, श्वास लेने में कष्ट होता है। जब कुछ कफ वाहर निकल जाता है, तब थोडी राहत मिलती है। कभी-कभी खाँसी का दौरा पहने पर मुख या नासिका से रक्त भी आने लगता है।

मन्थर ज्वर (मियादी बुखार) की तरह यह भी शीघ्र शान्त नहीं होती। ठीक होने मे प्राय दो सप्ताह लग जाते हैं। सावधानी से उपचार करने पर ८-१० दिन में भी यह साध्य होती दीख पडती है। यदि समुचित चिकित्सा और सयम-परहेज न किया जाय तो यह महीनो तक पिण्ड नहीं छोडती। इसलिए इसमें कफ-नि सारक औषधों का प्रयोग और उष्ण वातावरण नितान्त अपेक्षित है।

विशिष्ट निदान एवं लक्षण

त्रातज कास का निदान

(१) रूक्ष-शीत एव कषाय द्रव्यो का सेवन, (२) अल्पाहार या किसी एक रसवाले पदार्थ का सेवन, (३) उपवास, (४) अतिमैथुन, (५) अधारणीय वेगो का धारण और (६) थका देनेवाला परिश्रम।

वातज कास का लक्षण

(१) हृदयप्रदेश-शखप्रदेश-शिर-उदर तथा पार्श्व मे वेदना, (२) मुख का सूखना, (३) बल स्वर एव ओज का क्षय, (४) कास का निरन्तर वेग आना, (५) स्वरभेद और सूखी खाँसी आना।

पित्तज कास का निवान

(१) कटु-उष्ण-विदाही-अम्ल और क्षार पदार्थों का अधिक सेवन, (२) क्रोध,

पित्तज कास का लक्षण

(१) छाती मे जलन, (२) ज्वर, (३) मुखशोष, (४) मुख का स्वाद तिक्त होना एव तृष्णा, (५) पाण्डुता, (६) दाह और (७) कटुरस युक्त पीले रग का वमन ।

क्फज कास का निदान

(१) गुरु-अभिष्यन्दी-मधुर एव स्निग्ध पदार्थीं का सेवन, (२) दिवाशयन और (३) परिश्रम न करना।

कफज कास का लक्षण

(१) मुख की कफलिसता, (२) अवसाद, (३) देह मे कफाधिक्य, (४) शिर शूल, (५) अरोचक, (६) शरीरगौरव, (७) कण्ठकण्डू, (८) गाढे कफ का नि सरण।

क्षतज कास का निदान

(१) अति मैथुन, (२) अति भारवहन, (३) अति पैदल यात्रा, (४) हाथी, घोडा या अपने से अधिक वलवाले से भिडना।

क्षतज कास का लक्षण

(१) प्रथम शुब्क कास पश्चात् सरक्त कफष्ठीवन, (२) कण्ठ तथा छाती मे पीडा, (३) छाती मे तीक्ष्ण सूचीभेदनवत् दु सह श्रूल का दौरा पडना, (४) अगो मे दूटन, (५) ज्वर, (६) श्वास, (७) तृष्णा, (८) स्वरभेद और कवृतर की आवाज की तरह घुर्ष्राहट की ध्वनि निकलना।

क्षयज कास का निदान

(१) विषम भोजन, (२) असात्म्य भोजन, (३) अति मैथुन, (४) मल-मूत्रादि वेगावरोध, (५) अतिष्टणा एव अति शोकजन्य मन्दाग्नि और (६) त्रिदोष प्रकोप।

सयज कास का लक्षण

(৭) अग-अग मे शूल, (२) ज्वर, (३) दाह, (४) शरीरशोष, (५) निर्वेलता, (६) मासक्षीणता और (৬) पूर्ययुक्त रसक्तष्ट्रीवन ।

साध्यासाध्यता

वातज, पित्तज और कफज कास साध्य होते हैं। क्षतज तथा क्षयज कास यदि नये होते हैं और चिकित्सा के चतुष्पाद अपने सोलह गुणो से सम्पन्न होकर तत्परता से चिकित्सा में सलग्न हो तो कदाचित् साध्य भी होते हैं। क्षीण व्यक्तियों का क्षयज कास असाध्य होता है और उनका क्षयज कास भी असाध्य होता है। वलवान् रोगियों का क्षतज या क्षयज कास कभी साध्य होता है और कभी याप्य होता है। चुद्धावस्था में होनेवाला जराकास याप्य कहा गया है।

वातज कास-चिकित्सा चिकित्सासूत्र

- १. वातज कास मे स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन और विरेचन कराना चाहिए।
- २ स्नेहनार्थं वातघ्न द्रव्यो से सिद्ध घृत, पेय, यूप, क्षीर और मासरस का आहार देना चाहिए तथा वस्ति-प्रयोग करना चाहिए।
 - ३ वातहर द्रव्यो से सिद्ध 'स्नेह, स्निग्घ घूम और अविले का प्रयोग करे।
 - ४ वातहर अभ्यग, परिपेक और स्निग्ध स्वेदन करना चाहिए।
- ५ जिन रोगियो का मल सूख गया हो और कठिन हो गया हो तथा अपानवायु की गति ऊपर हो गयी हो, उन्हें भोजनोत्तर घृतपान करावे।
 - ६ जिनको मल और अपानवायु के निकलने मे विवन्ध हो, उन्हे अनुवासन देवे।
- ७. यदि वातज कास के साथ पित्त या कफ का अनुवन्ध हो, तो स्नेहो से युक्त विरेचन द्रव्यो का प्रयोग कर विरेचन कराना चाहिए।

चिकित्सा

- १. चरकोक्त कण्टकारी घृत, पिप्पल्यादि घृत, त्र्यूषणादि घृत या रास्ना घृत का १०-१२ ग्राम तक यथायोग्य अनुपान से प्रयोग करे।
- २ विडगादि चूणं, द्विक्षारादि चूणं या शटधादि चूणं को ३ ग्राम की मात्रा में मध्र या घृत के साथ दिन मे ३-४ वार चटाना चाहिए।
- ३. दुरालभादि लेह, विडगादि लेह, चित्रकादि लेह ५-१० ग्राम की मात्रा में ३ वार देवे।
- ४ कासरोग मे वहुत प्रसिद्ध और लाभकर औषध रूप मे अगस्त्य हरीतकी का योग है। इसे ५ ग्राम की मात्रा दिन मे ३ बार देवे।
- ५ वातज कास के रोगी को जब शिर.शूल, प्रतिक्याय और मूर्च्छा मालूम हो, तो मन शिलादि धूम या प्रपौण्डरीकादि धूम का पान करावे।
 - ६ पेया-यवान्यादि पेया अथवा दशमूलादि पेया पिलानी चाहिए।
- ७ भाङ्गर्चादि लेह-भारगी, मुनक्का, कचूर, काकडासिंगी, पीपर और सीठ के समभाग का चूर्ण ३ ग्राम की मात्रा में ६ ग्राम गुड और ६ ग्राम तिल्तैल मिलाकर दिन में ३ वार खिलावे।
- ८. पचमूली क्वाय बृहत् पचमूल (बेल, गनियार, गम्भार, पाढल, सोना-पाठा) के १०० मि० ली० क्वाथ मे काकडासिंगी का ३ ग्राम चूर्ण मिलाकर सबेरे-शाम पिलाना चाहिए।
- ९ सिद्धयोग—चन्द्रामृत रस, लघुमालिनी वसन्त, वसन्ततिलक, ताप्यादि लोह, अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, भागोत्तर वटी, लवगादि वटी, सितोपलादि चूर्ण, ताली-सादि चूर्ण, च्यवनप्राश आदि का उचित भात्रा और अनुपान से प्रयोग श्रेयस्कर है।
- १०. भ्युरवादि चूर्ण-काकडासिगी, अतीस, नागरमोथा, सोठ, कालीमरिच, पीपर, हर्रा-बहेडा-आवला का वक्कल, बडी कटेरी, पोहकरमूल, समुद्रनमक, काला-

नमक, सेंघानमक, नौसादर, जवाखार, इन सबको बराबर लेकर चूर्ण बनावे। मात्रा—बच्चो को २००-५०० मि० ग्रा० और बडो को १-२ ग्राम जल या मधु से दिन में ३-४ देने से जमा हुआ कफ निकलकर खाँसी, श्वास, हिचकी, प्रतिक्याय आदि रोग ठीक हो जाते हैं।

व्यवस्था-पत्र

१. दिन मे ३ बार प्रायादि चूर्णं ६ ग्राम अर्केलवण २ ग्राम टकण १ ग्राम जल या मधु से।, ३ मात्रा अथवा १ ग्राम चन्द्रामृत रस ४०० मि० ग्रा० अभ्रकभस्म ४०० मि० ग्रा० यवक्षार ३ मात्रा मुलहठी चूर्ण २ ग्राम और मधु से। २. प्रात -साय च्यवनप्राश ३० ग्राम प्रवाल भस्म ३०० मि० ग्रा० सुखोष्ण दूध से। २ मात्रा ३ भोजनोत्तर २ बार ५० मि० ली० कनकासव

एजदि वट १-१ गोली . पित्तज कास-चिकित्सा

२ मात्रा

समान जल से पीना।

४ चूसना ५-६ बार

चिकित्सासुत्र

- १ वमन—यदि पैत्तिक कास मे कफ का अनुबन्ध हो, तो वमाकारक (मुलहठी, कचनार, हिज्जल, शणपुष्पी, अपामार्ग) द्रव्यो से सिद्ध छत पिलाकर वमन कराना चाहिए। अथवा—
- रे. मदनफल ५ ग्राम, गम्भार ५ ग्राम और मुलहठी ५ ग्राम लेकर विधिवत् क्वाथ वनाकर पिलाकर वमन करावे । अथवा—
- रे मदनफल २ ग्राम और मुलह्ठी २ ग्राम का चूर्ण वनाकर गन्ने कं रस मे मिलाकर पिलाकर वमन कराना चाहिए।

४ कफ के निहुरण के बाद शीतल एव मध्र पेया-विलेपी के क्रम से पथ्य दे।

५ विरेचन - जब पित्तज कास में कफ पतला हो, तो निशोथ के ४ ग्राम चूणे मे चीनी मिलाकर, खिलाकर विरेचन करावे और विरेचन के पश्चात् स्निग्ध और भीतल आहार एव स्निग्घ अवलेह आदि का प्रयोग कराना चाहिए।

६ यदि पित्तज कास में कफ गाढा हो, तो कुटकी बादि तिक्त द्रव्यों के साथ निशोध चूर्ण ४ ग्राम खिलाकर विरेचन करावे। पथ्य में रूक्ष तथा शीतल पेया आदि क्रमश देना चाहिए।

चिकित्सा

- ७ पित्तज कास-नाशक अवलेह-
 - १. निघाडा, कमलगट्टा, नील, प्रसारिणी और पीपल।
 - २. पीपल, नागरमोथा, मुलहठी, मुनक्का, मूर्वा और सींठ ।
 - ३ धान का लावा, आंवला, मुनक्का, वंशलोचन, पीपल और मिश्री।
 - ४ पीपल, पदुमकाठ, मुनक्का और वडी कटेरी का फलस्वरस।
 - ५ खजूर, पीपल, वशलोचन और गोसरू।

इनके समभाग चूर्ण में विषम मात्रा मे घी-मधु मिलाकर चटावे।

८ स्वपादि लेह—दालचीनी, छोटी इलायची, सोठ, मरिच, पीपर, मुनका, पिपरामूल, पुष्करमूल, धान का लावा, नागरमोया, कचूर, रास्ना, आंवला, बहेडा, इनके समभाग के चूर्ण में चीनी एवं विषम मात्रा मे घी-मधु मिलाकर चाटने योग्य अवलेह बना ले।

इसकी ३-४ ग्राम की मात्रा दिन में ३-४ वार सुखोष्ण जल से दे।

९ क्षीरपाक-काकोली, वडी कटेरी, मेदा, महामेदा, बरुस और सोठ सें यथानिधि सिद्ध दूध पिलाना हितकर है।

१० शर्करादि योग—मिश्री, सोठ, सुगन्धवाला, रेंगनी और कचूर—इन सबको

चुर्णंकर फिर पीसकर रस निचोडकर उसे छानकर घी मिलाकर पिलावे ।

१९ गाय-भैंस-भेंड वकरी इनका दूध, अविले का स्वरस और घृत सब समभाग लेकर घृन सिद्ध कर ५-१० ग्राम पिलाना हितकर है।

९२ अगहनी या साठी चावल का भात जागल पशुपक्षियो के मासरस के साथ खाने को दे। जब कफ पनला हो, तो यह पथ्य हितकर है।

१३ यदि कफ गाढा हो तो तिक्तरसयुक्त द्रव्यो से निर्मित लेह मे घी मिलाकर दे।

१४ सांवा, कोदो तथा जौ से बने आहार को मूँग के यूष तथा परवल के शाक से खिलावे ।

१५ सिद्धयोग—चन्द्रामृत रस. कफकेतु रस, लक्ष्मीविलास रस, व्याग्री हरीतकी, सितोपलादि चूर्ण, तालीशादि चूर्ण, समशर्कर चूर्ण, भागोत्तर वटी, एलादि वटी, प्रवाल भस्म, टकण भस्म आदि तथा वासारिष्ट या कनकासव का उचित मात्रा मे प्रयोग करे /

१६ अनुपान मे चीनी का शर्वत, मुनक्के का रस, गन्ने का रस, दूध तथा अन्य पेय द्रव्य जो शीतल, मधुर और अविदाही हो, उसे देना चाहिए।

व्यवस्था-पत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४ बार

प्रगाराभ्र ५०० मि० ग्रा० प्रवाल भस्म ५०० मि० ग्रा० गोदन्ती भस्म १ ग्राम बृहत् सितोपलादि चूर्ण ६ ग्राम योग ४ मात्रा

वासारस १ चम्मच और १ चम्मच मधु से।

- २ भोजन के १ घण्टा पूर्व २ वार तालीसादि या समेंशर्कर चूर्ण ६ ग्रुगम जल से। २ मात्रा
- ३ भोजनोत्तर २ वार

वासारिष्ट ४० मि० ली० २ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

४. दिन में ५–६ गोली चूसना एलादि वटी

या

लवगादि वटी

५ रात मे सोते समय

यष्टचादि चूर्ण (सि० यो० सं०)

अथवा---

पनसकार चूर्ण ५ ग्राम सुक्षोब्ण जल से। १ मात्र

कफज कास-चिकित्सा

चिकित्सासूत्र

- १ सशोधन—वलवान् रोगी के कफज काम मे मदनफल चूर्णं २ ग्राम, वच चूर्णं २ ग्राम, सेंघानमक १ ग्राम मिलाकर यधु तथा लवण जल का घोल पिलाकर वमन कराना चाहिए।
 - र कफघ्न उष्ण इच्छाभेदी या नाराच रस खिलाकर विरेचन करावे।
 - रे. कट्फल के चूर्ण का नस्य देकर शिरोविरेचन कराना चाहिए।

- ४ धूम्रपान—देवदारु बुरादा, वरियार की जड और जटामासी को समभाग मे लेकर वकरी के दूध मे पीसकर वत्ती वना लें। इसमे घी चुपडकर चीलम पर रखकर धूम्रपान कराने से शीघ्र लाभ होता है। (भावप्रकाश)
- ५. कवलग्रह सोठ, मरिच तथा पीपर के चूर्ण मे मधु मिलाकर मुख मे रखकर उसे जीभ से चलाते रहना चाहिए। इसे कवल कहते हैं।
- ६. अवलेह—देवदार, हरीतकी, नागरमोथा, पीपर और सोठ के समभाग चूर्ण मे मधु मिलाकर चटाना चाहिए।
 - ७ कफनाशक, उष्ण, रूक्ष और लघु गुणयुक्त आहार देना चाहिए।

चिकित्सा

- १ त्रिकटु चूर्ण २ ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ३-४ वार चटाना चाहिए।
- २. श्रुग्यादि चूर्ण २ ग्राम की मात्रा मे जल से दिन मे ३-४ बार दे।
- ३. वायविडग के कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध छूत अथव। सिन्दुवार के कल्क एव क्वाथ से सिद्ध छूत १० ग्राम की मात्रा मे चीनी से २ वार दे।
- ४. पाठादि घृत (सुश्रुत) १० ग्राम की मात्रा मे चीनी से २-३ वार प्रति दिन देवे।
- ५ कासनाज्ञक प्रमुख द्रव्य—सोठ, मरिच, पीपर, नागरमोथा, अतीस, कट्फल, पुरुकरमूल, काकडासिगी, दशमूल, चित्रकमूल, कण्टकारी, मुनक्का, भारगी, जवालार, पिपरामूल, अरुस, सिन्दुवार, लिसोडा, देवदार और तुलसी एव अदरक आदि का अकेले ही चूर्ण या क्वाथ के रूप मे मधु मिलाकर सवेरे-शाम प्रयोग करना लाभकर है।
- ६ मयूरिपच्छ भस्म २५० मि० ग्रा० हरीतकी चूर्ण २ ग्राम के साथ मधु से ३
 - ७ अध्टाङ्गावलेहिका अवया वासावलेह १० ग्राम दिन मे ३ वार दूध से दे।
- ८. कट्फलादि स्वाय कफज कास में वात का अनुबन्ध होने पर इस क्वाय में मधु और भुनी हीग का प्रक्षेप कर प्रात -सार्य पिलावे । (चरक)
 - ९. निम्नलिखित अवलेह कफज कास-नाशक हैं—
 - १ पीपर, पिपरामूल, चित्रकमूल और गजपीपर।
 - २. हरीतकी, भुँई बाँवला, नागरमोथा और पीपर।
- ३. देवदारु, कचूर, रास्ना, काकडासिगी और दुरालभा—इन्हें ४ ग्राम की मात्रा मे लेकर विषम मात्रा मे मधु-धी मिलाकृर चटावे।
- १० दशमूलादि घृत, कण्टकारी घृत या कुल्त्थादि घृत १० ग्राम, प्रात साय प्रयोग करे।
- १९ कंडवी तरोई के फल का खुज्जा तथा मैनसिल एक मे मिलाकर चीलम पर पिलावे । बाद मे गरम दूध मे गुड मिलाकर पिलाना चाहिए ।

१२ सिद्ध योग—रसिस्ट्रर, आनन्दभैरव रस, कफकुठार रस, नागवल्लम रस. प्रश्नमस्म, शुम्राभस्म, टकणभस्म, अभ्रक भस्म, चन्द्रामृत, कफकेतु रस, वासारिष्ट और कनकासव का प्रयोग उचित मात्रा और अनुपान के साथ करना चाहिए।

आवस्थिक चिकित्सा

१ वातानुबन्धी कफल कास मे दशमूलादि घृत का पेया आदि के साथ प्रयोग करना चाहिए। मात्रा---१० ग्राम। अथवा---

२ देवदार, कचूर, रास्ना, काकडासिगी और दुरालमा का समभाग चूर्ण मधु तथा तिल का तेल मिलाकर चटाना चाहिए। अथवा---

३. पीपर, सोठ, नागरमोथा, हर्रा, आंवला और मिश्री के समभाग चूर्ण मे मधु तथा तिल तेल मिलाकर चटाना चाहिए । अथवा—

४ सोचरनमक, हर्रा, नौंवला, पीपर, यवलार और सोठ के समभाग चूर्ण को ३-३ ग्राम की मात्रा मे घी मिलाकर चटाना चाहिए।

५ कण्टकारी घृत सर्वविद्य वात-कफन कासन्धास-नाशक है।

६ कफज कास मे पितानुबन्धज तमक श्वास हो जावे, तो रोगावस्था के अनुसार पित्तज कास की चिकित्सा करनी चाहिए।

७ वातज कास मे कफानुबन्ध हो तो कफनाशक चिकित्या करे।

८ यदि कफज कास मे पित्त का अनुबन्ध हो, तो पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए।

९ यदि वात-कफात्मक कास में कफ अधिक निकलता हो, तो रूक्ष अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए, किन्तु यदि कफ न निकलता हो तो स्निग्ध अन्नपान का प्रयोग करे।

१०. कफज काम मे यदि पित्त का अनुबन्ध हो, तो तिक्त रस युक्त अम्नपान का प्रयोग करना चाहिए।

व्यवस्थापत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४ वार कासे लक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्रा० चन्द्रामृत १ ग्राम कफकेत् ५०० मि० ग्रा० ४ मात्रा पान के रस और मधु से। अयवा—दिन मे ई बार रससिन्दूर ५०० मि० ग्रा० शृगभस्म १ ग्राम टकण ५०० मि० ग्रा० मंधु से । ३ मात्रा

२७ का० द्वि०

२ ९ बजे य ३ बजे दिन

श्रुग्यादि चूर्णं,

३ ग्राम

या

समशकंर चूणं सुखोष्ण जल से।

३ त्राम

१ मात्रा

३. भोजनोत्तर २ वार

कनकासव

४० मि० ग्रा०

समान जल मिलाकर पीना। २ मात्रा

४ चूसना लवगादि वटी या रादिरादि वटी ५-६ गोली रोज

क्षतज कास-चिकित्सा

चिकित्सासूत्र

- १ यह एक आत्यियक न्याधि है, जिसमें वल-मास की क्षीणता धातक होती है, अत जीवनीय गण (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋदि, चृद्धि, मुलहठी, जीवन्ती, मूगपर्णी) की औपघो तथा मिश्री, मनवन, घी, दूध, सिघाडा, शतावर, तालमन्याना, मुसली, वशलोचन, चिराँजी, नारियल, अञ्चकभस्म, प्रवालिपप्टी, मुक्तािपप्टी आदि शीतल, स्निग्ध एवं पुष्टिकर औपघों के प्रयोग से शक्ति-सवर्धन करना चाहिए।
 - २. इसकी चिकित्सा मे पित्तज कास की चिकित्सा की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
- ३. कासनाशक अपिघो के अनुपान में दूध, घी, मद्यु, चीनी का शर्वत, ईख का रम, अगूर का रस, मुनक्के का क्वाथ, गोदुग्ध आदि मधुर एव शीतल पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए।
 - ४ सन्तर्पण, शीतल और अविदाही अन्नपान का प्रयोग करे।
 - ५. अभ्यग, उत्सादन सादि में घृत का प्रयोग करना चाहिए।
- ६. मन के अनुकूल और प्रिय एव सुलकर शब्द स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदि विषयो का प्रयोग करे।
 - ७ पेय जल के रूप मे घडगपानीय का प्रयोग करे। सथवा-
- ८. स्वा, कमल, श्वेतचन्दन, लोध, मुलहठी, धावा का फूल, पलाशपुष्प, श्वतावर, फूलियंगु, अश्वपप, नागरमोथा, अनन्तमूल, महुआ, पित्तपापडा, आँवला, गूलर की छाल, वरोह, इनमें से जो भी उपलब्ध हो उसका मोटा चूण २५ ग्राम लेकर २ लीटर जल में पकावे और आधा वचने पर छानकर रख ले। उसी जल का खाने, पीने या अनुपान में प्रयोग करना लाभप्रद है।

चिकित्सा

१ पिप्पल्यादि लेह १० ग्राम की मात्रा मे ५ ग्राम घी और १० ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ३ बार चटाना चाहिए।

- २. आंवले के ६ ग्राम चूर्ण को १२ ग्राम घी में पकाकर, खिलाकर दूध पिलाना चाहिए।
- ३. खर्जूशिव योग—खजूर, भारगी, पीपर, चिरोजी, मुलहठी, छोटी इलायची और आंवला के समभाग का चूर्ण बनावे। उसे ४ ग्राम लेकर चीनी ५ ग्राम, मधु ५ ग्राम और घी १० ग्राम मिलाकर चटाना चाहिए। ऐसी तीन मात्रा प्रतिदिन देवे।
- ४ रक्तावि चूर्ण-मजीठ, हल्दी, सीवीराञ्जन, चित्रक, पाठा, मूर्वा और पीपर समभाग का चूर्ण ३ ग्राम मात्रा मे मधु से ३ बार देवे ।
- ५ गुड के शर्वत को सुस्रोष्ण कर १ कप लेकर और ६ ग्राम मधु तथा ३ ग्राम मरिच का चूर्ण ढालकर सेवन कराना चाहिए।
 - ६ कल्याणगुरु ५ ग्राम की मात्रा प्रात -साय खिलानी चाहिए।
- ७ रक्तमिश्रित कफ निकले और दाह हो, तो वातरक्त में कथित जीवनीय घृत को १० ग्राम की मात्रा में दूध में पान कराये।
 - ८ कृश रोगी को लावा (वटेर) बादि पक्षियो का मासरस देवे।
- ९ तृष्णा की अधिकता हो, तो पचतृणमूल ढालकर पकाया गया वकरी का दूध पिलाना चाहिए।
- १० यदि मुख या नाक से रक्त आता हो, तो दूध से निकाले गये एत का नस्य दे और पान करावे।
 - ११ यदि मन्दानि, दुवंलता एव थकावट हो, तो यवागू खिलावे ।
- १२ यदि क्षतज कास मे उर क्षत का विकार शान्त ही गया हो, किन्तु फुप्फुस मे पीडा होती हो, तो घूम्रपान कराना चाहिए।
- १२. मन शिलादि धूम-मैनसिल, पलाशवीज, अजमोदा, वशलोचन और सोठ के कत्क को रेशमी वस्त्र के टुकड़े में लपेट कर घी से तर करके चीलम पर रखकर धूम्रपान करावे। अथवा—
- १४ मैनसिल और वड के वरोह को समान भाग में लेकर पीसकर घी मिलाकर चीलम पर रखकर घूम्रपान करावे। वाद में उक्त दोनो घूम्रपानों के बाद तित्तिर पक्षी के मामरस के साथ अन्न खिलावे।

सिद्धयोग

- ९ प्रवालपश्चामृत, वसन्ततिलक, प्रवालपिष्टी, मुक्तापिष्टी, वासावलेह, सिती-पलादि चूर्ण और तालीसादि चूर्ण भादि का यथायोग्य अनुपान से प्रयोग करे।
- २ सितोपलादि चूर्णं १ ग्राम, पीसा मुनक्का १ ग्राम और प्रवालभस्म ३०० मि० ग्रा॰ की मात्रा च्यवनप्राश ५ ग्राम के साथ दिन मे ३ बार दे।
- ३ उशीरावि चूर्ण--३-३ ग्राम की मात्रा मे ३ बार वासास्वरस भीर मधुसे दे।

कायचिकित्सा

व्यवस्यापत्र

१ प्रातः, साय, मध्याह्न

चन्द्रामृतरस १ ग्राम प्रवालिष्टी ३ ग्राम गुष्त्राभस्म ३ ग्राम लाक्षा चूर्ण ३ ग्राम

वासापत्र-स्वरस और मध् से।

२. ९ वजे व ३ वजे

शृगाराम्न ५०० मि० ग्रा० प्रवालपचामृत् २५० मि० ग्रा० तालीमादि चूणं २ ग्राम २ मात्रा

च्यवनप्राश ५ ग्राम दूध के साथ।

३. भोजन के वाद २ वार

समान जल मिलाकर पीना।

४ एलादि वटी ४-५ गोली प्रतिदिन चूसना

५ रात में सोते समय

ममशकर चूणं ४ ग्राम सुखोष्ण जल से। १ मात्रा

६. अभ्यग---

वासाचन्दनादि तैल

अथवा —

चन्दन बलालाक्षादि तैल

क्षयज कास-चिकित्सा

चिकित्सासूत्र

9 क्षयज कास अत्यन्त दारुण और त्रिदोषज होता है, इसलिए इसमे त्रिदोष-नाशक उपचार करना चाहिए।

२ क्षयज कास मे बारी-बारी से दीपन, वृहण और स्रोत शोधन औपधो का प्रयोग करना चाहिए अर्थात् एक बार दीपन औषध, फिर बृहण औपध, तत्प्रश्चात् स्रोत शोधक, फिर दीपन, फिर वृहण फिर स्रोत शोधक औषध का प्रयोग करे। ३ क्षतज कास में कहे गये मन सिला धूम्रपान और मधुर, स्निग्ध एव शीतल द्रवों के अनुपान क्षयज कास में भी दे।

४. वातनाशक (दशमूल आदि) औषधो से सिद्ध दूध और यूप का सेवन कराना लाभकर है।

५ मासमक्षी क्षयज कास रोगी को विष्किर, प्रतुद और विलेशय जाति के पक्षियो एव पशुओ का मासरस खिलाना चाहिए।

६ यदि रोगी मे बहुदोष के लक्षण (देखें चरक० सूत्र० १६।१३-१६) दीख पडें, तो उसे मृदु विरेचन देना चाहिए। जैसे—अमलतास फलमज्जा के क्वाथ से अथवा मुनक्का के क्वाथ से निशोध का चूर्ण ४-६ ग्राम खिलाना चाहिए।

७ जिस रोगी मे रस-रक्तादि घातुएँ क्षीण हो और कफ-पित्त क्षीण हो और वात की प्रधानता हो, उसे काकडासिंगी, वला, महावला के कल्क और दूध से सिद्ध किये हुए घी का पान कराना चाहिए।

चिकित्सा

- 9. द्विपश्वमूलादि घृत, गुडूच्यादि घृत, कासमर्दादि घृत, इनमे से किसी को भी १० ग्राम की मात्रा मे दूध मे सवेरे-शाम पिलाना चाहिए।
- २. हरीतकी लेह, पद्मकादि लेह, द्राक्षादि लेह या जीवन्यादि लेह की १० ग्राम की मात्रा मधु से ३ वार रोज चटाना चाहिए।
- ३. शल्लकीकण्टक मस्म या मृगश्या भस्म—इस भस्म को २५० मि० ग्रा० की मात्रा मे घी चीनी मिलाकर दिन मे ३ बार चटावे।
- ४. दूध मे पकाये हुए आंवले का चूर्ण ३ ग्राम घी-चीनी मिलाकर दिन मे ३-४ बार खिलाना चाहिए।
- ५. कालीमरिच का चूर्ण १ ग्राम, चीनी ५ ग्राम और १० ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ४-५ वार चटाना चाहिए।
- ६ ताजे वेर के पत्तों को पीसकर, घी में भूनकर, ३ ग्राम लेकर उसमे १ ग्राम सेंघानमक मिलाकर दिन में २-३ वार सेवन करावे।
 - ७ र्कण्ठ मे शोथ या कण्डू हो तो वासावलेह मे मधु मिलाकर ३ बार चटावे।
- ८ चूसने के लिए एलादि वटी, मरिचादि वटी या लवगादि वटी दिन मे ६-७ बार दे।
- ्र परदा-रहित पान के लगे बीडे मे १००-२०० मि० ग्रा० टकण भस्म रखकर चूसते रहने से खाँसी मे राहत मिलती है।
- १०. शीतलचीनी, लवग, मुलहठी, खैर, बहेडे का बक्कल या समभाग मे मरिच तथा चीनी का मिश्रण, इनमे से कोई एक औषध मुख मे रखकर चूसते रहने से कास का वेग शान्त रहता है।

सिद्धयोग

वसन्तमालती, वसन्ततिलक, चन्द्रामृत, अगस्त्यहरीतकी, व्याघ्रीहरीतकी, मुक्ता-पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, प्रवालपचामृत, तालीशादि चूणं, सितोपलादि चूणं, समशकंर चूणं, यवानीपाद्य चूणं, वासायलेह, च्यवनप्राश आदि वहुपरीक्षित औषधें हैं। इनका समुचित मात्रा मे योग्य अनुपान से प्रयोग लाभकारी है।

ध्यवस्थापत्र

१ दिन मे ३ वार
 नारदीय लक्ष्मीविलास ५०० मि० ग्रा०
 प्रवालपऱ्यामृत ५०० मि० ग्रा०
 मृगश्रृग भस्म १ ग्राम
 रसितिदूर ४०० मि० ग्रा०
 सितोपलादि चूणं ३ ग्राम
 ३ ग्राम
 भात्रा

च्यवनप्राश १० ग्राम के साथ दूध से।

२ भोजन के तुरन्त पूर्व २ वार

यवानीपाष्टव चूर्णं ६ ग्राम विना अनुपान । २ मात्रा

३ भोजनोत्तर २ वार

द्राक्षारिष्ट <u>४०० मि० ली०</u> २ मात्रा

वरावर जल मिलाकर पीना।

४ दिन मे ६ बार एलादिवटी

या

व्योपादि वटी १-१ गोली चूसना।

सामान्य पध्य

स्निग्ध स्वेदन, विरेचन, वमन, धूम्रपान । आहार मे शालि चावल, साठी चावल, मूग, कुलथी, जागल मांस, छृत, दुग्ध, जीवन्ती, मुनक्का, अरुस, सोठ, मरिच, पीपर, मधु, धान का लावा, इलायची, गोमूत्र आदि का दोपो का विचार कर प्रयोग करे।

सामान्य अपय्य

रक्तस्रावण, व्यायाम, धूप-सेवन, दूषित वायु, धूलि, धुंआ, अधिक पैदल चलना, विष्टम्भी, विदाही एव इक्ष अन्नपान, मल-मूत्र-छदि आदि के वेगो का रोकना, मछली, सरसो, लौकी, विषद्ध आहार, गुरु पदार्थ, शीतल अन्नपान आदि दोपो के अनुसार अपध्य हैं।

वातज कास मे पय्य

वथुआ, मकोय, मूली, तिनपतिया का शाक, तिल-तैल, गन्ने का रस, गुड से वने पदार्थ, अनार, मद्य का स्वच्छ भाग, मधुर-अम्ल-लवण रसयुक्त पदार्थ हितकर है।

पित्तज कास मे अपथ्य

सावाँ, जो तथा कोदो का भात, जागल पशुपक्षियो के मासरस के साथ या मूँग के यूष के साथ या तिक्तरसंयुक्त शाक के साथ खाना चाहिए। शर्बत, मुनक्का, गन्ने का रस, गोदुग्ध तथा मधुर, शीतल, अविदाही पदार्थ पथ्य हैं।

कफज कास मे पच्य

पुराना चावल, मूँग का यूष, पीपर और जवालार से सस्कृत सूखी मूली का यूष, जागल जीवो का मासैरस तथा लघु अक्ष पथ्य हैं। अनुपान मे मधु, खट्टे अनार का रस, गरम जल, मट्ठा, स्वच्छ मदिरा (प्रसन्ना) का पान करना पथ्य है।

क्षतज कास मे पथ्य

लावा पक्षी का मासरस, पचतृणमूल डालकर क्षीरपाक-विधि से बनाया हुआ वकरी का दूध, यवागू, मधुर, शीतल, स्निग्ध तथा पित्तनाशक पदार्थ पथ्य हैं।

क्षयज कास मे पथ्य

लघु अन्न, पुराना चावल, मूँग का यूप, रुचिकर सुगन्ध युक्त भोजन, अभ्यग, उबटन, मासरस और भात, मधुर फल, वकरी या गाय का दूध आदि पथ्य हैं।

श्वासरोग

परिचय-श्वास का फूलना या दम का फूलना 'श्वासरोग' कहलाता है। वेग के साथ वायु की उद्धवंगित को श्वासरोग कहते हैं। जैसे छोहार की भाषी से वेग के साथ वायु निकलती है, उसी तरह कण्ठ से वेग के साथ वार-वार वायु का निकलना श्वासरोग है। इस श्वास को छेने तथा छोडने में कष्ट का होना प्राणवहन्नोत में प्राणवायु के यातायात या विनिमय में बाधा होने का प्रतीक है। यह रोग प्राणवहन्नोतस् में अवरोधात्मक विकृति का परिणाम है।

निर्वेचन—'श्वम प्राणने' (अदादि) धातु से श्वास शब्द बना है, जिसका अर्थ है—प्राणधारणार्थं (शरीरस्थ रक्तपरिश्रमण-प्रक्रिया से दूषित रक्तशोधंनार्थं) प्राणवायु (आक्सीजन—Oxygen) का श्वासमार्गं से भीतर प्रवेश करना । जब श्वासप्रणाली या फुप्फुस के वायुक्षोषों में वायुप्रवेश के लिए स्थान कम होता है, तो प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए बार-बार शीझता से श्वास लेनी पडती है । यही श्वासरोग है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

चरकसहिता-चिकित्सास्थान अ० १७ । सुश्रुतसहिता-चत्तरतन्त्र अ० ५१ । अष्टाङ्गहृदय-चिकित्सास्थान अ० ४। माधवनिदान-श्वासरोग ।

निदान'

श्वासरोग के निदान कई श्रेणियों में हैं। जैसे—(१) वातप्रकोपक अहार-विहार (२) कफप्रकोपक आहार-विहार (३) आन्तरिक कारण (४) वाह्य कारण (५) स्थानिक कारण और (६) अनेक श्वासजनक रोग।

- १. (क) वातप्रकोपक आहार—रूक्ष अन्नसेवन, विषमाशन, शीतल जलपान, अपतर्पण, अतिभोजन, अध्यशन आदि।
- (ख) वातप्रकोषक विहार—धूल, धूम्र, धूप, शीतवायु लगना, शीत स्थान मे निवास, व्यायाम, अतिमैथुन, शीत जल-स्नान तथा वमन आदि का अतियोग, अधिक पैदल चलना, वेगावरोध आदि ।
- २ (क) कफप्रकोषक आहार—सेम, उडद, तिल की खली, पिष्ट पदार्थ, कमल की जड, विष्टम्भी और विदाही अन्न, गुरु द्रव्य, जलज-आनूपमास, दही, कच्चा दूध, अभिष्यन्दी तथा कफवर्धक आहार आदि।
- (ख) कफप्रकोपक विहार—शीतल स्थान मे निवास, शीतल वायु सेवन, शीत जल-स्नान तथा कफवर्धक वातावरण।
- ३ आन्तरिक कारण—मलावरोघ होना, आमविष, प्राणवायु का कफ के अनुगत होना, रोक्ष्य, दोर्वेल्य, प्राणवहस्रोतो विकार, फुप्फुस के वायुकोषो की निष्क्रियता, श्वास-प्रणाली मे सग या शोथ, फुप्फुसगत विकार, आमाशय या उदर की वायु-पूर्णता आदि ।
- ४. बाह्य कारण—कण्ठ या उर स्थल (छाती) पर आघात लगना, धुँए नाले या घूलि वाले स्थान मे निवास, अति मागंगमन, अधिक स्त्रीप्रसङ्ग आदि ।
- ५. स्थानिक कारण भ्यामनलिका के ऊपरी भाग मे किसी प्रकार का शोध, वक्ष स्थ किसी अग मे शोथ होना, श्वासक्रिया मे सहायक पेशियो की क्रिया मे बाधा, तुण्डिकाशोथ होना आदि।
- ६ श्वासरोगजनक रोग—पाण्डु, अतिसार, ज्वर, छर्दि, क्षतक्षीण, रक्तिपत्त, विष, जदावर्त, विसूचिका, अलसक, आध्मान, मेदोवृदि, जलोदर, हृदयरोग, गुल्म, शोष, यक्ष्मा, प्लीहोदर, अग्निमान्द्य आदि।

आधुनिक मत से उरोवात (Emphysema), सन्यास (Coma), जानपदिक शोफ (Epidemic dropsy), मूत्र-विषमयता (Uraemia), अत्यधिक हृदयाति-पात (Congestive heart failure) भी श्वास को जन्म देते हैं।

१. चरक० चि० १७।११-१६ तथा सुश्रुत० उ० ५०।३ ५

'संप्राप्ति'

प्रवल कफप्रकोपयुक्त प्रकृपित प्राणवायु जब प्राणवाही स्रोतो में अवरोध (रुकावट) पैदा कर सर्वत्र (पूरे फुप्फुस मे) व्याप्त होकर घूमती है, तो श्वास के यातायात मे वाधा होते से श्वास लेने मे कष्ट होने लगता है और 'श्वासरोग' उत्पन्न हो जाता है। प्राणवहस्रोत से श्वास-प्रणाली, नलिकाओ और फुप्फुस का ग्रहण करना चाहिए।

- वक्तव्य (१) फुप्फुम और श्वास-निलकाओं में कफ होने से क्षीम तथा श्वास-वायु के यातायात में व्यवधान की प्रतिक्रिया स्वरूप शीघ्र श्वास लेने की क्रिया का आरम्भ होता है। यदि वायु के विगुण होने से कफ आसानी से नहीं निकलता, तो श्वास की तीव्रता बढ जाती है।
- (२) श्वासरोग में विकृति केवल फुप्फुस मे न रहकर वातनाडियो मे भी रहती है। प्राणदा (वागस) की क्रिया की कमी या सिम्पैथेटिक की क्रिया की अधिकता के फलस्वरूप श्वासकब्द होता है।
- (३) विष्टम्भी, अभिष्यन्दी एव गुरु पदार्थं भी आमाशयिक क्षोभ द्वारा कफ-वृद्धि से फुप्फुस मे अवरोध उत्पन्न करके सुषुम्नाशीर्षस्थ श्वास-नियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित करके श्वासरोग की उत्पत्ति करते हैं।
- (४) कभी-कभी अधिक भोजन कर होने पर भी फुप्फुस पर आमाशय का दवाव पडता है, जिससे फुप्फुस मे होने वाले वायु-सन्वार मे कमी हो जाने से पुन पुन श्वास लेना पडता है।
- (५) श्वासरोग को पित्तस्थान-समुद्भव कहा गया है। पित्तस्थान-समुद्भव का अयं है—आमाशय-समुद्भव। दोषानुसार आमाशय के दो भाग हैं—१ ऊर्ध्व और २. अप्र । ऊर्ध्व आमाशय कृफ का स्थान है और अप्र आमाशय-ग्रहणी पित्त का। श्वासरोग प्रवल कफप्रकोप से होता है और आमाशय कफ-दृद्धि का स्थान है, अत श्वासरोग आमाशय-समुद्भव है।
- (६) होता यह है, िक कफ की वृद्धि से अग्निमान्द्य होता है और अग्निमान्द्य से आम तथा आमिवष बनता है, जिससे रसदुष्टि होती है और रस के मलभूत कफ की अधिकता हो जाती है, जिससे प्राणवहस्रोतस् में, अवरोध होता है, िफर वायु का यातायात वाधित होने से श्वासकष्ट होकर श्वासरोग हो जाता है। इस प्रकार श्वासरोग की सप्राप्ति में आमिविष के बनने का सिलिसिला चल पडता है। जैसे—कफ की वृद्धि→अग्निमान्द्य→आम→रसदुष्टि→कफवृद्धि→फिर अग्निमान्द्य। श्वासरोगोत्पत्ति में इस सप्राप्ति-चक्र की विशिष्ट भूमिका होती है।


श्वासकष्ट-श्वासकष्ट के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे-

१ यदा स्रोतासि सरुध्य मारुत कफपूर्वक । विष्वग् व्रजति सरुद्धस्तदा श्वासान् करोति स । सु० उ० ५१ तथा चरक चि० १७।१७

- (१) उरोवात (Emphysema) के फलस्वरूप फुप्फुस के वायुकोष वायु से अत्यिष्ठिक फूले रहते हैं, जिसके कारण बहि श्वसन के समय विशेष कष्ट होता है। (२) श्वासनिलका के ऊपरी भाग में किसी प्रकार का अवरोध होने से अन्त-
- श्वसन में कष्ट होता है, जैसा कि स्वरयन्त्रीय रोहिणी रोग में पाया जाता है।
- ं (३) फुप्फुसजन्य श्वास (Bronchial asthma), मूत्रविषमयता, जान-पदिक शोथ तथा मधुमेहजन्य सन्यास मे वहि श्वसन और अन्त श्वसन दोनो मे कष्ट होता है।

सम्प्राप्ति-चन्न

वात-कफप्रकोपक आहार-विहार, आन्तरिक एव वाह्य कारण, स्थानीय विकृति और श्वासजनक रोग आदि




दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १. दोष--कफप्रधान वात।
- २ दूष्य--रस।
- ३ स्रीतस्--प्राणवह।
- ४ अधिष्ठान---आमाशय।
- ५ स्रोतोदुष्टि लक्षण-सग, विमार्गंगमन (वायु का)।
- ६. आमाशय-समुद्भव रोग।
- ७ आशुकारी व्याधि।
- ८ सतत अषध-प्रयोग और जागरूकता अपेक्षित।

श्वासरोग के भेव

१ महाश्वास, २ तम्बिश्वास, ३. छिन्नश्वास, ४ तमकश्वास और ५ क्षुद्रश्वास के नाम से पाँच प्रकार का श्वासरोग होता है।



श्वासरोग मे दोषानुबन्ध एवं साध्यासाध्यता

- १ महाश्वास-वातप्रवल-कफ-अन्यक्तलक्षण-साध्य, सपूर्णं लक्षण-असाध्य
- २ कर्ध्वश्वास-वातप्रबल-कफ "" ""
- ३ छिन्नश्वास--वात-कफाधिक " " "
- ४ तमकश्वास—कफप्रधान वात कुच्छ्रसाध्य
- ५. क्षुद्रश्वास—वाताधिक कफ साध्य

पूर्वरूप

9 हृदय-प्रदेश मे पीडा, २. पार्श्वशूल, ३ आध्मान (उदर मे वायु भरना), ४. आनाह (आम या मल के रुकने से पेट मे वायु का तनाव होना), ५ मुख के स्वाद का फीका होना और ६ शखप्रदेश मे सुई चूभाने जैसी पीडा—ये पूर्वरूप हैं।

महाश्वास का लक्षण

इसमे वायु की ऊर्ध्वगित होने से रोगी उन्मत्त साँड की फुँफकार की गर्जना की तरह शब्द युक्त एव कष्ट के साथ श्वास लेता है। वह सज्ञाशून्य जैसा हो जाता है, आंखें नचाता है, मुख खुला रखता है, आंखें फैली रहती हैं, मल और मूत्र के वेग नहीं उठते हैं, वाणी रुक-रुक कर निकलती है। वह उदास और दीनबदन दीखता है, उसकी श्वास की ध्वनि दूर से ही सुनाई पडती है। इन लक्षणों से युक्त श्वास-रोग को महाश्वास कहते हैं। इससे आक्रान्त रोगी का मरणकाल निकट होता है।

ऊर्घ्यश्वास का लक्षण

जो रोगी देर तक वाहर की ओर श्वास छोडता है, किन्तु भीतर की ओर श्वास ग्रहण नहीं कर पाता, जिसका मुख और प्राणवहस्रोत कफ से व्यास रहते हैं, जो तीव्र वायु-प्रकोप से पीडित रहता है, जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर खिच जाती है और जो नेत्रो को इघर-उघर नचाता रहता है, जो वेदना से व्याकुल होकर वेहोश हो जाता है, जिसका मुख सूखता है और जिसे वेचैनी बनी रहती है। रोगी जब श्वास का त्याग तेजी से करता है, तो भीतर की ओर श्वास ग्रहण करने में कष्ट होता है, कदाचित् अन्त श्वास नहीं ले पाता। इस प्रकार पीडा और वेहोशी की स्थित लाकर यह ऊद्वेश्वास रोग रोगी के प्राणो का हरण कर लेता है।

छिन्नश्वास का लक्षण

इसमे रोगी सपूर्ण जोर लगाकर भी रुक-रुक कर श्वास लेता है और हृदय आदि मर्मों की पीडा से अस्त एवं दु ख से आतं होकर कुछ समय तक श्वास ही नही लेता। वह आनाह, स्वेदाधिक्य तथा मूर्च्छा से ग्रस्त रहता है, उसके वस्तिप्रदेश में दाह होता है, आंखे अश्रुपूर्ण होती हैं, रोग के प्रभाव से एक नेत्र मे लालिमा होती है, रोगी क्षीण होता है उसका मन उद्दिग्न रहता है, मुख सूखता रहता है, चेहरा कान्तिहीन होता है और रोगी प्रलाप करता रहता है तथा वीच वीच ने श्वास टूट जाता है। ऐसे रोगी को 'छिन्नश्वास' का रोगी समझना चाहिए। यह रोग भी शीघ्र प्राणहर होता है।

तमकश्वास का लक्षण

संप्राप्ति—प्रतिलोम (विपरीत) गतिवाला वायु प्राणवहस्रोतो मे पहुँचकर शिर को जकड लेता है तथा कफ को उभाडकर पीनस (प्रतिश्याय) रोग को उत्पन्न कर देता है। पुन बढा हुआ कफ प्राणवायु के यातायात मे अवरोध उत्पन्न कर 'प्राण के आश्रयस्थल हृदय को पीडा देनेवाले घुर्घुर शब्द युक्त एव अति तीव्र वेगवाले तमकश्वास को उत्पन्न करता है।

- लक्षण—(१) रोगी को प्राणवहस्रोत मे अवरोध के कारण जोर लगाकर श्वास वाहर फेंकना पडता है और श्वासकष्ट होता है। उसकी आंखो के सामने अंधेरा छा जाता है। वह प्यास से ज्याकुल और निश्चेष्ट हो जाता है। वहुत खाँसने से तया श्वास-गति ठीक न होने से वह बार-बार मूर्ण्छित-सा हो जाता है। खाँसते-खाँसते जब तक कफ न निकले, तब तक रोगी परेशान रहता है।
- (२) जब कफ निकल जाता है, तो रोगी को कुछ समय तक आराम मालूम होता है। उसका गला बैठ जाता है और कोशिश करने पर दम मारकर छोटे-छोटे शब्द बोल पाता है।
- '(३) लेटने या सोने पर श्वास की तकलीफ और वढ जाती है, क्योंकि पार्वे-प्रदेश में विमार्गगामी वायु हका होता है, जिससे पार्के में जकडन होती है। श्वास-क्रिया में भी वाधा पहुँचती है, जिससे रोगी सो नहीं पाता है।
- (४) रोगी को बैठने से आराम मिलता है। वह छाती मे तिकया दबाकर झककर श्वास लेने की कोशिश करता है।
- (५) उसे उष्ण वस्तुएँ, स्थान या वातावरण आरामदेह प्रतीत होते हैं, भाहे वह गरम जल हो अथवा चाय या काफी हो।
- (६) श्वास लेने और फेंकने में कष्ट के कारण ऐसा लगता है कि आंखें बाहर निकल आयेंगी और ललाट पसीने से तर हो जाता है। श्वासकष्ट अति पीडादायक होता है। मुख सूखता है और रोगी बार-बार श्वास लेता रहता है। जैसे लोहार की भाषी से वेगपूर्वक हवा निकलती है, वैसे ही वह फुँफकारता हुआ श्वास लेता है।

- (७) बाकाश में चादल छा जाने पर, वर्षा होने पर, शीतल पुरविया वायु वहने पर और कफवर्षक आहार-विहार का सेवन करने पर यह तमक श्वास बढ़ जाता है।
- (८) यह नवीन होने पर साध्य होता है और पुराना होने पर याप्य होता है---'यापनीय तुत विद्यात किया धारयते हि यम्'।

प्रतमकश्वास का लक्षण

निदान-यह रोग उदावतें, धूल के मध्यमें, अजीणं, धारीर के भीगने, वेगावरोध एवं कृद्धतर अवस्या के कारण होता है।

लक्षण-जिस सामरोग में तमकशास के तक्षणों के गाय ज्वर और मूर्च्छा भी हो उने प्रनमकश्चाम कहते हैं।

चक्तस्य — नह पित्तप्रधान होता है, इयिलए इसमे दीतोपचार उपशय और उप्लोपचार अनुग्राय होता है। आगनिकात में शोध होने में यह अवस्था उत्पन्न होती है।

सन्तमकावास का लक्षण

जब स्वान का वेग बन्धकार होने पर या मन में तमोगुण की अधिकता होने पर बढ़ें और शीतल उपचार से मान्त हो तया रोगी अपने को अन्धकर में दूबा हुआ-सा समझे, तो उम रोग को सन्तमक्रशाम जानना चाहिए।

यक्तस्य — महिंप चरक ने तमक्ताम के दो भेद जिलाये हैं — १ प्रतमक और २ मन्तमक । मुश्रुत और वाक्ष्मट (अव्हा हुदयकार) ने प्रतमक में ही उक्त दोनों का नमावेश किया है। तमादयाम कफवानात्मक होता है, परन्तु जय इमके माथ पित्त का अनुवन्ध हो जाता है, तब प्रतमक या नन्तमक आग होता है।

क्षुद्रश्वास का लक्षण

मझ पदार्थी के अधिक मेवन तथा अधिक व्यायाम मे जो श्वास उत्पन्न होता है और क्षाराम करने पर अथवा बैठ जाने पर जी शान्त हो जाता है, उसे श्रुद्रश्वास कहते हैं।

साध्यासाध्यता

महाश्वान, उर्ध्वं धाम और जिस्रधाम असाध्य होते हैं। दुर्वेल व्यक्ति का निरकालीन तमकश्वाम अमाध्य होता है। जिरकालीन तमकश्वाम क्रुड्यास होता है। स्वल रोगियों को होनेवाले सभी तरह के श्वासरोग पूर्वेश्यावस्था में साध्य होते हैं।

वक्तव्य -श्वामरोग वडा दारुण रोग है, इसमे ग्रदाचित्—(१) व्यामायरोध (Asphyxia), (२) हृदयाघात (Syncop) या (३) मन्यास (Coma) होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है।

चिकित्सा

रवासरोग के भेद दोषानुसार नहीं किये गये हैं, अपितु लक्षण के अनुसार किये गये हैं। सभी प्रकार के रवासरोग कफवातात्मक होते हैं, अत इसके सभी भेदों में समान चिकित्सा की जाती है। उक्त रवासों में महारकास, अर्ध्वरवास तथा छिष्ठ- रवास के रोगी प्राय नहीं मिलते और ये असाध्य हैं। क्षुद्रवास में विश्वाम करने से ही लाभ हो जाता है, उसमें चिकित्मा की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यत तमकरवास के रोगी मिलते हैं और उसमें स्वासरोग की पूर्णत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अत यहाँ सामान्यत सर्वविध स्वासोपयोगी चिकित्मा का उल्लेख करना अभीष्ट है, विशेषकर तमकरवास का।

चिकित्सासूत्र

१. आरोग्य के इच्छुक रोगी को इस रोग के कारणो का परित्याग करना चाहिए।
 २ श्वासरोगी को ऐसे औषध, पेय पदार्थ एव अन्न का प्रयोग करना चाहिए.

जो कफ और वात के नाशक हो, उष्ण हो तथा वायु के अनुलोमक हो।

३ यदि कफ द्वारा वायु के प्राणवहस्रोतस् के यातायात का मार्ग अवरुद्ध हो जाये, तो वायु के मार्ग को निरन्तर सुद्ध करते रहना चाहिए।

४ यदि रोगी बलवान् हो और उसे कफ की अधिकता हो, तो पहले उसे वमन-विरेचन कराकर शोधन करावे, उसके बाद पथ्य-आहारपूर्वक शमन चिकित्सा करे।

५ जो रीगी दुवंल हो और श्वास वातप्रधान हो एव बालक या वृद्ध हो तो उसे वातनाशक औषध दें तथा स्नेह, यूष एव मासरस का सेवन कराकर सतर्पण उपचार करे।

६ जो रोगी दृढ, बलवान् और कफप्रधान हो, तो उसे पहले आनूप और जलेचर जीवो के मासरस से तृप्त कराकर स्वेदन करने के बाद वमन करावे। यदि रोगी दुर्बेल है और कफ की प्रधानता नहीं है, तो उसकी वृहण चिकित्सा करनी चाहिए।

७ श्वास के रोग़ी का लवणिमश्रित स्नेह से अभ्यग करना चाहिए, जिसरे स्निग्ध और पिच्छिल कफ पिघलकर द्रव हो जाय।

८ अभ्यग के बाद स्तेहन हो जाने पर नाडीस्वेद, प्रस्तरस्वेद अथवा सकरस्वेद कराना चाहिए। स्वेदन से घना कफ द्रवरूप हो जाता है, स्रोतस् मृदु हो जाते हैं और खुल जाते हैं तथा वायु भी अनुलोम हो जाता है।

९. स्वेद्रन के प्रधात् स्निग्ध बाहार (दही-भात) खिलावे, जिससे कफ वढ़ जावे, तब यमन कराकर कफ का नि सारण करे। कफ के निकल जाने पर स्रोत की शुद्धि हो जाने से श्वासवायु के यातायात का मार्ग प्रशंस्त हो जाता है और रुकावट दूर हो जाती है।

१ यत्किञ्चित् कपवातव्नमुष्ण वानानुलोमनम् । भेषलं पानमन्नं वा तद्धितं च्वासदिकिने ॥ चरक० चि० १७।१४७

- १० यदि वमन कराने के वाद भी कफ का कुछ अश प्राणवहस्रोतों मे छिपा रह गया हो, तो कफनाशक—यव के बाटा को घी मे सानकर चिलम पर रखकर घूच्रपान कराना चाहिए या मन शिलादि घूच्रपान करावे।
- ११. नवज्वर से पीडित तथा आमदोप से युक्त रोगियों के बल-दोप का विचार कर रूक्ष स्वेद और लव्नन कराना चाहिए अथवा गरम जल में लवण घोलकर उसको पिघलाकर वमन कराना चाहिए।
- १२ तमकश्वास से पीडित रोगी को वात-कफनाशक द्रव्यों के प्रयोग से विरेचन कराना चाहिए। विरेचन से मलावरोध दूर होकर वायु का अनुलोमन होने से स्वास में लाम होता है।
 - १३ वमन-विरेचन के बाद रोगी को ससर्जन क्रम से पथ्य देना चाहिए।
- १४ श्वासरोग को आमाशय-समुद्भव कहा गया है। अत मूलस्यान की दृष्टि से श्वास मे होनेवाले अग्निमान्दा, आम, रसदुष्टि तथा प्राणवहस्रोतोऽवरोध को ध्यान मे रखकर दीपन-पाचन, कफ-वातनाशक तथा प्राणवहस्रोतस् शोधक चिकित्सा करनी चाहिए।

चिकित्सा

- 9 घृतप्रयोग—हरीतकी, विडलवण और हीग के कल्क से सिद्ध पुराना घृत १० ग्राम की मात्रा में सुयोष्ण जल से दिन में ३ वार दे।
- २. बड्से के पचाग से निर्मित क्वाय तथा कल्क से सिद्ध किया हुआ छत १० ग्राम और १५ ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ३ बार दे।
- ३. र्मृग्यादि पृत, तालीशादि पृत, रक्तिपत्ताधिकार मे वासागृत या वातव्याधि का पट्पलपृत, ये श्वासरोग मे वड़े उपयोगी हैं।
- ४ अनारदाना या विजीरा नीवू का रस कुलथी के यूप मे डालकर सेंघानमक मिन्नाकर पिलाना हितकर है।
- ५ पुराना घृत, पिप्पली, जागल जीवो का मासरस, सुरा, काञ्जी, शुद्ध हीग, मधु, मुनक्का, आँवला, बेल की छाल-फल या पत्र, मदार, धत्तूर, भारगी, अक्स, काकडासिगी, काली मरिच, कचूर, पुष्करमूल, छोटी इलायची, तुलसीपत्र, अदरक, दशमूल आदि द्रव्य रोगी के दोय-वलानुमार प्रयोग योग्य बनाकर सेवन कराना चाहिए।
- ६ शुद्ध सरसी का तेल १५ ग्राम और गुड १५ ग्राम मिलाकर प्रतिदिन २ वार सेवन करने से २-३ सप्ताह मे श्वास ठीक हो जाता है।
 - ७. अरस के पत्ते का नस १५ ग्राम वरावर कडवे तेल के साथ प्रयोग करे।
- ८ छोटी पीपर तथा सेंधानमक मिलाकर १ ग्राम को १ चम्मच आदि के रस से २ बार दे।
 - ९. भारगी और सोठ के बवाय मे गुड़ मिलाकर सेवन कराना हितकर है।

- १० भारगी और सोठ के समभाग चूर्ण को २ ग्राम की मात्रा मे मधु से ३ वार रोज दे।
- 99 शटघादि चूर्ण (चरक) ३ ग्राम की मात्रा सुखोब्ण जल से दिन में ३ वार दे।
 - १२ मुक्तादि चूर्णं (चरक) १ ग्राम मधु से दिन मे ३ वार देना चाहिए।
 - १३ पीपर, पोहकरमूल, सोठ, कचूर और दालचीनी का चूर्ण परम उपयोगी है।
- १४ लिसोडा की पत्ती के क्वाय में यवसार २ रत्ती मिलाकर पिलाने से कफ निकलकर श्वास में आराम मिलता है।
- 9५ छोटे बच्चो के श्वासरोग (हब्बा-डब्बा) मे सेहुँड की पत्ती को गरमकर उसका स्वरस निकालकर मधु के साथ देना चाहिए।
- 9६ बच्चो के श्वास में उशारेरेवन्द १५०-३०० मि० ग्रा० १ कप दूध में मिलाकर पिलाने से वमन-विरेचन होकर स्रोत्तोऽवरोध दूर हो जाने से बारोग्य-लाभ होता है।
- १७. पुष्करमूल, यवसार और कालीमरिच के समभाग चूर्ण को १-१ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ४ बार सुखोष्ण जल से दे।

सिद्धयोग

- १ मयूरिपच्छ सस्स २५० मि० ग्रा० और पीपर चूर्ण ५०० मि० ग्रा० मधु के साथ ३-३ घण्टे पर ४ बार देवे ।
- २. श्वायादि सूर्ण २ ग्राम, अर्कलवण ५०० मि० ग्रा० और टकणभस्म २५० मि० ग्रा० की १ मात्रा सुखोष्ण जरु से ३-४ बार दे।
- ३ हरिद्रादि चूर्ण-हल्दी, कालीमिर्च, मुनक्का, पुराना गुड, रास्ना, पीपर, कचूर, इनके समभाग का चूर्ण ४ ग्राम की मात्रा मे ३-४ बार देना लामप्रद है।
- ४ शारगी, शकरा, अगस्त्यहरीतकी, ज्याघ्रीहरीतकी, भागी गुड-इनमें से किसी का भी प्रयोग ५-१० ग्राम की मात्रा में करे।
- ५ श्वासकुठार रस, श्वासकासचिन्तामणि, महाश्वासारि लौह, भागोत्तर गृटिका, वासाहरीतकी अवलेह, सोमयोग, मन शिलादि घृत, मल्लिमन्दूर, नागार्जुनाम्न, शृगाराम्न, मुक्तादि चूर्ण, मुक्ताभस्म, प्रवालभस्म, शिक्षभस्म, ताम्रभस्म, लौहमस्म, रोप्यभस्म, कर्पूरादि चूर्ण, वासारिष्ट, कनकामव मादि परीक्षित बौपर्धे हैं। इनका रोगी के दोप-वल का विचारकर योग्य मात्रा मे प्रयोग करे।
- ६ भारगी, हल्दी, वासा, पुष्करमूल, अर्केदुग्ध, बत्तूरपत्र-स्वरस भावित कण्जली, रसमाणिक्य तथा अम्लेवन का श्वासरोग मर सफलता के माथ प्रयोग किया जाता है।
- ७ शुद्ध देशी कपूर और पुराने गुड की समभाग में बनी आधा ग्राम की गोली चूसने से श्वाम शान्त होता है। अर्कवटी—मदार के फूल की कली २ भाग, पीपर १ भाग, सेंबानमक १ भाग पीसकर आधा ग्राम की गोली वनाकर ४-५ गोली प्रतिदिन चूसने को देवे।

कायचिकित्सा

व्यवस्थापत्र

१. ४-४ घण्टे पर ३ बार

श्वासकासचिन्तामणि ३०० मि० ग्रा०
मुक्तादि चूर्णे ३०० मि० ग्रा०
अपामार्गक्षार ५०० मि० ग्रा०
श्वासकुठार ३०० मि० ग्रा०
तालीसादि चूर्णं ३ ग्राम
योग—३ मात्रा

ताम्बूलपत्र-स्वरस आधा चम्मच और मधु से।

अथवा---

हवासकासिचन्तामिण ३०० मि० ग्रा० मृगश्रृग भस्म ५०० मि० ग्रा० नरसार ५०० मि० ग्रा० मधुयब्टी चूर्ण ३ ग्राम योग—३ मात्रा

वासावलेह ५ ग्राम और मधु से।

२ ९ बजे व २ बजे

भ्रुग्यादि चूणँ (लवणयुक्त) ४ ग्राम सर्केलवण २ ग्राम टक्फण ३०० मि० ग्रा० सुखोष्ण जल से । योग—२ मात्रा

३. भोजनोत्तर २ बार

कनकासव २० मि० छी० द्राक्षारिष्ट २० मि० छी० कलमीसोरा ३ ग्राम योग—२ मात्रा

बरावर जल मिलाकर पीना।

४. २–२ घण्टे पर चूसना एलादिवटी १–१ गोली ६ बार

५ रात में सोते समय

आरोग्यवर्धनी १ ग्राम

सुखोष्ण जल से । १ मात्रा

नोट---न० १ के स्थान पर निम्नलिखित योग भी उत्तम है---

दिन मे-३ बार हवासकुठार ५०० मि० ग्रा० कपूरादि चूणं २ ग्राम स्तरोखर ३०० मि० ग्रा० अभ्रकमस्म ५०० मि० ग्रा० योग—३ मात्रा

लिसोडा के क्वाथ से।

अथवा--

३-३ घण्टे पर ४ बार

भ्रुगाराम्र ५०० मि० ग्रा० हवासंकासचिन्तामणि ३०० मि० ग्रा० हवासकुठार ५०० मि० ग्रा० सोम चूणं १ ग्राम यवक्षार ५०० मि० ग्रा० तालीशादि चूणं ६ ग्राम मधु से। योग—४ मात्रा

पध्य

पुराना साठी या अगहनी चावल, गेहूँ, जौ, मूँग, कुलथी, अरहर, जागल जीवो का मासरस, पुराना गोघत, वकरी का दूध, मधु, परवल, घौलाई, वथुआ, पालक, सिहजन की फली, सुखीष्ण जल का प्रयोग, कफ-वातनाशक आहार-विहार तथा औपध, वकरी के दूध के अभाव मे सोठ का या पीपर का चूर्ण डालकर गरम किया गया गोदुग्ध दे। गेहूँ-जौ की रोटी खाना ज्यादा लाभप्रद है।

अपय्य

रूक्ष, शीत, गुरु अन्न, शीत जल, शवंत, लस्सी, वर्फ, भेड का दूध-धी, सेम, कन्द वाले शाक, विदाही पदार्थ—सरसो आदि का शाक, राई, गरम मसाला, दही, उडद की दाल, मछली, जलेचर या आनूप जीवो का मास, तेल की बनी वस्तुएँ, विवन्धकारक पदार्थ, कटहल, कोहडा, वडा, अरुई, परिश्रम, पैदल चलना, धूल वाले स्थान मे या धुंआ की जगह रहना, स्त्री-प्रस्ग, भार वहन करना, वेगावरोध, वात-कफप्रकोपक आहार-विहार और पुरवैया हवा का झोका लगना, शीतल जलाव-गाहन, खुले बदन रहना, देर तक नहाते रहना, वापी स्नान और बर्फीले स्थान मे निवास आदि अपध्य हैं।

हिक्कारोग

परिचय—हिक्का को बोलचाल की भाषा में 'द्विचकी' कहते हैं। आधुनिक

चिकित्सा-विज्ञान में इसे हिक्कफ (Hiccough) कहते हैं। जब प्राणवायु प्रकृषित होकर वहें वेग के साथ मुख से बाहर निकलने के लिए उतावली होती है, तो अचानक गले से हिक्-हिक् की व्यनि निकलती है। इसी व्यनि के साथ खाँसने या श्वास लेने को हिक्का कहा जाता है।

नियंचन—(१) 'हिनस्ति असून्' (जो प्राणो को नष्ट कर देती है) इति हिक्का। इस निग्रह मे 'पृपोदरादीनि यथोपदिष्टम्' इस पाणिनीय सूत्र से हिक्का शब्द बनता है।

(२) हिक् इति कृत्वा शब्दायते इति हिक्का' (जिसके कारण रोगी के मुख से हिक् हिक् की ध्वनि के साथ श्वास या वाणी निकलती है, उसे हिक्का कहते हैं। इस विग्रह में हिक् पूर्वक 'कै शब्दे' (ध्वादि) धातु से हिक्का शब्द वनता है।

(३) 'हिम्फनम् = हिम्का' हिन्क अन्यनते 'शन्दे' (भ्वा० प० से०) गुरोब्र

हल (३।३।१०३) इत्य । यटा---

(४) हिक्कयते । 'हिक् हिंसायम्' (चु० आ० से०) पचाद्यच् (३।१।१३४)। कर्ष्वे वातप्रवृत्ती शब्दविशेष । अमरकोप—रामाश्रमी टीका ।

सन्दर्भ ग्रन्थ--

१ चरकसहिता-चिकित्सोस्थान अध्याय १७।

२. सुश्रुतसहिता-उत्तरतन्त्र अध्याय ५०।

३ अष्टाङ्गहृदय-चिकित्सास्थान अध्याय ४।

४ माघवनिदान-हिक्का-श्वास ।

निदान

9 विदाही (जैसे मरिच, सरसो), गुरु (जैसे उडद, कटहल), विष्टम्मी (जैसे कोहडा, वडा, अरूई), रूक्ष (जैसे जो, चना), अभिष्यन्दी (जैसे दही, दूध, मछली) पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, कीतल पेय पीना और भीतल आहार करना।

२ शीतल स्थान मे निवास, धूल-धुँआ धूप और तेज हवा मे रहना, अधिक व्यायाम, शक्ति से अधिक कार्य करना, अधिक वोझ उठाना, अधिक पैदल चलना मल-मूत्र आदि के वेगो को रोकना और अल्पाहार या अनशन आदि विहार।

उक्त आहार-विहार हिक्कारोग को उत्पन्न करने वाले निदान हैं।

३. विषम भोजन, आमदोष, आनाह रोग, दुवंलता का आधिक्य, मर्मस्थान पर चोट लगना, शीत और उष्ण का एक साथ सपके होना और वमन या विरेचन का अतियोग होना, ये हिक्का के कारण हैं।

१ विदाहिगुरुविष्टम्मिरुश्वाभिष्यन्दिमोजने । शीतपानाशनस्थानरजोषुमातपानिले ॥ व्यायामसममाराध्ववेगावातापतपंगे । हिस्सा (हवासश्च सासझ) नृणां समुपजायते ॥ छ० च० ५०

४. अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिश्याय, उर क्षत, धातुक्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अलसक, पाण्डुरोग और विष-विकार, ये रोग भी हिक्कारोग के जनक होते हैं।

प उक्त रोगो के अतिरिक्त अन्य किसी भी रोग से आक्रान्त व्यक्ति हो, उसे जीवन की अन्तिमावस्था मे तीव्र वेदनाप्रद हिक्का हो सकती है।

संप्राप्ति

कफ से संयुक्त उदान सिहत प्राणवायु वेग से यक्टत्-प्लीहा तथा आन्त्र की मुख द्वारा वाहर निकालता हुआ-सा जब बार-बार मुख की बोर आता है, तो हिक्-हिक् शब्द की व्विन के साथ हिक्कारोग को उत्पन्न करता है।

वक्तव्य—हिक्का की उत्पत्ति का प्रधान कारण महाप्राचीरा पेशी का असामियक सकोच हो है । सामान्यतया महाप्राचीरा पेशी का सकोच होनेपर उरोगुहा मे शून्यता हो जाती है, और इसी समय उपजिह्निका (Epiglottis) खुलती है, जिससे वायु फुप्फुस मे प्रवेश कर जाती है तथा महाप्राचीरा के अपने पूर्व स्थिति मे आने पर उसके दबाव से वायु फुप्फुस से बाहर निकल जाती है। यह श्वसन की सामान्य क्रिया है। इस क्रिया मे—१ महाप्राचीरा (Diaphragm) का सकोच, २ उरोगुहा (Thoracic cavity) की शून्यता और ३. उपजिह्निका (Epiglottis) का खुलना—ये तीनो काम एक साथ होते हैं।

यदि ये तीनो कार्य एक साथ नहीं होते और महाप्राचीरा का असामियक सकोच होने पर तथा उपजिह्मिका द्वार वन्द होने के कारण अन्त श्वसित या वहि प्रेरित वायु रास्ते में ही अवरुद्ध हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप हिक्-हिक् शब्द की उत्पत्ति होती है।

महाप्राचीरा के असामिषक सकोच के कारणो को दो भागो मे विभक्त कर सकते हैं—१ पाचन-सस्यानीय और २ वातनाडी-सस्यानीय।


- (१) पाचनसस्यानगत विकृति मे आमाशय एव अन्न-प्रणाली का प्रत्यक्ष कोम है, जिसके कारण मिचं, अचार आदि तथा तीक्षण धूम आदि हैं। तीक्षण आहार भी आमाशयिक क्षोभ का कारण है, जिससे उत्पन्न हिक्का जल पीने से शान्त हो जाती है। आमाशयिक क्षोभ से उत्तेजित अनुकोष्ठिका नाही (Phrenic nerve) महाप्राचीरा का असमय मे सकोच करा देती है। इसी प्रकार आमाशयिक क्लैब्मिककलाशोथ, आमाशय का विस्कार, आन्त्रिककललाशोथ, अन्त्रावरोध तथा आनाह-आहमान आदि कारणो से महाप्राचीरा का अनियमित सकोच होने से हिक्का उत्पन्न होती है। उक्त आशय से ही चरक मे हिक्का को पित्तस्थान (पाचन-सस्थान) समुद्भव कहा गया है।
 - (२) वातसस्थानगत हेतुओ मे योषापस्मार, मस्तिक अर्बुद, मस्तिष्कावरण-

¹ Clonic diaphragmatic spasm is called hiccough (Price)

शोथ, जलशीर्ष, मदात्यय एवं पुराना (Chronic) वृक्कशोथ, मूत्रविषमयता तथा उरस्तीय के कारण भी हिक्का की उत्पत्ति होती है ।

हिक्का के भेद

कफ से युक्त वायु-9 अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४. गम्भीरा तथा ५ महती नामक पाँच प्रकार की हिक्का उत्पन्न करता है।



गले का और छाती का भारी होना, मुख का स्वाद कसैला होना और उदर में वायु भरना तथा गुडगुडाहट की आवाज होना, ये हिक्का के पूर्वरूप हैं।

अञ्जा हिक्का का लक्षण

पेय पदार्थं या अस के अत्यधिक सेवन से या शीघ्रतापूर्वक पीने-लाने से

1 A recurring, involuntary spasm or clonic contraction of the diaphragm, associated with a characteristic sound is described as a hiccoup, hiccough or singultus

Causes—These are many varied They may be gastro-intestinal,

toxic, neurogical, psychogenic, infective or surgical

- (1) Intra-abdominal causes—Peritonitis, diaphragmatic lesions, intestinal obstruction, sub-phrenic abscess, dilatation of stomach or liver abscess.
- (2) Mediastinal causes—Enlarged heart, pericardinal effusion, mediasti-tumours, aorotic aneurysm, mediastinitis, asthma, sub-external goitre

(3) Toxic causes—High fevers, toxaemia, septicaemia, shock

- (4) Neurological (through irritation of respiratory centre)— Tuberculous meningitis, encephalitis, hydrocephalus, epilepsy, chorea, cerebral arteriosclerosis, brain tumour
- (5) Psychogenic—Neurosis, hysteria, sudden laughter, swallowing cold drinks, hot drinks, cold shower

(6) Post-operative—Dilataion of stomach, perifonitis

- (7) Metabolic and avitaminosis-Uraemia, diabetic acidosis, gout
- (8) Epidemic hiccup, vital infection in males over 40, usually in epidemics, related to influenza and incephalitis and followed (at times) by parkinsonian manifestations

-Clinical Diagnosis by Rustom J. Vakil page 43

(आमाशय में भार एवं क्षोभ होकर प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा महाप्रचीरा का अनियमित सकोचपूर्वक) सहसा पीडित वायु अध्वंगामी होकर असजा हिक्का को उत्पन्न करती है।

यमला हिक्का का लक्षण

जो हिक्का शिर और ग्रीवा को कैंपाती हुई, रुक-रुककर एक बार मे दो वेगों के साथ होती है, उसे यमला कहते हैं।

वक्तक्य—चरक मे यमला नाम की हिक्का का उल्लेख नही है, अन्य चार पूर्वोक्त हिक्काएँ हैं। विद्वानों ने चरक मे पठित ब्यपेता नाम की हिक्का को ही सुश्रुतोक्त यमला माना है। वाग्मट ने यमला का ही उल्लेख किया है। व्यपेता का लक्षण इस प्रकार है—'जो हिक्का अधित-पीत-खादित और लीड इन चार प्रकार के आहार के वाद उत्पन्न होती है और जब वे आहार पच जाते हैं, तब उसका वेग बढ जाता है। वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा, मूर्च्छा, जम्माई, नेत्राश्रुता, मुखशोप, शरीर का आगे या पीछे की ओर झुकना और उदर मे भयकर आह्मान होना, ये लक्षण होते हैं। यह जन्नु के मूल से उत्पन्न होती है। इसका वेग एक-एक कर उठता है। यह प्राणनाश करनेवाली हिक्का व्यपेता कहलाती है।'

मधुकोयकार ने व्यपेता के कुछ लक्षणों का यमला में होना बतलाया है। इससे भी यमला एवं व्यपेता का ऐक्य सिद्ध है।

क्षुद्र हिक्का का लक्षण

जो हिक्का कभी-कभी लम्बे अरसे के बाद उठे, जिसके वेग हलके हो और जो जनुमूल से ही उठे, उसे शुद्रहिक्का कहते हैं।

वक्तव्य — चरक ने इसे साध्य कहा है अर्थात् यह श्रम करने पर बढती है और भोजन करने पर शान्त हो जाती है।

गम्भीरा हिक्का का लक्षण

जो हिक्का नाभि से उठकर घोर एव गम्भीर शब्द करती हुई एवं अनेक उपद्रवो (तृष्णा, ज्वर, प्रलाप, मूर्च्छा आदि) से युक्त होती है, उसे गम्भीरा हिक्का कहते हैं।

महा हिक्का का लक्षण

जो हिक्का वस्ति-हृदय-शिर, इन मर्मी को पीडा पहुँचाती हुई तथा सपूर्ण शरीर को कँपाती हुई लगातार बनी रहती है, उसे महाहिक्का कहते हैं।

साध्यासाध्यता

९ हिचकी आने के कारण जिसका समग्र शरीर फैल जाये (खिच जाये),

१ कम्पयन्ती शिरोधीविमत्युपलक्षणं, तेन चरकोक्तप्रलायमूच्छांविमतुःणावैचित्यजूम्माविष्छ-ताक्षत्वमुखशोषा बोच्या इति गयदास । मा० नि० समला पर मधुकोष-टीका।

जिसके नेत्र ऊपर को चढ जायें या सकुचित हो जायें, जिसकी भोजन मे रुचि न हो तथा शरीर क्षीण हो गया है एव जिसे बहुत अधिक छीके आती हैं, वह असाध्य है।

- २ गम्भीरा और महाहिक्का ये दोनो अमाध्य होती हैं।
- ३. जिसके शरीर में दोषों का अतिमात्रा में मश्चय हो, जो न खाने-पीने के कारण दुवंल हो गया हो अथवा दी घंकालीन रोग के कारण दुवंल हो, वृद्ध हो और जो मैथुनकमं में अति आसक्त हो, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की हिक्का हो जाये, तो वह प्राणनाशनी होती है।
 - ४ यमला हिक्का मे यदि प्रलाप, पीडा, मुर्च्छा और तृष्णा हो तो वह असाध्य है।
- ५. वलवान् एव प्रवर मनवाले, स्थिर धातुयुक्त तथा स्वस्थेन्द्रिय व्यक्ति को होने-वाली यमला हिनका साध्य होती है। इसके विपरीत दुवेल शरीर एव मनवाले, क्षीणधातु तथा क्षीणेन्द्रिय व्यक्ति को होनेवाली यमला असाध्य होती है।

चिकित्सासूत्र

- १. हिक्का रोग के निदान का त्याग करना चाहिए।
- २ कफ-वातनाशक आहार, विहार और औपध का सेवन करे।
- ३. कुम्भक प्राणायाम कराना, अचानक मुख पर शीतल जल छिडकना, कठोर वचन बोलकर या डॉट-डपट कर उद्विग्न करना, त्रास, भय, आश्चर्य, शोक तथा प्रिय वस्तु के विनाश की बात करना, मन को व्याकुल करना और अगो में सूई चुभाना आदि हिक्का-शमन उपाय करे।
 - ४ श्वास तथा कास मे कथित उपचार करना चाहिए।
- ५. कफाधिक बलवान् रोगी हो, तो उर स्थल एव पार्श्वप्रदेश मे लवणयुक्त वातघ्न तैल का अभ्यग कर नाडी-प्रस्तर यां सकर विधि से स्निग्ध स्वेदन करे।
- ६ फिर कफवर्धक स्निग्ध भोजन कराकर मदनफल, पिप्पली और सेंधानमक के घोल को पिलाकर वमन कराना चाहिए। कफ निकल जाने से वायु के आवागमन से शान्ति मिलती है।
- ७ यदि उक्त कमं के बाद भी कफ पूरा न निकले तो मन शिलादि घूपपान करावे या जलती आग पर कूठ का चूर्ण डालकर मुख और नाक मे उसका धुँआ देवे।

चिकित्सा

- १ स्त्री के दूध में लालचन्दन को घिसकर उसका नस्य देना उत्तम औषध है।
- २. सुखोष्ण घृत मे सेंघानमक मिलाकर नस्य देवे, या-
- ३ केवल सेंघानमक को पानी मे घोलकर नाक मे टपकाने से हिनका शान्त होती है।
- ४ धूम योग-जलते अगारे पर राल डालकर धूँआ दे या मन शिला या गाय की सीग या गाय का चमं या बाल घी चुपडकर अगारे पर जलाकर धुँआ देना चाहिए।
- ५ सोठ के चूर्ण और गुड का नस्य या धुँआ देवे। नौसादर और चूना मिलाकर बन्द ढाट की शीशी में रखकर सुँघावे। प्याज के रस या गाजर के रस का नस्य देवे।

- ६ मयूरिवच्छभस्म ४०० मि० ग्रा० और पीवर का चूर्ण ५०० मि० ग्रा० मिलाकर मधु से २-२ घण्टे पर चटाना चाहिए।
 - ७ श्रुग्यादि चूर्ण २-२ ग्राम मधु से २-२ घण्टे पर चटावे।
 - ८. शुद्ध स्वर्णगैरिक है ग्राम और कुटकी चूर्ण १ ग्राम मधु से बार-बार देवे ।
 - ९ शाही के काँटे की अन्तर्धूम भस्म रे ग्राम मधु से ३-४ वार देवे।
 - १० कालीमरिच का चूर्ण 🖁 ग्राम मधु से वार-वार चटाना चाहिए।
 - ११ हरीतकी चूर्ण १--२ ग्राम मधु से बार-बार चटाना हितकर है।
 - १२ यवसार १ ग्राम खिलाकर सुखोष्ण जल पिलाने से हिक्का शान्त होती है।
- १३ छोटी पीपर का चूर्ण, खजूर और नागरमोथा, इनका मिलित कल्क ३-३ ग्राम की मात्रा मे बार-बार चटाना विशेष लाभप्रद है।
 - १४ विजौरानीवू का रस १० ग्राम लेकर मधु से दे।
 - १५ सुस्रोज्ण घृत, सुस्रोज्ण दूध और सुस्रोज्ण जल पीना शीघ्र हिक्काशामक है।

सिद्धयोग

- १ मयूरिपच्छभस्म ३०० मि० ग्रा०, सूतशेखर १२५ मि० ग्रा० और कचूर चूणें है ग्राम की १ मात्रा मध्र से ३-४ बार प्रतिदिन देना चाहिए।
- २ मुक्तापिष्टी १२५ मि० ग्रा०, लीलाविलास रस १२५ मि० ग्रा० स्वर्णयुक्त सूतशेखर १२५ मि० ग्रा० वहेडे के फल का घिसा द्रव और मर्घुंसे दे। यह १ मात्रा है।
- ३ ताम्रभस्म १०० मि० ग्रा० मधु से चटाकर बिजौरानीवू का रस १० ग्राम पिलावे।
- ४. शखचूल रस २००-३०० मि० ग्रा० मधु से दिन मे ३ बार दे। यह सर्वोत्तम योग है।
- ५ हिक्कान्तक रस—स्वर्णभस्म, मुक्तापिष्टी, ताम्रभस्म और लीहभस्म समभाग लेकर विजीरानीवू के रस की ३ भावना देकर १२५ मि० ग्रा० की गोली बनावें। १-३ गोली विजीरे के रस, कालानमक ३०० मि० ग्रा० और मधु से दिन मे ३ वार देवे।
 - ६ मुक्तादि चूर्ण रै- १ ग्राम की १ मात्रा दिन मे ३ बार मधु से दे।

ष्यवस्यापत्र

। २-३ घण्ट पर ४ बार	
शबचूल रस	है ग्राम
पीपरचूणं	१ प्राम
मधु से।	१ मात्रा
अथवा	
श्वासकुठार रस	२५० मि० ग्रा०
श्रूगभस्म	Dua Hama

न्ध्रगभस्म २५० मि० ग्रा० रससिन्दूर १२५ मि० ग्रा०

कायचिकित्सा

٠,	यवक्षार	रै ग्राम
		१ मात्रा
	हरीतकी चूर्ण १ ग्राम और म	घुसे।
२	४-४ घण्टे पर ३ वार	•
	मयूरपिच्छभस्म	३ ग्राम
	पीपर चूर्ण	१ ग्राम
	मधुसे। ,	१ मात्रा
Ę	भोजन के बाद २ बार	
	कनकासव	२० मि० ली
		१ मात्रा
	समान जल मिलाकर पीना ।	
8	रात मे सोते समय	
	आरोग्यवर्धनी	१ ग्राम
	सुखोष्ण जल से ।	१ मात्रा
	पथ्य	

मृदु-स्निग्ध भोजन, पुराना गेहूँ, जौ, अगहनी या साठी का चावल, कुलथी, मूग, विजीरा नीवू, परवल, पतली मूली, पका कैय का फल, लहसुन, गोदुग्ध, वकरी का दूध, सेंधानमक तथा वात-कफनाशक आहार-विहार-अन्नपान पथ्य है।

अपथ्य

गुरु, श्रीत, विष्टम्भी अन्नपान, उडद, तिलकल्क, जलेचर तथा आनूप मांस, राई-सरसो, कन्द, सेम, मछली, दही, विरुद्ध भोजन, वेगो को रोकना, घूल, घुआ, घूप, रूक्ष पदार्थ तथा कफ-वातकारक आहार-विहार अपथ्य है।

षोडश अध्याय

पार्श्वश्रुल, राजयक्ष्मा तथा शोपरोग

पार्श्वशूल

परिचय—वक्ष स्थल या छाती, की पसिलयों के भीतर या बाहर अथवा उनके इदे-गिर्द (अगल-बगल) के परिवेश में होनेवाली पीडा को पार्श्वशूल कहते हैं। यह उरोगुहा की सीमा में होनेवाली वेदना है। कतिपय विद्वान् उदरगुहा के किसी बगल में दायें या वार्ये होने वाले शूल या वेदना को भी पार्श्वशूल मानते हैं।

निवंचन--'शूल रुजायाम्' (भा० प० से०) 'इगुपद्यज्ञा' (३।१।१३५) इति क ।

१. शुल वग् बायुधम् (अमर० रामाश्रमी ३।३।१९७)।

२ पार्श्वम् — पश्ना समूह । 'पश्वा णस् वक्तव्य' (वा० ४।२।४३) सित्वात् (१।४।१६) पदत्वेन मत्वाभावात् 'स्रोर्गुण' (६।४।१४६) इति न । समर् रामाश्रमी (२।६।७९)।

३ 'पारवें शूल पारवंशूलम्'।

४. किसी कील या काँटे के घँसने या गडने से जो पीडा होती है या गडे कील को उखाडने जैसी पीडा होने के कारण इस पीडा को शूल कहा जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सुश्रुतसहिता—उत्तरतन्त्र अ० ४२। माघवनिदान।

निदान

पार्वं शूल कफ तथा वातदोष से होता है, इसलिए वात एव कफ के प्रकोपक आहार-विहार ही इसके निंदान हैं। जैसे—-अति व्यायाम, अति मैथुन, अति शीतल जलपान, मटर, मूँग, अरहर, कोदो, अत्यधिक रूक्ष पदार्थ-सेवन, अध्यशन, चोट लगना, कषाय एव तिक्तरस-प्रधान अन्न खाना, अकुरित चना आदि खाना, विरुद्ध भोजन, शुष्क मास, शुष्क शाक, मल-मूत्र-वायु का अवरोध, शोक, एपवास और अधिक हँसना, इन कारणो से वायु का प्रकोप होता है। साथ ही आनूप एव जलेचर जीवो का मास खाना, खोया, छेना या दूध से बने पदार्थों का अधिक सेवन, उडद का बडा, कचौडी आदि खाने से भी कफ का प्रकोप होता है।

१ शब्कुस्फोटनवदं तस्य यस्मादं तीवाश्च वेदना । श्रृष्ठासक्तस्य छक्ष्यन्ते तस्माच्छूरुमिद्दोच्यते ॥ सुश्रुत० उ० ४२।८१

संप्राप्ति

कफ-वातप्रकोपक आहार-विहार से कफ एव वायु प्रकुपित होकर असामान्य हो जाते हैं। प्रकुपित कफ कुक्षि तथा पार्श्व में स्थित होकर वायु को रोक देता है और वह अवरुद्ध वायु पार्श्वशूल उत्पन्न करता है।

लक्षण

वक्ष स्थल के पार्व में एका हुआ वायु अथवा उदरगुहा के पार्व में स्थित वायु शीघ्र ही कुिक्ष में आध्मान और गुडगुडाहट पैदा करती है एवं पार्व में सुई चुभाने जैसी पीडा उत्पन्न करती है। उस समय वह रोगी पीडा उत्पन्न होने के डर से बडी कठिनाई से स्वास ले पाता है। उसे भोजन में स्वि नहीं होती है और नीद नहीं आती है। इन लक्षणों से कफ-वात से उत्पन्न इस रोग को पार्वश्वल कहते हैं।

वक्तव्य-माघवकर ने कहा है, कि हृदय, पाश्वं तथा पृष्ठ मे होनेवाला शूल कफ तथा वात से होता है—'वस्तौ हृत्पाश्वंपृष्ठेषु स शूल कफवातिक'। अन्यत्र कहा गया है, कि कफज शूल का मुख्य स्थान हृदय, पाश्वं एव कुक्षि है—

> वातात्मक वस्तिगत वदन्ति पित्तात्मक चापि वदन्ति नाभ्याम् । हृत्पाश्वेंकुक्षौ कफसन्निविष्ट सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्।।

पार्श्वशूल उदर तथा विक्ष दोनो के पार्श्व में होता है। उदर पार्श्वशूल आन्त्र की विकृति से होता है अर्थात् कुिक्षिस्थित रलेष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध होने पर उदर पार्श्वशूल उत्पन्न होता है। यह कभी एक पार्श्व में और कभी दोनो पार्श्वों में भी हो सकता है।

वक्षगत पारवें शूल का कारण परिफुप्फुसशोथ (Dry pleurisy) है। यह शूल विकृत क्षेत्र के अनुमार एक अथवा दोनो पार्क में हो सकता है। इस शूल में वक्ष के विकृत पार्क की गित कम होती है तथा स्वास के समय उदर की गित बढ जाती है। स्वास लेने में रोगी कष्ट का अनुभव करता है। इस स्थित में रोगी को ज्वर भी हो जाता है। यह रोग कफ-वातजन्य होता है। कफ की अधिकता से आयाम और वात की अधिकता से पार्क्सकोच होता है। चरक ने कहा है—'पार्क्श्वल त्वनियत सङ्कोचायामलक्षणम्' (च० चि० ८)। पार्क्वेदना (Pleurodynia) तथा पर्शु-कान्तरीय वातनाडी शूल (Intercoastal neuralgia) जैसी ज्वररहित अवस्थाएँ भी पार्क्श्वल के अन्तर्गत आ सकती हैं।

चिकित्सा

- १. पुष्करमूलादि चूर्ण-पोहकरमूल, शुद्ध हीग, सोचर नमक, विदनमक, सेंधा-नमक, तुम्बुह और हर्रा के फल की मज्जा, सबको समान भाग मे लेकर बारीक चूर्ण बना लें। २ ग्राम की मात्रा मे जो के काढे के साथ दिन में ३ बार दें।
- २ (प्लीहोदराधिकारोक्त) षट्पल घृत १५-२० ग्राम दूध के साथ प्रात -साय पिलावे।

- ३. २० ग्राम घृत मे ै ग्राम शुद्ध हीग डालकर २ वार पिलावे।
- ४ विजीरा नीवू के बीज के चूर्ण की २ ग्राम दूध के साथ दे। अथवा-
- ५. विजीरा नीवू के रस को ५ ग्राम लेकर दूछ मे पकाकर पिलावे।
- ६ दोष एव प्रकृति का विचार कर एरण्ड तैल २० ग्राम मद्य, दही का पानी, दूध या मासरस के साथ दे।

सिद्धयोग

- ७ लक्ष्मीविलासरस, लक्ष्मीनारायणरस, श्रृङ्गभस्म, महावातराज, त्रिभुवनकीर्ति-रस, शूलविजनी वटी, दशमूलारिष्ट आदि का रोगी की प्रकृति आदि का विचारकर उचित मात्रा और अनुपान के साथ प्रयोग करे।
- ८ हिंगुद्विरुत्तरयोग—शुद्ध हीग १ माग, कालानमक २ माग, सोठ ४ माग, छोटी हर्रे ८ माग (भुनी हुई) सबका महीन चूर्ण कर लें। इसे ३-४ ग्राम सुखोष्ण जल से ३-४ बार दे।
- १० लेप-प्याज के रस और सेहुँड की पत्ती के रस में मृगशृङ्ग को धिसकर लेप करे। अथवा-
- ११ आमाहल्दी, रास्ना, सोवाबीज, सींफ, देवदार और मैदा लकटी पीसकर सुखोब्ज लेप लगावे ।

प्रथ

पुराना चावल, जो, गेहूँ, परवल, सिहजन की फली, वथुआ, सोवा, पालक, लहसुन, हीग, सोठ, कालानमक, पपीता, कागजी नीवू पथ्य है।

सपय्य

गुरु, विष्टम्भी तया विरुद्ध भीजन, रात्रिजागरण, अध्यशन, विषमाशन, रुक्ष, तिक्त, कपायद्रव्य, राई, सरसो, व्यायाम, स्त्रीप्रसग अपध्य है।

राजयक्षमा

(Tuberculosis)

पर्णाय और परिचय-जोप, क्षय, राजयक्ष्मा, रोगराट्, महावल, तपेदिक, दिक, सिल, थाइसिस (Phthisis), कजम्प्शन (Consumption), पल्मोनरी ट्यूबर-कुलोसिस (Pulmonary tuberculosis) आदि नामो से यह रोग जाना जाता है।

यह रोग काम, जबर और प्रतिक्याय आदि की ओट मे छिपकर धीरे से गुप्त रूप मे शरीर मे प्रवेश कर जाता है। प्राय. पूब जबर आदि लक्षणो के अनुसार चिकित्स इसकी चिकित्सा करते हैं, क्यों यह रोग अप्रकट रहता है, किन्तु धीरे-धीरे यह कारीर के भीतर अपनी स्थित सुदृढ बना लेता है। जब इस रोग के दुनिवार लक्षण प्रबल हो जाते हैं, तब इस रोग का ज्ञान होता है।

यह रोगो का राजा है, क्यों कि जिस प्रकार राजा की सवारी के आगे और पीछे सुरक्षा-सैनिक होते हैं, जसी प्रकार इस रोगराट् के पहले अर्थात् इसके प्रकट होने के पूर्व ज्वर, खाँसी, क्वास आदि रोग दिखलाई देते हैं और इसके हो जाने पर अतिसार, शोथ, पाण्डु आदि उपद्रव होते हैं। इसीलिए इसे बहुरोग पुरोगम और अनेक रोगानुगत कहा गया है। इसका निदान कठिनाई से हो पाता है और इसकी चिकित्सा मे सफलता मिलना भी कष्टसाध्य है। अतएव इस राजयक्ष्मा (शोप) को महाबलशालो कहा गया है।

निर्वचन 1

१ (क) राजयक्ष्मा 'यक्ष्मा' रोग को कहते हैं और यह सभी रोगो का प्रधान या राजा है, अत इसे राजयक्ष्मा कहते हैं—'यक्ष्मणा रोगाणा राजा राजयक्ष्मा'। (ख) यह रोग सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चन्द्रमा को हुआ था। इस प्रकार राजा का रोग होने के कारण इसे राजयक्ष्मा कहा जाता है—'राज्ञो यक्ष्मा राजयक्ष्मा'।

२ शोष—रस-रक्त आदि धातुओं का शोपण करने से इसे 'शोष' कहते हैं— 'सशोषणाद रसादीना शोष इत्यिभधीयते'।

३ क्षय-- शरीर की वाह्य तथा आन्तरिक क्रियाओं का नाश (क्षय) कर देने के कारण इसे 'क्षय' कहते हैं--- 'क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुन ।'

मन्दर्भ ग्रन्थ

- १ चरकसहिता-निदान० ६ तथा चिकित्सा० ८।
- २ सुश्रुतसहिता-उत्तरतन्त्र ४१।
- ३. अष्टाङ्गहृदय-निदान० ५ तथा चिकित्सा० ५।
- ४. माघवनिदान ।

निदान

शरीर की रोगप्रतिरोधक शक्ति और जीवनीय शक्ति के सुदृढ रहने पर यक्ष्मा के जीवाणुओं के लिए शरीर उर्वर नहीं होता और वे अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल पाते। जब किन्ही कारणों से व्याधिक्षमत्व का ह्यास होता है, तभी कोई व्यक्ति यक्ष्मा जैसे रोग से आक्रान्त होता है। इसी दृष्टि से प्राचीन ऋषियों ने अलौकिक प्रतिभापूर्ण अन्वेषण कर व्याधिक्षमता को घटाने वाले और राजयक्ष्मा के उत्पादक

१ सञ्चोषणाद् रसादीनां शोष इत्यभिषीयते । क्रियाक्षयकरत्वाच क्षय इत्युच्यते पुन ॥ राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामय । तस्मात्त राजयक्ष्मेति केचिदाहुमनीषिण ॥ सु० उ० ४१।४-५५

चार कारणो का उल्लेख किया है-- १. साहस, २. संघारण, ३. क्षय और ४. विषम भोजन ।

(१) साहस — दुवंल होने पर अपने से बलवान् से युद्ध फरना, किसी भारी वस्तु को खीचना, ऊँची बावाज में बोलना, बहुत ज्यादा बोस उठाना, दूर तक तरना, अपने शरीर को दूसरे के पैरों से चहलवाना, दूर का मार्ग दौडकर तय करना, पोट लग जाना बादि साहसिक कार्यों से वायु प्रकुपित हो जाती है, जिससे फुप्फुतों में उरक्षत हो जाता है। वहाँ स्थित वायु कफ को भी प्रकुपित करती है और दूषित कफ को साथ लेकर पित्त को दूषित करती हुई ऊपर, नीचे और तियंक् (तिरछे) चलने लगती है।

साहसजन्य राजयहमा की सप्राप्ति—साहसिक कार्य करने से प्रमुपित यायु का जो अंश सिन्धयों में जाता है, वह जम्माई, अगो में वेदना और ज्वर उत्पन्न करता है। वामाशय में जाकर अविच बादि, कण्ठ में जाकर स्वरभेद वादि, हृदय में जाकर हृदयशूल और प्राणवहस्रोतों में जाकर दवास और प्रतिश्वाय सथा मस्तिष्क में जाकर शिर शूल उत्पन्न करता है। फिर वक्ष में धत होने से, वायु की विषम गति से और कण्ठ के विकृत होने से साहसिक रोगी को लगातार खांसी आने लगती है। खांसी आने से छाती में धत हो जाने के कारण रोगी रक्त को यूकता है और रक्त निकलने से उसकी दुवंलता वढ जाती है, फिर तो दारीर-शोषक उपद्रवों से ग्रस्त होकर वह रोगी सूलने लग जाता है।

(२) सन्धारण—जब मनुष्य अपने से बढ़े लोगों के समाज में, सभ्य समाज में, स्त्रियों के बीच या सवारी से यात्रा करते हुए लज्जा, भय या सकोचयश अपने वायु के वेग को, मल या मूत्र के वेगों को रोकता है, तो वेगावरोध (सन्धारण) से वायु कुपित हो जाती है।

सन्धारणजन्य यहमा की सप्राप्ति—वह प्रकुपित वायु पित्त और कफ को प्रेरित कर ऊपर, नीचे और तियंक् ले जाती है। विकृत वायु अपने अश विशेष से शरीर के विभिन्न अवयवों में जाकर शूल उत्पन्न करती है। मल को तोष्टकर वाहर निकालती है या सुखा देती है। पाइवं, स्कन्ध, कण्ठ, छाती और शिर में अनेकविध पीटा उत्पन्न करती है। फिर खांसी, ज्वर, स्वरभेद तथा प्रतिश्याय उत्पन्न करती है, तत्प्रधात् शरीर-शोपक उपद्रवों से ग्रस्त होकर रोगी व्यक्ति सुखने लगता है।

(३) सय — जब पुरुप अति शोक तथा चिन्ता से आतुर होकर ईव्या, उत्कण्ठा, अपय, क्रोध आदि से प्रस्त होता है और दुवंल होते हुए भी रूक्ष अन्नपान का सेवन करता है, उपवास करता है अथवा अल्पाहार करता है, तव उसके हृदय में रहने

१ यदा पुरुषो दुर्बलो हि बलवता सह विगृषाति अतिविप्रकृष्टं वाऽध्वानं द्रुतमिभ-पति, अभिहन्यते वा अन्यद् वा किखिदेवविध विषममितमात्र वा व्यायामजातमारभते, तस्याति-मात्रेण कर्मणोर क्षण्यते तत स उपशोषणैरुवद्गत शनै शनेरुपशुष्यति तस्मात् पुरुषो मितमान् साहसं वर्जयेत कर्मे रक्षन् जीवितमारमन । च० नि० ६।४-५

वाला रस क्षीण हो जाता है। उस रस के क्षीण होने से वह शोष (राजयक्ष्मा) रोग से ग्रस्त हो जाता है।

सयज यहमा की सप्राप्ति—जब वह क्षयज राजयक्ष्मा ग्रस्त पुरुष अत्यन्त हुषं से कामासक्त होकर अतिशय स्त्री-प्रसङ्घ करता है, तो उसका शुक्र क्षीण हो जाता है, फिर भी यदि उसका मन स्त्री-सभीग से विरत नहीं होता है, तो मैथुन करने से शुक्र का स्नाव नही होता, अपितु वायु रक्तवाहिनी धमनियों में प्रविष्ट होकर उनसे रक्त-स्नाव कराती है और वह रक्त शुक्रमागं से बाहर आता है। परिणामस्वरूप उसकी सन्धियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर में रूक्षता वढ जाती है तथा वायु, रक्त तथा मास को सुखा देती है, फिर कफ तथा पित्त को निकालने लगती है, फिर पाश्वों में वेदना, कन्धे में पीडा और कफ तथा पित्त को निकालने लगती है, फिर पाश्वों में वेदना, कन्धे में पीडा और कफ में स्वरभेद उत्पन्न करती है। शिर में कफ की वृद्धि, सन्धिश्ल, अगमर्द, अरुचि, अजीर्ण आदि हो जाते हैं। पित्त और कफ के उत्कलेश से और वायु के प्रतिलोम गित होने से जनर, कास, श्वास, स्वरभेद और प्रतिश्याय हो जाता है। उर क्षत होने से उसके मुख से रक्त आता है, जिससे वह दुबंल हो जाता है, फिर तो शरीर को सुखाने वाले उक्त उपद्वनों से ग्रस्त होकर वह सूखने लगता है।

वक्तव्य-आयुर्वेद मे राजयक्ष्मा के दो प्रकार बतलाये गये हैं--- १ अनुलोम क्षय और २ प्रतिलोम क्षय ।

१ जब विभिन्न कारणों से कफ की वृद्धि होती है, तो सभी रसादिवहस्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे खाये हुए अन्न के परिणामस्वरूप रस से आगे की धातुएँ नहीं बन पाती और ज़रीर के कार्यों में जन धातुओं का ह्रास निरन्तर होता चला जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे धातुओं का क्षय हो जाने से वह व्यक्ति यहमा से पीडित हो जाता है। यह अनुलोम क्षय कहलाता है।

२. शुक्रक्षयकारी कारणों के लगातार प्रयोग से शुक्र का अत्यधिक क्षय हो जाता है और शुक्र-क्षय होने के कारण वायु का प्रकोप होता है। वह प्रकुपित वायु शुक्र के समीपवर्ती पूर्व धातु मज्जा का शोषण करती है और क्रमश वह वायु अस्थि- मेद-मास-रक्त तथा रस का भी शोषण कर लेती है। इसे प्रतिलोम क्षय कहा जाता है। जैसे तम लोहे का गोला जहाँ रखा जायेगा, उसके समीप की गोली भूमि भी सूख जायेगी, उसी तग्ह वायु अपनी रूक्षता से उक्त धातुओं का प्रतिलोम क्षय करके प्रतिलोम राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न करती है।

(४) विषम भोजन — जब पुरुप भोजन, जलपान, भक्ष्य और लेह्य आदि साने योग्य वस्तुओं को आहार विधि (आठ आहारविधि-विशेपायतन चरक० विमान० ११२९ तथा द्वादशाशनप्रविचार सुश्रुत०) से विपरीत प्रकार से सेवन करता है तो उसके शरीर में वात, पित्त तथा कफ विषम हो जाते हैं। विषम वात आदि दोष शरीर में फैलकर जब स्रोतों के मुखों को रोक कर स्थित हो जाते हैं, तब मनुष्य जो

१ यदा वा पुरुषोऽतिहर्षादितिप्रसक्तमाव स्त्रीष्वतिप्रसङ्गमारभते, तस्यातिमात्रप्रसङ्ख् रेतः क्षयमुपैति । तनः स शने शनेरुपशुष्यति । च० नि० ६।८

आहार ग्रहण करता है, उससे धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता, अपितु मूप और मल ही बनते हैं। रोगी मल के बल पर ही जीवित रहता है। उस पुरुप की क्षीण होती हुई धातुओं के पूर्ण न होने से विषम भोजन से बढे हुए दोप अलग-अलग उपद्रवों को उत्पन्न करते हुए शरीर को सुखा देते हैं।

विषम मोजनजन्य राजयक्षमा की सप्राप्ति—विषम भोजन के कारण प्रकुपित वात से अङ्गमदं, कण्ठ मे खरखराहट, पाइनंशूल, स्कन्ध मे दृढ गर्दन जैसी पीडा, स्वरभेद और प्रतिश्याय उत्पन्न होते हैं। पित से ज्वर, अतिमार और उदर मे दाह होता है। कफ से प्रतिश्याय, शिर मे भारीपन, अरुचि और काम उत्पन्न होता है, कास के अधिक होने के कारण छाती मे क्षत होने से रोगी रक्त यूकने लगता है और रक्त के लगातार निकलने से दुर्वलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार विषम भोजन जनित दोष राजयक्षमा को उत्पन्न कर देते हैं। रोगी शरीर-शोषण करनेवाले इन उपद्रवो से पीडित होकर धीरे-धीरे सूखने लगता है।

- वक्तव्य—(क) आचार्यं चरक ने—१. साहस, २. सवारण, ३. क्षय और ४ विषमाशन, इन चार प्रमुख कारणो का तथा इनमे राजयक्षमा होने की सप्राप्ति का युक्तियुक्त विवेचन किया है। उन्होंने उक्त कारणो मे वायु-विकृति-पूर्वंक अन्य दोपो की विकृति मानकर उनसे होनेवाले लक्षणों का उल्लेप किया है। वस्तुत यक्ष्मारोग त्रिदोपज है और विभिन्न अवस्थाओं में तत्तद् दोपजन्य लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है। इमी अभिप्राय से यह उल्लेख किया गया है, कि यक्ष्मारोग चार कारणों से होनेवाला त्रिदोपज रोग है—'त्रिदोपों जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्'—मा० नि०।
- (ख) पाश्चात्य चिकित्सा वैज्ञानिक इम रोग का प्रधान कारण एक जीवाणु को मानते हैं, जिसे वैसिलस ट्यूवरकुलोमिस (Bacillus tuberculosis) कहते हैं। यह आमागय को छोडकर शरीर के किसी भी भाग में यक्ष्मा उत्पन्न कर सकता है।
- (ग) यदमा का आन्तरिक निदान जटता (बुद्धिमान्य), प्रतिश्याय, कास, प्रसूतिरोग, मधुमेह, इन्फ्लुएङजा, न्युमोनिया, कुक्कुरकास, रोमान्तिका, शारीरिक कृशता आदि आन्तरिक कारण हैं।
- (घ) यक्ष्मा का बाह्य निवान—वाल-विवाह, प्रसव-सम्बन्धी दूरण व्यवस्या, पोपक आहार का अभाव, सकीणं प्रकाश एव शुद्धवायुरहित स्थान मे निवास, दुर्गन्ध-युक्त (चमडा आदि का) व्यवसाय, कल कारखानो मे कार्य करना, सिगरेट-गांजा-शराव आदि का व्यसन, क्षयरोगिणो से मैथुन, अति स्त्री-सेवन, हस्त-मैथुन, जल्दी-जल्दी गर्भद्यारण इत्यादि क्षय के बाह्य कारण हैं।
- (ड) सहायक कारण-- १ अधिकतर १५ से ४५ वर्ष तक की आयु मे होता है। युवावस्था में अधिक होता है। यालक और वृद्ध भी आक्रान्त होते हैं।

१ यदा पुरुष पानाञ्चनभद्ध्यं ह्योपयोगान् प्रकृतिकरणसगोगराशिदेशकालोपयोगसस्थोपयोग-विषमानासेवते तदा तस्य तेम्यो वातिषत्तद्देष्माणो वेषम्यमापद्यन्ते, ते विषमा शरीरमनुसूत्य यदा स्नोतसामयनमुम्वानि प्रतिवार्यावितिष्ठन्ते न तैरुपशोषणैरुषद्वत शर्म शनै शुप्यति ।

^{&#}x27;हिताशी स्यान्मिताशी स्यारकालमोजी जितेन्द्रियः।' चरकः नि० ६।१०

२. वश या जाति—कोई भी वश या जाति इसके लिए व्याधिक्षमतायुक्त नहीं है। जगल और पर्वंत के निवासियों को प्राय नहीं होता। शहरों में रहनेवालों को अधिक होता है, उनमें भी गन्दी वस्तियों, निलियों और कूडा-करकट की ढेर के वीच झोपडों में रहनेवालों, गन्दे खान-पान और सिनेमा जादि के व्यसनियों को अधिकाश होता है।

३. व्यवसाय—मिलो की अशुद्ध वायु मे काम करनेवालो को एव धूल, रुई, बुरादा आदि के कणो से व्याप्त वायुमण्डल मे रहनेवालो को होता है।

४ परिस्थिति—भीडभाड, गन्दगी, सील नथा प्रकाश और स्वच्छ वायु की कमी वाले स्थान मे निवास एव होटलो मे भोजन से राजयक्ष्माजनक जीवाणुओ के सक्रमण का अवसर होता है। परदावाली स्त्रियां भी इस रोग की शिकार होती हैं।

५ वरिद्रता — आहार में स्निग्ध पदार्थों का अभाव, खनिज और विटामिन्स एव प्रोटीन का अभाव राजयक्ष्मा को आवाहित करना है। अल्पवेतनभोगी कलकं, मजदूर, कुली और कलकारखानों में काम करनेवाले इस रोग से अधिक ग्रस्त होते हैं।

६ अतिश्रम^२—अपनी शक्ति से अधिक शारीरिक, मानसिक अथवा वाचनिक किसी भी प्रकार का कार्य, दौड-धूप, खेल-कूद या विना सोये-खाये वहुत अधिक पढना आदि, ये सभी साहसिक कार्य यहमा की पृष्ठभूमि वन जाते हैं।

७ अतिमैयुन³—अत्यधिक स्त्रोसभोग या अन्य प्रकार से वीर्यनाश, स्वप्नदोष, हस्तमैथून, अप्राकृतिक मैथून आदि भी क्षयज यहमा के जनक हैं।

८ कुलज प्रवृत्ति — कुछ परिवारों में माता-पिता से बालक में जीवाणु-सक्रमण की अनुकूलता से यहमा होता है। यह माता-पिता से बीजरूप में या घनिष्ठतम सम्बन्ध के कारण वालक में सक्रान्त हो जाता है।

वक्तव्य—इसी प्रकार शरीर की दुवंलता, शारीरिक वक्ष आदि के निर्माण की विकृति, वक्ष आदि पर आघात लगने तथा न्युमोनिया, कुकरखाँसी, फिरग, सूतिकारोग, आन्त्रिक ज्वर आदि के पश्चात् राजयक्ष्मा हो सकता है।

१. मार्ग-क्षयजनक जीवाणुओं के शरीर में पहुँचने के तीन मार्ग हैं—१ श्वास-मार्ग २. रक्तमार्ग और ३. मुखमार्ग।

२. यदा पुरुषो बलवता सद्द विगृह्णाति, अतिमात्रं वा भारमुद्दहति, अनिप्रकृष्ट वाऽभानं द्रनमभिषति तस्यातिमात्रेण कर्मणोर क्षण्यते । च० नि० ६।४

३. (क) रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः। आजगामाल्पतामिन्दोर्देहः स्नेहपरिक्षयातः॥ च० चि० ८।४

(ख) यदा वा पुरुषोऽतिहर्पादतिप्रमक्तमाव स्त्रीष्वित्रमङ्गमारमते, तस्यातिमात्रप्रमङ्गाद् रेत क्षयमेति तत सोऽप्युपशोषणेरेतरुपद्रवेरुपद्रुत शनै शनरुपशुष्यति । च० नि० ६११०

१ यदा पुरुषोऽतिमात्रं कृशो वा सन् रुक्षात्रसेवी भवति, दुर्बछप्रकृतिरनाहारी वा भवति, तदा तस्य हृदयस्थायी रस क्षयमुपैति, स तस्योपक्षयाच्छोषं प्राप्नोति । च० नि० ६।९

४ तत्रादिवलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोपान्वया कुष्ठाशं प्रमृतय । (तत्र) प्रमृतिग्रहणान्मेह क्षयादय (ढल्हण)। स० स० २४

२. देह मे रोगप्रसार—देह मे प्रवेश के वाद जीवाणु अपने प्रसार के लिए तीन साधनों का प्रयोग करते हैं—(१) क्लैंप्सिक त्वचा, (२) रसायनियाँ और (३) रक्त। इन तीनो साधनों से जहाँ जहाँ जीवाणुओं का प्रवेश हो जाता है, यहाँ-वहाँ पर वे क्षय की सप्राप्ति करा देते हैं। स्थानिक अथवा सावदेहिक दोनो प्रकार के क्षय का प्रसार इन साधनों द्वारा ही होता है।

३. झयजीवाणुलो से उत्पन्न रोग एक ही है, किन्तु स्थान भेद से इमे पृयक्पृयक् सज्ञा दी गयी है। क्षयरोग के मुस्यत दो विभाग हैं— १ सर्वा क्षय और
२ स्थानिक क्षय। सर्वाङ्ग क्षय मे यह रोग सम्पूर्ण प्ररीर मे फील जाता है और सब
अङ्गो को हानि पहुँचाता है। स्थानिक क्षय मे प्रधान फुप्फुमक्षय है। इसके अतिरिक्त
इसके अनेक विभाग हो जाते हैं—

सन्द्रिक्षय, अस्विक्षय, लसीकाप्रनिष्ठाय, स्वरयन्त्रहाय, जदर्याकलाहाय, अन्त्रहाय, मित्तिकक्षय, मस्तिव्कावरणक्षय, यकृत्क्षय, व्लीहाक्षय, पुष्पुसावरणक्षय, मृत्राधायक्षय, गर्माव्यक्षय, जपस्यक्षय, मासक्षय, त्वक्षय और सुपुम्नाक्षय बादि स्थानिक क्षय होते हैं। इनमे से सन्द्रिक्षय और अस्थिक्षय प्राय स्थानिक घोट लगने से होते हैं।

राजयक्मा की सामान्य सप्राप्ति

जब राजयहमा के जनक कारणों का सेवन किया जाता है, तो अग्नियाँ विषम हो जाती हैं, जिससे आहार तथा धातुओं का उचित पाक नहीं हो पाता। एवन्छ अग्निमान्द्यजनित कफ की वृद्धि होती है। वह वढा हुआ कफ स्रोतों के मार्गों को बन्द कर देता है, परिणामत रक्तादि धातुओं का क्षय हो जाता है तथा धातुओं में रहनेवाली सात धात्विग्नियों का नाश हो जाता है। इसी से राजयहमा रोग की उत्पत्ति होती है।

सुत्रुताचार्यं ने राजयहमा के सप्राप्ति-कथन मे--१. अनुलोमक्षय और २. प्रति-लोमक्षय के रूप में द्विविध सप्राप्ति का कथन किया है--

१ कफप्रधान (वात-पित्त) दोषों के द्वारा रसवाहक स्रोतों का अवरोध हो जाने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोषण कम होने के कारण उनका क्षय होकर राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न होता है। उसे अनुस्रोमक्षय कहते हैं।

वक्तव्य — रसवाहक स्रोतस् शब्द से रमायनियो (Lymphatic vessels) तथा रक्तवाहक स्रोतस् (Arteries and veins) दोनो का ग्रहण होता है। इन स्रोतो का अवरोध हो जाने से कफ या लिम्फ का पूर्णं रूप से सवहन न होकर वह विदग्ध होकर विकृत कफ के रूप में बाहर निकलता है।

२. अधिक सभीग करने या अन्य प्रकार से वीयं के सीण होने पर वायु प्रकुपित होती है और वह मज्जा को शोषित करती है, मज्जा के अनन्तर अस्थियां सीण होने

१ स्रोतसां सन्निरोधाद च रक्तादीनां च सङ्खयाद । धात्पाणां च अपचयाद राजयहमा प्रवतते ॥ च० चि० ८१४०

लगती हैं। इस प्रकार पीछे की घातुओं के क्षीण होने के क्रम में रसघातु तक के क्षीण होने का क्रम आ जाता है। उलटी (प्रतिलोम) घातुओं का क्षय होने से उसे प्रतिलोमक्षय कहते हैं।

सप्राप्ति-चक्र

निदान — सधारण + विषमाशन — कफप्रधान (वात-पित्त) दोष — स्रोतोऽवरोध

| पोषणाभाव | रसादि शुक्रान्त

धातुओ का

अनुलोम राजयक्ष्मा-शोष-सर्वधातुक्षय-उत्तरोत्तर क्षय

निदान-साहस +क्षय-श्रूकक्षय-वातप्रधान दोष-वात-प्रकोप

पोषणा भाव

शुक्र से रसपर्यन्त

प्रतिलोम राजयक्ष्मा---शोष---सर्वधातुक्षय---पूर्व-पूर्व धातुक्षय

दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १ दोष---त्रिदोष, वात-कफप्रधान।
- २ दूष्य-सभी धातुएँ मुख्यत रसधातु।
- ३ स्रोतस्—सभी स्रोतस्, मुख्यत रसवहस्रोतस्।
- ४ अधिष्ठान-फुप्फुस, सर्वेशरीरगत धातुक्षय।
- ५ आमपनवाशयोत्य चिरकारी व्याधि।

राजयक्ष्मा के पूर्वरूप

- १. शारीरिक दोषजन्य-श्वास, अगमर्द, कफसश्रव, तालुशोष, वमन, अग्नि-मान्द्य, मद, पीनस, कास, निद्रा, शुक्लाक्षता (रक्ताल्पता) (सुश्रुत) तथा शोथ (वाग्भट)।
- •२. मानसिक विकारजन्य—स्त्री-सभोग की प्रबल इच्छा, स्वप्न मे काक, सुग्गा, साही, नीलकण्ठ, गीघ, बन्दर और गिरगिट की सवारी करना, जल-विहीन निवयां देखना तथा सूखे, हवा मे झूमते, धुंबा से भरे और दावानल मे पडे वृक्षो को देखना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तक्य —यक्ष्मा के रोगी की धातुएँ क्षीण होती हैं, शरीर सूखा होता है और मनोबल गिरा होता है, इमीलिये वह सूखे जलाशय, जलते पेड और पक्षियों की सवारी करना बादि विलक्षण स्वप्न देखता है।

राजयक्मा के भेद

- (१) नियान की दृष्टि से यक्ष्मा के चार भेद होते हैं—१ साहसज, २ सधारणज, ३. क्षयज और ४ विषमाशनज ।
- (२) लक्षणों के आधार पर यक्ष्मा तीन प्रकार का होता है—१ त्रिरूप राजयक्ष्मा, २ पड्डूप राजयक्ष्मा और ३ एकादशरूप राजयक्ष्मा।
- (३) राजयक्ष्मा अनेक रोगो का समूह है, रोगो का राजा है और त्रिदोषज व्याधि है।

फुफुसमूल राजयक्ष्मा

(Hilum phthisis)

आयुर्वेदोक्त राजयक्ष्मा के वर्णन से यह प्रतीत होता है, कि उसका सम्बन्ध प्रधानरूप से फुप्फुस विकृति से है। यद्यपि राजयक्ष्मा सावंदिहिक हो सकता है। एक प्रकृत यह उठता है कि राजयक्ष्मा अधिकतर फुप्फुस मे ही क्यो होता है?

चूंकि शरीर मे फुप्फुस कोमलतम अङ्ग है और शरीर-रक्षक लसीकावाहिनियाँ फुप्फुस मे कम हैं, अत इसमे यह रोग अधिक होता है। जिस अङ्ग-मे लाइपेज की कमी होती है, उसमे राजयक्ष्मा का प्रकोप अधिक होता है और फुप्फुस मे लाइपेज की मात्रा नहीं के बराबर है। एक अन्य कारण यह भी है, कि सबसे अधिक रक्त-सबहन फुप्फुस में ही होता है, उसमें भी फुप्फुस के ऊपरी भाग में। इस रोग के होने में निम्नाव्हित कारण हैं—

- १. कपर के फुप्फुस का भाग टेढा होता है, जिसके कारण वहाँ वायु का गमना-गमन कम होता है।
 - २ ऊपरी भाग अक्षक (Clavicle) के नीचे दवा रहता है।
 - ३ ग्रीवा का दवाव भी इस पर पडता है।

इन कारणो से ऊपरी भाग दुवंल हो जाता है, जिससे सवंप्रथम यही विकृति होती है।

इस प्रकार फुप्फुस मे ही राजयक्ष्मा के होने की अधिक सभावना होने से तथा विकित्सा की दृष्टि से अन्य की अपेक्षा गम्भीर होने से केवल राजयक्ष्मा कहने से फुप्फुसगत राजयक्ष्मा का ही बोध होता है।

घास्प्रशो का मत है कि वाल्यावस्था मे राजयक्ष्मा का फुप्फुसगत उपसर्ग उसके मूल में होता है और घीरे-घीरे यह ऊपर या पार्श्व में फैलता है। राजयक्ष्मा बढ़ने याला रोग है। इसका न कोई क्रम है न अविध है। वैसे यदि रोगी, रोगाक्रान्त होने के बाद एक हजार दिनो तक जीवित रहता है, तो उचित चिकित्सा सुलभ होने से यह यम सकता है। इसका क्रम और काल जीवाणुओ की तीव्रता, रोगी की प्रति-

१ पर दिनसङ्सं तु यदि जीवति मानव । धुमिपिमरपकान्तस्तरण शोपपीटितः ॥ मृन्दमाथव

कारशिक, आर्थिक स्थिति, बाह्य परिस्थिति इत्यादि कई वातो पर निर्भर है। सामान्यत तीन्न प्रकार मे १ से ३ महीने में मृत्यु होती है, कभी-कभी ८-१० दिनों में भी हो सकती है। साधारणतया राजयक्ष्मा चिरकालीन रोग है, जो २-३ वर्ष तक रहता है। जब रोगी सौनिकतन्तु-भूयिष्ठ हो जाता है, तो उसकी अवधि बीसों वर्ष हो सकती है। प्राय क्षीणता, सन्यास, रक्तष्ठीवन, श्वासावरोध, मस्तिष्क-विकृति आदि होने से मृत्यु होती है। आयुर्वेदीय लक्षणों की दृष्टि से यह तीन प्रकार का होता है। कितपय आचार्य इन तीनो प्रकारों को राजयक्ष्मा की प्रथम, द्वितीय तथा तथा तृतीय अवस्था का लक्षण मानते हैं।

(१) राजयक्मा के लक्षण कारणों के आधार पर-

साहसज	वेगावरोधज	क्षयज	विषमाशनज
१ शिर शूल	शिर शूल	शिर शूल	शिर शूल
२ पाइवेंश्ल	पार्श्वशूल	पार्श्वेश्ल	पार्श्वशूल
३ ज्तर	ज्वर	ज्वर	ज्वर
४ कास 🍃	कास	कास	कास
५ स्वरभेद	स्वरभेद	स्वरभेद	स्वरभेद
६. अरुचि	अरुचि	अरुचि	अरुचि
७ अतिसार	अतिसार	अतिसार	रक्तवमन
८ उर.शूल	प्रतिश्याय	प्रतिश्याय	प्रतिश्याय
९. कण्ठोद्घ्वस	असावमर्द	असताप	असताप
१० जुम्भा	अगमर्दे	अगमर्द	प्रसेक
११ सरक्त कफष्ठीवन	छ दि	श्वास	छर्दि

वत्तव्य--

- १ प्रथम छह लक्षण सभी मे समान है।
- २ साहसज में उर शूल, कण्ठोद्घ्यस और सरक्त कफ्छीवन प्रमुख लक्षण हैं।
- ३. वेगावरोधज मे अगमदं और छदि प्रमुख हैं।
- ४ क्षयं में श्वास प्रमुख है।
- ५. विषमाशनज मे प्रसेक और छदि प्रमुख हैं।

मुख्य लक्षणों के आधार पर राजयक्ष्मा के प्रकार को जाना जा सकता है।

- (२) राजयक्ष्मा के दोषानुसार लक्षण १---
 - १ वात के लक्षण-स्वरभेद, अस-पाइवेंश्ल तथा अस-पाइवेंसकोच।

१ स्वरमेदोऽनिलाच्छूलं सङ्कोचश्चांसपाद्देयो । चनरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद् रक्तस्य चागम ॥ श्विरस परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च। कास कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विश्वेय कफकोपत ॥ (सु० ड० ४१)

- २ पित्त के लक्षण-ज्वर, दाह, अतिसार और रक्तष्ठीवन ।
- ३ कफ के लक्षण-शिरोगीरव, अरुचि, कास, कण्ठोद्ध्वस ।

(३) त्रिरूप राजयक्ष्मा ---

- (क) कन्छो तथा पारवीं मे पीडा, (ख) हाथ-पैर मे जलन और (ग) सम्पूर्ण शरीर मे ज्वर का होना, ये राजयक्ष्मा के लक्षण हैं।
- (क) 'असपार्श्वाभिताप-यह राजयक्ष्मा का मुख्य लक्षण है। इसके कई कारण है-
- १ रोग का आरम्भ फुप्फुस के असीय भाग अथवा पार्श्वभाग से होता है, अत वहाँ पीडा होना स्वाभाविक है।
- २ यक्ष्मा के जीवाणु का फुप्फुसावरण मे प्राथमिक या द्वितीयक उपसर्ग होने से 'फुप्फुसावरणशोथ' होता है, जिसके कारण ये लक्षण होते हैं।
- २. शोययुक्त वक्ष स्थ ग्रन्थियो का नाडियो पर दवाव पडने से भी वक्ष स्थल में पीढा होती है।
- ४ वायुकोषो के फट जाने पर वातोरस (Pneumothorax) हो जाने पर पीडा होती है।
- ५. सीत्रिकतन्तुमय प्रकार के राजयक्ष्मा में तन्तुओं के सकीच के कारण सपूर्ण वस स्थल में पीडा होती है।
- (ख) हाथ-पर मे जलन—रसादि धातुओं के क्षय के कारण हुई रोगवृद्धि से व्यानवायु का प्रकोप होने से एव वातनाडियों के क्षोभ के कारण हाय-पैर के तलवे में दाह मालूम होता है।
- (ग) सर्वाञ्चनत ज्वर—यह ज्वर सर्वशरीरव्यापी होता है। इसकी उत्पत्ति का प्रधान कारण राजयक्ष्माजन्य विषमयता है। यह ज्वर प्राय मध्याह्न के प्रधात् कुछ वढ जाता है।

वक्तव्य ज्वरोत्पत्ति का कारण यह है, कि विभिन्न स्रोतसो के अवरोध से धारीर में मल एव आमदीप के सचय के कारण धात्विग्वियों की सिक्रियता वढ जाने से अधिक कृष्मा की उत्पत्ति होती है तथा इस प्रकार उत्पन्न मल और आमदोप तथा राजयक्ष्मा के जीवाणुओं से उत्पन्न विप रक्तवाहिनियों के द्वारा परिश्रमण करते हुए तापनियन्त्रक केन्द्र पर विपाक्त प्रभाव पैदा कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह ज्वर भोजन के वाद या क्रोधादि उत्तेजक भावों के कारण यहमा के रोगी को हो जाता है, वयों कि रक्तिवहन के वढ़ने से विप उद्णतानियन्त्रक के पास शीघ्र ही पहुँच जाता है। यह ज्वर १००० से १०२० का० तक होता है। कभी-कभी दितीयक उपसगं हो जाने पर ज्वर का विभिन्न रूप प्रकट होता है। इसे 'प्रलेपक ज्वर' कहते हैं। यह तृतीया-यन्या मे पाया जाता है और इसका प्रधान कारण प्रतिमयता (Pyacma) है।

१ असपार्थामितापश्च सन्नाप करपादयोः।

च्याः सर्वात्रवश्चीते रभणं राभवस्मणः ॥ च० चि० ८।५२

(४) षड्रूप राजयक्ष्मा-

- (क) १ भक्तद्वेप (भोजन मे अरुचि), २. ज्वर, ३ श्वास, ४ कास, ५ रक्तियीवन और ६ स्वरभेद, ये राजयक्ष्मा के षड्रूप लक्षण हैं।
- (ख) १ कास, २ ज्वर, ३ पाश्वेंशूल, ४. स्वरभेद, ५. अतिसार और ६. अरुचि, ये राजयक्ष्मा के छह लक्षण हैं।


वक्तन्य---षड्रूप राजयक्ष्मा, फुप्फुसीय यक्ष्मा (Pulmonary tuberculosis) का ही अववोधक लक्षण है।

- भक्तद्वेष कफाधिनय के कारण भोजन के प्रति द्वेष हो जाता है।
- २ ज्वर-इसकी उत्पत्ति का कारण इमके पूर्व के वक्तव्य मे देखें।
- ३. श्वास फुप्फुस मे विवरीभवन (Cavitation) अधिक हो जाने से फुप्फुस का वातसन्वार मार्ग कम हो जाता है, वायु के आदान-प्रदान की मात्रा को प्राकृतिक रखने के निमित्त फुप्फुस की अविशिष्ट कोषाओ द्वारा यह कार्य शीघ्रता से किया जाता है, जिससे श्वासकष्ट होता है अथवा सान्द्र (घना) कफ के सचित होने से फुप्फुस घन हो जाते हैं, तब भी श्वासकृच्छ्रता होती है।

४ कास — यह श्वसन-सस्थान की विकृति का द्योतक है। खाँसी की उत्पत्ति का कारण क्षोभ और रक्ताधिक्य है। पहले सूखी खाँसी होती है, किन्तु जब बाद में एकत्रित कफ तथा फुप्फुस की भग्न कोपिकाओं की उत्तेजना के फलस्वरूप खाँसी आती है, तो इसमें कफ भी निकलता है और कफ निकलने के बाद खाँसी शान्त हो जाती है।

५ रक्तव्हीवन—इसे हीमोटाइसिस (Haemoptysis) कहते हैं। ८०-९० प्रतिशत राजयक्ष्मा-रोगियों में यह लक्षण अवश्य होता है। रोग की प्रथमावस्था में रक्ताधिक्य के कारण रक्तष्टीवन होता है और मात्रा में कम रहता है। उत्तरकाल में रक्तवाहिनी के विदीण होने से अधिक मात्रा में रक्त निकलता है। सिरा या धमनी किसी से भी रक्त आ सकता है। सिरागत रक्त शीझ वन्द हो जाता है, किन्तु धमनी-गत रक्त शीझ बन्द नहीं होता, इसमें लाली अधिक रहती है।

(५) एकादशरूप राजयक्ष्मा---



पार्श्वशूल, राजयक्मा तथा शोषरोग

५. दाह	पा र्वश् ल	शिरोरुजा
६ अतिसार	शिर शूल	स्वररुजा
७. रक्तष्टीवन	रक्तवमन	अरुचि
८ शिर पूर्णता	इलेज्म छर्दि	विड्भ्रश-सशोष
९ अरुचि	श्वास	कोष्ठज छदि
१० कास	अतिसार	पार्श्वशूल
११ कण्ठोद्ध्वस	अरुचि	ज्वर

असाध्य लक्षण

- १ पूर्वोक्त एकादश, पर्हप या त्रिरूप रोगी जो बल-मासक्षय युक्त हो।
- २ अधिक मात्रा मे भोजन करे, फिर भी क्षीण होता जाये।
- ३ अतिसार रोग से ग्रस्त हो।
- ४. उदर तथा अण्डकोषो मे सूजन हो।
- ५ जिसके नेत्र स्वेत हो।
- ६ जो अन्न से घुणा करता हो।
- ७ कद्वंश्वास-विकार से ग्रस्त हो।
- ८. मूत्रकृच्छ्र से पीडित हो।
- ९ जो बहुत अधिक मूत्र त्याग करता हो।

साध्य लक्षण

- १ जिसे लगातार ज्वर न रहता हो।
- २ जो बलवान् हो।
- ३ जो औपध की शक्ति तथा शोधन की क्रिया को सहन कर सके।
- ४ जो आत्मवल-सपन्न एव सयमी हो।
- ५ जिसकी जठराग्नि दीप्त हो।
- ६ जिसके शरीर में मास की क्षीणता न हो।
- इन गुणो से युक्त यहमा का रोगी साध्य होता है।

साहसज यक्ष्मा, उरःक्षत और क्षतज कास का सापेक्ष निदान

साहसज यक्ष्मा	उर क्षत	अतज कास
१. चिरकारी	बाशुकारी	चिरकारी
२. उर क्षत का	उर क्षत का समीपस्य	उर क्षत का दूरस्य
दूरस्य इतिहास	इतिहास	इतिहास
रे. यहमा के प्रत्यातम	नहीं मिलते	नहीं मिलते
ल्धण (पिरूप) मिलते हैं	1	
४. अधिक धातुक्षय	बस्प घातुसय	अनल्प घातुक्षय
५ सम्बक्त पूर्वरूप	भव्यक्त पूर्वरूप	व्यक्त पूर्वरूप

कायचिकित्सा

६ त्रिदोषज

वातप्रधान

वातप्रधान

७ रक्तष्ठीवन मिल सकता है। रक्तष्ठीवन अवश्य मिलता है।

रक्तष्ठीवन सभव है।

चिकित्सासूत्र

9 राजयक्ष्मा का रोगी यदि निर्वेल हो तो उसकी सशमन चिकित्सा करे।

२ सर्वप्रथम इस रोग के तिदान का परित्याग करना चाहिए।

३ रोगी का बहि परिमार्जन सौम्य और आरामदायक इंग से करे।

४. अगो की मालिश, उबटत लगाना, स्नान क्याता एव अवगाहन कराना चाहिए।

५ वातहर वलातैल की मालिश, असगन्ध-शतावर-पीली सरसो का उबटन, जीवन्ती-शतावर आदि जीवनीय द्रव्यों के क्वाय में सुगतिष्ठ इलक्र ऋतु के अनुसार शीत या उण्ण करके उससे स्नान और वलातैल की मालिश करके घत-तैलिमिश्रत दुग्ध-जल युक्त टव में अवगाहन कराना चाहिए।

६. स्वच्छ, आरामदेह नवीन वस्त्र धारण करावे, सुगन्धि वाले फूलो की माला पहनावे। प्रिय-इष्ट मित्रो का सुखद साहचर्ये, रमणीय एवं हेंसमुख ललनाओ का दर्शन, सुखद गीत एव वाद्य का श्रवण और मधुरालाप सुनना हितकर है।

७ मन मे हुई उत्पन्न करने वाले सवादो का सुनना और आस्वासन लाभप्रद है।

८. ब्रह्मचर्य पालन, श्रेष्ठजनो का आदर-सम्मान और दान-पुण्य करना चाहिए।

९. माङ्गलिक कार्य करना, सदाचारपूर्ण जीवन वितानो, देवार्चन और सयम का पालन करना शुभफलदायक है।

१० मन में ईर्ष्या-द्वेष-क्रोध-मद-लोभ-काम के भावो को न लाना और प्रमन्नता पूर्ण वातावरण में निवास करना आरोग्यदायक है।

१९ स्रोतोरोध, घातुसय तथा धात्विग्निमान्द्य का विचार कर स्रोतस् शोधन, धात्विग्निदीपन तथा बृहण औषघो की व्यवस्था करनी चाहिए।

१२. मासरस या घृत-दुग्ध युक्त तृप्तिकारक पथ्य देना चाहिए ।

१३ अग्निदीपन, मनस्तुष्टिकर प्रिय, लघु तथा वातनाशक औषध दे।

१४ बकरी के पुरीष-मूत्र-दुग्ध-घृत और रक्त का स्नान, उबटन और भक्षण तथा बकरियों के बीच में निवास करना राजयहमा रोगी के लिए जीवनप्रद है।

१५. लहसुन का जैसे भी पसन्द हो उपयोग करना हितकर है। नागबला चूणं दूध के साथ और विधान के अनुसार वर्धमानिपप्पली का सेवन तथा शिलाजीत का सविधि प्रयोग लाभकर है ।

१ अजाशकृन्मूत्रपयोष्ट्रतासङ् मांसालयानि प्रतिसेवमान । स्नानादि नानाविधिना जहाति मासादशेषं नियमेन शोषम् ॥ सु० उ० ४१।५८

२ रसोनयोगं विधिवत् क्षयातं क्षीरेण वा नागवलाप्रयोगम् । सेवेत वा मागिथकाविधान तथोपयोग जतुनोऽहमजस्य ॥ सु० उ० ४१।५९

- १६ अनित शीतल वायु वाले, मनोरम, स्वच्छ, प्राकृतिक सुपमा से समृद्ध जन्मुक्त पर्वतीय प्रदेश अथवा नदी में वजहे पर या किनारे पर रहने की व्यवस्था करे।
- १७ पूर्ण विश्राम, मनोऽनुवूल वातावरण, दक्ष परिचारक और प्रसन्न मन से विश्वास-लगन-धैर्य सयम के माध नियमित औषध सेवन करे।
- १८ घातुसय की पूर्ति हेतु मक्कन, दूध, घी, मासरस, अण्डा, मूरो फल तथा पौष्टिक श्रीषध-अन्न का सेवन कराना चाहिए।
 - १९ रोगी को पृयक लावाय में यवने की व्यवस्था करे।
- २०. मल, मूत्र, यूके आदि वन्द उनकनदार पात्र में सग्रह् कर उसे जमीन में गहुँदें में डलवावे या जलवा दे।
 - २१. रोगी के वस्त्र, आमन, फूल-माना पात बादि का बन्य कोग प्रयोग न करें।
 - २२. घर की फर्म और यस्त्र आदि की फिनायण दालकर गुरा करावे।
- २३ वातावरण के घोधनार्य लोबान, भूगल, चन्द्रन, देवदार, राई, जटागासी, नीम की पत्ती बादि यथालाभ जलाना चाहिए।
 - २४ पूर्ण विश्वान्ति और अच्छी निद्रा की पूर्ण आवश्यकता है।
- २५ क्षय रोगी के युक्त का नरक्षण परमावश्यक है। उमे स्त्री-गमागम से अलग रखे।
- २६ रोगी का ताप दिन-रात में कई बार घटता-बढ़ता है, इमिलए धर्मामीटर लगाकर ३-३ घण्टे पर तापमान लियते रहना चाहिए।
- २७ मोजन, निद्रा, घोच और स्नान के प्रश्नात् एव चिन्तित होने पर घरीर की उण्णता कम हो जाती है तथा मैंधुन, परिश्रम, मध्याह्नकाल, क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि भाव होने पर घरीर की उष्णता वढ जाती है। इन कारणो पर विचार कर तापमान लेना चाहिए।
 - २८ ज्वर शमनार्थं पसीना लाने वाली औपघ नही देनी चाहिए।
- २९ अतिसार यन्द करने के लिए अफीम मिश्रित दवा या पका बेल नही देना चाहिए।
 - ३० यदि रक्त गिरता हो, तो तत्काल रक्तरोधक उपचार और औपध दे ।
- ३१ मन्द ज्वर वाले और ज्वर रहित रोगियो के लिए तैलमर्दन लाभकर है। तैलमर्दन सायच्हाल हलके हाथों से करना चाहिए और दूसरे दिन प्रात गरम जल में कपड़ा भिगोकर देह को पोछ लेना चाहिए। लाक्षादि तैल की मालिश से प्रस्वेद कम बाता है।
- ३२ राजयक्ष्मा रोग दारुण व्याधि है। यह १०-२० दिन मे नही जाता है। अत धैर्यपूर्वक पथ्य-पालन एव श्रद्धा-विश्वासपूर्वक नियमित औपध का सेवन करे।
- ३३ राजयक्ष्मा त्रिदोपज रोग है। अंत दोषो के बलावल का विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए।
 - ३४ धातुओं की क्षीणता से आक्रान्त राजयक्ष्मा रोगी का वल धुक्र के अस्तित्व

१४ प्रदेह—गुग्गुलु, देवदारु, रक्तचन्दन और नागकेशर अथवा काकोली, वरियार का मूल, विदारीकन्द और सिहजन की छाल तथा गदहपुर्ना को पीसकर सुखोष्ण कर अस, पार्श्व एव शिर पर लगावे।

१५ आवश्यकतानुसार नस्य, धूमपान, भोजनोत्तर घृतपान, तैलाभ्यङ्ग, निरूह या अनुवासनवस्ति तथा सिरावेध द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिए।

१६. शिर, अंस या पाश्वं प्रदेश में दाह हो, तो पदुमकाठ, खस, लालचन्दन या दुव, मजीठ, मुलहठी और नागकेशर पीसकर घी मिलाकर उन पर प्रदेह लगावे।

९७ वाह मे अभ्यङ्ग तथा परिषेक—चन्दनादि तैल या शतधौत घृत की मालिश और ताजे गोदुग्ध या मुलहठी के क्वाय से शरीर का परिसेचन करना दाहशामक है।

१८ स्वरभेद मे नस्य-विदारीकन्द और मुलहठी डालकर सिद्ध छूत में सेंघानमक मिलाकर या पुण्डरिया काठ, मुलहठी, पीपर, वनभटा और विरयार की जड, इनके कल्क और गोदुग्ध से सिद्ध छूत का नस्य देना चाहिए।

१९ घृत का प्रयोग—चरकोक्त दशमूलादि घृत का भोजन के बाद पान करने से कास, श्वास तथा शिर-अस एव पाइवें का शूल नष्ट हो जाता है।

२० शिर, पार्श्व एवं असशूल में रास्नाघृत या वलाघृत को दूध में मिलाकर, रोगी के अग्निवल के अनुसार १०-२० ग्राम की मात्रा में भोजन के मध्य या अन्त में पिलाना चाहिए। इसी प्रकार खर्जूरादि घृत, दशमूलघृत, पञ्च पञ्चमूलघृत और पञ्च पञ्चमूल के कल्क से आठ गुने दूध और सोलह गुने जल में सिद्ध दूध से निकाले हुए घृत का सेवन यक्ष्मा के कास-श्वास-स्वरभेद-हिक्का तथा शिर-पार्श्व एवं अम के शूल का शमन करता है।

२१ मदाग्नि अरुचि, कास-श्वास में सितोपलादि चूर्ण २ ग्राम की मात्रा में मधु मिलाकर दिन में > वार चटावे अथवा तालीशादि चूर्ण इसी भाँति देवे। सबेरे-शाम च्यवनप्राश १० ग्राम में मिलाकर दे।

२२ अरुचि एवं वनन मे यवानीषाडव चूर्ण २-२ ग्राम विना अनुपान दिन मे ४-५ वार दे अथवा एलादि चूर्ण २-२ ग्राम ४ वार मधु से चटावे। चूसने के लिए एलादि वटी का २-२ घण्टे पर प्रयोग करे।

२३ शुष्ककास मे प्राग्यादि चूर्ण २ ग्राम, अभ्रक मस्म १२५ मि० ग्रा०, प्रवाल भस्म १२५ मि० ग्रा० की एक मात्रा मधु से दिन मे ३-४ बार दे।

२४ हाथ-पर एव अगो मे दाह होने पर चरकोक्त वासाघृत और शतावरी घृत का दूध के साथ उचित मात्रा मे प्रयोग करे।

२५. ज्वर, दाह, भ्रम, तृष्णा, वमन में दुरालभादि घृत १०-१५ ग्राम दूध में मिलाकर प्रात -साय पिलाना चाहिए।

२६ एकादश लक्षणों मे जीवन्त्यादि घृत १५-२० ग्राम की मात्रा में २५० मि० ली० दूध में सबेरे-शाम पिलाना चाहिए।

२७ ज्वर और कास में बलादि क्षीर का प्रयोग मधु मिलाकर करे।

२८. कफप्रसेक—कफ के अधिक हो जाने पर वायु वार-वार उसे निकालती है और वमन की प्रवृत्ति होती है, इसे कफप्रसेक कहते है। इसमे मदनफल का कल्क १० ग्राम डालकर सिद्ध किया हुआ दूध पिलाकर वमन करावे तथा कफनाशक—जी, गेहूँ, बरिष्ट, सुरा, आसव, जागल पशु पक्षियों का मास आदि आहार में देना चाहिए।

२९ अतिसार मे पीयूपवल्ली रस ५०० मि० ग्रा०, शखभस्म २५० मि० ग्रा० और जम्बादि चूर्ण १ ग्राम की एक मात्रा—ऐसी ३ मात्रा जल से देवे । अनार की पत्ती, दूषिया, चागेरी या जामुन की पत्ती से सिद्ध जल मे मूग की दाल का यूप बनाकर उसमे धनिया, जीरां, सेंधानमक और घी डालकर खाने को दे । स्थिरादि पचमूल से सिद्ध जल पीने के लिए दे ।

२० मुखर्वरस्य मे—१ प्रात -साय दन्तधावन, २. मुखशोधक द्रव्यो के क्वाथ से कुल्ला करावे और मुख मे उनका कल्क धारण करावे, ३. प्रायोगिक धूमपान करावे और ४ दीपन पाचन द्रव्यो से निर्मित अनुकूल औषध एव अन्नपान का सेवन करावे।

२१ मुख्वैरस्यनाशक योग-- १. दालचीनी, मोथा, वही इलायची, धनियां, २ मोथा, आंवला, दालचीनी, ३. दारहलदी, दालचीनी, अजवायन, ४ तेजपात, पीपर ५ अजवायन और इमली, ये पाँच योग हैं। इनमे से किन्ही का चूणें या गोली वनाकर मुख मे धारण करावे। चूणें का कवलग्रह और गण्डूप करावे।

३२ अरुचि और विवन्ध आनाह मे यवानीपाडव चूर्ण ६-६ ग्राम की मात्रा मे विना अनुपान ५-६ वार मुख मे रखकर चूसना चाहिए।

३३ कास-श्वास-वमन आदि मे तालीसादि चूर्ण २-३ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३-४ वार मधु से दे।

रेप. यहमा मे एकल द्रव्य—कास में वासा, दाह में द्राक्षा, इवास मे भारगी, रक्तिष्ठीवन मे लक्षा, कफ्ष्ठीवन मे अभ्रक, उर शूल मे प्रगमस्म, पाइवंशूल में पुष्करमूल, स्वरभेद मे मुलहठी, वमन मे कपूरकचरी, अविच में अनारदाना या आदी नीवू के रस और सेंघानमक से देना उपयोगी है।

सिद्धयोग

३५ ज्वर-शामनार्य-जयमगल रम, चतुर्मुख रम, लक्ष्मीविलास रस, प्रवालिष्टी तया सुदशन चूर्ण का रोगी के वलानुसार मात्रा में प्रयोग करावे ।

३६ मन्द-मन्द ज्वर वना रहने पर जयमगल रस १२५ मि० ग्रा०, मुक्ताशुक्ति भस्म २५० मि० ग्रा०, शिलाजत्वादि लौह ३०० मि० ग्रा० और गुडूचीसत्त्व रै ग्राम, की एक मात्रा प्राय -साय मक्खन-मिश्री के साथ दे।

३७ अथना नसन्तमालनी १२५ मि० ग्रा०, मुक्ताशुक्ति भस्म १२५ मि० ग्रा०, प्रवालभस्म १२५ मि० ग्रा०, सितोपलादि चूर्णं २ ग्राम, इनकी दो मात्रा बनाकर प्रात -साय मक्खन-मिश्री के साथ दे।

^{३८} क्रक्तिसरक्षणार्थ-मुक्तापश्वामृत १२५ मि० ग्रा० राजमृगाङ्क रस १२५

मि॰ ग्रा॰, वसन्तितिलक १२५ मि॰ ग्रा॰, तालीशादि चूर्णे ४ ग्राम की २ मात्रा प्रात -साय मक्खन-मिश्री के साथ दे।

३९ बृहणार्थं — छागलादि घृत, जीवनीय घृत, महांवलादि घृत आदि का दूध के साथ प्रयोग करे।

४० स्रोत शोधनार्थ तथा अग्नि-दीपनार्थ-भोजन के पूर्व यवानीषाडव ६ ग्राम दे और भोजनोत्तर द्राक्षासव और दशमूलारिष्ट २०-२० मि० ली० समान जल से दो बार दे।

४१. पार्श्वशूल मे पुराना गोघृत, कपूर और सेंधानमक मिलाकर मालिश करने से लाभ होता है। वासा-चन्दनादि तैल का भी अभ्यङ्ग करे।

आभ्यन्तर प्रयोगार्थ -- श्रृगभस्म १ ग्राम और पुष्करमूल चूर्ण ३ ग्राम मिलाकर ३ मात्रा बनावे। इसे दिन मे ३ बार मधु से दे।

४२ कास में चन्द्रामृतरस आधा ग्राम, सितोपलादि ३ ग्राम, टकणभस्म आधा ग्राम, यवाक्षार आधा ग्राम, इन्हें लेकर ३ मात्रा बनाकर दिन मे ३ बार मधु से चटावे।

४३. श्वासवृद्धि मे श्वासकासिचन्तामणि ३०० मि० ग्रा०, वसन्तिलक ३०० मि० ग्रा०, मुक्तापिचामृत ३०० मि० ग्रा०, इवासकुठार रस आधा ग्राम, इन्हें लेकर ३ मात्रा बनाकर दिन मे ३ वार दे।

४४ रक्तष्ठीवन मे मुक्तापश्चामृत आघा ग्राम, 'बोलबद्धरस १ ग्राम, प्रवालिष्टी आघा ग्राम, रक्तिपित्तान्तक रस आघा ग्राम, बोल चूर्ण १ ग्राम, नागकेशर १ ग्राम और लक्षाचूर्ण १ ग्राम, इन्हे लेकर ४ मात्रा बनावे तथा ३-३ घण्टे पर ४ बार वासास्वरस और मधु से दे। अथवा—

४५ शुद्ध स्वर्णगैरिक १ ग्राम, स्फुटिका भस्म आधा ग्राम, तृणकान्तमणि पिष्टी आधा ग्राम, अभ्रक भस्म आधा ग्राम, शोणितागँकः १ ग्राम, इन्हें लेकर ४ मात्रा बनावे तथा ३-३ घण्टे पर ४ वार मधु से दे।

४६ स्वरमेद मे चन्द्रामृत रस आधा ग्राम, किन्नरकण्ठरस आधा ग्राम, कल्याण-लेह ४ ग्राम लेकर ४ मात्रा बनाकर ५ ग्राम ब्राह्मी छत के साथ ४ वार चटावे।

४७ रात्रिस्वेद मे यशद भन्म ४०० मि० ग्रा०, प्रवाल भस्म आधा ग्राम, वृहत् कस्तूरीभैरव रस ३०० मि० ग्रा०, इन्हे लेकर ३ मात्रा बनाकर दिन मे ३ वार मधु से दे। बौर—

४८ इतिर पर जगली उपले की राख मले या भुनी कुलथी का चूर्ण या सीठ का चूर्ण या भूनी मसूर का आटा मलना चाहिए।

४९ प्रस्वेद शमनार्थ-प्रवालिप्टी आधा ग्राम, गुडूची सत्त्व १ ग्राम मिलाकर ३ मात्रा बनाकर दिन मे ३ बार मधु से दे। अथवा-

५० मद्रवन्ती (Cressa cretica) का चूर्ण ३ ग्राम और प्रवालिपण्टी ३०० मिल प्रा० मिलाकर ३ मात्रा बनाकर दिए भ ३ थार दे।

५१. राजयक्ष्मा में उपयोगी अन्य औपघो में स्वर्णं सूतशेखर, चन्द्रोदय, सुवर्णं-भस्म, महालक्ष्मीविलास, मृगाङ्क, राजमृगाङ्क, कुमुदेश्वर, शिलाजित्वादि वटी, शिवा-गुटिका, हेमगभंपोट्टली रस, लोकनाय रस, योगेन्द्र रस, जातीफलादि चूणं, सगजराहत भस्म, ताप्यादि लौह, च्यवनप्राशावलेह, वासावलेह, कूष्माण्डखण्ड, द्राक्षारिष्ट, दशमूलारिष्ट, रसोनक्षीरयोग, कर्पूरादि चूणं, वैदूर्यं पिष्टी, रसिन्दूर, त्रिकटु चूणं, दाडिमाष्टक चूणं, वराटभस्म, पञ्चामृतपर्पटी आदि का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना कल्याणकारक है।

व्यवस्थापत्र

रक्तस्राव मे त्वरित् लाभार्थ

सगजराहत भस्म
तृणकान्तमणि पिष्टी
गुद्ध्ची सत्त्व
वशलोचन चूणें
छोटी इलायची चूणें
शुद्ध स्वर्णगैरिक
हीराबोल
हीरादोखी गोद
सब समभाग लेकर मिला लें। २-२ ग्राम की मात्रा में ३ बार
अनार के शर्वंत या मधु से दे।

सामान्य व्यवस्था

' १. ३-३ घण्टे पर दिन मे ४ बार

स्वर्णं वसन्तमालती	४०० मि० ग्रा०		
सर्वेज्वरहर लौह	१ ग्राम		
चन्द्रामृत	१ ग्राम		
श्रुगभस्म	१ ग्राम		
मुक्तापश्वामृत	३ ग्राम		
सितोपलादि चूर्ण	४ ग्राम		
	४ मात्रा		

च्यवनप्राश ५ ग्राम और मधु से।

२. भोजन के तुरन्त पूर्व २ बार

यवानीपाडव <u>१० ग्राम</u> विना अनुपात । २ मात्रा

१० का० हि०

कायचिकित्सा

३ भोजनोत्तर २ बार

द्राक्षारिष्ट १५ मि० ली० दशमूलारिष्ट १५ मि० ली० २ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

४ सर्वाङ्ग मे अभ्यग— महालाक्षादि तैल

> या चन्दनादि तैल

अथवा---

9. ३-३ घण्टे पर दिन मे ४ बार

महालक्ष्मीविलास आधा ग्राम
काञ्चनाभ्र आधा ग्राम
राजमृगाङ्क ३०० मि० ग्रा०
प्रवाल पिष्टी आधा ग्राम
यक्ष्मारि लौह आधा ग्राम
अभ्रम भस्म आधा ग्राम
सितोपलादि चूर्ण ४ ग्राम
४ मात्रा

पारिजात पत्र स्वरस ५ ग्राम और मधु से।

२ भोजन के पूर्व तालीशादि चूर्ण

४ ग्राम २ मात्रा

जल से। ३ भोजनोत्तर

वासारिष्ट

२० मि० ली०

समान जल मिलाकर पीना ।

४. अभ्यगार्थ

वासाचन्दनादि तैल

दोष और लक्षण की गुरुता एव गम्भीरता का विचार कर पूर्वोक्त सिद्ध औषधो में से यथायोग्य कल्पना कर प्रयोग करना चाहिए।

पध्य

१. अभ्यग, उबटन लगाना, दुग्धद्रोणी मे अवगाहन, ऋतु के अनुसार औपधसिद्ध जल से शीत या उष्ण स्नान, सुगन्धि घारण, प्रियवयस्य साहचर्य, प्राकृतिक सुपमा से समृद्ध निवास-स्थान, अजा के दुग्ध-घृत-दिध का सेवन, अजा के मध्य मे निवास आदि बाह्य परिवेश रमणीय होना चाहिए।

- २. मुर्गी, मोर, वत्तक, गौरैया, मछली और नक्र के अण्डे ययाविधि संस्कृत कर सेवन करे।
- ३ लघुपचमूल से सिद्ध जल का भोजन पकाने मे प्रयोग करे, जो पटझपानीय विधि से पकाया गया हो।
 - ४ वकरी का दूध सर्वोत्तम है, अभाव मे गोदुग्ध देवे।
- ५. फल-अनार, अगूर, सेव, मुसम्मी, सन्तरा का मुखोष्ण रस देवे। पिण्ड खजूर, फालसा, नारियल, किसमिस, मुनवका, अजीर, आलूबुगारा, अखरोट, घादाम, चिरोंजी, पिस्ता आदि सूखे फल लाभदायक हैं।
- ६ मक्खन—वकरी के दूध से निकाला गया मक्खन अति हितकर है। अभाय मे गाय या भैस के दही से निकाला मक्खन मिश्री-मधु के साथ लेना चाहिए।
 - ७. घुत-वकरी का मिले तो उत्तम है, न मिले तो गाय-मैस का लें।
- ८ वकरे के मास से सिद्ध भीपधीय धृतो का भोजन के साथ प्रयोग करे। बीपधो के अनुपान में भी धृत दे।
- ९ पिप्पली घृत, छागलादि घृत, वला घृत, रास्नाघृत, जीवन्त्यादि घृत आदि का प्रयोग जैसे भी रुचिकर हो करना चाहिए।
- १० वारणी—ताजी, नीरा (खजूर या ताड की) पीना स्रति लामकर है। इसे १००-२०० ग्राम तक नित्य लेवे।
- 99 मासाहारी जीवो तथा जांगल जीवो का मांस, पका केला, अविला, सहिजन की फली, परवल, सींफ, चेंद्यानमक, सोठ, अदरक, कालीमरिच, पीपर, लींग, दालचीनी, लाइची, जो, गेहूँ, मूँग, कुलपी, धनियाँ, जीरा, लहसुन, अनार का सेवन पथ्य है।
- १२ मासाहारी को कौआ, उल्लू, भेडिया, चीता, साँप, नेवला, गीध, नीलकण्ठ आदि मासभक्षी पशु-पक्षियों का मास खिलाना चाहिए। रोगों को खाद्य एव प्रसिद्ध जीवों के व्याज से उक्त जीवों का मास देवे। सही नाम वतलाने से रोगी नहीं खा पायेगा।


अपध्य

रूक्षान्न-पान, विषमान्नन, विरुद्ध आहार, विदाही पदार्थ राई आदि, करेला, भण्टा, कुन्दरू, ताम्बूल, अम्ल, तिक्त, कषाय और कटुरस पदार्थ, पत्रशाक, तेल, हीग, उडद की दाल, क्षारीय पदाथ, विरेचन, वेगधारण, श्रम, प्रजागरण, दिवाशयन, स्त्री-प्रसग, साहसिक कर्म, क्रोध आदि अपथ्य है।

शोषरोग

कारण के अनुसार शोव के भेद

१. व्यवायज शोप, २ शोकज शोप, २ वार्षंक्यज शोप, ४ व्यायामज शोप, ५ मागंगमनजन्य शोप, ६. व्रणशोप और ७. जर सतजन्य शोप, ये सात प्रकार के शोप कहें गये हैं।



वक्तव्य—सामान्यत रसादि धातुओं का शोषण करने की प्रवृत्ति के कारण 'शोष' भी राजयक्ष्मा का पर्यायवाची माना जाता है, किन्तु कतिपय विशेषताओं के कारण राजयक्ष्मा को शोष से पृथक् मानना चाहिए। अतएव माधव ने 'शोष' का पृथक् वर्णन किया है। राजयक्ष्मा में ज्वर की उपस्थित तथा राजयक्ष्मा के दण्डाणु का उपसर्ग होना अनिवाय है, किन्तु शोष में उपसर्गकारी दण्डाणु तथा तज्जन्य ज्वर का होना अनिवाय एव अपेक्षित नहीं होता। राजयक्ष्मा के अन्य लक्षण भी शोष में उपलब्ध नही होते। शोकशोषी या जराशोषी में राजयक्ष्मा के लक्षण नही मिलते। राजयक्ष्मा के लक्षण तथा सम्प्राप्ति के न होने से उक्त 'शोष' को शोष ही कहना सगत है।

व्यवाय आदि कारणो से उत्पन्न घातुक्षय से ही जिस शोष की उत्पत्ति होती है, उसमें राजयक्ष्मा के समान सम्प्राप्ति और त्रिदोष के लक्षण नहीं होते हैं। अत शोप को राजयक्ष्मा से पृथक् समझना चाहिए। इसी आशय से सुश्रुत ने कहा है —

'इन सप्तविध शोषों में राजयक्ष्मा के त्रिदोषों से उत्पन्न होने वाले समस्त (एका-दश) लक्षण नहीं पाये जाते हैं, अतएव इन्हें केवल धातुक्षय के कारण 'क्षय' या 'शोष' ही कहना चाहिए। क्योंकि राजयक्ष्मा स्रोतस् सिन्नरोध आदि विशिष्ट सप्रप्ति पूर्वेक अनुलोम या प्रतिलोम धातुक्षय के रूप में त्रिदोषज तथा एकादश लक्षणों वाला होता है'।

(१) व्यवायशोष का लक्षण

व्यवाय शोष का रोगी शुक्रक्षय के लक्षणों से युक्त होता है, जैसे—शिश्न तथा अण्डकोष में वेदना होना, मैंथुन में असमर्थता, बहुत देर तक मैंथुन करने पर भी शुक्र का अल्पेमात्रा में क्षरण तथा कदाचित् किन्बिन्मात्रा में रक्त के साथ शुक्र का आना, ये लक्षण होते हैं। उसका शरीर पीला पड जाता है और पूर्व-पूर्ववर्ती धातुओं का क्रमश. क्षय होता जाता है।

(२) शोकशोष का लक्षण

शोकशोष का रोगी बहुत अधिक चिन्तन करता है, उसके अग शिथिल हो जाते हैं। रक्ताल्पता के कारण उसका शरीर पीला पड जाता है।

वक्तव्य—सट्टा, लाटरी, रोजगार या प्रियजन या धन की हानि होने से अवर-मन्त का व्यक्ति बार-बार उनको सोचता है। उसे खाने-पीने, नहाने-मोने की चिन्ता

१. न तत्र दोविक्तितां समस्तानां निपातनम् । क्षमा प्रव हि ते हेवाः प्रत्येकं षातुर्सविताः ॥ छ० ७० ४१।३१-६३

नहीं होती और भूख-प्यास नहीं मालूम पडती। वह जो कुछ खाता-पीता है, वह भी ठीक से नहीं पंचता है और रसादि घातुओं का निर्माण नहीं हो पाता। फलस्वरूप वह सूखने लगता है और अग्निम घातुओं का निर्माण नहीं हो पाता। इसे अनुलोम क्षय कह सकते हैं।

(३) जराशोष का लक्षण

जराशोधी का शरीर दुवला होता है, उसका बल और वीयं क्षीण होता है, उसकी बुद्धि और इन्द्रियों कमजोर हो जाती है, उसका शरीर कांपता है, उसे भोजन में विच नहीं होती और उसकी आवाज फूटे हुए कांसे के वर्तन के समान होती है। शरीर में भारीपन होता है, कहीं मन नहीं लगता है। वह ठाँय-ठाँय खाँसता है किन्तु कफ नहीं निकंलता। उसके मुख से, नाक से, आँख से अनिच्छित रूप से स्नाय निकलता है। उसका मल सूख जाता है और उसके चेहरे पर रूक्षता होती है।

(४) अध्वज्ञोष का लक्षण

अधिक पैदल चलने से होने वाले शोप को 'अध्वशोप' कहते हैं। ऐसे अध्वशोप रोगों के अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। उसके मुख की कान्ति झुलसी हुई और रूखी लगती है। उसके अग सूने पड जाते हैं और उसकी तालू, गला और मुख सूखते रहते हैं।

(५) व्यायामशोष का लक्षण

सिक व्यापाम करने वाले को व्यापामशोष हो जाता है और उसमे अध्वक्षोषी जैसे ही लक्षण होते हैं। वह उर क्षत न होने पर भी उर क्षय के लक्षणो का शिकार हो जाता है, जैसे—उर शूल, पार्वशूल, स्वास, शुष्क कास, कदाचित् किन्दिन्मात्रा मे मुख से रक्त निकल जाना, ये सब लक्षण होते हैं।

(६) वणशोष का, लक्षण

रक्तक्षय, त्रण,वेदना तथा नियन्त्रण के कारण पोवक पदार्थों के आहार का अभाव होने से वायु का प्रकोप होकर व्रणित को जो शोप होता है, उसे व्रणशोप कहते हैं।

(७) उर.क्षत घोष का लक्षण

परिचय-इस रोग में फुस्फुसो मे क्षत हो जाता है, जिससे छाती मे सुई चुभने के समान तीव्र वेदना होती है। इसमे कास, रक्तष्ठीवन या रक्तछदि होती है।

निदान

- ९ समता से अधिक वजनदार पदार्थों को उठाना, मुद्गर भाजना आदि।
- र अपने से बलवान् के साथ कुश्ती लडना, ऊँचे स्थान से गिरना, विपम भूमि, पर गिरना, दौडते हुए वैल या घोडे को रोकना या स्टार्ट कार को रोकना।
 - रे वजनदार पत्थर या लकडी का बोटा उठाकर फेंकना।

- ४ जोर-जोर से बोलना या चिल्लाता, तेजी से दौडकर लम्बे रास्ते को पार करना।
 - ५. अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करना।
 - ६ अधिक मैथुन करना, अधिक कूदना, तेजी से नाचना।
 - ७ रूक्ष, अल्प और किसी एक रस वाले पदार्थ खाना।

- संप्राप्ति

जपर्युक्त कारणो से फुप्फुस विदीणं हो जाते हैं, जिससे वायु का प्रकोप होकर उर क्षत शोष हो जाता है।

दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १. दोष-वात प्रधान ।
- २. दूष्य-रस'तथा रक्त।
- ३. स्रोतस् ---रस-रक्तवह, प्राणवह ।
- ४. अधिष्ठान---फुप्फुस ।
- ५. आशुकारी व्याधि है।

उरक्षत का पूर्वरूप

इसका पूर्वरूप अव्यक्त रहता है, क्यों कि कोई भी साहसिक कार्य करने के पहले रोगी विकार रहित होता है।

उरःक्षत का लक्षण

छाती मे अत्यधिक पीडा होती है। पाइवों में भी पीडा होती है। घरीर क्रमस सूखने लगता है और काँपता है। रूगण की शक्ति, बल, वर्ण, रुचि और जठरांगि सीण होने लगती है। ज्वर और घरीर मे व्यथा होने से रोगी का मनोबल गिर जाता है। उसे अतिसार तथा अग्निमान्द्य हो जाता है। जब वह खाँसता है, तो दूषित, मटमैला, दुर्गेन्घयुक्त, पीला, गाँठदार और रक्तमिश्रित कफ निकलता है। घुक्र और ओज के क्षय के कारण उरक्षत का रोगी बहुत अधिक क्षीण हो जाता है।

, वक्तव्य- उर क्षत रोग दो कारणो से उत्पन्न होता है - १. शक्ति से अधिक साहिसिक कार्य करने से और २ रूक्ष-अल्प-एकरस भोजी अति कामुक व्यक्तियों में शुक्र एव ओज के क्षय के कारण।

इन दोनो कारणो से उत्पन्न उर क्षत के लक्षणों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रथम को क्षत और दूसरे को क्षीण कहते हैं। प्रथम (क्षत) में छाती में पीडा, रक्त का वमन तथा अनेक वर्ण के दुष्ट कफ के साथ खाँसी आती है तथा दूसरें (क्षीण) में रक्त सहित मूत्रत्याग, पास्व, पृष्ठ तथा कमर में जकडाहट होना विशिष्ट लक्षण हैं।

साध्यासाध्यता

- १ जिस रोगी मे पूर्वोक्त उर क्षत के लक्षण कम हो।
- २. जो रोगी वीसाग्नि हो ।
- ३ जो रोगी वलवान् हो।
- ४ जिसका उर क्षत रोग नवीन हो।
- ये सव साध्य हैं।

एक वर्ष का पुराना रोग याप्य हो जाता है। सभी लक्षणो से युक्त रोगी, मन्दाग्नि, दुर्बल तथा कृश रोगी असाध्य होता है।

चिकित्सासूत्र

- १ व्यवायशोष—मैथुन का त्याग, मनोरम आर्घ्यात्मिक वातारण में अपने से श्रेष्ठजनो के साथ निवास और सत्संग, सद् ग्रन्य अध्ययन, नित्य स्नान, धार्मिक अनु-ष्ठान, शुक्र के समान गुण—समानगुणभूयिष्ठ द्रव्यो का उपयोग और धातुदृद्धिकर आहार-विहार का सेवन, शुक्रजनन और वय स्थापन द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए।
- २. शोकज शोव--विस्मापन, विस्मारण, प्रियवचन श्रवण, शीतवाद्य शब्दश्रवण, प्रियदर्शन, स्नान, अनुलेप, प्रहर्पण, सान्त्वना, आश्वासन, मन सन्तुष्टि, पौष्टिक बाहार-विहार का सेवन।
- ३. वार्धस्यशोष—नियमित स्नान, अभ्यग, पौष्टिक पदार्थ-सेवन, घी-दूध तथा सूखे मेवे खाना, नियमित टहलना, सन्तुष्ट रहना, चिन्ता का परित्याग करना, क्रोध-लोभ-मत्सर आदि का त्याग, सादा जीवन एव उच्च विचार, सुखद आचास, समय से भोजन, शयन और जागरण। प्रात काल खुली हवा मे टहलना और जिन्दादिली रखना परम लाभकर है—

जईफी जिन्दगी मे वक्त की वेजा खानी है। अगर जिन्दादिली है तो बुढापा भी जवानी है।।

४. व्यायामशोष—श्रमजनक कार्य न करना, कसरत और कुश्ती नही करना, श्रमहर द्रव्यों का सेवन करना, पौष्टिक आहार, सूखे फल, दूध-घी आदि का सेवन हितकर है।

५. अध्वज्ञोष--पूर्णं विश्राम, श्रमहर द्रव्यो का प्रयोग, आरामदेह निवास और विस्तर, मद्युर पदायं का सेवन, प्रियजन साहचयं, सुहृद्गोष्ठी और सुखद निद्रा आदि लाभप्रद है।

६ सणकोष--- त्रणोपचार, सक्रमण प्रतिषेध, स्वच्छ वातावरण और रक्तकोधक एव शोणित-स्थापन द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए। मधुर पदार्थ का अत्यल्प प्रयोग किया जाय।

७. उर.सतकोष--चन्दनादि तैल का अभ्यंग, शीतल उवटन, परिषेक, स्नान, निर्मल जलवाली नदी, नद, सरीवर, पुष्करिणी या हृद मे अवगाहन, धारागृह-निवास, सुखद विस्तर, शीतल उपवन, चन्द्रिकरण और सुखद हवा का सेवन, मोती-मूगा-

तृणकान्त आदि मणियो की चन्दनानुलिप्त शीतल माला छाती पर घारण करना, रक्तकमल, नीलकमल या क्वेतकमल पुष्पो या उनके पत्रो पर शयन करना या शीतल जलसिक्त कदली पत्र पर शयन करना, सहस्रधीत घृत का अनुलेपन करना, लाजसक्तु, युनक्का, खजूर, चिरौंजी, फालसा आदि खाना हितकर है।

कक्तव्य—इस रोग की उपेक्षा करने से यह राजयहमा का रूप पकड लेता है, इसलिए प्रारम्भ में ही सावधानी के साथ इसकी चिकित्सा करके इस रोग को निवृत्त कर देना चाहिए।

उरःक्षत को चिकित्सा

उर क्षत रोग का पता चलते ही उसे तत्काल रोकने का प्रयास करे।

२. लाक्षाचूणं १२ ग्राम की ४ मात्रा बनाकर ३-३ घण्टे पर चीनी मिले बकरी या गाय के दूध के साथ पिलावे। भोजन में केवल खीर खिलावे या धान के लावा का सत्तु दूध में घोलकर दे।

३ पार्श्व पीडा और वस्ति मे पीडा होनेपर एव पित्त तथा जठराग्नि की अल्पता होने पर लाक्षा चूर्ण ४ ग्राम की मात्रा मृतसजीवनी के अनुपान से दिन मे ३ वार दे।

४. यदि उर क्षत के रोगी को अतिसार हो, तो नागरमोथा-अतीस-पाठा और कोरया की छाल के समभाग चूर्ण ३ ग्राम और ३ ग्राम लाक्षा चूर्ण मिलाकर दिन में ३-४ बार ठडे जल से दे।

५. जब अग्नि प्रदीप्त हो, तो लाक्षा, जीवक-ऋषभक, मेदा-महामेदा, मधुमक्खी का छत्ता, काकोली-क्षीरकाकोली, मुद्गपणीं-माषपणीं, जीवन्ती, मुलहठी, क्रमल की केशर प्रत्येक ३—३ ग्राम लेकर बकरी या गाय का दूध ४०० मि० ली० और जल १३ लीटर मिलाकर क्षीरपाक करे और दूध मात्र बचे, तो छान ले। फिर गेहूँ का ७५ ग्राम आटा लेकर २५ ग्राम घी मे भूने, उसमे उक्त दूध और ७५ ग्राम चीनी हालकर लप्सी बनावे और तैयार होने पर उसमे ३ ग्राम वशलोचन चूणं हाले, फिर रोगी को खिलावे।

६ ईख की जह, कमल की नाल, कमल की केशर और रक्तवन्दन के चूर्ण से क्षीरपाक कर पिलाना क्षतसन्धानकारक होता है।

७ जी का सत्तू दूध मे घोलकर चीनी-मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे ज्वर और दाह का शमन होता है।

-८ खाँसी, पाइवेंशूल और अस्थिशूल मे महुए का फूल, मुलहठी, मुनवका, पीपर, बरियार का मूल समभाग मे लेकर पीसकर वशलोचन मिलाकर घी और मधु की विषम मात्रा मिलाकर दे।

यदि रक्त अधिक आता हो, तो मूग के साथ मुर्गे का अण्डा देना चाहिए।
 १० क्षीणशुक्र उर क्षत रोगी को बर की वरोह, गूलर-पीपर-पाकड-साखू इनकी
 छाल, फूलप्रियगु, ताल की बाल, जामुन की छाल, चिरोंजी, और पद्मकाठ, सबको

समभाग में लेकर करक वनाकर उससे क्षीरपाक कर उसके साथ पुराना अगहनी चावल का भात वनाकर खाने की देना चाहिए।

११. अधिक क्षीणता होने पर, नागवला (गगेरन-गुलशकरी) को पहले दिन ५ ग्राम सेवन करे, २-२ दिन पर १०-१० ग्राम वढ़ाते हुए ४० ग्राम तक दूध से सेवन करे, फिर ५-५ ग्राम घटाकर ५ ग्राम की मात्रा तक ले आवे। इसका इसी प्रकार बढाते-घटाते हुए ४० दिन तक प्रयोग करे। पथ्य मे केवल इच्छा भर दूध लेवे। यह कल्प, पुष्टि, आयु, वल और बारोग्य प्रदान करता है।

सिद्ध योग—एलादि गुटिका, अमृतप्राशघृत, श्वदप्ट्रादि घृत, सिपर्गुड, सैन्धवादि चूणं, तालीशादि चूणं, सितोपलादि चूणं, प्रवालपश्चामृत, मुक्तापिष्टी, गुढूचीसस्व, चन्द्रकला रस, प्रगमस्म, उशीरासव, वृह्त् चन्द्रामृतरस, इनका आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए।

ध्यवस्थापत्र

१. ३-३ घण्टे पर ४ वार

स्वणं वसन्तमालती ५०० मि० ग्रा०
मुक्तापिष्टी ५०० मि० ग्रा०
चन्द्रकला रस १ ग्राम
रक्तपित्तकुलकण्डन रस ५०० मि० ग्रा०
भ्रुगभस्म १ ग्राम
४ मात्रा

लाक्षाचूणं १ ग्राम, कूष्माण्ड स्वरस २० ग्राम और मधु ५ ग्राम के साथ दे।

२. ९ वजे व २ वजे दिन

सितोपलादि चूर्ण ४ ग्राम

घी ३ ग्राम और चीनी मिलाकर खिलावे।

- ३ दिन मे ४-५ वार एलादिवटी १-१ गोली चूसना।
- ४ भोजनोत्तर २ बार उशीरासव १५ मि० ली० वरावर जल मिलाकर पीना ।

पच्य

जो अन्नपान सन्तर्पण (शरीर को समृद्ध वनानेवाला—तृप्तिदायक) हो, शीतवीर्य, अविदाही, हितकर, लघुगुणयुक्त एव सुपाच्य हो, उसका सेवन करना चाहिए। जीवनीयगण के द्रव्यो को डालकर विधिपूर्वक पकाया हुआ जगली जीवो का मासरस

चीनी डालकर पिलाना चाहिए। उर क्षत मे नमक की जगह चीनी का ही प्रयोग करना चाहिए। यक्ष्मा, कास तथा रक्तिपत्त के रोगियो के लिए जो पथ्य है, उन सबको उर क्षत के रोगी के रोगवल, दोष तथा शरीर के बलावल का विचार कर प्रयोग मे लाना चाहिए।

जी या गेहूँ के आटे को घी मे भूनकर फिर दूध मे पकाकर छोटी इलायची का चूर्ण और चीनी डालकर खिलांवे। सूखे मेवे खिलाने चाहिए। बकरी का दूध सर्वोत्तम पथ्य है, न मिले तो गाय का दूध पिलावे।

पुराना अगहनी चावल, साठी चावल, जौ, गेहूँ, मूँग, मसूर तथा जो मधुर, सन्तोषप्रद और रुचिकर हो, वही पथ्य दें। आंवले का मुख्बा, कूष्माण्ड का मुख्बा, लोकी, परवल, आंवला, धान का लावा, मुनक्के तथा अगूर का क्वाथ या रस, गले का रस, अनार का रस, गोदुग्ध, ये सब पथ्य हैं।

अपच्य

स्त्री-सभोग, शोक, क्रोध, ईर्व्या, मद, मात्सर्यं, चिन्ता आदि मनोविकारो का त्याग करना चाहिए। रूक्षान्न, विरुद्ध भोजन, राई, करेला, बैगन, कुन्दरू, सेम, उडद और क्षारीय पदार्थं अपथ्य हैं। वेगावरोध, साहसिक कर्मे, दिन मे सोना तथा अभ आदि अपथ्य हैं।

सप्तद्रश अध्याय

हृद्रोग, हृच्छूल तथा हृदयाभिघात

हृद्रोग या हृदयरोग

(Cardiac Diseases)

परिचय—ह्त् और हृदय दोनो शब्द हृदयवाचक हैं। हृत् के रोग को हृद्रोग एव हृदय के रोग को हृदयरोग कहते हैं। (हृदो रोग हृद्रोग, हृदयस्य रोग हृदयरोग)। उरोगुहान्तवंतीं कमलाकृति हृदय अन्नरस, रक्त और ओज का आश्रय है। श्रीघाणेकर जी ने इसी हृदय को मन, बुद्धि, आत्मा का स्थान माना है। यह रक्त का आधार है और अपने सकोच तथा विकास से रक्त को सदैव गतिमान् रखनेवाला अथवा रक्त का समस्त शरीर मे परिवहन करनेवाला यन्त्र है। हृदय के अगो के प्रकृत स्थिति मे रहने पर शरीर का कार्य प्राकृतिक रहता है। इसके किसी अग या किसी क्रिया के विकृत हो जाने पर हृदय का कार्य विकृत हो जाता है। इसे ही हृदयरोग कहते हैं।

हृदय में दो प्रकार के रोग होते हैं—हृदय के अङ्गसम्बन्धी विकार (Orgenic disorders) और क्रियासम्बन्धी विकार (Functional disorders)। इनमें क्रियासम्बन्धी विकारों का शमन शीघ्र हो जाता है, किन्तु अङ्गसम्बन्धी विकारों का सुधार विलम्ब से होता है, कदाचित् नहीं भी होता।

निवंचन—वृहदारण्यक उपनिषद् में हृदय शब्द का सार्थक निवंचन किया गया है। जिसका तात्पर्यं यह है—'हृज् हरणे' 'दद दाने' और 'इण् गतौ' इन तीन धातुओं से हृदय शब्द बना है। एवच (१) पाचन-प्रक्रिया से बने हुए रस का आहरण तथा समस्त शरीर में परिश्रमणशील रक्त के अशुद्ध हो जाने पर पुन. अपने में आहरण करना 'हृज्' धातु का अर्थ है। (२) सर्वधातुओं को शुद्ध रक्त प्रदान करना 'दद' धातु का अर्थ है। (३) निरन्तर सकोच और विकास के रूप में गति करते रहना 'इण्' धातु का अर्थ है। इस निवंचन से यह सिद्ध है, कि हजारो वर्ष पूर्व भारतीय मनीषियों ने हृदय के इस रक्तसवहन-प्रक्रिया का ज्ञान कर लिया था।

इस हृदय के अवयव सम्बन्धी अथवा कार्य सम्बन्धी विकार को हृदयरोग कहा जाता है।

१ तदेतत त्र्यक्षरं हृदयमिति—(१) 'हृ' इत्येकमक्षरम्—अभिहरन्त्यस्मै स्वाधान्ये च य एवं वेद। (२) 'द' इत्येकमक्षरम्—ददन्ते अस्मै स्वाधान्ये च य एव वेद। 'य' इत्येकमक्षरम्— एति स्वर्गे य एवं वेद। एव हर्रोद्देदतेरेतेहृँदयशब्द।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- १. चरकसहिता-सूत्र० १७।
- २ चरकसहिता-चिकित्सा० २६।
- ३ सुश्रुतसहिता-उत्तरतन्त्र ४३।
- ४ अष्टङ्गहृदय-निदान० ५।
- ५ अष्टाङ्गहृदय-चिकित्सा० ६।
- ६. माघवनिदान-हृद्रोग ।

हृदयरोग का सामान्य निदान

- १ व्यायाम (अधिक परिश्रम), २ तीक्ष्ण आहार, ३ विरेचन का अतियोग, ४ वस्ति का अतियोग, ५ वमन का अतियोग, ६ आमदोष, ७ क्षशताकारक आहार-विहार, ८ अतिउष्ण, ९ अतिगुरु, १० क्ष्यायरस-प्रधान, ११ तिक्तरस-प्रधान भोजन और १२ अध्यक्षन, इन सब कारणो का निरन्तर सेवन करना, १३ रूझ अभ्र सेवन, १४ विरुद्ध भोजन, १५ अजीणं होना, १६ असात्म्य आहार-विहार—ये शारीरिक निदान हैं।
- विक्ता करना, २ अधिक भयभीत होना और ३ अधिक सताया
 जाना—ये मानस निदान हैं।
- १ मल-मूत्रादि के बेगो का रोकना, २. पहले से उत्पन्न रोग की चिकित्सा न करना और ३. शरीर अथवा हृदय पर चोट लगना—ये आगन्तुक कारण हैं।

इस प्रकार हृदयरोग को उत्पन्न करनेवाले निदान कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक और कुछ सागन्तुक हैं।

हृदयरोग का सामान्य लक्षण^२

(१) विवर्णता, (२) मूर्च्छा, (३) ज्वर, (४) कास, (५) हिक्का, (६) श्वास, (७) मुख का स्वाद फीका पडना, (८) अधिक प्यास लगना, (९) बेहोशी होना, (१०) वमन की प्रवृत्ति होना, (११) कफ का उत्वलेश होना, (१२) वेदना होना (अग टूटना) और (१३) अरुचि होना आदि हृदयरोग के लक्षण हैं।

१ सु० उ० ४३।३-४। च० चि० २६।७७ तथा माधवनिदान ।

२ (क) ब्यायामतीक्ष्णातिविरेकवस्ति चिन्ता भय त्रास गदातिचारा । छर्चामसन्धारणकर्जनानि हृद्ररोगकतृ णि तथाऽभिघात ॥ च० चि० २६


⁽२) वेगावातोष्णरूक्षान्नैरितमात्रोपसेविते विरुद्धार्ध्यश्चनाजीर्णेरसात्म्यैक्षापि भोजने ॥ दूषित्वा रस दोषा विगुणा इदयं गता । कुर्वन्ति इदये वाषां इद्रोग तं प्रचक्षते॥ सु० जु० ४३

⁽३) अत्युष्ण गुर्वन्न-सधाय तिक्त श्रमाभिधाताध्यशनप्रसङ्गे । सञ्चिन्तनैर्वेगविधारणैस हृदामय पञ्चविध प्रदिष्ट ॥

वत्तव्य-जागुनिक विक्तिमानास्य में भी ये मसन हृदय के विविध रोगों मे मिलते है—(१) वंबच्यं (Discolouration)—दममे पागैर में पाण्डुना (Pallor), स्वावता (Cyanosis) तथा वयोजारका (Malar flush) इन तीनों का समावेश होता है। पाष्ट्रना रत्नाहरता की दर्शन है, जो कि गुदय के विविध गपाटो की विकृति से होती है। स्थायना का मारण घोषमधुँकि (Haemoglobin) की कमी है तथा इनकी प्रशित विदेशतया श्रीष्ठ, नामाप तथा नमगद्भ स्थानों में होती है, जहाँ पर केजिकाएँ उसान परती है। इसना नारण निरायत रत्नवरीय (Venous clasis) है। अपीमान्य का कारण द्विपनम वपारमकोध (Mitral stenosis) है। (२) मुक्ती-यह हुएवस्य आम (Cardine asthma) या विशेष सराम है। (३) स्वर--शामवातराय हा जीनविवर हरन्त रनामोप (Rheumatic or septic endocarditis) में वह सहाय प्रधान होना है। (४) काम, रिवसा सथा दवान में सवगेधका नधार (Pressure symptoms) है। ये दिवनम प्रावृद्धिगरण (Mitral reputpitation) में नया विशेषत्या द्विपत्रसमञ्जीन (Miltral stenosis) में पावे लागे हैं। जिपत्रसमञ्जीप में रक रा बनन भी होता है। हरमग्राचाहिनो सी धनासता (Corentry thrombosis) में यमन, अर्थन संया द्यानक्रराष्ट्रा ने लक्षण विल्ले हैं।

प्रवयरोग के नेव

- (१) बायुवेंदिवशानकार ने सात प्रकार के सूद्रवरोगों का पर्वत किया है— १ बावरिक, २ कोष्टिक, ३. पृष्टुक, ४ बायाधिका, ५ परिसय, ६ मेद सूत्र और ६. निक्षेपिका। ये गार्को नाम विकृतिपरक है।
- (२) आषामें चरक ने रोगों भी मस्यायाने (पर सूर १९) अच्छोदरसीय अध्याय में तथा (पर पूर १७ एव) विभागीय निविद्या (एड्योगर्वे तथाय) में पांच प्रकार के हृदयरोगों का वर्णन किया है—१. पातज, २. पिसज, ३. मफुज, ४. त्रिदोपज एवं ५ मृतिज।
 - (३) राग्मट तथा माधवकर ने भी उन्ह पाँच हुदवरीय हाम है।
- (४) मानार्य मुख्त ने चार प्रवार पा ह्रियरोग वहा है—१ चातज, २. वित्तज, ३ कफन और ४ एवियों ने ससर्व से होतेवाना साम्निपादिक ।



कायचिकित्सा

५. परिक्षय

४ सन्निपातज

४ कृमिज

६ मेद सूत्र

५. कृमिज

७ विक्षेपिका

वावरणिक-निदान-संप्राप्ति-लक्षण

आमवात रोग, वृक्कविकार अथवा असयमी व्यक्ति के शीतल तथा आई स्नान में निवास करने से हृदय को बाहर से आच्छादित करनेवाली हृदयावरणीकला (Pericardium) तथा हृदयान्तरिक केला (Endocardium) में प्रदाह और शोथ होकर 'आवरणिक' रोग हो जाता है।

इसमे जलन, उष्णता, शोथ, भारीपन और शरीर मे व्यथा होती है। हृदय मे कम्पन, खाँसी, दुवँलता, श्वासकुच्छ्रता, नासिका से रक्तस्राव, अग्निमान्द्य और हाथ-पैर मे सूजन हो जाती है। नाडी की गति विषम हो जाती है। इसे आवरणिक कहते हैं। उत्पन्न होते ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसकी उपेक्षा करने से यह घातक हो जाता है।

कौष्टिक का निदान और लक्षण

आमवात, अभिघात (चोट लगना) और आवरणिक रोग के कारण हुत्कोष्ठ (Myocardium) मे शोथ होने को 'कौष्ठिक' कहते हैं। कोष्ठ शब्द का तात्पर्यं हृदय की अन्त स्थाकला और मासपेशी तथा छिद्रो के कपाटो से है।

इसमे ज्वर, दाह, अरुचि, कम्प, विवर्णता, अग्निमान्द्य, कास, श्वास, राजयक्ष्मा, कोष्ठ मे पूय का सचय होना, मूच्छी, आक्षेप, प्रलाप तथा नाडी का विषमगामिनी होना, ये लक्षण होते हैं। इस घोर रोग से कोई भाग्यशाली ही वच पाता है।

पृथुक का निदान और लक्षण

असयमी व्यक्ति के मिथ्या आहार-विहार के कारण जब हुत्कोष्ठ के रक्तसश्चार मे बाद्या पहुँचने से हृदय को अधिक कार्य करना पडता है, तो हृदय की समस्त पेशियाँ मोटी हो जाती हैं। इस स्थिति को 'पृथुक' रोग कहते हैं।

इसके होने से हृदय मे पीडा, दुर्बलता, श्वासक्टच्छ्रता, भ्रम, वेचैनी और मूच्छी होना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य—इसमे हृदय का मास मोटा हो जाता है और इसे हृन्मासोपचिति (Hypertrophy of the heart) कहते हैं।

आयामिका का लक्षण

इस रोग मे हृदय के कोष्ठ का फैलाव हो जाता है, अत इसे 'आयामिका' कहते हैं।

इसमे श्वासकष्ट, शोथ, भ्रम, मूर्च्छा, हृत्कम्प, अग्निमान्ध, जलोदर, अनिद्रा तथा बल एव मास की क्षीणता हो जाती है। वक्तक्य—जब पृथुक रोग होने के वाद भी रोगी को विश्वाम नही मिलता तो हृदय को अधिक कार्य करना पडता है और हुन्माससूत्र दबाव पडने से लम्बे और पतले हो जाते हैं एव हृदय की भिक्तियाँ फैल जाती हैं। इस फैले हुए हृदय को आयामिका (Dilatation of the heart) कहते है।

परिक्षय का लक्षण

इस हुद्रोग में हुन्मास का क्षय होता है, अतः इसे 'परिक्षय' कहते हैं। इस रोग में हुत्कोष्ठपेशी के क्षीण हो जाने से स्वासकष्ट, भ्रम, दुवंलता, अवसाद, अग्निमान्द्य, हुत्कम्प और शोष आदि लक्षण होते हैं।

वक्तव्य—इस विकार के होने मे औपस्तिक ज्वरादि रोग, विष तथा मद्य का अतिसेवन एव मद्यमेह आदि भी कारण होते हैं। इस विकार मे हृदय के माम का परिक्षय (Myocardial degeneration) होता है।

मेवःसूत्र का लक्षण

जव हुत्कोष्ठगत माससूत्रों में मेद के कणों का सचय हो जाता है तो उस स्थिति को 'मेद सूत्र' रोग कहते हैं।

इस रोग में नाडी की गित मन्द होती है, हृदय मे कम्पन होता है, अवसाद, घ्रम, मूर्च्छा और हृदय मासपेशी के स्नायुओ का वल क्षीण होता है और हृदयायरण के भेदन होने से सहसा मृत्यु हो जाती है। यह वडा भयकर रोग है। इसके उत्पन्न होते ही सावधानी से इसकी विकित्सा करे।

ं वक्तव्य-आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान मेद सूत्र रोग की 'पेट्टी डिजनरेशन आफ दी हार्ट' (Patty degeneration of the heart) कहता है।

विक्षेपिका का लक्षण

इस रोग मे हृदय के कोष्ठ की धडकन अधिक तीय हो जाती है, अत इसे 'विकेषिका' कहते हैं।

इस महाव्याधि के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य के उरोऽस्थि के अधोभाग के मध्य में, हृत्कोष्ठ में, वाम वाहु, वाम स्कन्ध की अस्थि, ग्रीवा और पीठ में मर्मान्तक एवं प्राणपीडक वेदना होती है। ऐसा अनुभव होता है, कि कोई हृदय को खीच रहा हो, उसमें सूई चुभा रहा हो, कोई तोड रहा हो और जलन भी मालूम होती है। अस्यमी रोगी को वार-वार दवास की रुकावट, वेहोशी, पसीना आना, शीताङ्गता, आनाह, आध्मान, विवर्णता, कृशता, अरुचि और क्रमश डिन्द्रयों की शक्ति का ह्रास होना, ये लक्षण होते हैं। यदि नियन्त्रण नहीं किया गया तो रोगी का प्राणान्त हो जाता है। इसको 'पिल्पटेशन आफ दी हार्ट' (Palpitation of the heart) कहते हैं।

वातज हृद्रोग का निदान और सप्राप्ति

l

शोक, उपवास, अधिक ज्यायाम, रूक्ष-शुष्क और मात्रा मे अल्प भोजन करने

मे प्रकुपित वायु हृदयप्रदेश में ज्याप्त होकर अत्यधिक वेदनापूर्वक वातज हृद्रोग को उत्पन्न करती है।

वातज हृद्रोग के लक्षण

वातज हृद्रोग में धडकन का अधिक होना, ऐंठन होना, हृंदय की गति में रुकावट होना, मूर्च्छा होना, हृदय का शून्य-सा मालूम होना और भय होना, भोजन के पच जाने पर इन लक्षणों का तीव होना तथा हृदय में खिचावट, सूचीवेधनवत् पीडा, हृदय में जैसे मन्यन हो रहा हो, हृदय को कोई विदीर्ण कर रहा हो, चीर रहा हो या फाड रहा हो, ये लक्षण होते हैं।

वक्तम्य-वातज हृद्रोग मे पीडा की विशेषता रहती है। हुच्छूल (Angma pectoris) तथा हृदयवाहिनी घनास्रता (Coronary thrombosis) का यह विशिष्ट लक्षण है। उक्त दोनो अवस्थाओं में शूल अनिवार्य रूप से रहता है, किन्तु फिर भी दोनों के जूल की प्रकृति तथा अन्य लक्षणों में भिन्नता भी है। यह अग्निम कोष्ठक से स्पष्ट है-

हुच्छूल

(Angina pectoris)

- १. परिश्रम, भावावेश या भोजनोपरान्त १ रक्तप्रवाह के मन्द होने पर अर्थात् भूल का आक्रमण होता है।
- २. रोगी निश्चल खडा रहता है, हिलने से हरता है, चेहरा पीला पढ जाता है, पसीना आ जाता है और शीत का अनुभव होता है।
- ३. कुछ मिनट मे आवेग समाप्त हो जाता है।
- ४ जूल का प्रचलन अनिवार्य रूप से वाम वाहु या कभी-कभी दोनो वाहु की ओर होता है।
- ५ रक्तवाहिनीप्रसारक औषंवियो के प्रयोग से शूल शान्त होता है।
- ६ धमनीगत रक्त का दाब बढ जाता है।
- ७. ज्वर नहीं रहता है।
- ८. रक्तगत घनता साधारण रहती है।
- ९. इवेतकायाणूत्कर्ष (Leucocytosis) रहता है।

हृदयवाहिनी घनास्रता

(Coronary thrombosis)

- रात्रि मे आराम के समय आक्रमण होता है।
- २ रोगी वेचैन रहता है, जिससे इधर-उघर गतियां करता है, शरीर गरम रहता है, चेहरे पर श्यावता (Cyanosis) रहती है।
- ३. आवेग कुछ घण्टो तक भी रह सकता है।
- ४ शूल का इस प्रकार प्रचलन नहीं होता। यह उर फलक के पीछे और कुछ नीचे तक रहता है।
- ५ ऐसी औषधियों के प्रयोग से शूल की वृद्धि होती है।
- ६ धमनीगत रक्त का दाव कम रहता है और सिरागत दाब बढ जाता है।
- ७ ज्वर अल्प मात्रा मे रहता है।
- ८ रक्त की घनता बढ जाती है।
- ९, इवेतकायाणूत्कर्ष नहीं होता ।

पित्तज हृवयरोग का निदान और सम्प्राप्ति

उज्ज, लवजरस-प्रधान, क्षार और कृदुरस वाले द्रव्यों के सेवन से, अजीजं रहने पर भी भोजन करने से, अधिक मदिरा पीने से, अधिक क्रोध करने से और देर तक धूप में रहने से हृदय में पित्त का प्रकीप होकर पित्तज हृद्रोग होता है।

पित्तज हृद्रोग का लक्षण

हृदय मे दाह, मुख मे तीतापन, मुख मे तिक्त और अम्ल रस का पानी आना एव डकार आना, इन्द्रियों मे थकावट, तृष्णा, मूच्छी, चक्कर आना, पसीना होना तथा आँखों के मामने अँघेरा छा जाना, परिताप होना, वेहोशी, सत्रास (घुटन), सताप, ज्वर, शरीर का पीला होना, हृदय की व्याकुलता और पसीना होना तथा मुख का सूखना, ये लक्षण होते हैं।

कफज हुद्रोग का निदान

अधिक भोजन करना, गुरु और चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करना, चिन्ता-रहित होना, किसी प्रकार का परिश्रम न करना और अधिक समय तक सोये रहना, ये सब कफज हुद्रोग के कारण हैं।

कफज हृद्रोग का लक्षण

तन्द्रा होना, भोजन मे अरुचि, हृदय का शून्य-सा होना या निश्चल सा लगना, वजनी मालूम पडना और हृदय के ऊपर पत्थर रखा हुआ जैसा प्रतीत होना तथा कफ का प्रसेक, ज्वर, कास एव हृदय का जकडना, मन्दाग्नि और मुख का स्वाद मीठा होना, ये लक्षण होते हैं।

त्रिदोषज हृद्रोग का कारण और लक्षण

वात-पित्त-कफ से होने वाले हृदयरोग के जो कारण कहे गये हैं, वे सयुक्त रूप से सिन्नपातज हृदयरोग के कारण होते हैं।

रूफण —वात-पित्त-कफ से अलग-अलग होने वाले हृद्रोग के जो लक्षण कहे गये गये हैं, उन लक्षणों का एकत्र होना त्रिदीयज हृद्रोग का लक्षण है।

कृमिज हृद्रोग का निवान और संप्राप्ति

त्रिदोषज हृद्रोग से ग्रस्त असंयमी रोगी जब तिल, दूध, गुढ आदि अधिक खाता है, तो उनके हृदय के एक प्रदेश मे ग्रन्थि वन जाती है। उस ग्रन्थि मे रसधातु आकर क्लेद उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप उस क्लेद मे कृमियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहले तो कृमियां हृदय के एक प्रदेश मे उत्पन्न होती हैं, किन्तु वहां से हृदय के सभी प्रदेशों मे चलती हुई हृदय का भक्षण करने लगती हैं।

कृमिज हृद्रोग का लक्षण

हृदय मे कृमियों के काटने से सूई चुमाने जैसी या शस्त्र से काटने जैसी वेदना होती है। हृदय में खुजली और महती पीड़ा होती है। इन लक्षणों को देखकर ११ का॰ हि॰ भयकर कृमिज हृद्रोग को जानना-समझना चाहिए। यह भयकर रोग शीघ्र मारक होता है। इसलिए जैसे ही पता चले, इसकी सद्य चिकित्सा करनी चाहिए।

वक्तव्य — कृमिज हृद्रोग का सुश्रुतोक्त लक्षण अकुशमुख कृमि (Hook worm) के लक्षण के समान हैं। जैसे हल्लास (मुख से पानी छूटना), आँखो के सामने अघेरा होना, नेत्रो की मिलनता तथा शोथ ये सभी अकुशमुख कृमि मे देखे जाते हैं। इस कृमि के उपसर्ग से रक्ताल्पता भी हो जाती है, जिससे शरीर का वर्ण पाण्डु तथा नेत्रो पर श्यावता भी आ जाती है। इसके उपसर्ग का प्रभाव हृदय पर भी पडता है। हृत्कपाटो मे भी कभी-कभी विकृति हो जाती है, जिससे वे हृदय-द्वार को उचित रूप से बन्द नही कर पाते और परिणामस्वरूप प्रत्युद्गिरण (Regurgitation) का दोष आ जाता है। हृदय मे रक्ताल्पतावश रक्तज ममंर (Hamic) भी उत्पन्न हो जाता है। रक्ताल्पता के कारण शरीर मे शोथ भी उत्पन्न होता है।

हृद्रोग के उपद्रव

शिर मे चक्कर आना, इन्द्रियो की अपने कार्य में असमर्थता, अगो की शिथिलता और शोध होना, ये हृद्रोग के उपद्रव हैं।

विशेष वक्तव्य—जब तक हृदय घडकता है, तब तक जीवन है, और घडकन का रकना ही मृत्यु है। हृदय एक प्रधान मर्म है। हर कीमत पर उसकी रक्षा करना प्रत्येक मानव का आध्यात्मिक और नैतिक उक्तरदायित्व है। यह ध्यान देने की बात है कि—

१ हृदय चेतना एव मन का स्थान है और चिन्ता, भय, शोक, त्रास, क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष आदि भावो की मानसिकता का हृदय पर गम्भीर प्रभाव पडता है। कई बार इन मानस विकारों से चेतना लूप हो जाती है और पुन आ जाती है।

२. हृदय का सम्बन्ध सीधे-सीधे धमनियो और सिराओ से है। कफज रोगो में 'धमनी-प्रतिचय' भी एक अवस्था है, जो कि धमनियो की भित्तियों मे कफ के सचित होने से होता है, जिससे सगात्मक विकृति होती है। कोलेस्टेरोल (Cholesterol) भी कफवर्गीय द्रव्य है, जो रक्तवाहिनियो की भित्तियों में सचित होकर सगात्मक विकृति उत्पन्न कर देता है। आजकल हृदय-रोग से कोलेस्टेरोल का धनिष्ठ सम्बन्ध समक्षा जाता है।

३ हृदय साधकपित्त का स्थान है—'साधक हृद्गत पित्तम्'। यह बुद्धि, मेधा और स्वाभिमान को जागृत रखकर मनुष्य को अपने अस्तित्व की लडाई लडने मे सफल बनाता है। हृदय-रोग मे इसका हास होता है।

४ हृदय ओज का भी स्थान है। ओज प्राणो का आधार है। यह दीघँ जीवन देता है और शरीर को रोगो के आक्रमण से बचाता है। ओज के नाश से मृत्यु हो जाती है। हृद्रोग मे ओज क्षय होता है।

५. हृदय मे अवलम्बक कफ भी रहता है, जिस पर प्रभाव पडने से हृदय-शून्यता हो जाती है। ६ हृदय मे प्राणवायु का स्थान है तथा हृदय प्राणवहस्रोतस् का मूल है। अतः हृद्रोग में श्वासकष्ट भी होता है।

७ हृदय रसवहस्रोतोमूल है। उसमे संगात्मक विकृति बाने पर रस की एक देशीय वृद्धि के रूप मे पादशोय तथा रसक्षय होने पर हृद्द्रवत्व (Palpitation of the heart) होता है।

८. विभिन्न रोगावस्थाओं में हृदय सम्बन्धी निम्न लक्षण मिलते हैं, जैसे-

१. हृद्ग्रह समानावृत अपान, प्राणसवृत उदान, अश्रुनिग्रह, प्रमेहोपद्रव,उन्माद-पूर्वेरूप, वातार्श, सहजार्श, अपस्मार-पूर्वेरूप।

२ हृद्रोग वातज ग्रहणी, मदात्यय, कोष्ठाश्रित वात, वीजोपघातज क्लैब्प, कृमिज छदि।

३. हृद्द्रव वातप्रधान अर्श, विप-वेग, रसक्षय।

४ हृत्स्पन्दन पाण्डु-पूर्वेरूप । ५ हृद्घट्टन हृद्विद्रधि ।

६. हृत्पीद् वातिक ग्रहणी, मूच्छी-पूर्वरूप, श्वास-पूर्वरूप, वातिक छदि ।

७. हृदयशूल वातिक कास, असाध्य अर्थ, वातज उदावतं, बद्धगुदोदर, अज्ञात दक्षोदर, मक्कलशूल, वातज अरोजक, गुल्म-सप्राप्ति, आमजा तृष्णा, त्रिदोपजा तृष्णा ।

८ हृद्व्यया विष ।

९ हृद्वेदना वातज प्रदर । १०. हृत्पीडन इवास-पूर्वेरूप ।

११ हृदयोपताप सहजार्श्व, वमन, विरेचन ।

१२ हृद्दाह् पित्तज गुल्म, अम्लपित्त ।

१३ हृदयोपरोध आमाशय-प्रविष्ट विष ।

१४ हृदयापर्कातक अतिक्षार प्रयोग।

१५. ह्दयोपशोषण हिक्का, श्वास ।

१६ सशुष्क हृदय क्षय, तृष्णा।

१७ हुन्मोह कुण्डलिका।

१८ ह्दयगौरव आमवात, शासाश्रित कामला।

हृद्रोग का चिकित्सासूत्र

- १ प्रात काल खुली हवा मे या उद्यान में टहलना चाहिए।
- २ सगयशव (हौलदिल पत्थर) की चौकोर चौकी पहननी चाहिए, जो छाती पर हृदयस्थल का स्पर्श करती रहे।
- २. प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और स्वच्छ प्राणवायु (आक्सीजन) को असन से भीतर में भरे।
 - ४. वस स्पल पर वातनाशक तैल या मोम तैल का अभ्यंग करे।

- ५ निदान का दृढतापूर्वक परित्याग करना चाहिए।
- ६: रोगी को विश्राम करना चाहिए।
- ७. अधिक बोलना, जोर से बोलना, भाषण-प्रवचन बन्द करे।
- ८ दौड-धूप का काम, क्रोध, चिन्ता, ईर्ष्या-द्वेष से दूर रहे।
- ९. स्त्री-प्रसङ्ग और कामुक वातावरण को एकदम त्याग दे।
- १०. बाहार-विहार मे सयम और नियन्त्रण रखे।
- 99 दोष और शरीर वल का विचार कर सशोधनकर्म करे।
- १२ सशमन उपचारार्थं आँवंले क्या मुरब्बा, गुलकन्द, चन्दन का अवलेह, दही की साढी, मक्खन-मिश्री का प्रयोग करें । '
 - १३ मकान के निचले तल्ले मे निवास करे।
 - १४ ऊँची सीढी पर न चढे, बोझ न उठावे।
 - १५. भूखा न रहे और न ही डटकर खाना खाये।
- १६ किसी विवाद, समस्या या उलझन या उद्देगजनक कार्य मे न उलझे। किसी के प्रति असम्मान न प्रकट करे, न ही शिकायत या आलोचना करे, और न किसी की बिखया उधेरे।
 - १७ अप्रिय वचन, गाली-गलीज, झगडा, तकरार से बाज आवे।
 - १८ ईश्वर या अपने इष्टदेव का स्मरण करे तथा मन मे निराशा न लावे।
 - १९ उपकार, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री और सहानुभूति का भाव रखे।
 - २० स्वाघ्याय, सत्सग, सुहृद्गोष्ठी मे अधिक समय व्यतीत करे।
- २१. बलकारक एव रसायन औषघो का प्रयोग करना चाहिए। जैसे—च्यवनप्राश, अश्वगन्छ चूर्ण, नागबला चूर्ण और अर्जुन चूर्ण श्रेष्ठ हैं।
- २२ वातानुलोमन एव मृदुरेचक योग दे। जैसे--वैश्वानर चूर्ण या शिवाक्षार-पाचन चूर्ण या मुनक्का-गुलकन्द आदि। '
- २३ मनोविकार से उत्पन्न हृद्रोग मे प्रसन्नताजनक सवाद, प्रहर्षण उपाय, मधुर सगीत, धैर्य और आश्वासन लाभकर है।
- २४. सहज-जन्मजात हृद्रोग (Congenital heart disease) मे रसायन एव बल्य औषद्यो (मुक्तापिष्टी, प्रवालपचामृत बादि) का सेवन, विश्राम, कोष्ठशुद्धि, समुचित आहार-विहार एव पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिए।
- २५ उच्च रक्तनिपीडजन्य हृद्रोग (Hypertensive) मे वातरोग की चिकित्सा करे, क्योंकि इसमें वात की अधिकता होती है।
- २६. आमवातज ह्व्रोग (Rheumatic heart disease) मे आम का पाचन, अग्निदीपन एवं एरण्डतैल-प्रयोग आदि आमवातघ्न उपचार करे।

सामान्य चिकित्सा

१. अर्जुन-अर्जुन हृद्रोग की सफल औषध है। इसके पत्र का स्वरस १ तोला

समान मधु से दे अथवा अर्जुन की छाल का चूर्ण ३ ग्राम १० ग्राम घी के साथ दूष के अनुपान से सवेरे-शाम दे।

- र. अर्जुनक्षीरपाक अर्जुन की छाल का चूर्ण २५ ग्राम, दूध ४०० मि० ली०, जल १ लीटर ६०० मि० ली० मिलाकर पाक करें। जब केवल दूध बचे, तो छानकर सबेरे-शाम पिलावे।
- ३. शालिपणी-बला-पष्टीमधु या लघुपचमूल—अर्जुन क्षीरपाक की तरह इनमें से किसी भी औषध से सिद्ध दूध पिलावे ।
- ४ गेहूँ का हलवा—गेहूँ का आटा ६० ग्राम और अर्जुन की छाल का चूर्ण १५ ग्राम लेकर घी मे भूने। जब लाल हो जाये और सुगन्ध आने लगे तव २५० मि० ली० गाय का दूध तथा ६० ग्राम चीनी डालकर पतला हलवा बनावे। ठडा होने पर बलामूल चूर्ण और कमलगट्टे का चूर्ण ६–६ ग्राम तथा २० ग्राम मधु मिलाकर २५० मि० ली० दूध के साथ खिलावे।
 - ५ नागबला-इसका चूर्ण ४-४ ग्राम सवेरे-शाम दूध से देना चाहिए।
- ६ ककुभादि चूर्ण-अर्जुन की छाल, दूधिया वन, वरियार की जह, नागवला (गुल्शकरी) की जह, वहा हर्रा का छिलका, कचूर, पोहकरमूल, पीपर और सोठ का समभाग का चूर्ण करे। इसकी ३ ग्राम की मात्रा १० ग्राम धी तथा १० ग्राम चीनी के साथ दिन मे ३ बार दे। यह सर्वेविध हृद्रोगनाशक है।
- ७ रजतिवद्भुमयोग-प्रवालिपिष्टी १ ग्राम और चाँदी का वक ५ ग्राम लेकर गुलावजल मे घोटकर वारीक करे। सवेरे-शाम २५० मि० ग्रा० की मात्रा मे आँवले के एक मुरब्वे के साथ खिलावे। यह हृदय-बलवर्षक है।
- ८ मृगश्रुंग भस्म अन्त पुटपक्व मृगश्रुग भस्म १ ग्राम तथा रसिसन्दूर रे ग्राम लेकर घोटकर ४ मात्रा बनावे । ३-३ घण्टे पर ४ बार घी और चीनी के साथ खिलावे ।
- ९ नागार्जुनाभ्र (श्वासरोगाधिकार)—यह बलप्रद और हुध है। दिन में ३ बार २०० मि० ग्रा० की मात्रा मे घी से देना चाहिए।
- १० रस-औषध-ह्दयाणंव रस, प्रभाकर वटी, चिन्तामणि रस, विश्वेश्वर रस, ह्दरोगरत्नाकर, काशीसादि वटी, हृदयरत्न चूर्ण, अर्जुन एत और अर्जुनारिष्ट, ये सर्वेविद्य हृदरोग मे लाभकर हैं।
- १९. हिंग्वादि चूर्णं, पाठादि चूर्णं और हिङ्गूग्रगन्द्यादि चूर्णं का प्रयोग लाभप्रद है।

व्यवस्थापत्र

१ प्रात -साय मकरध्वज २०० मि० ग्रा०, प्रवालपिष्टी ५०० मि० ग्रा० हृदयार्णंव रस ५०० मि० ग्रा०

कायचिकित्सा

मृगम्हग भस्म १ ग्राम ककुभादि चूर्ण ४ ग्राम २ मात्रा

घी-चीनी से खाकर अर्जुन-सिद्ध दूध पीना चाहिए।

२. भोजन के पूर्व २ बार
यवानीषाडव चूर्ण ८ ग्राम
विना अनुपान । २ मात्रा

३. भोजनोत्तर २ बार अर्जुनाद्यरिष्ट <u>३० मि० ली०</u> समान जल मिलाकर पीना । २ मात्रा

४. अपराह्ण ४ वजे आँवले का या सेव का मुख्बा या गोधूम का हलवा।

५. रात मे सोते समय चन्द्रप्रभावटी २ गोली दूध से ।

- ६. अचानक घबडाहट, न्यग्रता, तनाव आदि होने पर सेव का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा या छेने की मिठाई खाने को दे तथा पीने के लिए अजवायन का अर्क वेदमुष्क या अर्क सौंफ अथवा अर्क पुरीना या गुलाबजल मिलाकर शीतल जल पिलावे।
- ७ शिर मे विष्णु तैल या चन्दनादि तैल की मालिश करे।

विशिष्ट चिकित्सा वातज हृदरोग

9. वातज हृदय के रोगी को पहले वमन कराते हैं, क्यों कि सिद्धान्त के रूप में । यह माना गया है, कि स्थानीय दोष का उपचार करके ही विकृत दोष या रोग की चिकित्सा करनी चाहिए—'स्थानिन प्रतिकृत्य च'। यद्यपि हृदय का अवलम्बन करनेवाला अवलम्बक कफ उर स्थ होता है, अत उसके प्रतिकार के लिए वमन कराना उपयुक्त है।

२. वमन — वातज हृद्रोगी का विधिवत् स्वेहन करने के पश्चात् उसे दशमूल के क्वाथ मे मदनफल चूर्ण ६ ग्राम, बच ३ ग्राम, सेंधानमक १३ ग्राम और तिलतैल २० मि० ली० मिला-पिलाकर वमन कराना चाहिए।

३. वमन के बाद पिप्पल्यादि चूर्णं—िपप्ली, छोटी इलायची, वच, हीग, यवक्षार, सेंघानमक, सोचरनमक, सोठ और अजवायन, इनके समभाग मे लेकर बनाये गये चूर्णं को १ ग्राम की मात्रा मे दिन मे २-३ बार देवे। इसके अनुपान मे नीबू का रस या अनार का रस या मोसम्मी का रस या कुलथी का यूष अथवा आसव. पिलाना चाहिए।

४. पुष्करमूलािं चूर्णं—पोहकरमूल, विजीरे की जड, सोठ, कचूर, हरें, इनके समभाग मे लेकर बनाये गये चूर्णं को १ ग्राम की मात्रा मे सवेरे-शाम यवसार, घी या नमक के साथ दे।

५ पुष्करादि क्वाथ में सोठ, जीरा, वालवच, अजवायन, यवाखार ५००-५०० मि० ग्रा० प्रत्येक और सेंघानमक २ ग्राम मिलाकर सवेरे-शाम पिलावे।

६. हरीतक्यादि चूर्ण—हर्रे का वक्कल, मीठावच, रास्ना, पीपर, सोठ, कचूर, पोहकरमूल, इनके समभाग के चूर्ण को १-२ ग्राम की मात्रा मे सबेरे-शाम घी मिलाकर दे।

७. शुण्ठी—सोठ के क्वाय मे घी तथा सेंधानमक डालकर सेवन करना हुद्रोगनाशक है।

वातज हृद्रोग मे व्यवस्थापत्र

१. प्रात-साय

ष्टहद् वातिचन्तामणि २५० मि० ग्रा० चिन्तामणि रस २५० मि० ग्रा० मुक्तापिष्टी २५० मि० ग्रा० २ मात्रा

ककुभादि चूर्णं १ ग्राम और घी के साथ दे।

२ ९ वजे व २ बजे

मृगन्ध्रग भस्म ५०० मि० ग्रा० पुष्करमूलादि चूर्णं ४ ग्राम

मधु से।

४ मात्रा

३ भोजनोत्तर २ वार

दशमूलारिष्ट

३० मि० ली०

समान जल मिलाकरं पीना। २ मात्रा

४ रात मे सोते समय 'हिंगुद्धिरुत्तरादि चूर्णं २ ग्राम जल से ।

पित्तज हृद्रोग

- १ वसन—पित्तज हृद्रोग मे गम्भार का फल या जह तथा मुलहठी के क्वाथ मे मदनफल चूर्ण ६ ग्राम, मधु और चीनी मिलाकर वमनार्थ पिलावे।
 - २ विरेचन---निशोथ चूर्णं ६ ग्राम के साथ खिलावे।
 - ३ काकोल्यादिगण से सिद्ध घृत को दूध मिलाकर दे।

ŧ

४ पीने के लिए षडगपानीय या सींफ का अर्क या अजवायन का अर्क दे।

कायचिकित्सा

५. अर्जुन की छाल का चूर्ण २० ग्राम को २०० मि० ली० दूध और ८०० मि० ली॰ जल में एक साथ दुग्धाविशर्ष्ट पकाकर छानकर चीनी मिलाकर पकावे।

अर्जुन के चूर्ण को ३ प्राम की मात्रा मे घी या चीनी से या गृह से या दूध से या जल से दिन मे ३ वार दे।

६ पित्तज हृद्रोग मे शीतल प्रलेप एव शीतल परिषेक हितकर है।

७ मुनक्का, फालसा, अगूर, सेव का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, दूध, घी आदि पित्तनाशक आहार-विहार का सेवन करना चाहिए।

वित्तज हुव्रोग मे व्यवस्थापत्र

१ प्रात-साय

२५० मि० ग्राव प्रवालपञ्चामृत 🕡 सगयशव पिष्टी २५० मि० ग्रा० अकीकपिष्टी २५० मि० ग्रा० श्वेतचन्दन चूर्ण २ ग्राम २ मात्रा

र्वावले के मूरव्वे के साथ।

२. भोजन के पूर्व यवानीपाडव चूर्ण

बिना अनुपान ।

३ भोजन के वाद अर्जुनाद्यरिष्ट

३० मि० ली०

समान जल मिलाकर पीना । २ मात्रा

४. रात मे सोते समय अविपत्तिकर चूर्ण

३ ग्राम

सुखोष्ण दूध से।

कफज हृद्रोग

१ कफज हृद्रोग मे स्नेहन-स्वेदन कराकर वच का चूर्ण ३ ग्राम और मदनफल का चूर्ण ६ ग्राम मिलाकर मधु से खिलाकर वमन कराना चाहिए और वमन द्रव्य खिलाने के पूर्व रोगी को दूध या गन्ने का रस भरपेट पिलाना चाहिए।

२. त्रिवृतादि चूर्ण-निशोथ, कचूर, वरिआर की जड, रास्ना, सोठ, हरें तथा पुष्करमूल के समभाग मे बनाये गये चूर्ण को २-२ ग्राम की मात्रा मे सर्वरे-शाम मध्रु से दे।

१ ज्ञीना प्रदेहा परिषेचनानि तथा विरेकी हृदि पित्तदुष्टे। द्राक्षासिताक्षौद्रपरूषके स्यात् शुद्धे च पित्तापहमन्नपानम् । पिष्ट्वा पिबेद् चापि सिताजलेन यष्टयाह्नयं तिक्तकरोहिणीच्च ॥ मै० र०

३ सूक्ष्मैलादि चूर्ण-छोटी इलायची और पिपरामूल को समभाग मे लेकर चूर्ण कर १-१ ग्राम की मात्रा दिन मे २-३ वार घी से चटावे।

४. विष्यत्यादि चूर्ण---२ ग्राम मधु से प्रात -साय देनी चाहिए।

५. कृष्णावि चूर्ण-पीपर, कचूर, पोहकरमूल, रास्ना, वच, बडा हर्रा का छिलका और सोठ, इनके समभाग का वारीक चूर्ण करे।

इस चूर्ण को ३ ग्राम की मात्रा मे गरम जल से दिन मे ३ वार दे।

कफज हृद्रोग मे व्यवस्थापत्र

१ प्रात-साय

हृदयार्णेव रस २०० मि० ग्रा० चिन्तामणि २५० मि० ग्रा० प्रवालभस्म २५० मि० ग्रा० २ मात्रा

पिपरामूल चूर्णं ५०० मि० ग्रा॰ तथा पुष्करमूल चूर्णं १ ग्राम मधुके साथ।

२ ९ वजे व ३ वजे

अकीकभस्म २५० मि० ग्रा० मुक्ताभस्म २५० मि० ग्रा० ७ २ मात्रा

१५ ग्राम च्यवनप्राश और मधु से।

३ भोजनोत्तर २ बार

सारस्वतारिष्ट <u>१५ मि० छी०</u> समान जल के साथ पीना । १ मात्रा

४. रात में सोते समय हिंगूग्रगन्धादि चूर्णं ३ ग्राम सुखोज्ण जल से ।

त्रिदोषज हृद्रोग

९ त्रिदोवज हृद्रोग मे आवश्यकतानुसार उपवास करना चाहिए और त्रिदोष-शामक आहार-विहार तथा औषध का सेवन करना चाहिए। तीनो दोषो मे हीन, मध्य और प्रवल विचार कर तथा प्रधान एव गौण दोष की समीक्षा कर तीनो दोषो की चिकित्सा करे।

२. पुष्करमूल चूर्ण ३-३ ग्राम मधु से सवेरे-शाम दे।

३ गेहूँ के १०० ग्राम बाटे मे २० ग्राम अर्जुन चूर्ण मिलाकर घी तेल मे भूनकर १०० ग्राम चीनी डालकर छोटी इलायची का चूर्ण १ ग्राम डालकर हलवा बनाकर जलपान के रूप मे २ बार दे।

- ४ नागवला का चूर्ण ३-३ ग्राम २ बार देना चाहिए।
- ५ मृगर्श्वंग भस्म २५० मि० ग्रा० मधु से दिन मे ३-४ बार देना चाहिए।

त्रिदोषज हुद्रोग में व्यवस्थापत्र

१ प्रात, मध्याह्न, सार्य

सिद्धमकरध्वज ३०० मि० ग्रा० योगेन्द्र रस ३०० मि० ग्रा० विश्वेश्वर ३०० मि० ग्रा० हृद्रोगरत्नाकर ३०० मि० ग्रा०

३ मात्रा

अर्जुन चूर्ण १ ग्राम, पुष्करमूल चूर्ण १ ग्राम, बलादि घत १० ग्राम और चीनी १० ग्राम के साथ।

२ ९ बजे २ वजे दिन

सगयशव पिष्टी ३०० मि० ग्रा० **अकीकपिष्टी** २०० मि० ग्रा० ५०० मि० ग्रा० **प्रागभस्म** हृदयार्णव २५० मि० ग्रा० २५० मि० ग्रा० प्रवालपचामृत

२ मात्रा

पुष्करमूलादि चूर्णं २ ग्राम और मधु से।

३ भोजनोत्तर २ बार

अर्जुनाद्यरिष्ट ३० मि० ली० समान जल मिलाकर पीना। २ मात्रा

'४. रात मे सोते समय

कुटकी चूर्णे २ ग्राम यष्टीमघु चूर्ण १ ग्राम चीनी मिलाकर जल से। १ मात्रा

आमवातजन्य हृद्रोग मे व्यवस्थापत्र

१ दिन मे ३ बार

आमवातारि है ग्राम २०० मि० ग्रा० अग्नितुण्ही वटी महायोगराज गुग्गुलू १ ग्राम ३०० मि० ग्रा० प्रभाकर वटी

हृद्रोग, हुच्छूल तथा हृदयाभिघात

कल्याणसुन्दर ३०० मि० ग्रा० प्र्युगमस्म ६०० मि० ग्रा० ३ मात्रा

पुष्करमूलादि चूर्णं २ ग्राम और मघु से ।

२. भोजनोत्तर २ बार

दशमूलारिष्ट ३० मि० ली० २ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना ।

३ रात में सोते समय

वैश्वानर चूर्ण ५ ग्राम सुखोष्ण जल से। १ मात्रा

कृमिज हृद्रोग

- १ कृमिज हृद्रोग मे प्राय जब वायु का मार्ग रक जाता है, तो वह वायु आमा-शय मे प्रकृपित होती है। इसलिए शोधन, लघन तथा पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए।
- २ विरेचन—रोगी को तीन दिन तक दही-भात तथा तिल का लडू खिलावे। मासार्थी को मास-भात खिलावे। तत्पश्चात् उसे विरेचन औषध्र दे।

विरेचन योग—वायविडग, पलाशबीज प्रत्येक १-१ ग्राम, निशोध चूर्ण ४ ग्राम और चीनी ६ ग्राम, छोटी इलायची का चूर्ण ३ ग्राम मिलाकर खिलाने।

- ३ वायविडग १ ग्राम तथा कूठ १ ग्राम चूर्ण करके १००-२०० ग्राम गोमूत्र से सबेरे-शाम खिलावे।
- ४. जौ या गेहूँ के आटे मे १०-२० ग्राम वायविडंग चूर्ण मिलाकर रोटी बनाकर खिलावे।
- ५. पुष्करादि क्वाय-पोहकरमूल, कागजी नीबू के पेड की छाल, पलाशबीज, वायविडञ्ज, करञ्ज का फल, कचूर, देवदारु, सोठ, जीरा और वच, इनको समभाग लेकर भूसा की तरह कूटकर रख लेवे। २०-२५ ग्राम लेकर विधिवत् क्वाथ वनाकर है ग्राम यवक्षार और है ग्राम सेंधानमक डालकर सवेरे-शाम पिलावे।
 - ६. पिप्पल्यादि चूर्णं या कृष्णादि चूर्णं २-२ ग्राम प्रात -सायं खिलावे ।
- ७. कृमिमुद्गर, कृमिकालानल, कुवेराक्ष वटी, करञ्जादि वटी, नवायस लौह बादि का रोगी के वलावल का विचार कर उचित मात्रा मे प्रयोग करना श्रेयस्कर है।

कायचिकित्सा

व्यवस्थापत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४ बार

कृमिमुद्गर रस १ ग्राम पलाशबीज चूर्ण ४ " श्रुगभस्म १ " अर्जुन चूर्ण ४ " मधु से। ४ मात्रा

२ भोजनोत्तर---

बर्जुनारिष्ट १५ मि० ली० विडङ्गासव <u>१५ मि० ली</u>०

समान जल मिलाकर पीना । २ मात्रा

रात मे सोते समय
 आरोग्यर्वीं वटी १ ग्राम
 सुखोष्ण जल से।

पथ्य

अगहनी चावल, जो, जागल मास, परवल, करेला, मरिच, सेंघानमक, मुनक्का, तक्क, पुराना गुड, सोठ, अजवायन, लहसुन, हरें, कूठ, तुम्बुर, कूठ, अनार, अमलतास, नई मूली, अदरक, सिरका, मधु और मद्य हितकर हैं। स्वेदन, विरेचन, वमन, लंघन, वस्ति का प्रयोग पथ्य है।

अपध्य

तृष्णा, छर्दि, सूत्र, मल, अपान वायु, शुक्र, कास, उद्गार, श्रमज श्वास और आंसुओ का रोकना अहितकर है। सह्य और विन्ध्य पर्वत की नदियों का जल, भेड दूध, दूषित जल, कषायरस के पदार्थ, विरोधी आहार, उष्ण, गुरु, तिक्त, अम्ल द्रव्य, पत्रशाक, शुष्क शाक, क्षार, महुए का फल, दतवन और रक्तस्रावण अपथ्य है।

हुच्छूल निदान और संप्राप्ति

मिध्या आहार-विहार से कुपित हुए कफ और पित्त से अवरुद्ध हुआ वायु रस से मिश्रित होकर हृदय में स्थानसध्य कर वहाँ शूल उत्पन्न करता है। इस शूल की पीडा के कारण उस रोगी का उच्छ्वास (Expiration) अत्यधिक रुक जाता है। आहार रस और वात से उत्पन्न होने वाले इस रोग को हुच्छूल कहते हैं।

कफिपत्तावरुद्धस्तु मारुतो रसमृच्छित ।
 द्विदस्थ कुरुते शूळमुच्छ्वासारोधकं परम् ॥
 स् हृच्छूळ इति ख्यातो रसमारुतसम्भव ॥ द्व० उ० ४२।१३२

सप्राप्ति

मियाहार-विहार निदान-अफ-पित्तप्रकोप-वात का अवरोध

|
वायु का आहार रस से सम्मूच्छेंन
|
वात का हृदय मे स्थानसंश्रय
|
उच्छ्वासावरोध सह शूल
|
हुच्छूल रोग

दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १ दोप-शिदोप प्रकोप वात-प्रधान।
- २. दूष्य--रस।
- ३. अधिष्ठान—हृदय ।

यसच्य--- यह ह्च्छूल ह्दरोग से भिन्न है। इसके कारण और लक्षण भी अलग हैं। एते आधुनिक भाषा में एञ्जाइना पेक्टोरिस (Angina pectoris) कहते हैं। एम मूल का प्रारम्भ उर फलक (Sternum) के उपरितन तथा पृष्ठ भाग से होता है। ध्रमजनक कार्य करने से इसके आवेग या दौरे आते हैं। यह शूल वक्ष (छाती) में पाम चाहु के आभ्यन्तर भाग से होता हुआ अगुल्यग्र तक पहुँच जाता है। कभी-कभी ग्रीम के वामपाइवं में भी इसकी पीडा का अनुभव होता है। प्राय हृदय की रागाहिनियों में विकृति होने के प्रधात् प्राणवायु की कभी होने के फलस्वरूप यह अवग्या उत्पन्न होती है। ध्रासावरोध होना हुच्छूल का प्रधान लक्षण है।

चिकित्सा

- १. ६ च्यूल की चिकित्सा हृदरोग के अनुसार करनी चाहिए।
- र हृदय कर का स्थान है तथा कफन रोगों में वमन प्रशस्त माना गया है तथा वात पित भी जब हृदयस्य हो, तो उनकी भी चिकित्सा स्थानीय अर्थात् हृदय के अगुनार ही यमन द्वारा शोधन करके करनी चाहिए—

'गम्प्रस्य च विनाशार्थं यमन शस्यते बुधै'। तथा—'स्यानिस्यानगत दोप स्यानिवत् समुपाचरेत्'।

ै यमन—रोगी का स्नेहन तथा हलका स्वेदन करके उते दशमूल क्याय में एउ और सेंवानमक मिलाकर आक्ष्य पान कराकर मदनकल चूर्ण ६ ग्राम मधु से परादे।

यावदीय से पीटित हृदयरोगी को वमन कराने का विधान है—
'वासोपसृष्टे हृदये यामयेत् स्निग्धमातुरम्।
द्विपरामुशीनवायेन सस्तेहुरावणेन पा'

कायचिकित्सा

४ श्रृंगमस्म — मृगश्रुङ्ग भस्म २५० मि० ग्रा० और अर्जुन चूर्ण २ ग्राम मधु से ३-३ घण्टे पर दिन मे ४ बार देना चाहिए।

५. अर्जुनादि चूर्णं, पुष्करमूलादि चूर्णं, अर्जुनघृत, प्रवालभस्म, मुक्ताभस्म, हृदयार्णंव, प्रभाकर, हृद्रोगरत्नाकर, रत्नेश्वर आदि का रोगी के वलावल का विचार कर प्रयोग करना चाहिए।

न्यवस्थापत्र

' १ रससिन्द्रर ३०० मि० ग्रा० सभ्रम भस्म २०० मि० ग्रा० भूगमस्म १ ग्राम दहत्कस्तूरीभैरव ३०० मि० ग्रा० हृदयार्णव २ ग्राम ३ ग्राम

अर्जुन चूर्णे २ ग्राम और मधु से दिन में ३ बार दे।

२ भोजन के बाद २ बार

अर्जुना**रिष्ट**

३० मि० ली०

२ मात्रा

समान जल मिलाकर पिलाना।

३ हुच्छूल प्रदेश पर— हल्के हाथो से अभ्यञ्ज —लाक्षादि तैल, महानारायण तैल, विषगमं तैल या कपूर मिलाकर तारपीन के तेल की मालिश करनी चाहिए।

पथ्यापथ्य - हृद्रोग मे कथितानुसार।

हृदयाभिघात

लक्षण

हृदय पर अभिघात होने (चोट लगने) से कास, श्वास, शारीरिक बल का हास, कण्ठ का सूखना, क्लोम के अद्योभाग मे आकर्षण होने की तरह वेदना, जिह्ना का बाहर की ओर निकलना, मुख और तालु का सूखना, अपस्मार, उन्माद, प्रलाप एवं संज्ञानाश आदि लक्षण होते हैं।

चिकित्सासूत्र

हृदय एक मर्गेस्थान है और इसकी विशेष रूप से वायु से रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वायु की यथास्थिति से ही जीवन रक्षित रहता है और प्राणवायु का स्थान हृदय है। वायु ही पित्त और कफ को भी प्रकुपित करता है। इसलिए वायु को अपने प्राकृत स्वरूप मे रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। वायु के विकार को दूर करने के लिए 'वस्ति' सर्वोत्तम उपाय है। 'वस्ति' के दो भेद हैं—१ आस्थापन और २ अनुवासन।

चरक-विमानस्थान, अध्याय ८ मे छ आस्थापन और दो अनुवासन वस्तियाँ बतलायी गई हैं। पचकर्म मे कुशल चिकित्सक को इस ममेंस्थान की रक्षा के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए और वातव्याधि मे जो चिकित्सा कही गई है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए।

चिकित्सा'

१ हृदयाभिघात मे घी मे भुनी हीग २५० मि० ग्रा० को कालानमक २५० मि० ग्रा० के साथ घोटकर विजीरा नीवू के रस या खट्टे अनार के रस या अर्जुनारिष्ट १५ मि० ली० मे मिलाकर दिन मे २–३ बार पिलाना चाहिए।

२ लघुपचमूल के क्वाथ में अर्जुन चूर्ण ३ ग्राम और चीनी मिलाकर प्रात साय पीने को दे।

३ वृहत्पचमूल के क्वाथ में बनाया हुआ गेहूँ के आटे का पतला हलवा जलपान के रूप मे सवेरे-शाम खिलाना चाहिए।

४. ह्दयरोग के प्रसिद्ध सिद्धयोगो (हृद्रोगरत्नाकर, हृदयाणंव, विश्वेश्वर, प्रमाकर, श्रृगभस्म, प्रवालभस्म, चिन्तामणि, ककुभादि चूणें, पुष्करमूलादि चूणें, अर्जुनपृत, बलापृत, श्रदष्ट्रापृत, अर्जुनारिष्ट, दशमूलारिष्ट, च्यवनप्राशावलेह आदि का यथायोग्य प्रयोग करे।

५ पय्यापय्य पहले कहे गये हृद्रोग के अनुसार जानना चाहिए।

१ प० सि भ० ९।

अष्टाद्श अध्याय

रक्तिप्त, कामला, कुम्भकामला तथा हलीमक रक्तिवन

परिचय—विना किसी बाहरी आघात या चोट के शरीर के भीतरी कारणो से होनेवाले रक्तस्राव को रक्तिपत्त कहते हैं। शरीर के ऊपरी भाग (मुख, नाक, आंख और कान) से तथा निम्न भाग (मूत्रेन्द्रिय, योनि और गुदा) से अथवा सभी रोमकूपो से रक्तस्राव का होना रक्तिपत्त है। इस रोग मे दुष्टिपत्त से दूषित रक्ति। किसी भी मार्ग से निकलने लग जाता है।

जिन रोगो में शुद्ध रक्त का स्नाव होता है, उन रोगो के नाम के पहले रक्त शब्द लगाया जाता है, जैसे—रक्तार्श, रक्तातिसार, रक्तष्टीवन, रक्तवमन आदि । किसी भी रक्तस्नावी रोग में जब तक रक्त पित्त से दूषित नहीं होगा, तब तक उसे रक्तपित्त नहीं कह सकते ।

इस प्रकार दुष्टिपित का प्रवृद्ध रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलना रक्तिपत्त है। यह एक महारोग है।

निरुक्ति या निर्वचन-आचार्यं सुश्रुत ने-'रक्तश्व पित्तश्व इति रक्तपित्तम्' ऐसा द्वन्द्वसमास करके रक्तपित्त की निरुक्ति बतलायी है।

आचार्य खरक ने कहा है—'ससर्गात् लोहितप्रदूषणात् लोहितगन्धवर्णानुविधानाच्च पित्त लोहितपित्तम् (रक्तपित्तम्) इत्याचक्षते (च० न० २।५)। चरक-टीकाकार चक्रपाणि ने रक्तपित्त शब्द की तीन प्रकार की निरुक्ति की है—१. 'रक्तपुक्त पित्तं रक्तपित्तम्, इति प्रथमा निरुक्ति । २. 'रक्ते दूष्ये पित्तम्, इति द्वितीया'। ३ 'रक्तवत् पित्त रक्तपित्तम्, इति नृतीया निरुक्ति । (च० नि० २।५ पर चक्रपाणि) इनका तात्पर्यं क्रमश इस प्रकार है—१ पित्त का रक्त के साथ सयुक्त रहने से इसे रक्तिपत्त कहते हैं। २. रक्त दूष्य मे पित्त मिलकर रक्त को दूषित करता है, इसलिए इसे रक्तिपत्त कहते हैं। ३ रक्त के ससर्ग से पित्त भी गन्ध-वर्ण मे रक्त के समान हो जाता है, इसलिए भी इस रोग को रक्तिपत्त कहते हैं।

रक्तिपत्तिकित्साध्याय मे चरक ने पूर्वोक्त तीन कारणो के आधार पर रक्तिपत्त नाम रखे जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है—

'सयोगाद् दूषणात् तत्तुं सामान्याद् गन्धवर्णयो । रक्तस्य पित्तमास्यात रक्तपित्त मनीषिभिः ॥' च० चि० ४

9 सयोगात्—इस रोग में पित्त रक्त के साथ सयुक्त होता है, अर्थात् रक्त और पित्त मिल जाते हैं।

२. दूषणात् — इस रोग में पित्त के द्वारा रक्त की दुष्टि होती है।

३ गन्धवर्णयो सामान्यात्—रक्त और पित्त समान गन्ध और वर्ण के होते हैं। दोष और दूष्य मे गन्ध और वर्ण की समानता होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- १ चरकसहिता निदानस्थान २।
- २ ,, ,, चिकित्सास्थान ४।
- ३ सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र ४५।
- ४ अष्टाङ्गहृदय निदानस्थान ३।
- ५ ,, ,, चिकित्सास्थान २।
- '६ माधवनिदान रक्तपित्तनिदान ।

रक्तपित्त का विप्रकृष्ट निदान

प्राचीनकाल मे दक्षप्रजापित के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के क्रोध और अमर्ष (अक्षमा-अशान्ति) रूपी अग्नि से सतप्त शरीर और प्राणवाले प्राणियों मे ज्वर के बाद रक्तपित्त का प्रकोप हुआ।

वक्तव्य—रक्तपित्त रोग को महागद (महान् रोग), महान् वेगवाला और आग को लपट वाला, जैसे देखते ही देखते आग सब कुछ जलाकर खाक बना देती है, उसी तरह शीघ्र ही शरीर को नष्ट करनेवाला कहा गया है।

चरकसिहता (चि॰ अ० ४।३-४) के अनुसार रक्तिपत्त रोग का उपदेश पश्चगङ्ग प्रदेश (पजाब) में किया गया है। ऐसा लगता है, कि पजाब में हजारों वर्ष पूर्व यह रोग होता रहा है। सुश्रुत ने भी इस रोग के निदान में क्रोध का प्रथम उल्लेख किया है। क्रोध में अग्नि का ज्वालामुखी वसता है। क्रोध और तीक्ष्ण-उष्ण-क्षार-लवण-अम्ल-कटुरसप्रधान आहार आज भी पजाब के खान-पान में देखा जाता है। चाट, मसालहोसां, गुलगप्पा और किस्म-किस्म के पकौडे खाना उस प्रदेश के निवासियों की आदत है और क्रोध-त्रास-आतक तथा तीखे आहार-विहार रक्तिपत्त को उजागर करनेवाले प्रधान कारण हैं। आज आतन्द्व और त्रासदी की दमधोद्व जिन्दगी (जो पजाब की भूमि में) जीने की मजबूरी है, उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। अन्तर यह है कि अब पजाब में रक्तिपत्त का दूषित रक्त नहीं, अपितु शुद्ध रक्त का स्नाव हो रहा है।

रक्तपित्त का निदान

- 9. आहार—जई, वनकोदो, सेम, उडद, कुलथी, खट्टी दही, सूकर, भैंस, मछली का मास, सरसो, लहसुन, सिहजन तथा उष्ण, तीक्ष्ण, लवण, अम्ल, कटु एव क्षारीय पदार्थों का अधिक सेवन, सिरका, सुरा, विरुद्ध वस्तुत्रो का एक साथ भोजन बादि।
- २ विहार -- व्यायाम, अधिक पैदल घलना, अतिध्यवाय, घूप मे रहना, अग्नि के संपर्क मे रहना आदि ।
 - २. मानसिक निदान--क्रोझ, समय, भय, नास, शोक सादि । २२ का० द्वि

उक्त निदानों के अभ्यास से पित्त प्रकुपित हो जाता है और रक्त भी अपने प्रमाण से अधिक बढ जाता है। शरीर में रक्त का प्रमाण बढने पर कुपित हुआ पित्त पूरे शरीर में फैलकर यकृत् एवं प्लीहा से उत्पन्न होनेवाले रक्त को वहानेवाले स्रोतों के मुख को रोक देता है, तब वही पित्त रक्त को दूषित करता है।

रक्तिपत्त की संप्राप्तिर

पूर्वोक्त पित्त-प्रकोपक कारणों से बढा हुआ पित्त जब अपने स्थान से निकलकर रक्त छातु में मिल जाता है, तब तक वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में जाकर और अधिक रूप में बढ जाता है और उसे दूषित भी कर देता है। उस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं से रक्त में द्रवाश का खिचाव होता है, जिससे रक्तवाहिनियों में रक्त की दृद्धि हो जाती है। पित्त सामान्य प्रमाण से अधिक रक्त होने के कारण गौरव तथा तनावयुक्त रक्तवहस्रोतों को अवरुद्ध कर सगात्मक विकृति उत्पन्न कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप सिरा-धमनी तथा कोशिकाओं के फटने से रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति होती है।

• वक्तव्य—पित्तप्रकोपक आहार-विहार से रक्त अधिक मात्रा मे बनता है, किन्तु वह विदग्ध होता है। अतएव उसमे मलल्प पित्त की भी अधिक उत्पत्ति है। इसकी उपस्थिति मे रक्त मे जलीयाश का सन्तुलन घट जाता है। रक्त मे जलीय सन्तुलन बनाये रखने के लिए मास आदि धातुओं के जलीयाश का रक्त मे शोषण होता है, जिससे रक्त का प्रमाण और भी बढ जाता है। परिणामस्वरूप रक्तवहस्रोतोगत भाराधिक्य के कारण उत्पन्न तनाव एव पित्त की अधिकता के कारण रक्तवाहिनियों की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनसे रक्त का क्षरण होने लगता है। इसी पित्त-मिश्रित रक्त की प्रवृत्ति को रक्तपित्त कहते हैं।

रक्तवित्त की गति और उसकी संप्राप्ति

रक्तिपत्त की गति या मार्ग दो हैं-- १. ऊपर से और २ नीचे से।

- 9 जिस व्यक्ति के शरीर में कफ की अधिकता होती है, उसके शरीर में कफ के मसर्ग से ऊपर जाता हुआ रक्तिपत्त दोनो नासिका, दोनो कान, दोनो नेत्र और एक मुख—इन सात छिद्रों से निकलता है।
- २. अधिक वायुवाले शरीर मे वात के ससर्ग से नीचे जाकर वह रक्तिपत्त मूत्रमार्ग और गुदा (तथा योनि) से निकलता है।

एवन्त्र कफाधिक और वातप्रधान शरीर में कफ वात के ससर्ग से ऊपर और

१ च० चि० २।४ तथा सु० उ० ४५।३-४ एव मा० नि० रक्तिपत्त ।


२ तेहेंतुभि समुल्किण्ट पित्तं रक्त प्रपद्यते । तद्योनित्वाद प्रपन्न च वर्षते तद्य प्रदृषयत् ॥ तुस्योष्मणा द्रवो थातुर्धातीर्धातो प्रसिच्यते ।

^{&#}x27; स्त्रिमृतस्तेन' संदृद्धि भूयस्तदिभगच्छति ॥ च० च० ४।७-८

रक्तपित्तरोग

नीचे वह दोनो मार्गों से निकलता है। कदाचित् बढा हुआं वह रक्तिपत्त शरीर के सभी छिद्रो या रोमकूपो से निकलने लगता है।

संप्राप्ति-१ स्निग्ध और उष्ण आहार-विहार से प्रायः कव्वंग रक्तिपत्त तथा २. रूक्ष और उष्ण आहार-विहार से अधीग रक्तपित्त होता है।



१ प्रकुपित पित्त से विदग्ध हुआ रक्त आमाशय से ऊपर की ओर जाकर मुख, नासिका, नेत्र और कर्ण से निकलता है।

२ प्रकृपित पित्त से विदग्ध हुआ रक्त पक्वाशय से नीचे की ओर जाकर मूत्रमार्ग, गुदा और योनि से वाहर निकलता है।

३. आमाशय एव पक्वाशय दोनो मे विदग्ध हुआ रक्त ऊर्घ्व तथा अध दोनो मार्गों से प्रवृत्त होता है।

४ कुछ बाचार्यं कर्घ्वं तथा अध इन दोनो मार्गों से होने वाली रक्तिपत्त की गति को यक्कत् और प्लीहा से मानते हैं।

सम्प्राप्तिचक्र---

१ तीक्ष्ण-चष्ण-अम्ल-लवण-क्षार-प्रधान एव विरुद्ध आदि आहार २ सूर्यंताप, अग्निताप, श्रम, मार्गेगमन, अतिव्यवाय आदि विहार निदान– --पित्तप्रकोप----रक्त का ३ क्रोध-शोक-भय-अमर्ष-द्वेष-त्रास आदि सयोग, दूषण एव मानसविकार गन्ध-वर्णसाम्य रक्तदहस्रोतस् क्षोभ पित्तदुष्ट रक्त का क्षरण

बोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १. दोष--पित्तप्रधान ।
- २ दूष्य--रक्त।
- ३ स्रोतस्—रक्तवहस्रोतस्।
- ४. अधिष्ठान--यकृत्, प्लीहा, रक्तवाहिनिया । '
- ५. स्रोतोदुष्टि-लक्षण-सग-विमार्गगमन ।
- ६. आम-पक्वाशयोत्थ व्याधि ।
- ७. आशुकारी महागद।

वक्तम्य—विभिन्न कर्म्बंग या अधोग रक्तस्रावो मे निकलनेवाले रक्त की परीक्षा करके यह निश्चय कर लेना चाहिए कि यह रोग रक्तिपत्त है अथवा अन्य किसी कारण से रक्तस्राव हो रहा है। जैसे—

- १. नासाप्रवृत्त रक्तस्राव (Epistaxis) के स्थानीय तथा सार्वदैहिक—दो प्रकार के कारण हैं। नासा पर आघात तथा रक्तवाहिनीगत अर्वृद आदि स्थानीय कारण हैं। सार्वदैहिक कारणो मे रक्तचाप की वृद्धि, कालाजार, घातक पाण्डु, कामला और पैत्तिक रक्तस्राव-प्रवृत्ति आदि रोग हैं। आँख और कान से रक्तस्रुति बहुत कम देखने में आती है।
- २. मुखप्रवृत रक्तस्राव यह आमाशय तथा श्वासप्रणाली से होनेवाला स्नाव है। बिना खाँसी के आमाशय से होनेवाले रक्तस्राव को रक्तवमन (Haematemesis) कहते हैं। खाँसी के साथ श्वासप्रणाली की कोशिकाओं के फटने से कफ के साथ या कभी-कभी बिना कफ के भी आनेवाले रक्त को रक्तष्ठीवन (Haemoptysis) कहते हैं।
 - ३. कान से बहनेवाले रक्त को आटोरेजिया (Otorrhagia) कहते हैं। ये सभी ऊर्ज्यंग रक्तपित्त या रक्तस्राव के रोग हैं।

अधोग रक्तिपत्त या रक्तस्राव के निम्नलिखित रोग हैं—(१) मूत्रेन्द्रियप्रवृत्त रक्त को हीमेत्रूरिया (Haematuria) कहते हैं। (२) आर्तवकाल में प्रवृत्त अत्यधिक रक्तस्राव को मेनोरेजिया (Menorrhagia) कहते हैं। (३) आर्तवकाल के अतिरिक्त काल में प्रवृत्त योनि से होनेवाले रक्तस्राव को मेट्रोरेजिया (Metrorrhagia) कहते हैं। इनके अतिरिक्त सरक्ता प्रवाहिका, रक्तातिसार, रक्ताशं और दुष्ट गुद्रवृण में भी गुदामार्ग से रक्त निकलता है, जिनके भिन्न-भिन्न लक्षण होते हैं।

इनमे रक्तपित्त का रक्त है या इन रोगों के कारण रक्त निकल रहा है ? यह भेद इन रोगों के लक्षण मिलाकर तथा रक्तपित्त की विशिष्ट संप्राप्ति एवं पित्त द्वारा रक्तदुष्टि और ग्रुद्ध रक्त की प्ररीक्षा कर तथा सापेक्ष रोग-निदान से जानना चाहिए।

सापेक्ष निवान

रक्तपित

रक्तस्रावी अन्य रोग

- १. रक्तिपत्त के रक्त से मिले अन को कीआ-कुत्ता आदि नहीं खाते।
- कौआ-कुत्ता आदि नहीं खाते। २. रक्तरजित वस्त्र सूखने पर गरम जल

से घोने पर दाग नहीं छूटता।


- ३ रक्तपित्त के पूर्व रूप मिलते हैं।
- ४. रक्तिपत्त के लक्षण मिलते हैं।
- १ इनके रक्त से मिश्रित अन्न को फीए-कुत्ते खाते हैं।
- २, इनके रक्त का दाग नहीं पडता।
- ३. नहीं मिलते हैं।
- ४ अपने-अपने रोग के लक्षण मिलते हैं।

रक्तपित के पूर्वरूप

- १ भोजन में अनिच्छा।
- २. भोजनोत्तर कण्ठदाह।
- ३ खट्टे सिरके जैसी डकार।
- ४ बार-बार वमन होना।
- ५ घृणायुक्त वमन होना ।
- ६. स्वर भेद ।
- ७. अगो मे शिथिलता।
- ८ हाय-पर मे जलन।
- ९ मुख से घुँआ-सा निकलना ।

- १०. मुख से लोहा, रक्त, मछली बीर अपच की-सी गन्ध माना।
- ११ शरीर के अगो, मल-मूत्र-स्वेद-लाला एव मुख-नाक-कान-नेत्र के मलो को रक्त, हरित, हारिद्र वर्ण होना।
- १२ अग-अग से वेदना होना।
- १३ स्वप्न मे रक्त-नील-पीत-श्याववर्ण तथा तेज चमकती चीजो का बार-बार देखना, ये रक्तपित के पूर्वरूप हैं।

दोषानुसार रक्तपित्त के भेद



वातज रक्तपित्त का लक्षण

१ व्यात्रवर्ण-मिश्रित (मटमैला) रक्तत्रणं, २ झागदार, ३ पतला और ४. रूक्ष रक्त का स्नाव हो, तो उसे वातिक रक्तपित्त जानना चाहिए।

पैत्तिक रक्तपित्त का लक्षण

१ वरगद की छाल के काढे के रग का, २ काले रग का, ३ गोमूत्र के रग का, ४ चिकना काला, ५. घर के घुँए के झाले के रग का अथवा ६. अजन के सद्त्र काले वर्ण का रक्त निकले, तो उसे पैत्तिक रक्तपित्त जाने ।

कफज रक्तपित का लक्षण

१ गाढा, २. पाण्डुवर्ण, ३. स्नेहयुक्त और ४ पिच्छिल रक्त का स्राव हो, तो उसे कफन रक्तपित्त समझना चाहिए।

द्वन्द्वज रक्तपित्त का लक्षण

9 वात और पित्त, २ वात और कफ तथा ३ पित्त और कफ, इन दो-दो दोषों के सम्मिलित लक्षणों को देखकर द्वन्द्वज रक्तपित्तों को जाने।

सन्निपातन रक्तपित्त का लक्षण

तीनो दोषो के (प्रकृतिसमसमवायारव्य) लक्षणो को देखकर सिन्नपातज रक्तपित्त जानना चाहिए।

रक्तपित्त के उपद्रव

दुर्बलता, श्वास, कास, ज्वर, वमन, मद (हलका नशा जैसा), पाण्डुता, दाह, मूर्च्छा, भोजन का विदाह, धैयें का ह्रास, हृदयस्थल मे असह्य पीडा, प्यास, अतिसार, शिर मे ताप की अधिकता, दुर्गन्धित यूक निकलना, आहार से द्वेप, भोजन का न पचना और मासप्रक्षालन के जल के वर्ण का रक्तस्राव होना, ये रक्तिपत्त के उपद्रव हैं।

दोष, लक्षण और मार्ग-भेद से रक्तपित्त की साध्यासाध्यता

ृ १. एकदोषज, २ बलवान् रोगी, ३ अल्पवेग, ४ नवीन रोग, ५ उपद्रवरहित, ६ हेमन्त और शिशिर ऋतु मे उत्पन्न तथा ७ अध्वेंग रक्तिपत्त साध्य होता है।

याप्य

१ द्विदोषज, २ अल्पबल रोगी, ३ मध्यवेग ४ अनवीन रोग, ५ अल्प उपद्रव, ६ शीतिभिन्न ऋतुज तथा ७ अद्योग रक्तिपत्त याप्य होता है।

वक्तक्य—(१) अर्ध्वा रक्तिपत्त में कफ और पित्त का ससर्ग रहता है, अत. इस अवस्था में कफ और पित्त का हरण करने वाले, कषाय तथा तिक्तरस प्रधान अविष्व द्रव्यों का सुलभता से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त (२) पित्त के व्हरण के लिए 'विरेचन' को श्रेष्ठ और प्रधान उपचार वतलाया गया है—'विरेचन पित्तहराणाम्' (च० सू० २५।४०), तदनुसार विरेचन के प्रयोग से पित्त का आसानी से शमन किया जा सकता है और पित्त का हरण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्तिपत्त की चिकित्सा में (३) रोगमार्ग के विपरीत मार्ग से दोष-

१ दौर्बन्यमासकासन्वर्वमशुमदाः पाण्डुतादाहमूर्च्छां भुक्ते होरो विदाहस्त्वधृतिरिप सदा दृष्णुल्या च पीडा । तृष्णा कोष्ठस्य मेद शिरसि च तपनं पृतिनिष्ठीवनत्वं मक्तद्वेषाविपाकौ विकृतिरिप सवेद् रक्तिपत्तोपसर्गा ॥ सु० उ० ४५

हरण का सिद्धान्त अपनाने का निर्देश है— 'प्रतिमागं च हरण रक्तपित्ते विधीयते'—
कर्ष्वंग रक्तपित्त का विपरीत मार्ग अधोग विरेचन ही होगा। इस दृष्टि से भी कर्ष्वंग
रक्तपित्त मे विरेचन की उपयोगिता होने से यह साध्य होता है।

अधोगं रक्तिपत्त में वात और पित्त का ससर्ग रहता है। यदि-—(१) इसमें प्रतिमार्ग-हरण सिद्धान्त के अनुसार अधोग के विपरीत ऊर्ध्वंग 'वृमन' कराया जाये, तो वह केवल वेगमार्ग का ही विरोधी होगा और वमन से न वात का और न पित्त का शमन या हरण होगा, अपितु वमन कराने से वात और पित्त के बढ़ने की संभावना होगी। (२) इसमें वात तथा पित्त की विशेषता रहती है और पित्तशामक कपाय, तिक्त, मधुर-रसो में से केवल एक मधुर रस ही वात को शान्त करता है। अत सीमित औषधों की उपलक्ष्यता और प्रतिमार्गहरण उपचार की अनुपयोगिता के कारण अधोग रक्तिपत्त याप्य है ।

असाध्य

- (क) १ त्रिदोषज, २ मदाग्नियुक्त, ३ अतिवेगयुक्त, ४ क्षीणगरीर, ५ वृद्धरोगी, ६ अनशनकारी, ७. रक्त-दृश्यदर्शी, ८ रक्त-आकाशदर्शी, ९ रक्तलोचन, १०. रक्तगन्धी उद्गार, ११ रक्तवमनकर्ता, १२. अतिदुर्गन्धित रक्तवमन, १३ सर्व उपद्रवयुक्त, १४. इन्द्रधनुष के समान विभिन्न वर्णयुक्त रक्तवमन, १५ मास-प्रक्षालित जल के समान, १६ कीचडयुक्त जल के समान, १७ चर्ची और पूय से मिश्रित रक्त के समान, १८. यकृत् खण्ड जैसा, १९ पके जामुन के फल के वर्ण का, २० काला या २१ नीला और २२ मुद्दें जैसी दुर्गन्ध वाला रक्तिपत्त का रक्त जिममे निकलता हो, २३ उभ्यमार्गी २४ रोमकूपप्रवृत्त रक्त और २५ अतिमाप्रवृत्त रक्त वाला रक्तिपत्त रोग असाध्य होता है।
- (ख) कभी-कभी साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं। जैसे— १ परिचारक (सेवा-टहल करने वाले) के न होने से, २. उपकरण (साधन) न होने से, ३. रोगी के अधीर होने से, ४. चिकित्सक के दोष से और ५ उचित चिकित्सा उपलब्ध न होने से कोई-कोई साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है।
- (ग) १. कभी अध्वंगामी रोग (रक्तिपत्त) अधोगामी हो जाता है, २ कभी अधोगामी कध्वंगामी हो जाता है, ३ कभी मार्ग-परिवर्तन होने पर अध्वं या अध गमार्ग बन्द हो जाता है और कभी ४ मार्ग-परिवर्तन होने पर अपना प्रधान मार्ग नहीं छोडता, यह स्थिति भी असाध्य है।
- (घ) उभयमार्ग (ऊर्ध्वंग एव अद्योग) से प्रवृत्त रक्तिपत्त मे पित्त के साथ वात और कफ की विशेषता रहती है। रक्तिपत्त मे प्रतिमार्गहरण का सिद्धान्त है, जो उभयमार्गी रक्तिपत्त मे चरितार्थं नहीं होगा। क्रयों कि यदि वमन कराया जाय या विरेचन कराया जाय, इन दोनों ही स्थितियों में अद्यक्त रक्तिस्नाव की सभावना

१ तत्रे यदूर्ध्वमार्गं तस् साध्य, विरेचनीपक्रमणीयत्वाद् वह्वीवधत्वाच्च । च० नि० २।९

२. च० नि० २।९

होने से जीवन-नाश का सशय है। दूसरी बात यह है, कि यह उभयमार्गी है 'बौर इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। क्यों कि समुब्द दोषों में सभी दोषों को जीतने वाली औषध देना ही उचित माना गया है और विरुद्ध मार्गगामी रक्तिपत्तोपयोगी औषध का अभाव है। अत वमन-विरेचन के अयोग्य तथा विरुद्धोपक्रम होने से द्विमार्गी रक्तिपत्त असाध्य होता है।

चिकित्सा-सूत्र

- 9 जगल की आग की तरह सत्यानाशी इस रोग की शान्ति हेतु सावधानी से प्रयत्न करना चाहिए।
 - २ देश, काल, प्रकृति, दोष आदि का विचार कर सन्तर्पण करे।
 - ३ मधुर-तिक्त-कषाय प्रधान रुचिकर गन्ध-वर्ण-रस युक्त मृदु आहार दे।
 - ४ शरीर पर शीतल प्रलेप तथा शीतजल से स्नान तथा परिषेक करे।
- ५ शीतल द्रव्यो के कल्क का अभ्यग, शीतजल सिश्वन, शीतजलावगाहन, शीतगृहशयन, शीतल विस्तरा की व्यवस्था करे।
- ६ धारागृह (जल का फुहारा लगा घर), भूमिगृह, सुन्दर बगीचा, जीतल जल और वायु, मोती-मूँगा की माला का धारण और स्पर्श मे जीतल तथा हिमजल-सिक्त वस्तुओ का स्पर्श हितकर है।
 - ७ कमल के पुष्प-पत्र और केले के पत्ते आसन एव शयन पर बिछावे।
- ८ निंदयाँ, बडे तालाब, हिमगिरि की शीतल गुफाएँ, खिली चाँदनी, फूले कमल तथा अन्य शीतल, मनोऽनुकूल दृश्य एव श्रवणीय प्रसङ्ग रक्तिपत्त के दाह का शमन करते हैं।
- ९. रुचिर गन्धी इत्र के अनुलेप से सुगन्धित, मनोहर वस्त्राभरण से विभूषित सुवदना, कोमलाङ्गी, मासल भुजा की स्वामिनी, मिष्टभाषिणी, सुहासिनी, सुवासिनी, सुनयना, पीनपयोधरा, प्रमदा जनो का साङ्ग स्पर्श तथा शिशिर जल सिक्त रक्त-कोकनद पुष्पी एव नीलसरोव्ह प्रसूनो के व्यजन से वीजित पवन का मृदुस्पर्श रक्त-पित्त के दाह का प्रशमन करता है।
- १०. बलवान् तथा भोजन करने वाले रोगी के बढे हुए रक्तपित्त के रक्तस्राव को ग्राही औषघो से पहले ही स्तम्भन न करे।
- ११. बल, मास और अग्नि जिनकी क्षीण न हो और दोष बढे हो, उनका अपतर्पण करे।

१ रक्तिपित्तं तु यन्मार्गी द्वाविप प्रतिपद्यते । स्रसाध्यिमिति तज्झेयं पूर्वोक्तादेव कारणात् ॥ निह्नं सशोधनं किञ्चिदस्त्यस्य प्रतिमार्गगम् । प्रतिमार्गं च हरणं रक्तिपत्ते विधीयते ॥ एवमेवोपशमन सर्वशो नास्य विद्यते । सस्ष्टेषु च दोषेषु सर्वं जिच्छमनं मतम् ॥ प्रतिमार्गं मत्तिमार्गं मत्तिमार्गं मतम् ॥ प्रतिमार्गं मतम् ॥ प्रतिमार्गं मत्तिमार्गं मतम् ॥ प्रतिमार्गं मतम् ॥ प्रतिमार्गं मतम् ॥ प्रतिमार्गं मत्तिमार्गं मत्तिमार्तिमार्गं मतम् ॥ प्रतिमार्तेमार्याः मत्तिमार्याः ॥ प्रतिमार्गं मत्तिमार्गं मत्तिमार्गं मत्तिमार्याः ॥ प्रतिमार्गं मत्तिमार्गं मत्तिमार्तेमार्तिमार्याः स्वार्याः सत्तिमार्याः सत्तिमार्तेमार्तेमार्तेमार्गं मत्तिमार्तेमार्याः सत्तिमार्याः सत्तिमार्

१२. बलवान् बहुदोष रोगी के अधोग रक्तिपत्त का वमन कराकर शोधन करे।
यदि कब्वंग हो तो विरेचन कराकर शोधन करना चाहिए।

१३ यदि वल-मासादि से सीण रोगी हो तो सशमन उपचार करे।

१४ रक्तिपत्त के निदान का सावधानी से परिवर्जन करे।

१५ दोषानुबन्ध एव निदान आदि की समीक्षा कर लघन या तपण प्रयोग करे।

१६ जो भी आहार-विहार हो वह रक्तिपत्तनाशक होना चाहिए।

१७. क्षीण वल-मास वाले रोगी के प्रवृत्त रक्तस्राव को शीघ्र रोकने का प्रयास करना चाहिए।

१८ वालक, वृद्ध, शोपरोग से पीडित व्यक्ति तथा वमन-विरेचन के अयोग्य रक्तपित्त के रोगी के प्रवृत्त रक्तस्राव को स्तम्भन औपघों का प्रयोग कर शीघ्र रोकना चाहिए।

१९ सामान्यत आम (अपक्व आहाररस) के कारण रक्त तथा पित्त उत्किल्प्ट होते हैं। अत आमपाचनार्थ सर्वप्रथम लघन (उपवास) कराना चाहिए।

२० कब्वंग रक्तिपत्त मे प्रारम्भ मे रोगी की प्रकृति, वलावल, दोप, सात्म्य, काल आदि का विचार कर एक दो भोजनकाल मे उपवास कराकर, धान के लावा के सत्तू को खजूर-मुनक्का-महुआ और फालसा डालकर निमित पडगपानीय मे घोल कर मधु-चीनो मिलाकर पिलावे। इस प्रकार तर्पण करने के प्रधात् विरेचन औपध का प्रयोग करे।

२१ अद्योग रक्तिपत्त मे विना उपवास कराये प्रारम्भ सें ही पेया का प्रयोग करना चाहिए, तत्पश्चात् वमन कराना चाहिए।

चिकित्सा मंशोधन-चिकित्सा

तर्पण

- १. अर्थंग रक्तिपत के रोगी को घान के लावा का सत्तू घोलकर घी-चीनी मिलाकर समय-समय पर पिलाना चाहिए।
- २. पिण्डखजूर, अगूर, महुआ का फूल और फालसा प्रत्येक २५-२५ ग्राम लेकर पीसकर चीनी मिलाकर क्षुधाभर पिलावे ।

पेयनल

रे हाऊबेर, लालचन्दन, खबा, नागरमोथा और पित्तपापडा का चूर्ण २५ ग्राम डालकर २ लीटर जल पकावे, आधा बचे तो छानकर ठडाकर थोडा-थोडा पीने के लिए दे।

रेवन

४ अमलतास की गुद्दो, आँवला और निशोध २०-२० ग्राम लेकर, आद्या लीटर पानी मे चतुर्थांशाविशिष्ट क्वाथ कर, उसमें मधु या चीनी मिलाकर पिलावे अथवा क्वेत और काली निशोध ४-४ ग्राम तथा पीपर २ ग्राम लेकर चूर्ण कर और ४ ग्राम त्रिफला चूर्ण मिलाकर १५ ग्राम चीनी तथा थोडा मधु मिलाकर मोदक बनाकर खिलावे जिससे विरेचन हो जाये।

फलरस

५ मोसम्मी, अगूर, सेव, मीठा अनार, इनका रस तथा ग्लूकोज का घोल दे। अरुचि

६ यदि मन्दाग्नि और अरुचि हो, तो फलरसो या तर्पण योगो को खट्टा अनारदाना चूर्ण या आमलक चूर्ण मिलाकर दे अथवा १--१ ग्राम यवानीषाडव चूर्ण खाने को दे।

पेया

७ अधोग रक्तिपत्त मे पेया, विलेपी या मण्ड पिलाना चाहिए। पुराना चावल, साठी का चावल लेकर लघुपचमूल से सिद्ध जल मे पतला द्रव बनाकर चीनी मिलाकर पिलावे अथवा कमल, पृश्विनपर्णी, खस, लोध, धावा का फूल, यवासा, बिल्वपत्र एव विरयार डालकर षडगपरिभाषा से पकाये गये जल मे पुराना चावल और मूँग की दाल डालकर खिचडी बनाकर खिलावे। पेया हो तो थोडा घी-चीनी और खिचडी मे घी, हलका नमक और थोडा खट्टे बनार का रस डालकर खिलावे।

८ पेया या खिचडी २ से ४ भोजन वेला मे देने के अनन्तर जब वमन कराना हो, तो पहले रोगी को भरपेट गन्ने का रस अथवा चीनी का शर्वत पिलाकर, मदनफल ६ ग्राम या मुलहठी ३ ग्राम चूर्ण करके मधु से चटाना चाहिए। तर्पण

९ अधोग रक्तपित्त मे खजूर, मुनक्का, मुलहठी और फालसा डालकर पकाये जल मे बनाये गये यूष या पेय को चीनी डालकर पिलावे ।

संशमन चिकित्सा

१ थोडा-थोडा वर्फं चूसने को दे। पूर्णं विश्राम करावे। ज्यादा न बोलने दे। शीतल स्थान, शीतल वायु, पेय और भोजन सभी कुछ शीतल दे।

२ रक्तरोधक औषध देने से सयोजक तन्तुओं का सकीच होकर और रक्त सयत होकर रक्तस्राव बन्द हो जाता है। अत क्षीण बल-मास रोगी, वृद्ध या बालक या भीरु रोगी को सशमन औषध देनी चाहिए।

शमन

३ अरूस के पत्ते को पुटपाक-विधि से पकाकर उसका रस निचोड कर मधु और चीनी मिलाकर पिलाने से भयकर रक्तपित्त भी शान्त हो जाता है। यह रस २० ग्रांम, १० ग्राम चीनी और १० ग्राम मधु से दिन मे ३ बार।

निसर्गोपचार

४ रोगी को चित्त लिटावे और पैताने की ओर इंट लगाकर उठा दे, सिरहाना नीचा रखे। शिर पर शीतल जल की पट्टी या अर्फ रखे।

५ दोनो पैरो को गरम जल में डुबोकर रखने से निम्न शाखा की शिराएँ प्रसारित होती हैं, फलत रक्त मस्तिष्क में से नीचे की ओर आ जाता है।

६. पृष्ठदेश की कशेरकाओं के ऊपर गरम जरु से सेंक करने पर मस्तिष्क में से रक्त शीघ्र ही नीचे की ओर आकृष्ट हो जाता है। रक्तरोधक योग

७ कठगूलर के २० ग्राम स्वरस मे १० ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ४ बार पिलावे।

८ पके गूलर, गम्भार के फल, हरीतकी, पिण्डखजूर अथवा मुनवका पीसकर खिलाने से रक्तिपत्त शान्त हो जाता है।

९ खदिर, प्रियगु और लाल कचनार के फूलो का चूर्ण मधु से दे।

[']१० गेंदे के पत्ते का रस २०–२० ग्राम दिन मे ३–४ वार पिलावे ।

११ सिघाडे का, धान के लावे का तथा नागरमोथे का मिलित चूर्ण ४ ग्राम कमलकेशर १ ग्राम और खजूर १५-२० ग्राम पीसकर मधु से सबेरे-शाम देवे ।

१२ कबूतर के बीट को ५०० मि० ग्रा० लेकर मधु से दिन मे ३-४ बार देवे।

१३ लाक्षा चूर्ण ५ ग्राम मधु से दिन मे २-३ बार देना प्रवल रक्तिपत्तशामक है।

१४. किसमिस, रक्तचन्दन चूर्ण, लोध बीर पियगु के सममाग का कल्क १० ग्राम, बक्से का रस १० ग्राम और १० ग्राम मधु मिलाकर चटाने से नाक-मुख-गुदा- मूत्रेन्द्रिय से गिरनेवाला रक्त अथवा शस्त्र द्वारा कटने से होनेवाला रक्तस्राव वन्द हो जाता है।

94 फिटकिरी का फूला और मिश्री समभाग मिलाकर 9-9 ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३-४ बार देने से रक्तवमन शीघ्र बन्द होता है।

१६ राल १ ग्राम और चीनी १ ग्राम मिलाकर दिन मे ३-४ वार देवे। यह

१७ गोदन्तीभस्म २५० मि० ग्रा०, राल ५०० मि० ग्रा० और यशदभस्म १२५ मि० ग्रा० की १ मात्रा आवले के १ चम्मच स्वरस और मधु से ३ बार प्रतिदिन दे।

१८ वासादि ववाय — अरूसे के पचाग के ५० मि० ली० क्वाथ मे नीलकमल के मूल की कालीमिट्टी-प्रियगु-लोध-कमलकेशर १-१ ग्राम, क्वेताञ्जनभस्म २५० मि० ग्रा०, चीनी २० ग्राम और मधु मिलाकर दिन मे ३ वार देने से रक्तिपत्त का वढा हुआ वेग एक जाता है।

१ नासाकषायोत्पलमृत्तियद्गुलोधाक्षनाम्भोरुष्टकेशराणि । पीत्वा सिताक्षीद्रयुतानि हन्यात् पित्तास्त्रज्ञो वेगमुदीर्णमाशु ॥ सु० ७० ४५।३६

9९ आटरूपकािव क्वाय — अरूसे की जड की छाल, मुनक्का और हरें, इनके समभाग के क्वाथ मे चीनी तथा मधु डालकर पिलाने से कास, श्वास तथा रक्तिपित्त रोग शान्त होते हैं।

२० खैर, प्रियगु, कचनार और सेमर के समभाग फूलो का चूर्ण ४-४ ग्राम मधु मिलाकर दिन मे ३-४ बार देना चाहिए।

२१. शखभस्म ५०० मि० ग्रा०, सुवर्णगैरिक १ ग्राम और दुग्वपाषाणपिष्टी ५०० मि० ग्रा० चीनी मिलाकर दिन मे ४ बार देना चाहिए।

२२. जामुन, आम और अर्जुन इन तीनों की छाल समानभाग में लेकर मोटा कूट ले। उसमें से ५० ग्राम लेकर ३०० मि० ली० जल में रात में भिगों दे और सबेरे मसलकर छानकर १०-१५ ग्राम चीनी मिलाकर पिलावे। इसी तरह सुबह का भिगोया शाम को पिलावे।

२३ रक्तवन्दन, मुलहठी और लोघ, इनके समभाग का चूर्ण ५ ग्राम मधु मिला मिलाकर ५० मि० ली० तण्डुलोदक दिन मे ३ बार पिलावे।

२४ करञ्जफलमज्जा चूणं ३ ग्राम, सँघानमक र ग्राम मिलाकर दही के पानी के साथ दिन मे ३ बार तीन-चार दिनो तक देवे।

२५. अति रक्तस्राव होने पर रोगी को तत्काल मारे गये वकरे अथवा एणमृग के रक्त में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। अथवा बकरी के ताजा निकाले हुए कच्चे यकृत् को पित्त के साथ खिलाना चाहिए।

२६ घोडे की लीद के स्वरस २० मि० ली० मे उत्तना ही मधु मिलाकर पिलावे।

२७ वथुवा के बीज का चूर्ण ३ ग्राम मधु से ३-४ बार प्रतिदिन दे।

२८ चौलाई के बीज का चूर्ण ३ ग्राम मधु से ३-४ बार दे।

२९ खैर, जामुन, अर्जुन, कचनार, शिरीष, लोघ, विजयसार, सेमर और सिहजन, इन सबके फूल समानभाग में लेकर, चूर्ण कर ४-४ ग्राम की मात्रा में दिन में ३-४ बार मधु के साथ दे।

२०. ह्रोबेरादि क्वाय—नेत्रबाला, नीलकमल, धनियाँ, रक्तचन्दन, मुलहठी, गुरुच, खश और निशोथ इनके विधिवत् वने क्वाथ में चीनी मिलाकर पिलाने से उग्र रक्तिपत्त का सद्य शमन होता है।

३१. सिद्धयोग—उशीरादि चूणं, किरातितक्तादि चूणं, सुधानिधि रस, चन्द्रकला रस, रक्तिपित्तान्तक रस, रक्तिपित्तकुलकण्डन रस, प्रवालपन्दामृत, सुवणंगेरिक, प्रवाल-पिष्टी, मुक्तापिष्टी, शुक्तिभस्म, तृणकान्तमणिपिष्टी, स्वणंमाक्षिकभस्म, सगजराहत-भस्म, बोलबद्ध रस, बोलपपेटी, वासाघृत, शतावरीषृत, दूर्वीदि घृत, उशीरासव, वासारिष्ट, समशकंर लौह, वासावलेह, कूष्माण्डावलेह, एलादि वटी, वासाकूष्माण्ड-खण्ड, अर्केश्वर रस, रसामृत रस, शतमूल्यादि लोह आदि का रोगी के दोष-बल,

१ आटरूपकमृद्दोकापथ्याक्वाथ सशक्रेर । मधुमिश्र. श्रासकासरक्तिपित्तनिवर्षण ॥ च० चि० ४।६५

प्रकृति के बनुसार उचित मात्रा और अनुपान से आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए।

लालनिक चिकित्सा

३२ रक्तपित्त के रोगी की तृषा में सुगन्धवाला, लालचन्दन, राश, नागरगोपा बौर पित्तपापडा डालकर पकाया हुमा जल पीने को दे या पित्तपापडे का अकं या सौंफ का मर्क या मिट्टी के घंटे में रखा जल पिलावे। अथवा—

३३. उज्ञीरादि पैय, प्रियंग्वादि पेय या बरियार के षवाय में मूँग की दाल, धान का लावा, जी, पीपर, खरा, चन्दन और नागरमोधा दालकर निर्मित भूतजीत कवाय पीने को देवे ।

३४. मूत्रमागं प्रवृत्त रक्तपित्त में पंचतृणमूल को या दासायर और गौरारू को अपना पर्णीचतुष्ट्य को क्षीरपाक-विधि से पकाकर प्रति दिन २-३ बार दे।

३५ बकरी का दूध या अनार के फूलो का रस और गिश्री मिलाकर उत्तरयस्ति देने से रक्त बन्द हो जाता है।

३६ प्रियंगु, भुनी फिटकरी, लोग बीर रसींत के मिलित १ ग्राम पूर्ण की अरूते के स्वरस और मधु से ३ बार रीज दे। इससे नासा-मुन्न-गुन्न-योनि-मेदू का रक्त एक जाता है।

रे७ गुदा के रक्तिपत्त में—१ मोचरस का या २. यट के वरोह बौर कुनगी का बयवा रे सुगन्धवाला, नीलकमल और सोठ का क्षीरपाक करके पान कराना चाहिए। अथवा—

३८. हीवेरादि नवाय, वासादि नवाय या उद्योरादि पूर्ण के क्वायजल को विलाकर उसी जल से चावल या पेया पकाकर खिलाना पाहिए।

३९ कफानुबन्धी रक्तिपत्त में यदि रक्त गौठदार होकर पण्ठ में एके, तो फमल के नाल का क्षार बनाकर १-१ ग्राम, विषम मात्रा में मधु घी से घटावे। अथवा--

४० कमलनाल, कमलकेशर, नीलकमलकेशर, प्रशास, प्रियगु, महुआ और विजयसार के मिलित क्षार को विषम मात्रा में मधु-धी मिलाकर चटाये।

४१ नासिकाप्रवृत रक्तपित में सहसा स्तम्भन न करे । इसके स्तम्भनार्य-

४२ नीलकमल का फूल, गेर, शल मस्म और सफेद चन्दन को चीनी के शर्वत मे पीस-छानकर रोगी को चित्त सुलाकर चूँद-चूँद नाक मे टपकावे। अथवा—

४३ लाम की गुठली का रम, लजालू का रस, धाय का फूल, गोचरस और पठानी लोध, इनकी चीनी के धर्वत में पीयकर नाक मे बूँद बूँद कर टपकावे।

४४ इसी प्रकार अलग-अलग--- १ अगूर का रस, २ गन्ने का रस, ३ गाम का दूध, ४. दूर्वीस्वरस, ५ प्याज का रस और ६ अनार की कली का रस बूँद वूँद कर टपकावे। अथवा---

४५. वांबले को चूर्ण कर घी में भूनकर पीसकर शिर पर छेप करे। यह छेप नाक से होने बाले रक्तमाब को रोकता है। ४६ अतिप्रवृद्ध रक्तिपत्त मे बोलपर्पेटी, चन्द्रकला रस, तृणकान्तमणि पिष्टी प्रत्येक २०० मि० ग्रा०, स्वर्णंगैरिक ३ ग्राम, लाक्षा चूर्ण ३ ग्राम की १ मात्रा मधु से चटाकर अरूसे का स्वरस २५ मि० ली० पिलावे।

४७ फिटकरी का फूला २५० मि० ग्रा०, राल चूर्ण 🞝 ग्राम, आंवले का चूर्ण १ ग्राम, प्रवालपिष्टी २०० मि० ग्रा० को वासाघृत से ३-४ वार देना चाहिए।

४८ सगर्भा के रक्तिपत्त में सुवर्णमाक्षीक भस्म २०० मि० ग्रा०, तृणकान्तमणि पिष्टी २०० मि० ग्रा०, चन्द्रकलारस २५० मि० ग्रा०, प्रवालपिष्टी २०० मि० ग्रा० सितोपालादि चूर्ण दे ग्राम की १ मात्रा मधु से दिन मे ४-५ बार देवे।

४९ अवरसत्त्व या नाजुक मिजाज रोगी को सगजराहत भस्म २५० मि० ग्रा०, प्रवालिपिष्टी २०० मि० ग्रा०, तृणकान्तमणिपिष्टी २०० मि० ग्रा० की १ मात्रा मधु से या गुलकन्द से या आंवले के मुख्बे से प्रति दिन ३-४ बार दे।

५० योनि मे दाह-कण्डू-रक्तस्राव होने पर शतधीत घृत का फाहा रखे। नस्य-पान या अभ्यग मे दूर्वादि घृत, जात्यादि घृत अथवा चन्दनादि तैल का प्रयोग करे तथा तृणकान्तमणिपिष्टी और प्रवालपिष्टी का उचित योग गुडूचीसत्त्व और मधु से ३-४ बार दे।

५९ नये तीव रक्तिपत्त मे तृणकान्तमणिपिष्टी, प्रवालपिष्टी, बोलबद्ध रस और छाक्षा चूर्ण एव अमृतासत्त्व का योग वासा-स्वरस और मधु से दे।

व्यवस्थापत्र

कर्ष्वंग रक्तपित्त मे

१ ३--३ घण्टे पर ४ बार

रक्तिपत्तकुलकण्डन ५०० मि० ग्रा० बोल पर्पटी १ ग्राम लाक्षा चूर्ण ४ ग्राम प्रवाल पिष्टी ५०० मि० ग्रा० गुद्ध स्वर्णंगैरिक २ ग्राम तृणकान्त पिष्टी ५०० मि० ग्रा० द्व के रस और मधु से । ४ मात्रा

२. प्रात -साय

कूष्माण्डखण्ड २०-२५ ग्राम अथवा--नारिकेल खण्ड <u>२०-२५ ग्राम</u> १ मात्रा

वकरी या गाय के दूध से या शृतशीत जल से।

३ भोजनोत्तर प्रशीरासव प्रशीरासव प्रशीरासव प्रशीरासव प्रशीसव प्राव्या प्रभान प्रशीना । २ मात्रा

रक्तिपत्त, कामला, कुम्मकामला समा हलीमक

प्रतिदिन न्ताना—एलादि वटी ३-४ ग्राम

अधोग रक्तिपत्त मे

१ ३-३ घण्टे पर ४ बार

कामदुघा रस ५०० मि० ग्रा० वोल पपंटी १ ग्राम स्वर्णमासीक भस्म ५०० मि० ग्रा० गुद्ध स्वर्णगैरिक १ ग्राम लासा चूर्ण २ ग्राम मोचरस ४ ग्राम ४ ग्राम

रसौत १ प्राम और मधु मे ।

२ भोजनोत्तर

लोझासव <u>४० मि० ली</u>० २ मात्रा

समान जल से पीना ।

३ प्रात-साय

उशीरादि चूर्णं <u>४ ग्राम</u> मधु से । २ मात्रा

पस्य

अल्ल-पुराना अगहनी या साठी का चावल, गेहूँ, जी, धान का छावा, मूँग मसूर।

शाक—परवल, लोकी, चौलाई, पतली मूली, प्याज, भगुआ, फचनार शय सेमर का फूल।

मांस —हिर्ण, खरगोश, जावा, तीतर, बटेर और जागल जीव ।

हुग्ध-वकरी या गाय का दूध, घी, मक्लन।

फल—वेदाना अनार, श्रांबला, खजूर, फालसा, सिंघाडा, कसेम्र, धसीट कमलगट्टा, मीठा अगूर, मुनक्का, किशमिश, कच्चे नारियल का पानी, गन्ने का रस चीनी, मिश्री।

अपच्य

आहार—कुलथी, उटद, सरसो, राई, लहसुन, सेम, कटु-अम्ल पदार्थ, ग मसाला, विरुद्ध भोजन, मछली, विदाही पदार्थ, मद्य ।

विहार—क्रोध, धूप-सेवन, आग के पास रहना, स्वेदन, मेथुन, धूम्मपान रक्तमोक्षण, मल-मूत्रादि वेगो को रोकना, भय, ष्यायाम, परिश्रम, पैदल चलना औ रक्तिपत्त के निदान मे कहे गये विषयों का स्याग करना चाहिए।

कामला

परिचय—नेत्र, त्वचा, मुखमण्डल और नख का हल्दी जैसे रग का हो जाना, शरीर की शिथिलता, भोजन मे अविच, आलस्य और मन्द-मन्द ज्वर बना रहना, ये सब कामलारोग के लक्षण हैं।

निदान—१ अति स्त्री-संभोग, २. अम्ल-लवण का अधिक सेवन, ३ मद्य-प्रयोग, ४ मिट्टी खाना, ५. दिवाशयन, ६. तीक्ष्ण पदार्थं का प्रयोग, ७ विरुद्ध आहार, ८. असात्म्य सेवन, ९. वेगावरोध और १० पाण्डुरोगी का पित्तवर्धंक पदार्थं खाना।

सामान्य लक्षण — १ नेत्र-त्वचा-मुख-नख का हरिद्रा वर्ण होना, २ मल-पूत्र का रक्तमिश्रित पीतवर्ण का होना, ३. शरीर का बरसानी मेढक जैसा पीला होना, ४. इन्द्रियो का अपना कार्य न करना, ५ दाह, ६. अपचन, ७. दुवंलता, ८. शरीर-शैथिल्य, ९ अर्चन, १० तन्द्रा और ११ बलक्षय।

• सन्दर्भ ग्रन्थ ्

- १ चरकसहिता चिकित्सा० १६।
- २. सुश्रुत उत्तरतन्त्र ४४।
- ३. अष्टाङ्गहृदय निदान० १३।
- ्४ " " चिकित्सा० १६।
 - ५ माधवनिदान।

वक्तव्य—'कामला' को पित्तज और रक्तज विकारों में गिना जाता है। कामला को पाण्डुरोग की प्रवर्धमानावस्था माना गया है। (१) चरक ने पाण्डुरोगी द्वारा पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन, (२) वाग्भट ने पित्तोल्बण पुरुषो द्वारा पित्तवर्धक पदार्थों का अधिक सेवन, (३) सुश्रुत ने किसी भी रोग से मुक्त होने पर पित्तवर्धक (अम्ल-तीक्षण एव अपथ्य) पदार्थों का सेवन करना कामला का निदान कहा है। इस प्रकार कामला एक पित्तप्रधान त्रिवोषज रोग है। चरक ने कामला को 'कोष्ट-शाखाश्रया' कहा है। जिससे विद्वानों ने कामला के २ भेद माने हैं—१ शाखाश्रया कामला और २ कोष्ठशाखाश्रया कामला।

कामला के भेद : निदान की दृष्टि से

१ स्वतन्त्र कामला, २ परतन्त्र कामला, ३. पाण्डुरोग बढकर हुई कामला, ४ पाण्डुभेद कामला (हारीत), ५ अन्य रोग के उपद्रवस्वरूप कामला।

१ पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निपेनते । च० चि० १६।३४

२ भवेत् पित्तोल्बणस्यासी पाण्डुरोगादृतेऽपि च । अ० ६० नि० १३।१७

३ यो धामयान्ते सहसाऽत्रमम्लमधादपथ्यानि च तस्य पित्तम् । करोति पाण्डुं वदनं विशेषात् पूर्वेद्वितौ तन्द्रिबलक्षयौ च ॥ छ० छ० ४४।११ ४. कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता । च० चि० १६।१६

लाक्षणिक भेद

१. शाखाश्रया कामला तथा २. कोष्ठशाखाश्रया कामला।

शाखाश्रया कामला की संप्राप्ति

जब रूक्ष, शीत, गुरु तथा मधुर आहारों के सेवन से, व्यायाम न करने से तथा पुरीय आदि के वेगों को रोकने से वायु प्रकुपित हो जाती है और वह कफ के साथ मिलकर याकृतिक पित्तवाहिनी में अवरोध उत्पन्न कर देती है, जिससे वह पित्त अन्त्रों में न जाकर रक्त में मिल जाता है और त्वचा में एवं नेत्रादि में पहुँचकर उनमें हरिद्रावणें ला देता है। याकृतिक पित्त का वर्णे हारिद्र होता है।

कफ, द्वारा पित्त के स्रोतस् के अवरुद्ध होने से पित्त के अन्त्रों में न पहुँचने के कारण पिसे हुए तिल के वर्ण का पुरीप आता है। दूसरी ओर रक्त में अधिक पित्त के कारण मूत्र अधिक गहरा हरिद्रावर्ण का होता है। होता यह है, कि पित्त दुष्टि-जनित अग्निमान्य से 'आम' वनता है, जिससे कफ में पिच्छिलता बढकर अवरोध या सग उत्पन्न होता है और परिणामस्वरूप वायु पित्त को रक्त में पहुँचा देती है। अत कामलारोग पित्तप्रधान होते हुए भी यह त्रिदोपज रोग है।

कोष्ट्रशाखाश्रया कामला की सप्राप्ति

पाण्डुरोग या किसी अन्य कारण से रक्तकण दुर्वल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पित्तवर्धक बाहार-विहार के सेवन से पित्त वढकर अपने जल्ण तथा तीहण गुण से जन्हें तोडने लगता है, जिससे याकृतिक पित्त अधिक वनता है और यकृत् अपनी शक्ति के अनुसार इस पित्त को अन्त्रों में भेजता है और कुछ अश रक्त के साथ भी मिलकर त्वचा आदि में चला जाता है। ऐसी स्थिति में मल का वर्ण भी हरिद्रावणीं होगा और त्वचा, नेत्र एव मूत्र का भी। अत यह कोष्ठशाखाश्रया कामला का रूप है। चरक ने 'पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निपेवते। तस्य पित्तमसृड्मास दण्टवा रोगाय कल्पते।।' इस कथन से उक्त अभिप्राय को ही प्रकट किया है। '

- वक्तव्य (१) पित्तवर्धक पदार्थों के अधिक सेवन से वढा हुआ पित्त अपने प्राकृतिक बाशय में न जाकर शाखागत हो जाता है एवं मार्ग के कफ से आवृत होने के कारण वह पुन कोष्ठ में नहीं आता। इस प्रकार शाखाश्रित कामला में पित्त कफ से आवृत होता है।
- (२) कामला मे एव अन्य रोगों में रक्तकणों के दूटने से मुक्त शोणवर्तुलि (Haemoglobine) से पित्तरिक्त (Bilirubin) भी अधिक मात्रा में बनती है। रक्तप्रवाह में इसकी उपस्थिति से जो कामला होता है, उसे शोणाशनजन्य (Haemolitic) कामला कहते हैं। यह कामला स्वतन्त्र न होकर पाण्डु की प्रमुद्धावस्था-विशेष एव परतन्त्र है।


१ अ० ह० चि० १६।४५-४८।

२ च० चि० १६।३४।

रेरे का० वि**०**

कायचिकित्सा

संप्राप्ति-चक



शाखाश्रित कामला के लक्षण

नेत्र, मूत्र, मुख, त्वचा मे हारिद्रवर्ण, पुरीष का क्वेतवर्ण, आटोप, विष्टम्भ, हृदय-प्रदेश मे भारीपन, दुवंलता, मन्दाग्नि, पार्व्यूल, हिक्का, श्वास, अरुचि और ज्वर होता है।

कोष्ट्रशाखाश्रित कामला के लक्षण

नेत्र, मूत्र, नख, त्वचा एव मुखं में हरिद्रावर्ण, मूत्र तथा पुरीष रक्तमिश्रित पीतवर्ण, बरसाती मेढक जैसे शरीर का पीला होना, दाह, अपचन, दुवंलता, थकावट, अरुचि और इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होना, ये लक्षण होते हैं।

कामला का असाध्य लक्षण³

जिस रोगी के मल-मूत्र कृष्ण एव पीत वर्ण के हो तथा जिमको शोथ हो गया हो अथवा जिसके नेत्र, मुख, मल, मूत्र और वमन रक्तवर्ण के हो, जिसे मूर्च्छा आती हो तथा जो दाह, अरुचि, प्यास, आनाह, तन्द्रा और मोह से ग्रस्त हो एवं जिसकी जठराग्नि और चेतना नष्टप्राय हो, वह कामला का रोगी असाध्य होता है।

शाखाश्रया कामला का चिकित्सासूत्र^४

१ कामला के रोगी का सर्वप्रथम स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन के लिए—

१ अ० ह० चि० १६।४७-४८।

र व० चि० १६।३५-३६।

३ च० चि० १६।३७-३९।

४ च० चि० १६।४०-४२।

- (क) पञ्चगन्य घृत (अपस्मार), (ख) महातिक्त घृत (कुष्ठ) अथवा (ग) कल्याण घृत (उन्माद) का प्रयोग करना चाहिए।
 - २ स्नेहन के बाद तिक्त द्रव्यों से वने मृदु विरेचन का प्रयोग करना चाहिए।
 - ३. स्नेहन और विरेचन प्रयोग के पश्चात् प्रशमन उपचार करना चाहिए।
- ४. वायु और कफ के शमन, अग्नि के दीपन, कफ के पाचन-विलयन तथा पित्त ेको कोष्ठ मे लाने के उपाय करने चाहिए।
 - ५ शासाश्रया कामला मे याकृतीय पित्तवाहिनी का मार्ग कफ से अवरुद्ध रहता है, अत (क) कफ का ह्रास कर मार्गावरोध दूर करने, (ख) पित्त की वृद्धि करने तथा (ग) वायु के निग्रह के लिए कटु-अम्ल-लवण-तीक्ष्ण एव उष्ण द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए।
 - ६. पित्त के स्वस्थान (कोष्ठ) मे आ जाने पर, पित्त द्वारा मल के रिञ्जित हो जाने पर तथा उपद्रवों के शान्त हो जाने पर सामान्य कामला रोग की चिकित्सा करनी चाहिए।
 - ७ दोषवृद्धि, विष्यन्दन, पाक, स्रोतोमुख-विशोधन तथा वायु के निग्रह उपक्रमो से दोष को शाखा से कोष्ठ मे लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

चिकित्सा र

- १ पित्त को कोष्ठ में लाने के लिए रूक्ष, अम्ल और कटु रसवाले द्रव्यों के साथ मोर, तीतर और मुर्गे का मासरस खिलाना चाहिए।
 - २ आहार के साथ सूखी मूली के यूष या कुलधी के यूष का सेवन करावे।
- ३ मातुलुङ्गादि योग—विजीरा या कागजी नीवू का रस ६ ग्राम, मधु ६ ग्राम, पीपर का चूर्ण ५०० मि० ग्रा०, मरिच ५०० मि० ग्रा० और सोठ का चूर्ण ५०० मि० ग्रा० मिलाकर दिन मे ३ वार सेवन करावे।
- ४ निशोथ का चूर्णं ४ ग्राम या इन्द्रवारुणीमूल चूर्णं ४ ग्राम अथवा सोठ का चूर्णं ३ ग्राम द्विगुण चीनी मिलाकर सवेरे-शाम खिलावे।
- ५. अमलतास के फल का गूदा २ ग्राम और त्रिकटु चूर्ण २ ग्राम गन्ने के रस से २ बार दे।
 - ६ कोष्ठ-कोधनार्थं इच्छाभेदी रस २५० मि० ग्रा० आधा गिलास शर्वंत से दे ।
 - ७ अन्य उपचार और पथ्य सामान्य कामला चिकित्सा की भौति करे।

सामान्य अथवा कोष्ठशाखाश्रया कामला की चिकित्सा

- १ सर्वप्रथम निदान का परित्याग करना चाहिए।
- २ महातिक्तघृत, पञ्चगव्यघृत, कल्याणघृत, हरिद्रादि घृत या द्राक्षादि घृत का

१ च० चि० १६।१३०-१३१।

र च० स्० २८।इर।

३ च० चि० १६।१२८-१२९।

सेवन कराकर रोगी का स्नेहन करे, फिर उसे तिक्त रसवाले द्रव्यो का प्रयोग कराकर विरेचन करावे, तत्पश्चात् शमन चिकित्सा करे।

- ३ विरेचनायं (१) निशोध का चूर्ण ६ ग्राम और १२ ग्राम चीनी मिलाकर खिलावे अथवा (२) इच्छाभेदी रस २५० मि० ग्रा० आधा गिलास शर्वत से देवे या (३) स्वर्णकीरी (भडभाड) का मूल, काली निशोध, देवदार बुरादा और सोठ इन्हे ६-६ ग्राम लेकर कल्क करके २०० मि० ली० दूध और ८०० मि० ली० जल मे दुग्धावशेष पकाकर चीनी डालकर पिलाना चाहिए।
- ४. (१) त्रिफला का चूर्ण ६ ग्राम दिन मे १ बार प्रात दे अथवा त्रिफला का क्वाथ पिलावे या (२) गुडूची का क्वाथ या (३) दारुहल्दी का क्वाथ या (४) नीम की पत्ती का स्वरस अथ्वा क्वाथ शीतल कर चीनी मिलाकर प्रतिदिन प्रात पिलावे।
- ५ (१) दन्तीमूल का ६ ग्राम कल्क १२ ग्राम चीनी के साथ दिन में २ वार देवे या (२) निशोथ के चूर्ण की २—३ ग्राम की मात्रा दूनी चीनी और त्रिफला क्वाथ से २ बार दे।
- ६. (१) पतली मूली का स्वरस ५० मि० ली० मे २० ग्राम चीनी मिलाकर २ बार दे या (२) गदहपुर्नामूल चूणं ६ ग्राम, मरिच चूणं ५०० मि० ग्रा०, चीनी ५० ग्राम में शबंत बनाकर २ बार दे। (३) द्रोणपुष्पी का शाक खिलावे। (४) दारुहल्दी और हल्दी का चूणं या क्वाय मधु से दे।
 - ७ रोगी को पूर्ण विश्वाम देना अत्यावस्यक है।

सिद्धयोग

- ८ 'नवायस लौह' बाधा ग्राम, 'पुनर्नवा मण्डूर' बाधा ग्राम, 'शख भस्म' २५० मि० ग्रा० की १ मात्रा पुनर्नवा स्वरस और मधु से देकर बाद मे फलत्रिकादि क्वाय सबेरे और शाम पिलावे।
 - ९ ज्वर रहने पर प्रात -साय 'सुदर्शन चूर्ण' ३-३ ग्राम सुखोज्ण जल से देवे।
 - १० 'योगराज' १ ग्राम की मात्रा दिन में ३ बार जल से देना चाहिए।
 - १९ 'शिलाजतुबटक' आधा ग्राम की १ मात्रा सबेरे-शाम गोदुग्ध से देवे।
- १२ 'धात्री लौह' आधा ग्राम दिन मे ३ बार मधु से देवे, बाद मे फलित्रकादि क्वाथ पिलावे।
- १३ कुमार्यासव, लोहासव, पुनर्नवासव या धात्र्यरिष्ट मि० ली० की १ मात्रा भोजनोत्तर २ वार समान जल मिलाकर पिलावे ।
- १४ 'क्षारोग्यविधनी वटी', 'लोकनाथरस', 'यक्तुत्प्लीहारि लौह' 'कालमेघ-नवायस' 'हरिद्रादि घृत' 'द्राक्षादि घृत' का प्रयोग लाभप्रद होता है ।
- १५. शतपत्रयादि योग-शतपत्रयादि चूर्ण (अजीर्णाधिकार) २ ग्राम, मीठा सोडा २ ग्राम मिलाकर दिन मे २ बार जल से देवे।

१६. अञ्जन-दोणपुष्पी (गूमा) की पत्ती के रस के अभाव में नीम की पत्ती के २-२ बूँद रस को आँख में सबेरे-शाम डाले।

१७ निशासञ्जन—हरूदी, गेरु और आँवले की समान मात्रा में साफ पत्थर पर घिसकर नेत्र में अजन करने से पीलापन दूर हो जाता है।

9८ नस्य—कर्कोट (ककोडा या खेखसा) की जड को पानी मे भिगोकर अथवा कडवी तरोई के सूखे फल को रात मे पानी मे भिगोकर, दूसरे दिन उसको छानकर नासिका में छोडने से पीलास्राव नाक से निकलकर नेत्र का पीलापन दूर होता है।

व्यवस्थापत्र

<u> </u>	
१. प्रात -सार्थ	
पुनर्नवा मण्डूर	५०० मि० ग्रा०
नवायस लोह	५०० मि० ग्रा०
श क्षभस्म	२५० मि० ग्रा०
	9 मात्रा
दारुहल्दी चूर्णे ३ ग्राम	और ६ ग्राम मध् से
२. तत्पश्चात्—फलत्रिकाति	दं क्वाध ५० मि ली०
मधु मिलाकर पीना ।	१ मात्रा
२. ९ बजे व २ बजे दिन	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
अग्नितुण्ही वटी	२५० मि० ग्रा०
कारोग्यवधिनी	१ ग्राम
कासीस भस्म	२५० मि० ग्रा०
लोकनाथ रस	२५० मि० ग्रा०
मधु से ।	२ मात्रा
४. भोजनोत्तर २ बार	
लोहासव .	५० मि० ली०
समान जल से पीना।	२ मात्रा
५ रात में सोते समय	
निफला चूर्ण	६ ग्राम
जल से।	

पच्य

१ पुराना चावल, जो, गेहूँ, मूँग, अरहर, मसूर, परवल, कच्चा केला, चौराई, पुननेवापत्र, द्रोणपुष्पी, पालक, बयुमा, लोकी, मूली, जीरा, लहसुन, हरें, सिघाडा, आंवला, अनार, मुनक्का, किक्कमिका, अजीर, सेव, पका पपीता, सन्तरा, पका आम, पुसम्मी, डाम, गोहुन्छ, गोछत, तक्क तथा मक्खन —इनका रोगी की प्रकृति, दोष आदि का विचार कर प्रयोग करे।

अपथ्य

रक्षमोक्षण, घूम्रपान, वमन का वेग रोकना, स्वेदन, मटर, सेम, सरसो का शाक, उडद, तिलखली, पान, सुरा, दिवाशयन, दुष्ट जल, गुरु एव विदाही द्रव्य, मैथुन, क्रोध आदि अपथ्य हैं।

कुम्भकामला का लक्षण

जब कामला रोग पुराना हो जाता है अथवा चिकित्सा मे उपेक्षा करने के कारण शरीर मे रूक्षता आ जाती है, क्यों कि पित्त मासधातु को भी दूषित कर देता है, अत शरीर के विभिन्न अवयवों में शोथ हो जाता है और सन्धियों में भेदन करने के समान पीडा होती है, तो इसे कुम्भकामला कहते हैं। यह कुच्छ्रसाध्य होता हैं।

वक्तव्य — कुम्भ का अर्थ घडा है। जैसे घडे मे भीतर खाली स्थान होता है, उसी तरह कोष्ठ मे भी भीतर खालीपन होने से कुम्भ शब्द का कोष्ठ के अर्थ मे प्रयोग किया गया है।

ज्ञातन्य है कि पहले शाखाश्रित पित्त कामला को उत्पन्न करता है और जब रोग पुराना हो जाता है, तो पित्त कोष्ठ में चला जाता है। इसी स्थिति का नाम कुम्भकामला है। इसके लक्षण में चरक ने रूक्षता का होना, वाग्भट ने शोथ की अधिकता होना और सुश्रुत ने महाशोथ तथा पर्वभेद का होना बतलाया है। इसमें त्वचा का वर्ण पीत तथा हारिद्र और वरसाती मेढक के समान गाढा हरिद्रावण होता है।

चिकित्सा

- १ इसमे कोष्ठशाखाश्रया कामला की सपूर्ण चिकित्सा करनी चाहिए।
- २ स्वर्णमाक्षिक भस्म २५० मि० ग्रा० की १ मात्रा मघु से चाटकर गोमूत्र २५ मि० ली ।
- ३ शुद्ध शिलाजीत ५०० मि० ग्रा० की १ मात्रा मधु से चाटकर २५ मि० ली० गोमूत्र सबेरे-शाम पीना।

४ मण्डूर को समभाग सेंघानमक के ढेले के साथ गोमूत्र मे १ मास तक भिगोकर, फिर निकालकर उसका वारितर भस्म बनाकर ३०० मि० ग्रा० की मात्रा में दिन मे ३ बार मधु से चटावे। सबेरे-शाम फलित्रकादि क्वाथ दे।

५ मण्डूर को बहेडे की लकडी की आँच पर आठ वार प्रतप्त कर गोमूत्र मे बुझावे। हर बार गोमूत्र बदल दे। फिर चूर्ण कर गोमूत्र की भावना देकर

१ कालान्तराव खरीमृता कृच्छ्र स्याव कुम्भकामला। च० चि० १६

२ उपेक्षया च शोफाट्या सा कृच्छा कुम्मकामला। अ० ६० नि० १३

३ मेदस्तु तस्या खछ कुम्मसाहः शोथो महास्तत्र च पर्वमेदः । सु० उ० ४४

१५-२० गजपुट देकर भस्म बनाकर ३०० मि० ग्रा० की मात्रा मे दिन मे ३ वार मघु से देवे ।

- ६ विमीतक लवण (सुश्रुत) ५०० मि० ग्रा० की मात्रा मे दिन मे २ वार मट्ठे में मिलाकर पिलाना चाहिए।
 - ७ प्राणवल्लम रस २५० मि० ग्रा० की मात्रा सवेरे-शाम मधु से देवे।
 - ८ हरिद्रादि घृत अथवा मूर्वादि घृत १० ग्राम की मात्रा मे सबेरे-शाम दूध से दे।
 - ९ बामलक्यवलेह १० ग्राम सवेरे शाम गोदुग्ध से देना चाहिए।
- १० पुनर्नवा मण्डूर १ ग्राम तक्र के साथ सवेरे-शाम देवे और रोगी को तक्र के पथ्य पर रखे।
- ११. नवायस लोह, धात्रो लोह, निशा लोह, विडङ्गादि लोह, कामलान्तक लोह, पुनर्नवादि मण्डूर और श्यूषणादि लोह का रोगी के दोष, वल आदि का विचार कर प्रयोग करना चाहिए।

१२ सागान्य कामला का पथ्य इसमे भी देना चाहिए।

व्यवस्थापत्र

१. प्रात -मध्याह्न-साय

मण्डूर भस्म

३ ग्राम

्मधुसे।

३ मात्रा

वाद मे गोमूत्र या फलत्रिकादि क्वाथ ५० मि० ली० पीना ।

२ ९ वजे व २ बजे

भारोग्यवधिनी वटी

१ ग्राम

सुखोष्ण दुग्ध या जल से।

२ मात्रा

३. भोजनोत्तर २ बार

लोहासव

1

४० मि० ली०

समान जल मिलाकर पीन।। २ मात्रा

४ रात मे सोते समय

अविपत्तिकर चूर्ण

४ ग्राम

्रमुखोष्ण दुग्ध से ।

हलीमक का लक्षण

जव पाण्डुरोग से पीडित व्यक्तियो का शारीरिक वर्ण हरा, श्याव तथा पीले वर्ण का हो जावे, वल-उत्साह का नाश हो जावे, तन्द्रा, मन्दाग्नि, मन्द-मन्द ज्वर, मैथुन में असमर्थता, अगमर्द, श्यास, तृष्णा, अरुचि और श्रम उत्पन्न हो जावे, तो उसे हलीमक रोग कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वात और पित्त की प्रधानता से होती है।

१ माथवनिदान--पाण्ड्वादिरोग-निदान।

वक्तव्य जब कुम्भकामला का रोगी मिथ्या बाहार-विहार करता है, तो उससे वात तथा पित्त का प्रकोप होकर उस रोगी का शरीर उसके नेत्र-नख-त्वचा आदि हरे, पीले और नीले वणं के हो जाते हैं, तब उसे 'हलीमक' कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा-विशान की दृष्टि से हलीमक को अवरोधजन्य पुराण कामला (Chronic obstructive jaundice) कह सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में भी रोगी का वणं गहरा हरा या श्यावपीत हो जाता है। कई विद्वानो ने इसे क्लोरोसिस (Chlorosis) नामक रक्त का रोग माना है। वारमट ने हलीमक का वर्णन लोढर नाम से किया है और सुश्रुत ने इसे लाघवक एव अलस नाम भी दिया है। यह रोग शाखा-श्रया कामला के अधिक दिनो तक बने रहने से हो जाता है।

चिकित्सासूत्र³

- 9 इसमे वात तथा पित्त-प्रधान दोष हैं। अत वात-पित्तनाशक पाण्डुरोग की चिकित्सा तथा कामला-नाशक चिकित्सा करनी चाहिए।
- २. महातिक्तघूत, पञ्चगव्यघूत, कल्याणघृत या गुडूचीस्वरस और गाय के दूध से सिद्ध भैस का घी पिलाकर रोगी का स्नेहन करने के प्रश्चात् निकोथ चूर्ण ४-६ ग्राम चीनी मिलाकर खिलाकर विरेचन कराना चाहिए।
 - ३ मधुररस-प्रधान एव वात-पित्तनाशक आहार और औषध देवे।
- ४. यापनावस्तियो का, क्षीरवस्तियो का और साथ-साथ अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए।
- ५. जठराग्नि के बल को बढाने के लिए जीवनीयपृत, द्राक्षालेह और द्राक्षारिष्ट आदि का सेवन कराना चाहिए।

चिकित्सा

- 9 कालातिल, बरियार का बीज, मुलहठी, निर्बीज आँवला, निर्बीज हर्रा, निर्बीज बहेडा, हल्दी, दारुहल्दी, लौह भस्म (सहस्रपुटी या शतपुटी) और चीनी, इन सबका बारीक चूर्ण २०-२० ग्राम लेकर खरल में घोट कर मिला ले। दिन में ३ बार, १-१ ग्राम, मधु ६ ग्राम और घी ३ ग्राम के साथ दे।
- २. अरुस, गुरुच, नीम की छाल, चिरायता और कुटकी प्रत्येक ५०-५० ग्राम लेकर भूसा जैसा कूटकर रख ले। २०-२० ग्राम दवा है लीटर जल मे पकावे, चौथाई बचे तो छानकर मधु मिलाकर सबेरे-शाम पिलावे।
- व उपयुक्त क्वाथ में समभाग आँवला, हर्रा और बहेडा मिला देने से वह फल-त्रिकादि क्वाथ कहलाता है। यह क्वाथ अद्भुत लाभ करता है। हमने सैकडो रोगियो पर इससे सफलता मिलते देखी है।

१ अ० ह० नि० १३।१८-२०।

२ ज्वराङ्गमदेश्रमसादतन्द्राक्षयान्वितो लाघरकोऽल्लसाख्य । तं वातिपत्ताद्धरिपोतनीलं इलीमकं नाम वदन्ति तज्हा ॥ सु० उ० ४४।१४

३ च० चि० १६।१३५-१३७।

४ सिद्धयोग-पाण्डु-कामला की वात-पित्तनाशक श्रीषधें देवे-ताप्यादि लीह, रोहीतक श्रीह, लोकनाथ रस, आरोग्यवधिनी, पुनर्नवा मण्डूर, नवायस लीह, अपृतारिष्ट और कुमार्यासव का प्रयोग करे।

५ पथ्य बादि पाण्ड और कामला की तरह जानना चाहिए।

व्यवस्थापत्र

१ दिन मे ३ बार

शतपुटीलीह भस्म ५०० मि० ग्रा०
नागरमोथा चूर्ण ६ ग्राम

३ मात्रा

मधु से चटाकर खदिर क्वाय ५० मि० ली० पिलावे।

२. भोजन के पूर्व ,

यवानीषाडव <u>१० ग्राम</u> बिना अनुपान २ मात्रा

३. भोजनोत्तर

लोहासव ४० मि० लो० ् समान जल से पीना। २ मात्रा

४. रात मे सोते समय आरोग्यवधिनी १ ग्राम

दूध से ।

अथवा--- ५. द्राक्षादि घृत २० ग्राम दूध से दे।

पानकी

(Jaundice complicated with Diarrhoea)

सन्ताप, अतिसार, बाहर-भीतर पीतवर्णता और नेत्रों में पाण्डुता का होना, ये पानकी के लक्षण हैं।

वक्तव्य—पाण्डुरोग की उपेक्षा से कामला, फिर कुम्भकामला, फिर हलीमक होता है। ये सभी पाण्डुरोग की प्रवधंमानावस्थाएँ ही अपनी प्रवलता के कारण अलग-अलग नाम घारण करते हैं। इन्ही रोगो का पिछलग्गू रोग पानकी है। इन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, जैसे—(१) कुम्भकामला मे स्क्षता की अधिकता, (२) बारीर में महान् शोथ और (३) सन्धियों मे पीडा होती है। हलीमक मे बल तथा मासादि घातुओं का अधिक क्षय होता है। उसी तरह पानकी में अतिसार होना एक विशिष्ट स्क्षण है। कुछ लोग हलीमक को ही पानकी कहते हैं।

रकोनविंश अध्याय

दाहरोग, वातरक्तरोग, रक्तगत वात तथा रक्तावृत वात वाहरोग

परिचय — किसी बाहरी कारण (आग या घूप आदि) के सपकें के विना शरीरान्तगंत आग्नेय तत्त्व पित्त की वृद्धि होने से शरीर मे होनेवाली जलन को दाह कहते हैं।

निदान-- निदान की दृष्टि से दाह के दो भेद है-- (१) वातिक और

वातिक दाह-निदान

जव वायु अपने प्रकोपक कारणो से कुपित होकर पित्त को विकृत कर दाह । उत्पन्न करता है, तो वह वातिक दाह होता है।

१ घातुक्षयज दाह वातज होता है, क्योंकि घातुक्षय से वायु का प्रकोप होता
 है। अथ च—

२ आशयापकर्ष से होनेवाला दाह वातिक दाह होता है। जैसे—प्रकृतिस्थ दोप जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान मे चले जाते है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, वह आशयापकर्षजन्य कहलाता है।

जब शरीर में पित्त सम हो, किन्तु वायु कुपित हो तो वह वायु रजक पित्त को सीचकर त्वचा में ला देता है और त्वचा में पहले से ही ध्राजक पित्त वर्तमान रहता है, इसलिए पित्त द्विगुण मात्रा में हो जाता है, तो वह अपने उष्णगुण से त्वचा में दाह उत्पन्न करता है।


पैत्तिक दाह का निदान

विधि-विपरीत मद्यपान, प्रकुपित रक्त, तृष्णानिरोध, आभ्यन्तर रक्तस्राव, व्रण होना और मर्माभिघात तथा पित्त का स्वय प्रकुपित होना, ये पित्तज दाह के कारण होते हैं।

वक्तव्य — पित्त पगु है और इसका प्रेरक वायु होता है — 'समीरणोऽने ' (च॰ सू॰ १)। अत पित्त को सचालित करनेवाला वायु है तथा सपूर्णे इन्द्रियो से ग्राह्य विषयो को मस्तिष्क तक वायु ही पहुँचाता है — 'सर्वेन्द्रियार्थानामिनोढा' (च॰ सू॰ १२) जिससे त्वचा आदि में दाह होने पर दाह का ज्ञान होता है। इस प्रकार पित्त स्वप्रकोपक कारणो से कुपित होकर वायु की सहायता से ही जिस दाह की उत्पत्तिं करता है, वह पैत्तिक दाह है।

ं सन्दर्भ ग्रन्थ


१. सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र ४७ । २. माधवनिदान । ३ योगरत्नाकर ।



संप्राप्ति

किसी कारण से कफ के क्षीण होने पर वायु के वृद्ध तथा प्रकृपित होने से एव पित्त के सम होने पर बढा हुआ वायु शरीर के जिस-जिस प्रदेश मे पित्त को ले जाता है, वहाँ-वहाँ दाह होता है। जब पित्त स्वप्रकोपक कारणों से कुपित होकर वायु की सहायता प्राप्त कर शरीर में सन्धरण करता है, तब दाह होता है।

संप्राप्ति-चन्न



मद्यन दाह

विधि-विपरीत मद्यपान करने से उत्पन्न शरीरोष्मा जब पित्त और रक्त से मिलकर त्वचा मे पहुँचती है तो भयस्कर दाह को उत्पन्न करती है।

रक्तज दाह

प्रकृपित रक्त सपूर्ण शरीर मे ज्याप्त होकर दाह उत्पन्न करता है, जिससे रोगी के शरीर मे आग-सी लगी रहती है, प्यास बढ जाती है, शरीर लाल हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, रोगी के शरीर तथा मुख से लोहे के सदृश गन्ध आती है और वह अपने को आग की लपटो से घिरा हुआ महसूस करता है।

पित्तज दाह

इसमे पित्तज्वर जैसे लक्षण होते हैं। जैसे—गर्मी अधिक लगना, नींद कम आना, वमन की प्रवृत्ति, कण्ठ आदि का सूखना, प्रलाप होना, मुख का स्वाद कडवा होना आदि लक्षण होते हैं।

तृष्णानिरोधज दाह

तृष्णा के वेग को रोकने से जलीय धातु के क्षीण हो जाने पर बढा हुआ पित्त प्रारीर के बाह्य एव आभ्यन्तर अवयवों में दाह उत्पन्न कर देता है, जिससे गला, तालु तथा बोठ सूख जाते हैं और रोगी जीम को बाहर निकालकर कौंपने लगता है।

रक्तपूर्ण कोष्ठज या आम्यन्तर रक्तस्रावज दाह

आभ्यन्तर रक्तस्राव के कारण होनेवाला दाह वर्दास्त के बाहर होता है।

घातुक्षयज दाह

रस, रक्त आदि धातुओं का क्षय होने के कारण जो दाह होता है, उसे धातुक्षयज दाह कहते हैं। इसमे प्यास, मूच्छा, स्वरक्षीणता, अकर्मण्यता, अवसाद और कष्ट का अनुभव होता है।

क्षतज दाह

त्रण के कारण अन्न न खाने और अनेक तरह का शोक करने के कारण क्षतज दाह होता है। इसमें अन्तर्दाह, अत्यन्त प्यास, मूच्छी तथा प्रलाप होता है।

मर्माभिघातज दाह

हृदय, वस्ति और शिर आदि ममँस्थानों में चोट लगने से जो दाह होता है, उसे मर्माभिघातज दाह कहते हैं।

असाध्य लक्षण

इनमे मर्माभिघातज दाह असाध्य होता है तथा उपयुंक्त दाहो मे, जिनमे शरीर बाहर से शीत होने पर भी भीतर दाह का अनुभव हो। ये दाह असाध्य होते हैं।

चिकित्सासूत्र

- १ सभी प्रकार के दाहजनक निदानो का परिवर्जन करना चाहिए।
- २. बाह्य और आभ्यन्तर रूप से शीतल आहार-विहार-औषध और उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए।
 - ३ पित्तज्वर और रक्तपित्त रोग की औषध मादि की तरह व्यवस्था करे।

चिकित्सा

धातुक्षयज के अतिरिक्त सभी दाहो में पित्त दोष की प्रधानता रहती है। अत सभी का समान उपचार करना चाहिए।

- १. प्रलेप सर्वाङ्ग मे मलयचन्दन का लेप अथवा कच्चे आम को आग मे पका कर उसके पन्ने (स्वरस) का लेप करना चाहिए।
- २. ज्ञायन-आसन खिले हुए नीलकमलवाले ठण्डे विस्तर पर या जलविन्दु से भीगे कमलिनीपत्रो पर या कदलीदल पर सोये।
- ३ शीत उपचार—चन्द्रमा की शीतल किरणो का सेवन, मोतियो के हार का धारण और बर्फ के पानी का सेवन करना चाहिए।
- ४ परिषेचन तथा अवगाहन—सुगन्धवाला, खश, पदुमकाठ, सफेद चन्दन डालकर पकाये हुए जल मे केतकी, गुलाब, मौलिश्री आदि के इत्रो को मिलाकर उससे शरीर पर बफारा दें या सिश्वन करे और-इसी जल को टब मे भरकर अवगाहन करावे।

५ वापीस्नान—शीतल, रमणीय, मनोहर सुगन्धित जल से पूरित तरणताल अथवा वावली मे शरीर मे श्वेतचन्दन के पतले द्रव का लेपन कर, कमलकोमलाङ्गी, कठोर उरोजोवाली, जलावगाहन मे प्रवीण, सुमद्युरभाषिणी, कलाकुशल, साहित्या-नुरागिणी युवतियो के स्पर्श-सुख का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक स्नान कर दाह का शमन करे।

६. धारागृहशयन — फन्नारों के छिद्रों से निकलनेवाले शीतल जलकणों के स्पर्श से शीतल वायुवाले, सुगन्धित पुष्पों से अधिवासित एवं गन्धोदक से अभिविश्वित भूमितलवाले, पुष्पमालाओं तथा अभिनव यौवना स्त्रियों से आवासित धारागृह में शयन करे।

७ दाहशासक विविध प्रयोग—रमणीय वनप्रान्त, नील-रक्त-श्वेत कमलयुक्त सिललाशय, कदलीवन, हास्य-गीत-कथाश्रवण, प्रिय-वयस्य गोष्ठी, पीनस्तनी, पीनोक्ष-जधना, प्रिय-अनुरागवती, आर्द्रवसना, शियलमेखला, गले मे गजरा और वेणी मे मोतीया की कलियो की माला धारण की हुई भावावबोध-कुशला, रसज्ञा रमणियो का साम्निध्य दाहशामक है।

ऒवघ

- ८ दाह के स्थान मे शतधीत घृत को लगावे।
- ९. नीम की पत्ती को चटनी की तरह पीसकर थोडा पानी मिला किसी मिट्टी के पात्र में रखकर हाथों से मसले और उसके फेन को लगावे। अथवा बेर के पत्ती के फेन का लेप करे।
- ९० जौ का सत्तू, आवला तथा आम का पन्ना एक साथ मधकर लेप करने से दाह का वामन होता है।
- १९ नागरमोथा, सुगन्धवाला, श्वेतचन्दन, लोध, खश, प्रियगु और नागकेशर का लेप लगाना चाहिए।
 - १२ पित्तपापहा, खश और नागरमोथे का क्वाथ चीनी हालकर पिलावे।
- १३ चन्दनादि चूर्ण—चन्दन, खश, कूठ, नागरमोथा, आंवला, नीलकमल-फूल, मुलेठी, महुए का फूल, मुनक्का, खजूर, छोटी इलायची, ककडी वीज, खीरे का वीज, धनियां इन्हें समभाग मे लेकर चूर्णकर सबके वरावर चीनी मिलावे। इस चूर्णको ३-३ ग्राम की मात्रा मे दिन मे ३ वार शीतल जल से दे।

१४ शालिपणीं, पचतृणमूल या जीवनीयगण की औषधो से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए।

विशिष्ट उपचार

१५ रक्तज दाह के रोगी को लघन कराकर फिर पेया आदि के द्वारा तर्पण जपवार करे। यदि फिर भी दाह शान्त न हो, तो रोगी को जागल मासरसी से तृप्त कर बाहु तथा जया मे स्थित लोहिता सिराओ का सिरावेध-विधि से वेधन करे।

१६. तृष्णानिरोधज दाह—मधुर-शीतल आहार, शकरायुक्त जल और दुग्ध, शीतल, ईख का रस वर्फ मिलाकर तथा घी-चीनी मिला सत्तू पिलाना चाहिए।

१७. रक्तपूर्णकोष्ठज बाह-इसमें सद्योवण की तरह उपचार करे।

१८. क्षतज बाह में रुचिकर, मनपसन्द शब्द स्पर्श-रूप-रस-गन्ध का सेवन, मित्रो की गोष्ठी, दुग्ध, मासरस का सेवन तथा पूर्वोक्त दाहशामक उपचार करे।

१९ तृष्णाशामक मद्य-सफेंद जीरा, आईक, सोठ, सोचरनमक का जूर्ण तथा छोटी इलायची, दालचीनी के चूर्ण को डालकर आधा जल मिलाकर मद्य का पान करना तृष्णाशामक है।

व्यवस्यापत्र

१ दिन मे ४ वार चन्द्रकला रस चन्द्रनादि चूर्णं प्रवालिपच्टी गुढ्चोसत्त्व

५०० मि० ग्रा० ३ ग्राम ५०० मि० ग्रा० २ ग्राम ४ मात्रा

गुलकन्द या आँवले के मुख्ये के साथ।

२ रात मे सोते समय यष्टचादि चूर्णं ६ ग्राम दूध से।

३. वहेडे की फलमज्जा का प्रलेप !

२१ धातुक्षयज दाह में स्निग्ध, वातहर तथा रक्तपित्त की चिकित्सा करे।

व्यवस्थापत्र

 दिन मे ३ बार गुग्गुलु वटी

उप्पुर्व पटा २–२ गोली गरम जल से । ३ ग्राम

२. रात मे सोते समय

यष्टघादि चूर्ण

६ ग्राम

दूध से। ३ अभ्यग

पचगुण तैल

पथ्य

जी के सत्तू का घी-चीनी मिलाकर बनाया गया द्रव पेय, पुराना चावल, जी, भूग, परवल, सिघाडा, मुनक्का, किसमिश, खजूर, गोदुग्ध, घृत, मक्खन, फालसे का शर्वत, हाभ का पानी, अगूर का रस, गन्ने का रस आदि शीतल स्निग्ध पदार्थ पथ्य हैं।

खपध्य

विरुद्ध अप्र-पान, धार-तीक्षण-कटु-तिस्तरम प्रव्य, येगावरीध, परिश्रम, स्यामाम, धूप मे और आग के निकट रहना, हीग का मेवन, वही, महली सवा पिसवर्धक पदार्घ अपन्य हैं।

वातरक्तरोग

परिचय—पह बात और रक्त, इन दोनों के दूषित होने ने उत्पन्त होतेवाला एक रोग है, जो अधिकतर पैर के अपूठे से या हाय में अपुलियों से प्रारम्भ होकर कपर से गुल्फ और जानु की सन्धियों में फैन जाता है। हाय पैर में दिर्गात हो. फड़कन, मूनापन, दिदोरे उठ जाना और मन्प्रिस्यनों में दर्द होता, इस रोग के होते के मूचक लक्षण है।

निर्वधन और पर्याय -- इन रोग गा यातण्याधि में निषट का रिष्टा ि सीर सुश्रुत ने इनका पाठ वातव्याधि-प्रकरण में ही किया है, परन्तु परको रणतान सध्याय में उनका वर्णन किया है, पयोकि यात की अपेना इस रोग ने निराप, दोग, दूष्य तथा सप्राप्ति में कुछ विधिष्टता है।

(१) इसमें बात तथा रक्त दोनों दुष्ट होकर महकारिता में रोग के उपपर करते हैं, इसलिए इसे बातरक्त, यातामुक और बातदीणिय करा जाता है। (२) यह रोग विदोषकर छोटी मन्धियों में होता है, अत. इसे पुरुषात माने हैं (गुर का स्थे छोटी सन्धि हैं)। (३) यात के बाहा ही जाने से रक्त अधिक दूरिय होकर दम रोग को उत्पन्न करता है, अत इसे बातबलास (यातस्यायरमें) अपमर्थास्थ्य द्योणिते इति बातबलाम) सहते हैं। (४) धनिकों को प्राय हो। ने यह आहफ्त बात कहराता है।

सन्दर्भप्रन्य ---

- १ चरवमहिता निफिरमाम्मान २९।
- २ सुश्रुतमहिता निदानम्या १।
- ३ सुश्रुतमहिता चिकित्राग्यान ५।
- ४ अष्टाञ्चहृदय निश्चनस्मान १६।
- ५ अण्टाञ्जह्दय विकित्साम्यान २२।
- ६ माधवनिदान वातरता।

निदान

वातरक्त में साथ ही वात और रक्त का प्रकोग होता है तथा इस रोग में गुरु निदान वातप्रकोपक और कुछ रक्तप्रकोपक होते हैं। जैसे—

१. खुंड वातवलामास्यमात्यवानं च नामिन । च० चि० १९।>१

वातप्रकोपक

रक्तप्रकोपक

- १. कपाय-कदु-तिक्त तथा रूक्ष आहार।
- २. अल्पभोजन, अनदान ।
- ७. लवण-अम्ल-कदु-क्षार तथा स्निग्ध माहार।
- ३. ऊँट या घोडे की अधिक सवारी करना।
- ८. क्लिन्न, शुब्क और आनूपमास-सेवन। ९ तिलकुट, मूली, कुलथी, उडद और सेम खाना ।
- ४ अधिक कूदना और तैरना।
- ५ ग्रीष्मऋतु मे अधिक पैदल चलना ।
- १० दही, काञ्जी, सिरका, तक्र और
- ६ अतिमैथुन, वेगघारण
- आसव।

जागरण।

११ विरुद्ध आहार और अजीणं में भोजन।

१२ क्रोध, दिवाशयन, रात्रि-जागरण।

- १३ सुकुमारता, वन्यायाम तथा आरामतलब स्वभाव होना।
- १४. मिथ्या आहार-विहार एव अधिक मिठाई खाना और मोटापा ।
- १५. बैठे-ठाले रहना, कोई श्रम न करना और पैदल न टहलना अथवा घूमना ।
- १६ किसी तरह की चोट लगना और शरीर का कभी शोधन न करना मादि ।

सम्प्राप्ति

वातप्रकोपक कारणो के सेवन तथा विदाही अन्न का अधिक सेवन करनेवाले व्यक्ति के भोजन का निदग्ध परिपाक सम्पूर्ण रक्त को दूषित कर देता है। वह दुष्ट रक्त खिसक कर नीचे पैरो मे इकट्ठा हो जाता है और प्रकुपित वायु से मिलकर वातरक्त को उत्पन्न करता है।

वक्तध्य—इस रोग मे यद्यपि वात तथा रक्त दोनो बढे होते हैं, फिर भी दोनो के दुष्ट होने पर भी वात के दोष होने से प्रवलता के कारण इस रोग को वात-रक्त² कहते हैं। वढे हुए दूषित रक्त के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और रुकी हुई वायु पुन सपूर्ण रक्त को दूषित कर देती है तब वातरक्त होता³ है ।


१ प्रायश सुकुमाराणां मिष्टान्नसुखमोजिनाम्। भचड्कमणशीळानां कुप्यते वातशोणितम्॥ अभिवातादशुद्धया च प्रदुष्टे शोणिते नृणाम् । च० चि० २९।७-८

२. तत्सम्यक्त वायुना दूषितेन तत्प्रावल्यादुच्यते वातरक्तम् । मा० नि०

३. वायु प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारित पथि। कुस्स्नं सन्दूषयेद् रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम् ॥ च० चि० २९।१०

पूर्वरूप

१. पसीना अधिक आना या बिलकुल न आना, २ शरीर का काला पड जाना, ३. स्पर्ध न मालूम होना, ४. क्षत होने पर अतिपीडा, ५. सिन्धर्शेयिल्य, ६. आलस्य, ७. शरीर मे यकावट, ८ जानु, जच्चा, ऊरु, किट, अस तथा हाथ-पैरो की सिन्ध मे पिडकाओं की उत्पत्ति और इनमे तीव्र पीडा, ९ अंगो मे फडकन और टूटन, भारीपन और सूनापन तथा खुजली, १०. सिन्ध्यो मे वार-वार पीडा होना और पीडा का नष्ट हो जाना, ११. त्वचा मे विवर्णता होना और १२ त्वचा मे वकत्ते पड जाना, ये वातरक्त के पूर्वेष्ट्प हैं।



इस प्रकार आश्रय-भेद से २ और दोष-भेद से ८ प्रकार का वातरक्त होता है।

उत्तान वातरक्त का लक्षण

खुजली, दाह पीड़ा, खिचाव, सूई चुभने जैसी पीडा, फडकन, अगो मे सिकुडन और त्वचा का वर्ण श्यावरक्त तथा ताम्रवर्ण का होना, ये उत्तान वातरक्त के लक्षण हैं।

गम्भीर वातरक्त का लक्षण

जकडन और कठोरता युक्त शोथ, शोथ में भयकर दर्द, सिन्ध्यों में दाह, तोद, फडकन और पाक होना, ये गम्भीर वातरक्त के लक्षण हैं।

उत्तान-गम्भीर मिश्रित वातरक्त का लक्षण

वेगवान् वायु शरीर मे पीडा, दाह, सन्धि-अस्थि-मज्जां मे काटने जैसी वेदना उत्पन्न करती है, वह सन्धिस्थल को भीतर से टेढा करती हुई गति करती है और लगडापन या पङ्गुता उत्पन्न करती है।

वातादि दोष प्रधान वातरक्त के लक्षण

सिराओं में तनाव, शूल, फडकन और सूई चुभने जैसी वेदना, शोथ में कृष्णता, रूसता का घटना-वढना, धमनी-अगुली एवं सन्धियों में सकीच, अगी में जरूडन, सितिपीडा, आकुञ्चन (खिचाव) और शीतल आहार-विहार से द्वेप होता है। ये बातप्रधान वातरक्त के लक्षण हैं।

पित्तप्रधान में विदाह, वेदना, मूच्छी, स्वेदाधिक्य, पिपासा, मद, भ्रम, लालिया, ज्वर, दूटन, सूखना और उष्णता का अनुभव होता है।

रक्तप्रधान मे खुजली, क्लेदयुक्त शोय, वेदना, तोद, चुनचुनाहट और त्वचा वाम्र वर्ण की होना।

ककप्रधान मे आर्द्रेवस्य से ढका जैसा अनुभव होना, भारीपन, चिकनापन, शून्यता, मन्दवेदना होना, ये लक्षण होते हैं।

वक्तव्य —िकन्ही दो दोवो से द्वन्द्वज और तीनो दोवो के मिलने से त्रिदोवज वावरक्त होता है। इनमे दोवानुसार लक्षण होते हैं। द्वन्द्वज और त्रिदोवज प्रकृति-समसमवायारव्य होते हैं। अत शास्त्रकारों ने उनका अलग से लक्षण नहीं दिया है, यह उनकी परम्परा है।

साध्यासाध्यता

- १ एकदोषज और नवीन वातरक्त साध्य होता है।
- २ द्विदोपज याप्य होता है। एक वर्ष पुराना और उपद्रव रहित भी याप्य होता है।
- ३. त्रिदोषज और बहुत उपद्रव युक्त असाध्य होता है। और (१) जो वात-रक्त अगूठे से जानुसन्धि तक पहुँच गया हो (२) जिसमे त्वचा विदीण हो गयी हो (३) जिसमे त्वचा से स्नाव होता हो और (४) जो वलक्षय तथा मासक्षय आदि उपद्रवों से युक्त हो वह भी असाध्य है।

उपवत

१ निद्रानाश २ अविच ३ म्हास ४. मासकोय ५. शिर.शूल ६ मूर्च्छा ७. मद ८ शरीर मे पीडा, ९ तृष्णा १० ज्वर ११. मोह १२ कम्पवात १३. हिचकी १४ पङ्गुता १५. वीसर्प १६ पाक १७ तोद १८ म्नम १९. वलम २०. अगुली-वक्रता २१ व्रण निकलना २२ जलन २३ हृदय-वस्ति-शिर मे विकार होना और २४ अर्बुद होना, ये उपद्रव हैं।

इनमें से अल्प उपद्रव रोगी याप्य और उपद्रवों से रहित रोगी साध्य होता है।

वातरक्त को असाध्यता का कारण

वायु प्रकुषित होकर शाखा एव सिन्धयों में जाकर रक्त के मार्ग को रोक देती है अर्थात् बन्द कर देती है और बढ़ा हुआ रक्त भी वायु के मार्ग को रोक देता है।

इस प्रकार रक्त के मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोक देता है, जिससे इतनी दारुण वेदना होती है कि रोगी मृत्यु की गोद मे सो जाता है।

चिकित्सासूत्र

- १ वातरक्त के निदान का सर्वथा परित्याग करे।
- २ गम्भीर उपद्रवो से रहित, बलवान्, जितेन्द्रिय और साधन सपस रोगी की चिकित्सा करे।
- ३ अन्त परिमार्जन . (क) रक्तमोक्षण—रोगी के दोष तथा बल आदि का विचारकर स्नेहन-स्वेदन आदि समुचित पूर्वकर्म करके—(१) श्रुङ्ग (२) जोक (३) सूई (४) तुम्बी (५) पाछकर या (६) सिरावेध द्वारा रक्त का निहंरण करना चाहिए। (७) यदि अगशोप हो, रूक्षता अधिक हो और वात-प्रधान वात-रक्त हो, तो रक्त न निकाले।
- (ख) वात को पुरीध से आवृत जानकर, वार-वार मृदु विरेचन देना चाहिए अथवा घृत मिलाकर क्षीरवस्ति के प्रयोग से मल का निर्हेरण करना चाहिए। र
- ४ बहि-परिमार्जन-पुल्टिस, परिषेक, प्रदेह, मालिश, वायुरिहत मनोज्ञ विशाल गृह मे निवास, सुखकर शय्या और कोमल हाथो से सवाहन करना चाहिए।
- ५ विशिष्ट चिकित्सासूत्र—उत्तान (बाह्य) वातरक्त मे आलेप, अभ्यज्ज, परिवेक और उपनाह द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए।
- ६. गम्भीर वातरक्त मे विरेचन, निरूहवस्ति और स्नेहपान द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए।
- ७ वातप्रधान मे घी-तेल-वसा और मज्जा के यथायोग्य पान, अभ्यग, अनुवासन वस्ति के प्रयोग तथा मन्दोष्ण पुल्टिस की सेंक देकर चिकित्सा करे।
- ८ रक्त एवं पित्त प्रधान में विरेचन, घृतपान, दुग्धपान, परिपेक और अनुवासन वस्ति के द्वारा एव शीतल दाहशामक प्रलेपो द्वारा उपचार करना चाहिए।
- ९ कफप्रधान में मृदुवमन, स्नेह, परिषेक और लघन का अल्प प्रयोग तथा उष्ण लेप लगावे।

सामान्य चिकित्सा

- हरीतकी चूर्ण ३ ग्राम को ३ ग्राम गुड के साथ सवेरे-शाम दे।
- २ दूध मे ५ पीपर पीसकर और प्रतिदिन ५-५ के क्रम मे बढाकर १० दिनो तक सेवन करे और १५ सख्या होने पर क्रमश घटावे तथा दूध-भात का पथ्य ले।
 - ३ जीवनीयगण के कल्क तथा दूध से घृत पकाकर अभ्यङ्ग करना चाहिए।

१ वलवन्तमात्मवन्तसुपकरणवन्त चोपक्रमेत् । सु० चि० ५।६

२ निर्हरेद् वा मलं तस्य सघृते क्षीरवस्तिमिः। निर्ह वस्तिसमं किश्चिद् वातरक्तिचिकित्सितम्॥ च० चि० २९।८८

- ४ मोम, मजीठ, राल और अनन्तमूल के कल्क तथा दूध से सिद्ध पिण्डतैल का अभ्यक्त करे।
 - ५. गुर्रच का स्वरस, कल्क या क्वाय २-३ महीने तक पीना लाभकर होता है।
- ६ अमलताश का गूदा, गुरुच और अरुस प्रत्येक १०-१० लेकर, विवाध बना १५ ग्राम एरण्ड तैल डालकर सर्वेरे-शाम पीना वातरक्त शामक है।
 - ७ पीपल की छाल २० ग्राम लेकर क्वाथ बना प्रात -साय मधु मिलाकर पीना ।
- ८. शुद्ध शिलाजीत रे ग्राम की मात्रा मे गुडूंची क्वाथ से सबेरे-शाम पीना चाहिए।
 - ९ गोरखमुण्डी का चूर्णं ५ ग्राम, १० ग्राम घी, २० ग्राम मधु से प्रात -साय दे।
 - वाह्य प्रलेप—तिल को भूनकर गोदुग्ध से पीसकर लेप करे।
 - 99 भेंड के दूध या घी का लेप करे या राख चूर्ण का घी के साथ लेप करे।
 - १२ शतधीत पृत लगावे या बलादि प्रलेप या गृहधूमादि लेप लगावे ।
- १३ तैल-प्रयोग—गुडूची तैल, मरिचादि तैल, महापिण्ड तैल, सुकुमारक तैल, मधुपण्यादि तैल, महापद्मक तैल या खुड्डाकपद्मक तैल लगावे।

सिद्धयोग

- १४. महामञ्जिष्ठादि स्वाय इस रोग की वहुक परीक्षित औषध है।
- १५. पटोलादि क्वाथ, लघुमञ्जिष्ठादि और हरीतकी क्वाथ २ वार दें।
- १६ चूर्ण-निम्बादि चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण या भृगराज चूर्ण उत्तम हैं।
- १७ गुग्गुलु कैशोर, गोक्षुरादि या अमृता गुग्गुलु का प्रयोग करे।
- १८ घृत-जीवनीय घृत, अमृतादि घृत या गुडूची घृत का प्रयोग करे।
- १९ आसवारिष्ट—खदिरारिष्ट, मञ्जिष्ठारिष्ट, सारिवाद्यरिष्ट अथवा चन्द-नासव दे।
- २० वातरक्तान्तक रस, विश्वेश्वर रस, महातालेश्वर रस, सर्वेश्वर रस और पित्तान्तक लीह का यथायोग्य मात्रा मे प्रयोग करना चाहिए।

व्यवस्थापत्रं

१ प्रातः कैशोर गुग्गुलु २ ग्राम १ मात्रा महामञ्जिष्ठादि क्वाथ ५० मि० ली० के साथ। २. ९ बजे प्रातः व २ बजे अपराह्म बातरक्तान्तक रस ३०० मि० ग्रा० निम्वादि चूर्ण ३ ग्राम

३ ग्राम

9 मात्रा

पीपल की छाल के ५० मि० ली० क्वाय से ।

३. भोजनोत्तर २ बार

खदिरारिष्ट ५० मि० ली०
समान जल से पीना । २ मात्रा
४. रात मे सोते समय

आरोग्यविंघनी १ ग्राम मन्दोष्ण गोदुग्ध से ।
५. अभ्यञ्ज—महामरिचादि तैल की मालिश करे ।

पध्यापय्य

पथ्य-पुराना चावल, जी, गेहूँ, मूँग, मसूर, करेला, परवल, बयुबा, श्रांवला, मुनक्का, किसमिस, मक्खन, घी, गाय-बकरी-भैंस का दूध, चना-गेहूँ की रोटी और दूध उत्तम पथ्य है।

अपय्य-उडद, कुलथी, सेम, तिल, दही, अम्ल-लवण कटुरसवाले द्रव्य, क्षारीय पदार्थ, उष्ण और विदाही पदार्थ अपय्य हैं।

रक्तगत वात

रक्तगत वात का सक्षण

रक्त में वायु दूपित होने पर शरीर में तीव वेदना, सन्ताप, विवर्णता, कृशता, भोजन में अविच, समस्त शरीर में अविच, समस्त शरीर में फुन्सियों का होना, भोजन कर लेने पर शरीर में स्तब्धता (जकड़न) और व्रणो की उत्पत्ति होना, ये रक्तगत वात के लक्षण हैं।

वन्तव्य—कतिपय आचार्य रक्तवात नामक एक स्वतन्त्र रोग मानते हैं, जिसके दो भेद शास्त्रों में विणित हैं—(१) रक्तगत वात और (२) रक्तावृत वात । प्रथम में केवल वात विकृत होकर शुद्ध रक्त के सञ्चार में बाधा डालकर रक्तविकृति के लक्षण उत्पन्न करता है तथा दूसरे में प्रवृद्ध या दूषित रक्त के आवरण के कारण वायुविकार उत्पन्न होता है।

चिकित्सा

१. एरण्डतैल २५ मि० ली० को २५० मि० ली० दूध मे पिलाकर विरेचन करावे अथवा निशोध चूर्णं ४ ग्राम चीनी मिलाकर विरेचनार्थं खिलावे।

२ शल्यविद् चिकित्सक द्वारा रक्तमोक्षण करावे। उसके पूर्वकर्म विधिवत् सपन्न कर रक्तमोक्षण करे और विधिवत् पश्चात्कर्म की व्यवस्था करे। अविदाही, शीतवीयं आहार-विहार का सेवन करावे।

३. शतधीतपृत, दशाङ्गलेप, निम्बपत्रकल्कफेन, बदरीपत्रफेन, चन्दनानुलेपन,

१ रुजस्तोत्रा ससन्तापा वैवण्यै कृशताऽरुचि । गात्रे चार्लपि मुक्तस्य स्तम्मश्रासुग्गतेऽनिले ॥ च० चि० २८।११

२ ज्रणांश्च रक्तग । सु० नि० १।२६

चन्दनादि तैलाम्यञ्ज, कमल-पुष्प माला, मोतिया की कली की माला आदि दाहवामक उपचार तथा शीतल प्रदेहों का प्रयोग करे।

ओवध

- १ बांवला, कमलगट्टा, मुनक्का, गुलकस्द, बांवले का मुख्या, नारियल का जल, गन्ने का रस, सन्तरा आदि का सेवन कराये।
- २. लोध, खश, सुगन्धवाला, नागकेशर, नागरमोया, पित्तपापड़ा, श्वेतचन्दन जादि शीतल एवं सुगन्धित द्रव्यो का भीतर-वाहर प्रयोग करे।
- ३. चन्द्रकलारस, महायोगराजरस, अमृता गुग्गुलु, यातरक्तान्तकरस, पव्धरणयोग, रसमाणिक्य बादि का यथायोग्य मात्रा बोर अनुपान से प्रयोग करें।

रक्तावृत वात

रक्तावृत वात का सक्षण

वायु के रक्त से बाइत होने पर सुद्र्यां चुनने जैसी व्यया, स्पर्श से द्वेष होना (स्पर्श वर्दास्त न होना) और स्पर्शनान्यता (स्पर्श का अज्ञान) एवं स्वया बीर मासपेशियों के मध्य में दाइ तया वेदना जी अधिकता, लाखिमायुक्त शोष एव मण्डल (चकत्ते) होना, ये लक्षण होते हैं।

वत्तव्य-सुश्रुतसहिता निदानस्थान अध्याव १ मे ४०-५० सन्दर्भ पर गयदास ने वातरक्त का वर्ष 'रक्तावृत वात' किया है।

चिकित्सा

जब वात ने रक्त से आवृत होकर रोग उत्पन्न किया हो, तो उस विकार में वातरक्त प्रकरण में कथित चिकित्सा-क्रम के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए।

बक्तम्य—वातरक्त की पूरी चिकित्सा इसी अध्याय मे देखें। पच्चापच्य भी वातरक्त के अनुसार जानना चाहिए।

१ शीता प्रदेश रक्तस्ये विरेको रक्तमोक्षणम् । च० चि० २८।९२

२. स्चीभिरिन निस्तोद स्पर्शदेष प्रसुप्तता । श्रीपाः पित्तविकाराः स्युमारते शोणितान्विते ॥ स्र० नि० १।३३

र रजावृते सदाहातिस्त्वङ्मांसान्तर्जो मृशम् । मनेत् सरागः श्वययुर्जायन्ते मण्डलानि च ॥ च० चि० २८।६३ ४ शोणितेनावृते कुर्याद् वातशोणितकी क्रियाम् । च० चि० २८।१९५

विंश अध्याय

तृष्णारोग, अतिसार तथा प्रवाहिका

तुष्णारोग े

परिचय—गर-बार जल पीने की उच्छा होना और पानी पीने पर भी प्यास न मिटना तृष्णारोग कहलाता है।

निवान

तृष्णा में पित्त अपने उष्ण गुण से और वायु अपने रूझ गुण से शरीर के जलीय अश को सुक्षा देते हैं। इसी अभिप्राय से चर्क ने इस रोग के निदान में कुछ वात-प्रकोपक तथा कुछ पित्तप्रकोपक कारणों का उल्लेख किया है—

यातप्रकोपक निवान—१ क्षोभ, २. भय, ३ श्रम, ४ क्षोक, ५ लघन, ६. ख्ल एवं शुक्क अञ्च, ७ मद्य, ८. घातुक्षय, ९. रोगज क्षशता और १०. वमन-विरेचन का अतियोग।


वित्तप्रकोषक निवान —१ क्षार, २. अम्त्र, ३ लवण, ४. कटु, ५. उटण पदार्थ, ६. क्रोध करना और ७. सूर्य सन्ताप ।

सन्दर्म-प्रत्य-१. चरकसहिता चिकित्सा० २२ । २. सुश्रुतसहिता उत्तर० ४८ । ३ अध्या त्रहृदय निदान० ५ । ४. अध्या त्रहृदय चिकित्सा० ६ । ५. माधवनिदान ।

संप्राप्ति


स्वप्रकोषक कारणो से कुषित वात तथा पित्त उदकवहस्रोतस् में जाकर उसके जल को मुखा देते हैं, जिससे शरीर में जलाश का क्षय हो जाता है और इस क्षय की पूर्ति के लिए तृष्णा होती है। पित्तप्रधान अथवा वातप्रधान कुछ रोगों में उपद्रव स्वरूप तृष्णा होती है, वह उपसर्गजा तृष्णा है।

संप्राप्ति-चक



बोष-वृष्य-अधिष्ठान---

- १. दोष--पित्त और वात ।
- २ 'दूष्य--उदक-जलीय घातु ।
- ३. स्रोतस्--उदकवह (रस-रक्तवह)।
- ४ अधिष्ठान--तालु।



वक्तव्य-चरक ने कफजा, क्षतजा एवं असजा को नहीं माना है, अपितु एक अन्य उपसर्गजा माना है। वाग्सट ने, वात-पित्त-कफ-सिन्नपात-आम-क्षय तथा उपस्गं से सात प्रकार की तृष्णा माना है।

पुर्वरूप

मुख का सूखते रहना तृष्णा रोग का पूर्वहप होता है।

प्रत्यात्म लक्षण

निरन्तर जल पीने का इच्छा का बना रहना निजी अवश्यम्भावी लक्षण है।

सामान्य लक्षण

१ मुखशोष, २ स्वरभेद, ३ भ्रम, ४. संताप, ५ प्रलाप, ६ शरीर जकडना, ७. तालुशोप, ८ कण्ठशोष, ९ सोष्ठशोष, १० जिह्वाशोष, ११. संशानाश, १२ जीभ निकालमा, १३. अहचि, १४ बहरापन, १५ मम्पीडा, १६. शरीर मे शिथिलता का अनुभव होना।

(१) वातजा तृष्णा के लक्षण

१. निद्रानाश, २. शिर चकराना, ३ मुख सूखना, ४ मुखवैरस्य और ५. स्रोतो मे अवरोध।

(२) वित्तजा तृष्णा के लक्षण

ी मुख का तीतापन, २ शिर में दाह, ३ शीतिप्रयता, ४. मूर्च्छा, ५ नेत्र-मूत्र-पुरीव का पीळापन ।

(३) कफजा तृष्णा के लक्षण

१ निद्राधिक्य, २. शरीर मे भारीपन, ३ मुख मीठा रहना और ४. शरीर का अधिक सुखना।

(४) क्षतजा तृष्णा के लक्षण

अत्यधिक रक्तस्राव एव पीडा के कारण प्यास अधिक लगती है।

(५) रसक्षपजा नृष्णा के लक्षण

प दिन-रात बार-बार पानी पीते रहना, २ हृदय मे पीडा, ३. कम्पन ४. शरीर सूखना, ५ अगो मे सुनायन तथा ६ पानी की तरस वरकरार रहना।

(६) आमजा तृष्णा के लक्षण

१. अरुचि, २ आध्मान, ३. कफप्रसेक, ४ हुच्छूल, ५. मचली साना तथ ६ वारीर का ह्रास।

(७) अन्नजा तृष्णा के लक्षण

स्निग्ध, अम्ल, लवण, कटु तथा मात्रागुर एव द्रव्यगुरु अन्न के सेवन से यह तृष्णा होती है।

(८) उपसगंजा तृष्णा के लक्षण

ज़नर, प्रमेह, क्षय, शोष और श्वास आदि रोगो से ग्रस्त रोगियो मे उपद्रवस्त्रहण जो नृष्णा होती है, वह उपसर्गंजा कहलाती है। यह शरीर को सुखा डालती है और अत्यधिक कष्ट देनेवाली होती है।

असाध्यता के लक्षण

किसी भी तृष्णा की अधिकता और निरन्तरता, रोगी की कुशता, वमन होना और भषद्भर उपद्रवो का होना, ये तृष्णा के असाध्य लक्षण हैं।

चिकित्सासुत्र

- १. निदान का परिवर्जन प्रथम उपचार है।
- २ बलवान् रोगी को विधिवत् वमन-विरेचन कराकर शोधन और दुवैल रोगी का शमन-उपचार करे।
- ३ दीपक की ली पर जलाई हुई हल्दी की गाँठ से जिह्ना के नीचे की सिरा का दाह करे।
- ४. लेप—चन्दन, कपूर, खश आदि शीतल द्रव्यो को पीसकर शरीर में लेप लगावे।
- ५. स्नात-अवगाहन—शीतल जल से भरे टब मे बैठना और बुबकी लगाना चाहिए।
 - ६. जलसिक्त खश की टट्टी लगे या फन्वारा लगे आवास मे निवास करे।
 - ७ कूलर की ठण्डी हवा दे या सुगन्धित इत्र मिले जल से भीगे पक्षे की हवा दे।
 - ८ गोदुग्ध एव गोधत, फलो के शीतल रस, धी-चीनी मिल्ले सत्तू का घोल दे।
- ९. चन्द्रनाईप्रियादलेष, कौमुदी, शिशिर-मन्द मिनल, मधुर इत्र तथा रत्नाभरण तृषाशामक हैं।
- १० तालुकोष निवारणार्थे विजीरा नीबू से रस या आँवले के रस का गण्डूप धारण करावे।
 - ११ सौबले के चूर्ण का मुख में कवल धारण तथा घर्षण करावे।

सामान्य चिकित्सा

- १ शीतल जल--तृषपश्चमूल या श्वेतचन्दन और खश का षडङ्गपरिभाषा-नुसार बनाया हुआ जल मिश्री मिलाकर घोडा-थोड़ा पीते के लिए देवे।
- २ धनिया का अथवा कसेर, सिंघाडा, कमलगट्टा का शीत कषाय मिश्री मिलाकर दे।
- ३ मधुर (अष्टवर्ग आदि) जीवनीय, शीतवीयं और तिक्तरस द्रव्यो से क्षीर-पाक विधि से पकाये हुए दूध में चीनी मिलाकर पिलावे तथा उसी दूध से मालिश एवं परिसेचन करे।
- ४. नस्य—स्त्री के दूध में मिश्री मिलाकर नस्य दे अथवा ईख के रस का नस्य दे।
- ५ लेप--जामुन-आमड़ा-बेर-वर-पीपर पाकड-गूलर की गीली छाल, खट्टी वेर, खट्टा अनार, क्वेतचन्दन, खश, इन्हें समभाग लेकर महीन पीसकर घी मिलाकर लिलाट आदि मे लेप करे।
 - ६. गण्डूष-गीदुग्ध, ईल का रस, शर्वत, मधु, सिरका, विजीरा नीवू के रस का गण्डूष धारण करे।
 - ७. अर्क--सौंफ-अजवायन-पुदीना-श्वेतचन्दन का अर्क, बरफ का जल या एलेक्ट्राल पिलावे।

विशिष्ट चिकित्सा

- ८ बातज में-- १ गुड + दही पिलावे। २. गुष्च का स्वरस मधु के साथ देवे। ३ वातनाशक शीतल अन्नपान दे। ४ जीवनीय गण के द्रव्यो, से सिद्ध दुग्ध-घृत का प्रयोग करे।
- ९ पित्तज मे—१. पके गूलर का रस या क्वाथ या शीत कपाय पिलावे या २ मुनक्का, खेत चन्दन, पिण्ड खजूर और खश से पकाये गये जल मे मधु मिलाकर पिलावे या ३ काकोल्यादि गण, उत्पलादि गण, सारिवादि गण या जीवनीयगण की औषघो से क्षीरपाक-विधि से पकाया गया दूध पिलावे। ४ धान के लावा का सत्तू चीनी-घी मिलाकर पिलावे।
- १०. कफल में—१ नीम की पत्ती का काढा बना सेंघानमक मिलाकर आकण्ठ पिलाकर वमन करावे। २ वेल की छाल, अरहर की जह, घावा का फूल, पीपर, पिपरामूल, चन्य, चीता, सोठ और कुश की जह, इनका फाण्ट या क्वाथ बनाकर थोडा-थोडा पिलाना चाहिए।
- ११. सतज मे—१. वेदना के शमन का उपचार करे। २. अधिक रक्तस्राव होने पर मासरस या ताजे रुधिर का पान करावे। ३ कसेर, सिंघाडा, कमल, कमल की जह, केला और ईस्र की जह से सिद्ध किया हुआ जल या क्वाथ पीने को दे।
 - १२ स्रवज मे—दूध की लस्सी, मासरस और मधु के शर्वत का सेवन करावे या

क्षपय्य

स्वेदन, धूत्रपान, व्यायाम या अग्नि-सेवन, अम्ल-लवण-कटु-कपाय रसवाले द्रव्य स्त्री-सभोग, तीस्प पदार्ग, गुरु भोजन, ये सब अपध्य हैं।

अतिसार

परिचय-गुदामार्गं से जलबहुल मल का बार-वार परित्याग होना अतिसार कहलाता है। नाघुनिक चिकित्साविज्ञान में इस रोग को डायरिया (Diarrhoea) कहते हैं। यह पुरीपवहस्रोतस् का रोग है। जब कोष्ठ में अधिक मलसञ्चय होता है तो वह अतिसार द्वारा वाहर निकाल दिया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ--

१ चरक० चि० १९। सुश्रृत० उत्तर० ४०। ४ अष्टाङ्ग० नि० ८, चि० ९। सामान्य निदान

(क) १. मात्रागुरु, स्वभावगुरु, सस्कारगुरु भोजन, २ स्वतिस्निग्छ, स्वतिस्का, स्वतिद्या, स्वतिद्या, स्वतिद्वा, प्रवान क्षेत्र स्वतियोग । (स) स्वतियोग । (स) भय-शोक स्वादि स्वादि मानमिक भाव। (ह) दूषित जल एव दूषित मद्य का स्वतिमात्रा में पान। ऋतुविप्यंय और मात्म्यविप्यंय। (छ) सत्यधिक जलक्रीडा तथा मूत्रादि वेग-धारण और (ज) कृमि, सर्श्व, ग्रहुणी, स्वजीणं रोग।

निर्वनन-'अति' उपगेपूर्वक 'मृ' घातु से अतिसार शब्द बना है। 'अति' का अर्थ है—अधिक और 'मृ' का अर्थ है—सरण, निकलना, वहना। इस प्रकार अतिसार का अर्थ है—(गुदमार्ग से) अधिक मात्रा एवं अधिक सल्या में द्रवमल का निकलना। डल्हण ने 'अतिमरणम् अतिसार', मधुकोपकार ने 'गुदेन बहुद्रवसरणम् अतिसार'; क्षार्झंघर ने 'अतीव सरत्यतिसारे गुदेन' तथा सुश्रुत ने 'शकृत्मिश्रो वायु-नाअ प्रणुत्र सरत्यतीवातिसारं तमाहु' ऐसा निर्वचन किया है।

संप्राप्ति

अपने प्रकोषक कारणों से प्रदुष्ट जलीय धातु (रस-जल-मूत्र स्वेद-मेद-कफ-रक्त आदि) पाचक अपने को मन्द करके मूल के साथ मिलकर वायु के द्वारा प्रेरित होकर गुदमागं से प्रचुर मात्रा में बाहर निकलती है। इस घोर व्याधि को अतिसार कहते हैं।

संप्राप्ति-चन्न

गुर, अतिस्निग्ध आदि निदान } — जलीयघातु का प्रदूषण—अग्निमान्द्य की उत्पत्ति एव मल-मिश्रण + विकृत जल-मिश्रित दूध पिलावे। इसमे शोषरोग मे कथित औषधो का प्रयोग करना चाहिए।

9३ आमज में—9. गरम जल मे सेंधानमक मिलाकर आकण्ठ पिलाकर वमन करावे। २ पिप्पल्यादि गण की दीपनीय औषधों के साथ बेल की छाल और वच समान भाग में मिलाकर क्वाथ बनाकर पिलावे।

१४. अन्नज मे—१ पतली पेया पिलाकर मदनफल चूर्ण ३-४ ग्राम चीनी से देकर वमन करावे। २ लाजसत्तू में घी-चीनी मिलाकर ठण्डे जल में घोलकर पिलाना चाहिए।

१५. मद्यत्त मे ---अर्धंजल-मिश्रित मद्य मे थोडा खट्टे अनारदाने का चूर्णं और थोडा सेंघानमक मिलाकर थोडा-थोडा पिलाना चाहिए।

१६ अति रूस तथा दुर्बेल रोगी की तृष्णा मे—गोदुग्ध थोडा-थोडा पिलाना चाहिए।

१७. स्निग्धाहारज तृष्णा मे—मालपूआ, हलवा आदि खाने से जो तृष्णा हो तो गृड का शर्वत दे।

सिद्धयोग

१८ रसादि वटी, रसावि चूर्णं (दीनो योगरत्नाकर), लोकेश्वर रस, महोदिष्ठ रस और कुमुदेश्वर रस का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए।

व्यवस्थापत्र

१ ३-३ घण्टे पर ४-५ बार

कुसुदेश्वर रस ५०० मि० ग्रा० जहरमोहरा पिष्टी १ ग्राम मधुसे। ५ मात्रा

अनुपान—१ लालचन्दन, अनन्तमूल, मोथा, छोटी इलायची, नागकेशर मिलित ५० ग्राम चूर्ण को २ लीटर जल मे अर्धाविशिष्ट पकाकर रख ले और चीनी मिलाकर थोडा-थोडा दवा खिलाकर पिलावे।

२. दिन मे ५-६ बार-एलादिवटी १-१ गोली या बालूबुखारा या आंवला चूसे। ३ भोजन के बाद-अविपत्तिकर चूर्ण ४ ग्राम मे २ मात्रा बनाकर दूध से दे।

पथ्य

धान का लावा सत्तू बनाकर, पेया, विलेपी, मण्ड, मूँग, मसूर, चने का यूष, वेर, कू॰माण्डखण्ड, नारिकेलखण्ड, आंवले का मुरव्वा, गुलकन्द, खजूर, बनारदाना, महुआ का फूल, विजोरा या कागजी नीबू, कच्चे नारियल का जल, छोटी इलायची, पुदीना, पुराना शालिचावल, जो, परवल, लोकी, केला का फूल और मधुर तथा तिक्त पदार्थ पथ्य हैं।

वातातिसार सक्षण

इसमे अरुणवर्ण, झागुयुक्त, रूझ और आम् मल योडी-योडी मात्रा मे बार-बार् पीडा और आवाज के साथ निकलता है।

वित्तातिसार लक्षण

इसमे पीला, नीला या हलके लाल रग का मल निकलता है एवं रोगी को तृष्णा, 'मूर्च्छा, सर्वाङ्ग मे दाह तथा गुदपाक होता है।

कफातिसार लक्षण

इससे पीडित व्यक्ति को रोमान्व हो जाता है तथा उसके रोगटें खडे हो जाते हैं। वह सफेद, गाढे, कफ युक्त, दुर्गन्धित एव शीतल मल का त्याग करता है।

सिमपातज अतिसार स्रक्षण

इसमे आनेवाला मल शूकर की चर्बी तथा मास के घोवन के सदृश तथा सभी दोपों के रूपों से युक्त होता है और यह क्रच्छ्रसाघ्य होता है।

शोकज अतिसार: निदान-सम्प्राप्ति-लक्षण

धननाश, बन्धुनाश आदि आपदाओं के कारण शोकसत्तस, अत्तएव अल्प भोजन करने वाले मनुष्य के अतिवाष्पत्यांग (नेत्र-नासा तथा गले से निकलने वाले जल-स्नाव) से उत्पन्न ऊष्मा उसकी कोष्ठस्थित पाचकाग्नि की दूषित करके रक्त को भी क्षुभित करता है। इस प्रकार क्षुभित एव गुञ्जाफल के समान वर्ण वाला रक्त मल रहित या मल युक्त, निर्गन्ध या सगन्ध होकर गुदामागं से निकलता है। यह शोकोत्पन्न अतिसार कष्टसाध्य होता है।

आमातिसार लक्षण

अन्न के न पचने के कारण प्रकुपित दोप कोष्ठ, रक्तादि घातु तथा मलो को दूपित करके अनेक वर्णों से युक्त शूल सहित मल को बार-बार निकालते हैं। इसे आमातिसार कहते हैं।

रक्तातिसार लक्षण


पैत्तिक अतिसार से पीडित रोगी जव अम्ल-लवण-कटु-क्षार-तीक्ष्ण पदार्थों का निरन्तर और अधिक मात्रा में सेवन करता है, तो पहले से ही सुट्य आन्त्रिककला-गत केशिकाओं के विदीण हो जाने से मल के साथ रक्त भी आने लग जाता है। इसको रक्तातिसार कहते हैं।

वसाध्य लक्षण

१ पके जामुन के समान स्निग्ध कृष्णवर्ण, २. यकृत् खण्ड के समान गहेरे कत्यई रग का, ३ पतला, ४ धृत-तैल वसा-मज्जा-वेशवार-दूध दही तथा मास धोये हुए जल के समान वर्ण वाला, ५ अञ्जनवत् कृष्ण, ६ नील अष्ण वर्ण, ७ पिसे हुए अपानवायु की | अतिसार रोग—गुदा से द्रवमल का ।

दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १ दोष-वातप्रधान।
- २. दूष्य-पुरीष एव जलीय घातु रस आदि।
- ३ स्रोतस्—पुरीषवह। 🥕 🌈
- ४. अधिष्ठान--पक्वाशय ।
- ५. स्रोतोदुष्टि लक्षण--अतिप्रवृत्ति ।



सहिताग्रन्थानुसार ६ भेव

चर	क और वाग्मट	सुश्रुत
9	वातज	वातज
3	पित्तज	पित्तज
₹	कफज	कफज
४	सन्निपातज	सन्निपातज
4	হাীক্ব	शोकज
Ę	भयज	आमज

वक्तव्य चरक और वाग्मट ने 'मामज' को दोषज मे मानकर पृथक् उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि 'भयज' और 'शोकज' भी वातातिसार मे अन्तर्भाव योग्य है, क्यों कि 'काम-शोक-भयाद वायु (प्रकुप्यति)' तथापि लक्षण, सज्ञा एव चिकित्सा भेद होने से पृथक् कहा है। सुश्रुत ने 'भयज' को वातातिसार मे गताय माना है और शोकज तथा आमज को हेतुविपरीत चिकित्सायोग्य के दृष्टिकोण से पृथक् बतलाया है।

पूर्वरूप

१. हृदय-नाभि-गुदा-उदर तथा कुक्षिप्रदेश मे सूचीवेधनवत् पीडा, २ अगो मे शिथिलता, ३ अधोवायु की रुकावट, ४ मलावरोध, ५ आध्मान तथा ६ भोजन का परिपाक न होना, ये अतिसार के पूर्वरूप हैं।

काले अञ्जन के समान कृष्णवर्ण, ८ स्निग्ध एव नानावर्ण, ९ मयूरिपच्छ के समान चित्रकायुक्त, १०. घन, ११ मुर्दे के समान गन्धवाला, १२. मस्तुलुङ्ग-सदृश, १३. सुगन्धित, १४. सडा हुआ और १५ अधिक मात्रा मे मल का आना, ये असाध्य लक्षण हैं।

१६ तृष्णा-दाह-नेत्रो के सामने अन्धेरा छाना, श्वास-हिक्का-पाद्वंशूल-अस्यि-शूल-मूर्च्छा-अरित और इन्द्रियमोह से ग्रस्त अतिसारी असाध्य होता है।

१७ जिसकी गुदवलियाँ पक गई हो, जो क्षीण हो, जो प्रलाप करता हो, वह असाध्य है।

१८ जिसकी गुदविलयाँ सकुचित न हो, पेट फूल गया हो, गुदपाक होने पर भी जिसमे गरमी न रह गयी हो, वह असाध्य है।

१९ श्वास-शूल-विपासा एव ज्वर से ग्रस्त तथा वृद्ध रोगी असाध्य होता है।

आम-पक्यमल लक्षण

वात आदि दोपो के लक्षणों से युक्त मल यदि अत्यन्त दुर्गन्धित एव पिच्छिलता युक्त हो और जल में डूव जाये, तो उसे आममल कहते हैं। जिसमें इसके विपरीत (दुर्गन्ध, पिच्छिलता का अभाव और जल में तैरना) लक्षण हो एव शारीर तथा कोष्ठ में हलकापन विशेषरूप से पाया जाय, तो उसे पक्व-मल समझना चाहिए।

सापेक्ष निदान

	शोकज अतिसार	रक्तातिसार	रक्तपित्त
9	रक्त मलयुक्त होता है।	रक्त मलयुक्त होता है।	अनिवाये नहीं ।
२	रक्त अल्प मात्रा मे	रक्त अधिक मात्रा मे हो	रक्त अधिक मात्रा मे हो
	रहता है।	सकता है।	सकता है।
₹.	जीवरक्त के लक्षण हो	हो सकते हैं।	जीवरक्त के लक्षण नही
	सकते हैं।		होते ।
४	रक्त गुदामार्ग से ही . आता है ।	रक्त गुदामार्ग से ही आता है।	रक्त गुदा-मुख-नासिका आदि से भी आता है।
	•	मात्र पित्तशामक एव स्तम्भक	
4	मानसिक उपचार से	•	
	लाभ ।	से लाम।	लाभकर।

आमातिसार और प्रवाहिका

आमातिसार

अनेक घातुओं का क्षरण होता है।

- २. मलत्याग के समय शूल होता है।
- ३ मल की मात्रा अधिक होती है।
- ४. अपनव अन्न भी गिरता है।

प्रवाहिका

केवल कफ का क्षरण होता है। मलत्याग के पूर्व ऐंठन होती है। मल की मात्रा कम होती है। अपक्व अन्न नहीं गिरता।

अतिसार-प्रवाहिका-प्रहणी

अतिसार	प्रवाहिका	प्रहणी
१ प्रवाहण नहीं ।	प्रवाहण अवश्य ।	प्रवाहण नही ।
२ मल कभी-२ कफयुक्त।	मल सदा सक्फ।	मल कभी-२ नकफ।
३. द्रवमल अधिक एव	मल कम, किन्तु वारम्यार।	द्रवगत वाग्भ्वार और
वारम्वार ।		अन्नयुक्त ।
४ पुरीव अधिक।	पुरीय की मात्रा कम।	मलसचय होनेपर भीच-
		प्रवृत्ति ।
५ काश्यं विशेष नही।	कारयं विशेष नही ।	काइवं धिरोप ।
६ जिह्नापाक नही।	जिह्वापाक नही ।	जिद्धापात ।
७. पक्वाशयसमुत्य ।	पक्वाशयनमुत्य ।	त्रहणीसमृत्य ।
८ रक्त निकल सकता है।	रक्त निकल सकता है।	प्राय नहीं निकलता।
९ शोथ उपद्रवस्वरूप।	शोय नही ।	घोष उपद्रवस्वम्प ।
१०. आशुकारी ।	आधुकारी।	चिरकारी।
	E-Conse	

चिकित्सासूत्र

- १ अतिसार मे सर्वेत्रयम आमातिसार है या पनवातिसार, यह पहुचान करे।
- २ आमातिसार हो, तो हरीतकी चूर्ण ५ ग्राम देकर या एरण्डतैल १५ ग्राम दूध मे पिलाकर विरेचन कराना चाहिए, फिर लघन, पाचन और दीपन उपचार करे।
 - २. पश्चकोल बादि पाचन औपधो के न्वाय से सिद्ध यूप या यवागू शिलावे ।
- ४ यदि बामातिसार में रोगी को घूल, आध्मान आदि हो, तो पिप्पली चूर्ण और सँघा नमक से युक्त मन्दोष्ण जल आकण्ठ पिलाकर वमन कराना चाहिए।
 - ५ वमन कराने के वाद लघु द्रव आहार यूप-मण्ड-लाजमण्ड-कृशरा आदि देवे।
- ६ यदि मल स्वय निकल रहा हो, तो उसे पहले रोजना नहीं चाहिए और यदि दस्त लगकर मल न निकल रहा हो, तो हरीतकी चूर्ण ५ ग्राम देकर मल को प्रवृत्त करे।
- ७ जो रोगी अधिक द्रव तथा मात्रा में अधिक मल का त्याग करता हो, उसे पिप्पली चूर्णे तथा सैन्धव लवण युक्त मन्दोष्ण जल आकण्ठ पिलाकर वमन कराकर लघन कराना चाहिए, पश्चात् पाचन औषध देनी चाहिए।
- ८ यदि रोगी अति दुवंल हो, दस्त वहुन होते हो और पावन औपध देने पर उसकी मृत्यु होने का सन्देह हो, तो उसे सयाही औपध देनी चाहिए।
- ९ यदि दस्त के वेग तीव्र हो, तो दवा की मात्रा आधी कर के ६-७ वार दिन भर मे दे।
- १० यदि अपानवायु तथा मल के निकलने में ठकावट हो, तो रोगी को अजादुग्ध दे।

१५ का० हिं

१९ पक्वाशय वायुका स्थान होने से अतिसार चिकित्सा मे (आम पाचन के प्रश्चात्) पहले वायुका उपचार करे, फिर पित्त और कफ का क्रमश उपचार करे।

१२. निराम अतिसार का निश्चय होने पर सग्राहक औषध देनी चाहिए।

आमातिसार चिकित्सा

- 9 हरीतक्यावि चूर्णं—घी मे भुनी छोटी हरें और हीग, अतीस, कालानमक और मीठायच का चूर्णं कर ३—३ ग्राम की मात्रा दिन में ३ बार मन्दोब्ण जल से देवे।
- २ धान्यपचक क्वाय-धिनया, सोठ, नागरमोथा, सुगन्धबाला और कच्चे वेल फल, समभाग का क्वाथ दिन मे ३ बार पिलाना चाहिए।
 - ३ पेय जल-वच और अतीस डाल कर पडगपरिभाषा से पकाया जल पिलावे।
- ४ दीपन-पाचनगण—तिकदु, चित्रकमूल, सज्जीखार, कालानमक, आँवला, इन्द्र-जौ, सोठ, विडग, दालचीनी, छोटी लाइची, अदरख, शीतलमिर्च, शख भस्म, कुचला शुद्ध इनका अकेले प्रयोग करे।
- ५ सिद्ध औषधें शिवाक्षारपाचन चूर्ण, लवणभास्कर चूर्ण, रसोनादि वटी, गन्धक वटी, शख वटी, सजीवनी वटी, विल्वादि चूर्ण, बचादि क्वाथ और वराट भस्म का उचित मात्रा मे प्रयोग करना चाहिए।

वातातिसार चिकित्सा

- १ इसमे दीपन-पाचन और वातानुकोमन ग्राही औपधो का प्रयोग करे।
- २ पश्चमूलादि चूर्ण वृहत्पश्चमूल, विरयार, सोठ. धनियाँ, नीलोफर और वेल की गिरी, समभाग का चूर्ण ४-४ ग्राम की मात्रा दिन मे ३-४ वार महे से देवे।
- ३ बचादि दराथ--बच, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजी का क्वाथ ३ वार पिलावे ।
- ४ पथ्यादि क्वाथ—हरीतकी, देवदार, बच, सोठ, नागरमोथा, अतीस और गुरुच, समभाग का क्वाथ दिन में ३ बार देना शीघ्र लाभकर है।
- ५. सिद्ध औषधें-अगस्तिसूतराज, कनकसुन्दर और हिंगुलवटी का प्रयोग उत्तम है।

पितातिसार चिकित्सा

- १ पित्तशामक और दीपन-पाचन औपघ एव आहार-विहार का सेवन करे।
- २ चीनी मिलाकर चिरायता, इन्द्रजी, नागरमोथा और रसॉत का नवाय पिलावे।
- ३ बिल्वादि ववाथ—वेलगिरी, इन्द्रजी, नागरमोथा, सुगन्धवाला और अतीस समभाग लेकर २० ग्राम का क्वाथ बनाकर सबेरे-शाम पिलावे।
- ४ तालीशादि चूर्ण, गगाघर चूर्ण, शख भस्म, कामदुघा रस, र्मूतशेखर रस, शुक्तिभस्म, इनमे से रोगी की दृष्टि से अनुकूलता का विचार कर दिन मे ३ वार अनार के शर्वेत से औषध दे।

५ मधुकावि चूर्ण-मुलहठी, कायफल, लोध, अनार का व्यक्तल इनके सममाग का चूर्ण ४-४ ग्राम दिन मे ३ वार तण्डुलोदक से दे।

कफजातिसार चिकित्सा

- १ कफशामक, पाचक और ग्राही औषध का प्रयोग करना चाहिए।
- २ पय्यादि स्वाय—हरॅं, चित्रकमूल, जुटकी, पाठा, वच, नागरमोया, कोरया की छाल और सोठ का क्वाय बनाकर पिलाना चाहिए।
- ३ चड्यावि क्वाय—चव्य, अतीस, नागरमोया, कच्चा वेल, सोठ, इन्प्रजी, कोरया की छाल और हर्रें, इनके समभाग का नवाय कर दिन में ३-४ वार पिलाना चाहिए। २० ग्राम की १ मात्रा।
- ४. हिग्वादि चूर्ण-मुनी हीग, कालानमक, सोठ, कालीमियं, पीपर, हरें, अतीस बौर वच, समभाग का चूर्ण कर ३-३ ग्राम तीन समय दे।
- ५ सिद्ध सौषधो में लोकनाथ रस. लक्ष्मी निलाम रस, जाती फलादि चूणं, आनन्दभैरव रस, अगस्तिसूतराज तथा लवगादि चूणं का उचित मात्रा में दिन भर में ३-४ वार सेवन करावे।

त्रिदोषज अतिसार चिकित्सा

- १. इनमे त्रिदोपनायक औषध-आहार-विहार का प्रयोग करना चाहिए।
- २ समङ्गादि क्वाय—छज्जावन्ती, अतीस, नागरमोया, सोठ, सुगन्धत्राला, धाय के फूल, कोरया की छाल, इन्द्रजी, वेलगिरी, इन्हें ममनाग मे लेकर २०-२० ग्राम का क्वाथ वनाकर, दिन में ३ वार पिलाना अति लाभकर है।
- ३ पञ्चमूलािद बवाय-वृहत् पञ्चमूल के सभी द्रव्य, विरयार की जड, वलिगरी, गुरुच, नागरमोथा, सोठ, पाठा, चिरायता, सुगन्धवाला, कोरवा की छाल, इन्द्रजी, इनके समभाग का क्वाथ २-३ वार प्रतिदिन पिलावे।
- ४ सिद्ध योग—पीयूपवल्ली रस, अमृताणंच रस, कुटजायलेह, कपिलाप्टक, जातीफलादि चूर्णं आदि को रोगी कें वलानुसार मात्रा मे दे।

रक्तातिसार चिकित्सा

- ९ रक्तातिसार मे वेदनास्थापक तथा रक्तस्यापक औषध-आहार का प्रयोग करे।
 - २ मोचरस चूर्ण १० ग्राम लेकर क्षीरपाक-विधि से दूध पकाकर प्रयोग करे।
- रे. वकरी का दूध मधु-चीनी मिलाकर पिलावे और उसी के साथ गीला भात सिलावे।
- ४ बिल्वादि कल्क-वेलगिरी, नागरमोथा, धाय के फूल, पाठा, सोठ और मोचरस, समभाग मे लेकर चूर्णंकर ३-३ ग्राम चीनी के माथ ३-४ वार प्रतिदिन देवे।

कायचिकित्सा

सन्दर्भं ग्रत्थ-१ सुश्रुत उत्तर० ४०। २. चरक चि० १९ मे छिटपुट। ३. अष्टाङ्गसग्रह चि० ११। ४. शार्ड्गंधरसं०। ५ भावप्रकाश। ६ मा० नि०।

स्वतन्त्र प्रवाहिका-निदान

- १ दूपित जल, दूपित आहार, बाई वायु, सीडन वाले स्थान मे निवास ।
- २ अतिसार के सभी निदान प्रवाहिका के भी निदान हैं।
- ३ मिथ्या आहार-विहार, विषद्धाशन अध्यशन, विषमाशन आदि।
- ४ वातप्रकोपक तथा कफप्रकोपक सभी निदान तथा अधिक गरमी पडना, तिलकुट या डालडा की वनी पूडी-मिठाई खाना आदि।

परतन्त्र प्रवाहिका-निदान


५ यह अतिसार के कारण जब परतन्त्र रोग के रूप मे होता है या अन्य किसी रोग के बाद होता है, तब इसका निदान इसके पूर्व का रोग होता।

६ दोप या लक्षण की दृष्टि से इसके '४ भेद किये गये हैं, उनमे कफजा का निदान स्नेह (धी-तेल) का अधिक प्रयोग, वातजा का रूक्षाहार और पित्तजा तथा रक्तजा का तीक्षण एवं उष्ण पदार्थ का सेवन है।

सामान्य संप्राप्ति

पहले मिथ्या आहार-विहार से अग्निमान्द्य होता है तथा कफ की वृद्धि होती है एव वायु (समान + अपान) का प्रकोप होता है। साम कफ पिन्छल होने से आंतो की दीवारों में चिपका रहता है। प्रकुपित वायु कफ को पुरीप के साथ वाहर निकालता है और इसके लिए प्रवाहण (जोर लगाकर कॉबना) करना पडता है, जिससे आंतो में कूथन या कर्तनवत् पीडा होती है तथा इस प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति होती है।

सप्राप्तिचक---



वस्तव्य-१ इन सभी प्रकार की प्रवाहिकाओं के लक्षण, चिकित्साक्रम तथा सामता निरामता का ज्ञान अतिसार के समान ही जान लेना चाहिए। २ प्रवाहिका में मुख्य रूप से चहदन्त में विकृति होती है। मलाशय में मल के साथ कफ चिपका रहता है और कफ की अधिकता होती है। कफ को बाहर निकालने के लिए औत का प्रवाहण जोर लगाकर करना पडता है और वात का प्रकीप होने से ऍउन अधिक होती है और मल अल्प मात्रा में निकलता है। आधुनिक दृष्टि से इसे डिसेफ्टरी. (Dysentery) कहते हैं।

चिकित्सासूत्र

- १ पहले दिन उपवास करावे, तदनन्तर दीपन पाचन औपध देवे।
- २ वाम अधिक हो तो स्तम्भक औषध न दे, अपितु इसवगोल की भूसी ३-४ ग्राम दूध के साथ दे।
 - ३ लघन-पाचन या मृदुविरेचन से लाभ न हो, तो पिच्छावस्ति देवे ।
- ४ प्रवाहिका मे वायु तथा कफ की प्रधान विकृति होती है, अत. वायु के अनुलोमन तथा कफ के निर्हरण का प्रयत्न करना चाहिए, एतदर्थ दीपन-पाचन और प्राही 'कुटजाष्टककवाथ' आदि के साथ एरण्ड तैल का प्रयोग करना चाहिए।
- ५ उदर मे शूल हो तो हॉटवाटर वैंग से सॅंक करे या कपूर मिला तापिन का तेल मले।

चिकित्सा

,विवन्ध मे धरोष्ण दूध, भामदोषयुक्त प्रवाहिका मे एरण्डमूल डालकर पकाये दुग्ध का प्रयोग तथा अतिसार हो या रक्त आता हो तो बालविल्वमज्जा-साधित दूध का प्रयोग उत्तम लाभप्रद है।

- २. विदारीगन्धार्दि गण भौषधें मिलित ५० ग्राम, पञ्चलवण २५ ग्राम और विदारीगन्धादि गण की भौषधों का क्वाथ ४ लीटर, तिल-तैल १ लीटर लेकर तैला-विशिष्ट पाक करें और इसी तेल से सिद्ध भोजन दे।
- ३ लोझाहि चूर्णे—लोध, विडलवण, वेलिगरी, सोठ, मरिच, पीपर, समभाग लेकर चूर्ण कर ३ ग्राम की मात्रा दिन में ३ बार पूर्वोक्त तेल के साथ देवे।
- ४. उक्त लोघादि चूर्ण खाने के बाद भूख लगने पर मलाई सहित दही में मधु मिलाकर भात से साथ खिलावे।
 - ५. राल का चूर्ण २-२ ग्राम चीनी के साथ दिन में ३ बार देना चाहिए। अथवा
- ६ सफोद राल १ ग्राम, मोचरस चूणं २ ग्राम और गुड ३ ग्राम मिलाकर मट्ठें के साथ दिन मे ३-४ बार दे।
 - ७ वेलगिरी तथा मोचरस २-२ ग्राम मिलाकर सबेरे-शाम गुड के साथ दे।
 - र ८. मुना जीरा ३ ग्राम मट्ठे मे मिलाकर कालानमक मिला घोडा-घोडा पिलावे।
- ९ कीरया की छाल और अनार के फल का वक्कल २०-२० ग्राम का क्वाथ बनाकर दिन मे ३ बार पिलावे।

१० सिद्धयोग--लघु गगाघर चूणं, कनकसुन्दर रस, शखोदर रस, जातीफलादि वटी, सिद्धप्राणेश्वर रस, कुटजावलेह, वृद्धगगाधर चूणं, किपत्याण्टक, कुटजादि वटी, दाडिमावलेह, इनका रोगी के वल आदि का विचार कर प्रयोग करे।

व्यवस्थापत्र

१. पीयूपवल्लीरस	१ गाम
रामवाण रस	३ ग्राम
शलभस्म	१ ग्राम
अग्नितुण्डी वटी	डे ग्राम
तालीसादि चूर्णं	४ ग्राम
ुजल से।	४ मात्रा
२. भोजन के पूर्व	
हिंग्वष्टक चूर्णं	४ ग्राम
जल से ।	२ मात्रा
३. भोजन के वाद	
कुटजारिष्ट	४० मि० ली०
	२ मात्रा

समान जल मिलाकर पीना।

४ दिन भर मे ४-५ वार चूसना हिंग्वादि वटी १-१ गोली

पथ्य

पुराना चावल, मूँग की दाल, कच्चे केले की सब्जी, नेनुआ, टमाटर, आँवला, लहसुन, होग, वालमूली, धान का लावा आदि हलके, सुपच लघु आहार पथ्य हैं। मट्ठा, बकरी का दूध देना उत्तम है।

अपथ्य

कोहडा, कटहल, आलू, सेम, डालडा या तेल मे तली चीजें, तीक्षण, उष्ण और भारी पदार्थ अपय्य हैं।

रकविंश अध्याय

पाण्डरोग, आमवात, मद तथा मदात्यय

पाण्डुरोग

, परिचय—रक्त की कमी के कारण जब समस्त शरीर की त्वचा का वर्ण मिलन, उदास, सफ़ेदी लिये हुए पीला हो जाता है और नाखून और नेत्र का वर्ण क्वेतपीताभ हो जाता है, रोगी रक्तहीन, मुरझाया हुआ तथा शिथिल होता है, तो उसे 'पाण्डुरोग' कहते हैं।

सन्वर्भ ग्रन्थ—१ चरक० चि० १६। २ सुश्रुत० उत्तर० ४४। ३ अष्टाङ्ग-हृदय निदान० १३।४ अष्टाङ्गहु० चि० १६। ५. मा० नि०।

सामान्य निवान

आहार—१. क्षार, २ अम्ल, ३. लवण, ४. अधिक उष्ण, ५ विरुद्ध, ६ असात्म्य, ७ सेम, ८ उडद, ९. तिल की खली, १० तिलतैल, ११ मद्य, १२. मिट्टी खाना। विहार—१. व्यायाम, २ अधिक मैथुन, ३ शोधन चिकित्सा का व्यतिक्रम होना, ४. ऋतुवैषम्य, ५ मल-मूत्रादि वेग-धारण आदि।

मानस माव-- १ कामवासना, २. चिन्ता, ३ भय, ४ शोक आदि।

सामान्य संप्राप्ति

स्वप्रकोपक निदानों से प्रकुपित पित्त का सन्वय और प्रकोप होकर जब प्रसर होता है, तो हृदय में स्थित साधक पित्त बढ़ जाता है। जब प्रबल वायु द्वारा वह पित्त प्रक्षिप्त होकर दश धमनियों द्वारा समस्त शरीर में घूमता है और कफ-वात-रक्त-मास तथा त्वचा को दूषित करता है एवं त्वचा और मास के आध्यन्तर स्थानसश्रय करके त्वचा में पाण्डु बादि अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है, तब पाण्डुरोग की उत्पत्ति होती है।

संप्राप्ति-चक

क्षार-अम्ल-लवण आदि निदान } पित्तप्रधान वातादि दोषप्रकोप — वायु द्वारा समस्त देह मे पित्त का प्रसर | कफ वात-रक्त आदि दूषण | रक्ताल्पता

त्वचा का श्वेतपीत वर्ण, विवर्णता

। पाण्डुरोग

दोष-दूष्य-अधिष्ठान---

- १ दोष--पित्तप्रधान व।त-कफ।
- २. दूष्य--रक्त, त्वक्, मास, मेद।
- ३ वधिष्ठान—त्वक्।

पूर्वरूप

१ हृदयस्पन्दन की अधिकता, २ रूक्षता, ३. स्वेदाभाव, ४ श्रम (चरक), ५ त्वचा मे फटन, ६ ष्ठीवन, ७. गात्रशियलता, ८. मिट्टी खाने की इच्छा, ९ नेत्र-कूटशोथ, १० मल-मूत्र मे पीलापन तथा ११ भोजन का पाचन, ये पूर्वेष्प हैं।

सामान्य लक्षण

प. रक्ताल्पता, २ मेद की अल्पता, ३. नि सारता, ४ इन्द्रियशैथिल्य एव५ विवर्णता।

वातज पाण्डु-लक्षण

१. त्वचा-नेत्र-नख-मुख एव मल-मूत्र का रूक्ष, कृष्णू तथा अरुणवर्ण का होना। २ शरीर मे सूचीवेधनवत् पीडा, कम्पन, आनाह, भ्रम, भेद और शूल आदि होना।

पित्तज पाण्डु-लक्षण

१. मल-मूत्र-नेत्र में पीलापन २ शरीर मे दाह, प्यास तथा ज्वर और ३. शरीर का वर्ण पीला हो जाना एव ४ अम्लिपित के समान कहवा स्वाद होना, खट्टी डकार और अन्न का विदाह होना, ये पित्तज पाण्डु के लक्षण हैं।

कफज पाण्डु-लक्षण

9 मुख से कफ का स्नाव-तृन्द्रा-आलस्य तथा शरीर मे भारीपन, २ शोय, ३ त्वचा, मल, यूत्र, नेत्र और मुखमण्डल का स्वेतवर्ण का होना।

त्रिदोषज पाण्डु-लक्षण

१ ज्वर २. अविच ३ मिचली ४ वमन ५ ध्यास और ६ क्लम (अनायास थकावट और इन्द्रियो का अपना काम न करना)।

यदि इन लक्षणों के साथ रोगी अतिक्षीण और हतेन्द्रिय (इन्द्रियों की शक्ति का नाश) हो, तो वह असाध्य होता है।

मृत्तिकाभक्षणजन्य पाण्डु की संप्राप्ति

मिट्टी खाने के अभ्यस्त व्यक्ति का कोई एक दोष प्रकुपित होता है। कषायरस की मिट्टी वात को, क्षारीय मिट्टी पित्त को और मधुर मिट्टी कफ को प्रकुपित करती है।

इस प्रकार दोष-प्रकोप करनेवाली मिट्टी अञ्चवहस्रोतस् मे चिपक जाती है, जिससे रसाङ्कुर अवरुद्ध हो जाते हैं और आहार रस का शोषण नही हो पाता । परिणामत इन्द्रिय-शक्तिनाश तथा तेज-वल-ओज का नाश करके वह मिट्टी बल-वर्ण एवं जठराग्नि के वल का ह्रास करनेवाले 'पाण्डुरोग' को उत्पन्न करती है।

मृत्तिकाजन्य पाण्डु की संप्राप्ति

कषाय-क्षार या मधुर मिट्टी खाने का अभ्यास े — निदान—अन्यतम दोषप्रकोप—अन्नवहस्रोतोऽवरोध

आहार रस का अशोपण

पाण्डुरोग-वलवणं हानि, रक्ताल्पता-रस-रक्तादि घातुक्षय

मृद्भक्षणजन्य पाण्डु-लक्षण

१. नेत्रकूट, कपोल, भौंह, पैर, नाभि, मूत्रेन्द्रिय मे शोथ होना, २. उदर मे कृमियो का होना और ३. रक्त तथा कफिमिश्रित मल का पतला होना और ४ वल-वर्ण-अग्नि का नाश।

असाध्य लक्षण

9 अधिक पुराना, २ अतिरूक्ष, ३ पीतदर्शी और शोययुक्त, ४ मल वधा-अल्प-हरितवर्ण और कफयुक्त निकलना, ५ हपंरिहत, ६ वमन-मूर्च्छी-नृषापीडित, ७ दाँत-नख-नेत्र मे पाण्डुता, ८ हाय-पैर मे शोय युक्त, मध्यशरीर क्षीण या मध्य शोययुक्त और हाय-पैर पतले, ९ गुदा-लिंग-अण्डकोपो मे शोय, १०. ग्लानियुक्त, ११ तीव्रज्वर और १२ अतिसार होना, ये पाण्ड्रोग के असाध्य लक्षण हैं।

चिकित्सासूत्र

- १ पाण्डुरोग के सभी निदानो का परित्याग करना चाहिए।
- २. स्तेहन करके तीक्ष्ण द्रव्यों के प्रयोग से विरेचन कराना चाहिए। तत्पश्चात् पथ्य बाहार की व्यवस्था करे।
 - ३ दोपविशेष के अनुसार औषध एव आहार देना चाहिए।
- ४. वातज पाण्डु मे स्नेहप्रधान औपघ, पित्तज पाण्डु मे तिक्तरस एव शीतवीयंवाले औषध द्रव्य, कफज पाण्डु मे कटु-तिक्त रसवाले तथा उष्णवीयं औषध द्रव्य एव सिन्नपातज पाण्डुरोग मे मिश्रित द्रव्य का प्रयोग करे।
- ' ५. मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोगी के वलावल का विचार कर तीक्ष्ण विरेचन देकर शरीर से मृत्तिका को निकाले और वमन भी करावे।
 - ६. विरेचन से शरीर शुद्ध हो जाने पर औषध-सिद्ध घृत का सेवन करावे।
- ७. पेयजल-पीने के लिए अथवा भोजन पकाने के लिए लघुपन्चमूल से सिद्ध किये हुए जल का प्रयोग करना चाहिए।

चिकित्सा

 पाण्डुरोग में स्नेह का क्षय होता है और रूक्षता अधिक होती है, अत रुग्ण को पश्चितक्त घृत, पश्चगव्य घृत, कल्याणक घृत, दाडिमादि घृत, कटुकादि घृत, हरिद्रा घृत या द्राक्षा घृत मे हो जो भी सुलभ हो उसको २५-३० मि० ली० की मात्रा मे दिन मे ३ बार दूध मे मिलाकर पिलाना चाहिए।

२ सम्यक् स्नेहन के बाद वातिक पाण्डु मे ५०० मि० ली० दूध मे १०० मि० ली॰ गोमूत्र मिलाकर विरेचनार्थं पिलावे, पित्तज मे निशोथ चूर्ण ४-६ ग्राम वरावर चीनी मिलाकर दे और कफज मे हरीतकी चूर्ण ५ ग्राम समान चीनी मिलाकर खिलावे।

३. शोधन के वाद पुराना चावल, जी, गेहूँ, मूँग, मसूर और जागल मासरस पथ्य मे दे।

्४ एकल द्रव्यो मे अमलतासफल-मज्जा, बिल्वपत्रकल्क, विदारीकन्द स्वरस, आंवले का स्वरस, गुडूची स्वरस, निम्बपत्र स्वरस, दारुहल्दी क्वाथ या द्रोणपुष्पी क्वाथ मे त्रिकदु चूर्णं और चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए।

५ हरीतकी चूर्ण ३ ग्राम को १०० मि० ली० गोमूत्र मे मिलाकर प्रतिदिन २ वार दे।

६ गोमूत्र को गोदुग्ध या त्रिफला क्वाथ और भैंस के मूत्र को भैंस के दूर्ध मे

७ जौ-चना के सत्तू को घोलकर, मधु मिलाकर, गन्ने के रस तथा आँवले के रस के साथ दे।

८ मुलहठी चूर्ण २–२ ग्राम मघु मिलाकर दिन में ३ बार देना पाण्डुनाशक है।

९ अग्निवल के अनुसार पिप्पलीचूर्ण २-३ ग्राम दूध से सेवन करना पाण्डुहर है।

१० न्यग्रोघादि गण, सालसारादि गण या केवल आवले का चूर्ण ३-३ ग्राम मधु के साथ दिन मे ३ बार देने से पाण्डुरोग नब्ट हो जाता है।

११ अजाशकृवादि चूर्णे —बकरी की मेगनी ५० ग्राम, हल्दीचूर्ण १५ ग्राम और सेंघानमक १५ ग्राम मिलाकर चूर्ण कर ले। ३–३ ग्राम मधु के साथ दिन मे ३ वार देवे।

सिद्धयोग

१२ पुनर्नवामण्डूर १−१ ग्राम, ५ ग्राम मधु और १० ग्राम घी मिलाकर सबेरे-

९३ नवायस लौह ९ ग्राम, गुडूचीस्वरस १० ग्राम और मधु १० ग्राम के साथ २ बार दे।

१४ योगराज रस ३०० मि० ग्रा० मधु से दिन मे ३ बार दे।

१५. फलित्रकावि क्वाय-—हर्रें, बहेडा, औवला (सभी निर्वीज), गुरुच, अरुस, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल, सब समान भाग लेकर भूसा की तरह कूट लेवे। २० ग्राम दवा को आधा लीटर जल मे चतुर्थाशाविशव्ट पकावे तथा ठडा कर छान ले भीर मधु मिलाकर सदेरे-शाम पिलावे । यह क्वाय अनेकशः परीक्षित है और अन्ययं सौपद्य है।

१६ मण्डूर भस्म ५०० मि० ग्रा० तथा शलभस्म २५० मि० ग्रा० एव हरें चूणें १ ग्राम की १ मात्रा मधु से २ बार दे।

१७ धात्रीलीह १ ग्राम की १ मात्रा मधु से चटाकर फलत्रिकादि क्वाय सवेरे-शाम दे।

१८ कासीसभस्म २०० मि० ग्रा०, शखभस्म २०० मि० ग्रा०, त्रिफला चूणं २ ग्राम इनकी १ मात्रा मधु से २ वार दे।

१९ प्रवालभस्म १२५ मि० ग्रा०, मुक्ताभस्म १२५ मि० ग्रा०, रसाञ्जन ३०० मि० ग्रा०, शखभस्म १२५ मि० ग्रा०, स्वर्णगैरिक २५० मि० ग्रा० की १ मात्रा मद्यु से दे, तत्पञ्चात् गोमूत्र १५ ग्राम २ वार गीए।

२० मृत्तिकाजन्य पाण्डु मे तीक्ष्ण विरेचन (इच्छाभेदी ५०० मि० ग्रा० शर्वत से) देकर विरेचन करावे तथा कडाई के साथ मृद्भक्षण का निपेध करे।

२१ तत्पञ्चात् प्रात -साय विडञ्जाद्यवलेह ४-४ ग्राम मन्दोव्ण जल से देवे ।

२२ हरीतकी चूर्ण ३-४ ग्राम गोमूत्र के साथ दे। कटुकादि छत, व्योपादि छत या आरम्बधसिद्ध छत का प्रयोग करे तथा फलियकादि क्वाथ पिलावे।

२३ मिट्टी खाने में अरुचि उत्पन्न करने के लिए मिट्टी में अतीश चूर्ण या कुटकी चूर्ण या निलम्ब पन्न चूर्ण खिलाकर मिट्टी खिलावे।

२४ कृमिज पाण्डु मे लौहभस्म २०० मि० ग्रा०, वायविडण चूणं २ ग्राम, अजवायनसत्त्व १०० मि० ग्रा०, पीपर १ ग्राम, इन्हें मधु से दिन मे ३ वार देवे।

२५. धात्र्यवलेह तथा द्राक्षावलेह १०-१० ग्राम सवेरे-शाम देना उत्तम है।

२६ तालीशादि चूणं, अविपत्तिकर चूणं, मण्डूर वटक, पाण्डुप-ज्ञानन रस, आरोग्यविद्यती वटी, ताप्यादि लौह, लोहामव, कुमार्यासव, द्राक्षासव, अभयारिष्ट, इनका यथोचित मात्रा और अनुपान के साथ प्रयोग करना लाभदायक होता है।

२७. शिलाजतु वटक (चरक) १-१ ग्राम गोदुग्ध के साथ सबेरे-शाम देना परम लाभकर है।

ब्यवस्यापत्र

वातज पाण्डु मे— १ योगराज १३ ग्राम

३ मात्रा
गोष्टत ५ ग्राम तथा मधु १० ग्राम से ३ वार ।
२ कुमार्यासव ४० मि० ली०
२ मात्रा
भोजनोत्तर २ वार समान जल मे गीना ।

कायचिकित्सा

पित्तज पाण्डु मे—	१ घात्रीर	गैह	१३ ग्राम
			३ मात्रा
_	धात्र्यव	ालेह २० ग्राग	न के साथ दिन मे २ वार।
	२. द्राक्षा	सव	४० मि० ली०
			२ मात्रा
	समान	जल से भोज	नोत्तर २ बार ।
	३ अविप	त्तिकर चूर्णं	४ ग्राम
	1		१ मात्रा
	गोदुग्ध	से रात में सं	ोते समय ।
कफज पाण्डु मे—	१. त्र्यूपण	ादि मण्डूर	9३ ग्राम
			३ मात्रा
	गोमूत्र के साथ दिन मे ३ बार ।		
	२ कुमाय	सिव	५० मि० ली०
			२ मात्रा
	भोजन	तिर समान	जल से २ वार।
	३ हरीत	की चूणें	५ ग्राम
			१ मात्रा
	रात मे	रात मे सोते समय गरम जल से।	
शोययुक्त पार्ण्डु मे—	१ पुनर्ने	वा मण्डूर	२ ग्राम
	•	•	३ मात्रा
	३ बार	संधु से, वाव	र मे पुनर्नवाष्टक पीना।
	२ पुनर्नव	ासव	५० मि० ली०
			२ मात्रा
	समान जल से भो		नोत्तर २ वार ।
	३ आरोग	यविंघनी	१ ग्राम
			१ मात्रा
	रात मे	सोते समय	मन्दोष्ण जल से।
मृत्तिकाज पाण्डु मे	१ कृमिमु	द्गर -	रै ग्राम
	विडङ्ग	ादि लीह	१ ग्राम
	नवायस	न लौह	9 ग्राम
		_	३ मात्रा
	विडङ्ग	चूर्ण, पलाश	बीज चूणं ३-३ ग्राम तथा मधु से

२ भोजन के बाद लोहासव

५० मि० ली०

२ मात्रा

समान जल से भोजनोत्तर २ बार ।

पथ्य

पुराने अगहनी चावल का भात, जो, गेहूँ, मूँग, अरहर, मसूर, परवल, करेला, गूमा, वैगन, प्याज, लहसुन, 'आंवला, जागल जीवो का मासरस, नेनुआ, लोकी, चौलाई, पालक, पपीता, अनार, अगूर, मुनक्का, किशमिश, सेव, नारङ्गी, केला, मीठे आम, सेव-आंवले का मुख्बा, गोदुग्ध, इक्षुरस, हल्दी से सिद्ध छत, ये सब पथ्य हैं।

सपध्य

उडद, तिलकुट, सरसो, सुरा, दिन में सोना, मिट्टी खाना, अतितीक्षण चरपरा भोजन, अधिक नमक, अधिक जल पीना, गुरु और विदाही भोजन, बीडी-सिगरेट-चरस का सेवन, कुलथी, अधिक अम्ल पदार्थ, मैथुन, व्यायाम आदि अपथ्य हैं।

आमवात १

परिचय—यह जिस स्थान पर होता है, वहाँ विच्छू के डंक मारने जैसी कब्टदायक पीडा होती है। यह शरीर की छोटी या वडी सिन्धयों में वेदनायुक्त शोथ उत्पन्न करता है। प्राय हाथ की मध्यवर्ती अंगूलि, कलाई, कर्पूरसिन्ध को आक्रान्त कर धीरे-धीरे सर्वेशरीरस्थ सिन्धयों में शोथ एवं पीडा उत्पन्न कर देता है। इसके होने के साथ अपच, जबर, शरीर में भारीपन, अङ्गो में अकर्मण्यता और हृद्यह आदि लक्षण होते हैं। वात की प्रधानता होने पर पीडा की अधिकता, पित्ताधिक्य में वाह तथा कफाधिक्य में अगो में जकड़न और भारीपन अधिक होता है। सिन्धशोथ में विकत्नापन और घनत्व की प्रतीति होती है।

सन्दर्थं ग्रन्थ--- १ माधवनिदान---आमवात । २ चक्रदत्त ---आमवात-चिकित्सा । ३ भै० र० आमवात-चिकित्सा । ४. शार्ङ्गधरसहिता---रोगगणना ।

निर्वचन-आमवात शब्द आम + वात, इन दो शब्दो से वना है। 'आमेन सहित वात:' अथवा 'आमश्च वातश्च आमवात ' इस प्रकार इसकी दो निरुक्ति की जाती है। जठराग्नि की दुर्वेन्ठता से असम्यक् पक्व आहार रस को 'आम' कहते हैं। वह वायु द्वारा प्रेरित होकर रक्तवाहिनो द्वारा सर्वेशरीर मे परिज्ञमण करता हुआं 'आमवात' रोग का जनक होता है। इस प्रकार 'आम' और 'वात' इन दोनो के सहकार से यह रोग होता है। ये दोनो सन्धिस्थलों मे शोथ, पीडा आदि लक्षण उत्पन्न करते है। इसलिए दोनो के प्राधान्य की अभिन्यक्ति के लिए इस रोग का नाम आमवात है। जव आमाश्चिक क्लेदक कफ की दृद्धि होती है तब आमाश्चिक अम्लरस पतला

१ सर्वाङ्गेकाङ्गसन्धिस्यशोयातियहगौरवम् । ज्वरोऽपाकाग्निमान्धे चृतृष्णा चामानिलाक्कति ॥ अअनिनिदान

(Dilute) हो जाता है, जिससे अन्न का परिपाक ठीक से न होने से आहाररस 'आम' (कच्चा) बनना है।

निवान

१ विरुद्ध आहार, २. विरुद्ध चेष्टा, ३. मन्दाग्नि होना, ४. कोई श्रम न करना, ५. म्निग्ध भोजन करने के वाद व्यायाम करना, ६ आमजनक-वातप्रकोपक एव सिन्धशैथिल्यकारक कारणो का सेवन, ७ उडद-दही-दूध-खीर खाना, ८. आनूप जीवो का मास भक्षण तथा ९. दूषित या सविष जल।

सम्प्राप्ति

विरुद्ध आहार-विहार आदि कारणो से निर्मित आमरस वायु से प्रेरित होकर कफ के मुख्य स्थान आमाशय, सिन्ध, हृदय आदि में जाकर वहाँ स्थित समानगुण-धर्मी कफ से मिलकर और भी विकृत एवं विदग्ध हो जाता है तथा अपनी विदग्धता से पित्त को प्रकुपित करता है। वह आम अपने अभिष्यन्दी-गुरु आदि गुणो से स्रोतो में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे वायु जो पहले से ही कुपित थी, अब और अधिक प्रकुपित हो जाती है। वायु की प्रेरणा से आम के प्रसर होने से हृदय भी प्रभावित होकर विकृतियुक्त हो जाता है। जब वह आम धमनियों में पहुँचता है तो नि। दोषों के प्रकोप से प्रभावित होकर शरीर के स्रोतों में क्लेद पैदा करता है, जिससे दुवंलता और हृदय में भारीपन होता है। वात और कफ एक साथ प्रकृपित होकर कोष्ठ, त्रिकप्रदेश तथा सिन्धयों में प्रविष्ट हो जाते हैं और समस्त शरीर को जकड लेते हैं। यही आमवात है।

सम्प्राप्ति-चक्र

विरुद्धाहारादि निदान—अग्निमान्द्य—आम + वातप्रकोपक निदान—वातप्रकोप—वात इलेड्मस्थान, सिन्ध, आमाशय उर कण्ठ मे वात की प्रेरणा से आम का प्रसर

धमनियों में प्रसर

१ (क) जन्मणोऽल्पवलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टामामाद्ययगत रसमाम प्रचक्षते ॥

⁽ख) आमाशयस्य कायाग्नेदीर्वं स्यादिनपाचित । आद्य आहारधातुर्ये स आम इति कीर्तित ॥

⁽ग) अविपनव्यसस्युक्त दुर्गन्थ बहु पिच्छिलम् । सदनं सर्वगात्राणामाम इत्यर्भिथोयते ॥

⁽ घ) आहारस्य स शेषो यो न पक्वीऽग्निलाघवात् । स मूल मर्वरोगाणामाम इत्यभियीयते ॥

⁽ड) आममन्नरस केचित केचित्तु मर्ठसन्नयम् । प्रथमां दोषर्द्धाष्ट्र च केचिदामं प्रचक्षते ॥ मधुकोष-आमबातनिदान

(Dilute) हो जाता है, जिससे अन्न का परिपाक ठीक से न होने से आहाररस 'आम' । (कच्चा) बनता है।

निदान

१ विरुद्ध आहार, २. विरुद्ध चेष्टा, ३. मन्दाग्नि होना, ४. कोई श्रम न करना, ५. म्निग्ध भोजन करने के बाद व्यायाम करना, ६ आमजनक-वातप्रकोपक एव सन्धिशैथिल्यकारक कारणो का सेवन, ७ उडद-दही-दूध-खीर खाना, ८. आनूप जीवो का मास भक्षण तथा ९ दूषित या सर्विष जल।

सम्प्राप्ति

विरुद्ध आहार-विहार आदि कारणो से निर्मित आमरस वायु से प्रेरित होकर कफ के मुख्य स्थान आमाशय, सिन्ध, हृदय आदि में जाकर वहाँ स्थित समानगुण-धर्मी कफ से मिलकर और भी विकृत एवं विदग्ध हो जाता है तथा अपनी विदग्धता से पित्त को प्रकुपित करता है। वह आम अपने अभिष्यन्दी-गुरु आदि गुणो से स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे वायु जो पहले से ही कुपित थी, अब और अधिक प्रकुपित हो जाती है। वायु की प्रेरणा से आम के प्रसर होने से हृदय भी प्रभावित होकर विकृतियुक्त हो जाता है। जब वह आम धमनियों में पहुँचता है तो तीनों दोपो के प्रकोप से प्रभावित होकर शरीर के स्रोतों में क्लेंद पैदा करता है, जिससे दुवंलता और हृदय में भारीपन होता है। वात और कफ एक साथ प्रकुपित होकर कोष्ठ, त्रिकप्रदेश तथा सन्धियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और समस्त शरीर को जकड लेते हैं। यही आमवात है।

सम्प्राप्ति-चन्न

विरुद्धाहारादि निदान-अग्निमान्द्य-आम

+ उर कण्ठ मे वात की प्रेरणा

वातप्रकोपक निदान-वातप्रकोप-वात

से आम का प्रसर

|
धमनियो मे प्रसर

१ (क) कष्मणोऽल्पवल्लेन थातुम्।चमपाचितम् । दुष्टामामाशयगत रसमाम प्रचक्षते ॥

⁽ख) आमाशयस्य कायाग्नेदौर्वच्यादिवपाचित । आच आहारथातुर्य स आम इति कीर्तित ॥

⁽ग) अविपनवससयुक्त दुर्गन्ध बहु पिच्छिलम्। मदन सर्वगात्राणामाम इत्यर्भिधीयते॥

⁽घ) आहारस्य स श्रेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात् । स मूल सर्वरोगाणामाम इत्यभियोयते ॥

⁽ह) आममन्नरस केचित केचित्तु मर्लसञ्चयम् । प्रथमां दोषदुष्टि च केचिदामं प्रचक्षते ॥ मधुकोष-आमवातनिदान

हृदय-विकृति, त्रिदोषप्रकोप
|
| रसवहस्रोतस् संग
|
| साम कफ + वात का सन्धियो मे
| स्थानसश्रय
|
| सन्धिशूल, शोथ, ज्वर, बालस्य,

बोप-बूष्प-अधिष्ठान

१ दोष-वातप्रधान त्रिदोष ।

२. दूष्य--रस, स्नायु, कण्डरा।

३ अधिप्रान—सभी सन्धिस्थल ।

४ स्रोतस्—रसवह।

५. स्रोतोदुष्टि-सग ।

६. रोगमार्ग--मध्यम रोगमार्ग ।

आमवात का सामान्य लक्षण

१ विभिन्न अङ्गो मे पीडा होना २ अरुचि ३. प्यास ४. आलस्य ५ शरीर मे भारीपन ६. ज्वर ७. भोजन का परिपाक न होना तथा ८ अगो मे शोथ होना, ये आमवात के सामान्य लक्षण हैं।

त्रिकसिन्ध के आक्रान्त होने पर कटिप्रदेश में नित्य ही पीडा बनी रहती है, रोगी उठने-बैठने में भी असमयें रहता है और हाय-पैर की सिन्धयों में शोय उपस्थित हो जाता है।

वामवात की तीवावस्या के लक्षण

आमवात की प्रवृद्ध अवस्था सब रोगो से अधिक कष्टसाध्य होती है। इससे हाथ, पैर, शिर, गुल्फ, जानु, त्रिक एव ऊरु की सिन्धयों मे पीडा युक्त शोथ उत्पन्न होता है। इनके अतिरिक्त भी जिस-जिस स्थान पर आमदोध पहुँचता है, वहाँ-वहाँ विच्छू के डक मारने जैसी वेदना होती है। इसमे अग्निमान्दा, लालास्नाव, अरुचि, शरीर मे मारीपन, उत्साहहानि, मुख की विरसता, शरीर मे दाह, पेशाव की अधिकता, उदर में कठोरता और शूल होता है। दिन में नीद आना और रात मे न आना, प्यास, वमन, श्रम, मूच्छी, हृद्ग्रह (Precardial region में स्तब्धता) और कोष्ठबद्धता हो जाती है। शरीर में अकर्मण्यता, आँतो मे गुडगुडाहट, आध्मान तथा अन्य अनेक उपद्रवो के होने की संभावना रहती है।

दोषज विशेष लक्षण

आमवात में पित्त का अनुबन्ध होने पर रुग्ण स्थान पर जलन और लाली होती है। बात का अधिक प्रकोप होने पर पीढा की अधिकता होती है। कफ का अनुबन्ध होने पर स्तिमितता (स्तब्धता), भारीपन और खुजली, ये लक्षण मिलते हैं।

दे६ का० वि•

साष्यासाध्यता

१. एकदोषज आमवात साध्य, २ द्विदोषज याप्य तथा ३ सर्वे-शरीरव्यापी शोथ से युक्त सान्निपातिक आमवात असाध्य होता है।

सापेक्ष निदान

आमवा त	वातरक्त	सन्धिवात
१ प्राय बडी सन्धियो से	प्राय छोटी सन्धियो से	सभी सन्धियो में
बारम्म '	आरम्भ	समान
२. ज्वर	ज्वर नही	ज्वर नहीं
३. सन्धिकोय, सन्धिकक्	सन्धिशोय, सन्धिरुक्	सन्धिरुक्
४ हृदगौरव		-
५. त्रिदोषज, वातकफ-प्रधान	त्रिदोषज, वातकफ-प्रधान	वात-प्रधान
६. दूष्य-रस	दूष्य-रस	दूष्य~रस
७. वृक्षिक दंशवत् शूल	सन्धिशूल	सन्धिशूल '
८ रक्तमोक्षण से लाभ नही	लाभ	-

चिकित्सासूत्र

- १ रोगी के बलाबल का विचार कर उसे लघन और स्वेदन कराना चाहिए।
- २. औषध तथा आहार में अग्निप्रदीपक एवं तिक्त तथा कटु रस वाले द्रव्य देवे।
- ३ विरेचन कराना चाहिए एवं लघन मादि से आमक्षय हो जाने पर रूप वायु के प्रशमन के लिए स्नेहपान कराना चाहिए।
- ४ सैन्धवादि तैल की अनुवासनवस्ति तथा आम के निर्हरण के लिए शोधन वस्ति दे।
 - ५, वालू की पोटली वनाकर उससे रूक्ष स्वेदन करना चाहिए।
 - ६ विना स्नेह का प्रयोग किये उपनाह (पुल्टिस से) स्वेदन करना चाहिए।
 - ७. रूक्ष स्वेद के लिए निम्नलिखित पद्य स्मरणीय है-

कार्पासास्यिकुलियकातिलयवैरेरण्डमूलातसी-वर्षाभूशणशिग्रुकाञ्जिकगुतैरेकीकृतैर्वा पृथक् । स्वेदः स्यादयकूर्परोदरशिर स्फिक्पाणिपादाङ्गुलि-ग्रीवास्कन्धकटीरुजो विजयते सामा समस्ता रुज ॥

- ८ आमवात के रोगी को प्यास लगने पर ५-५ गाम पीपर-पिपरामूल-वाभ-चीता-सोठ लेकर मोटा कूटकर ४ लीटर जल में अर्धेशेष पकाकर छानकर पिलाना चाहिए। यह पचकोल सिद्ध जल कहलाता है।
 - ९, पचकोल डालकर क्षीरपाक-विधि से पकाया हुमा दूध पिलाना चाहिए।
 - १०, भामवात मे लंबन, पाचन और शोधन प्रयोग करना चाहिए।

चिकित्सा

- १९ पाचन कषाय-कचूर, सोठ, हरीतकी, बच, देवदार, अतीस और गुरुच को समभाग लेकर २० ग्राम का क्वाथ बनाकर प्रात -साथ देवे।
- १२ शोधन कवाय दशमूल के सभी द्रव्य, गुरुच, रास्ना, सोठ और देवदार, समभाग लेकर क्वाथ बनाकर २०-२५ मि० ली० एरण्ड तैल मिलाकर आवश्यकतानुसार शोधनायं प्रयोग करे।
- १३. यदि उक्त क्वाथ का प्रयोग शमनार्थं करना हो, तो एरण्ड तैल १० मि० ली० डालना चाहिए।
- १४ रास्नासप्तक क्वाथ—रास्ना, गुरुच, अमलतास, देवदारु, एरण्डमूल, गदह-पूर्ना, गोखरू समभाग का क्वाथ सोठ का १ ग्राम चूर्ण मिलाकर सवेरे-शाम पिलावे।
- १५ एरण्डपायस—एरण्डवीज और सोठ का चूर्ण ३-३ ग्राम लेकर २०० मि० ली० दुध मे खीर बनाकर प्रतिदिन प्रांत काल खाने को देवे।
 - १६ हरीतकी चूर्ण ३ ग्राम, एरण्ड तैल १५ मि० ग्रा० के साथ सबेरे-शाम देवे।
 - १७ त्रिवृत चूर्णं ३ ग्राम प्रतिदिन एक वार मन्दोष्ण जल से दे।
- १८ रसोनादि वधाथ---लहसुन, सोठ, सिन्दुवारमूल की छाल, समभाग लेकर २० ग्राम का क्वाथ बनाकर सबेरे-शाम पिलावे।
- १९ गुग्गुलु, रास्ना, सोठ, लहसुन, कुचला, शुद्ध भल्लातक, गुडूची और एरण्ड स्नेह से बने योगो का प्रयोग लाभप्रद होता है। विशेषकर एरण्ड तेल को विशेष उपयोगी कहा गया है—

'कटीतटनिकुञ्जेषु सञ्चरन् वातकुञ्जर । एरण्डतैलसिहस्य गन्धमाघ्राय गच्छति ॥ यो० र०

अर्थात् 'शरीर रूपी वन मे विचरण करने वाला आमवातरूपी गजराज एरण्ड तेल रूपी सिंह के गन्धमात्र से भाग जाता है।

२० एकल द्रव्यो मे दशमूल, शिलाजीत, रास्ना, लहसुन, पिपरामूल, शतावर, सोठ, प्रसारणी, वच, वादाम तथा पिस्ता का प्रयोग उत्तम है।

सिद्धयोग---

- २९ चूर्ण —वैश्वानर चूर्ण, अलम्बुषा चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण या हिग्वादि चूर्ण दे। २२ वटी —अग्नितुण्डी वटी, आमवातारि वटी, चित्रकादि वटी एव रसोन वटी का प्रयोग करे।
- २३ गुग्गुलु—सिंहनाद, योगराज, कैशोर, वातारि और त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु का प्रयोग करे।
- २४. रस-रसायन-हिगुलेश्वर, वातगजाकुश, समीरपन्नग, अमृतमजरी, मल्ल-सिन्दूर, तालसिन्दूर, आमवातारिवच्च रस का उचित मात्रा मे प्रयोग करे।
- २५ मृत्युङ्जय रस, भ्रुग भस्म, पंचानन लौह, भामवात-विघ्वंसन का प्रयोग

कायिविकित्सा

२६ पीड़ा-शमनार्थ-महाविषगर्भ, पंचगुण तैल, प्रसारिणी तैल की हलकी मालिश करे।

२७ दशाग लेप, शताह्वादि लेप, हिस्रादि लेप, सिन्दुवार पत्र का प्रयोग करे।

२८ बासवारिष्टो मे पुनर्नवासव और बमृतारिष्ट देने ।

२९. दशमूलक्वाय, सैन्धवादि तैल या नारायण तेल की वस्ति देवे।

३०. रसोनिपण्ड---१०-१० ग्राम सवेरे-शाम मन्दोष्ण जल से देवे।

३१. जीणरींग पर बृहद् योगराज गुग्गुलु, मल्लिसन्दूर, सुवर्णभूपित रस, लक्ष्मी-विलास रस, समीरगजकेशरी, अजमोदादि चूर्ण, कासीस भस्म, इनमें से अनुकूलता का विचार कर प्रयोग करे।

ब्यवस्थापत्र

9. दिन मे ४ बार ३-३ घण्टे पर

वृहद् योगराज गुग्गुलू	१ ग्राम
अग्नितुण्डी वटी	५०० मि० ग्रा०
मल्लसिन्दूर	२५० मि० ग्ना०
वामवातारि रस	१ ग्राम
श्रृंगभस्म	१ ग्राम
आर्द्रंक स्वरस व मधु से। २ सवेरे-शाम	४ मात्रा
रास्नासप्तक क्वाय	१०० मि० ली <i>०</i>
एरण्डलैल	१० ग्राम
	१ मात्रा
३ भोजनोक्तर २ जार	

३. भोजनोत्तर २ बार अमृतारिष्ट

४० मि० ली० २ मात्रा

समान जल से पीना । ४. रात में सोते समय

वैश्वानर चूर्णं ५ ग्राम मन्दोब्ण जल से।

पथ्य

जी, कोदो, साँवा, कुलथी, मूँग, पुराना अगहनी चावल, गीमूत्र, मधु, उष्ण जल, कटु-तिक्तरस-प्रधान द्रव्य, अजवायन, जीरा, सोंठ, मरिच, आदी, लहसुन, जागल जीवों का मांसरस, करेला, बथुआ, परवल, पन्धकोल-सिद्ध जल, एरण्डतैल, लहसुन, सोठ, इनका नियमित प्रयोग अधिक लाभप्रद होता है।

सपभ्य

दूध-मछली, दूध-गुड, विरुद्ध, गुरु एव स्निग्ध पदार्थ, विरुद्धाशन, विषमाशन, अभिष्यन्दी पदार्थ, रात्रिजागरण, वेगावरोध, पिष्ट पदार्थ, पुरवैया वायु, चिन्ता, शोक, आसस्य आदि अपथ्य हैं।

सब

परिचय—'मद' शब्द का अयं हवं और आमोद होता है। राजस या तामस आहार करने से या मद्य अथवा अन्य मदकारक द्रव्य गाँजा, भाँग या सुपारी आदि का सेवन करने से वात-पित्त-कफ अलग-अलग या एक साथ अल्पाश में प्रकृपित हो जाते हैं और मन रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट हो जाता है तो दोष रक्तवह तथा संज्ञावह स्रोतो को अवबद्ध कर वक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप 'मद' की उत्पत्ति होती है, जिससे हवं, उल्लास, अधिक प्यास, प्रीति सुख, हलका नशा और निद्रा का अनुभव होता है।

'मद' मे दोषो का प्रकोप हलका होता है और रसवह, रक्तवह या संज्ञावह स्रोतो में अल्प अवरोध होता है। यह मानस विकार है, क्यों कि इसकी उत्पत्ति के पूर्व मन के रज-तम, इन दोनो दोषो का प्रकोप अवश्य ही होता है।

वक्तव्य—आचारं चरक ने 'मदरोग' का वर्णन दो स्थानो पर किया है— प्रथम चरक-सूत्रस्थान के चौबीसर्वे अध्याय (विधिशोणितीय) में यह रक्तज रोग के रूप में कहा गया है और दूसरा चरक-चिकित्सास्थान के चौवीसर्वे (मदात्यय चिकित्सा) अध्याय में मद्यज विकार के रूप में वर्णित है। चाहे इसे रक्तवहसस्थान का रोग मानें या मद्यज रोग मानें। दोनों ही स्थिति में इसमें रज-तम की कारणता निर्विवाद है। अतः यह एक मनोविकार है। इस रोग की वृद्धि होने से 'मूर्च्छा रोग' और मूर्च्छा की वृद्धि होने से 'सन्यासरोग' होता है। इस प्रकार यह कथन असगत नहीं होगा, कि एक ही रोग अवस्था-भेद से तीन नामो से जाना जाता है, क्योंकि उन तीनो रोगो के निदान और सम्प्राप्ति एक हैं। एवन्च अल्प दोष-प्रकोप होने पर मद, मध्यम श्रेणी के दोषप्रकोप से मूर्च्छा तथा तीत्र रूप में दोषप्रकोप होने पर संन्यास रोग होता है। यह रोग प्राय. नशीले पदार्थों के सेवन से होता है, अत. इसे मद्यविश्रम और मद कहते हैं।

निर्वेचन-माद्यति इति मद । 'मदी हर्षे' (दि० प० से०)। 'मदोऽनुपसर्गे' (३।३।६७) इत्यप् । हर्षेऽप्यामोदवन्मद । अमर० ३।३।९१

सन्दर्भं प्रन्य—१ चरक० सूत्र० २४। २ चरक० विकित्सा० २४। ३ सुश्रुत० उत्तर० ४७। ४. अष्टाङ्गह् ० नि० ६। ५ अष्टाङ्गह् ० वि० ७। ६ माधवनिदान। ७. योगरत्नाकर।

१ यदा तु रक्तवाद्दीनि रससञ्चावद्दानि च।

पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मला. ॥

मिलनाद्दारशिलस्य रजोमोद्दादृतात्मन. ।

प्रतिदृश्यावतिप्रन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥

मदमूर्व्यायसत्तेषां विद्याद् वित्तक्षण ।

यथोत्तरं बलाधिक्यं देतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ च० सू० २४।२५-२७

निदान

विरुद्ध आहार, वेगधारण, मन मे रज-तम का बाहुल्य, हीन मनोवल रक्तविकार, रसवह, रक्तवह तथा सज्ञावह स्रोत मे अवरोध, नशीले पदार्थों का सेवन, कसैली, सुर्ती, जर्दा तथा मद्य का सेवन।

संप्राप्ति

स्वप्रकोपक कारणों से प्रकृपित वायु दुवंछ मनवाले व्यक्ति के हृदय एवं मनोवाही स्रोतों में प्रवेश करती है, तो मन को सुब्ध करती हुई ज्ञान को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार पित्त और कफ दुवंछ हृदय में जाकर मन को सुब्ध करते हुए सज्ञा को नष्ट कर देते हैं, जिससे मदरोग की उत्पत्ति होती है।

रक्तज मद के भेद | | | | वातज पित्तज कफज सिन्नपातज वातज मद के छक्षण

१. रुक-रुक कर, अस्पष्ट, अधिक और शीघ्रतापूर्वक बोलना, २. चन्चल और अव्यवस्थित रहना और ३ शरीर का वर्ण रूक्ष, श्याव एव अरुण वर्ण होना।

पित्तज सद के लक्षण

१ क्रोधयुक्त कठोर वचन बोलना, २. मारपीट, लढाई-झगडे पसन्द करना और ३ रक्त, पीत अथवा काले वर्ण की आकृति होना ।

कफक मद के लक्षण

श्वल्प तथा असम्बद्ध बातें करना, २ तन्द्रायुक्त और आलसी होना, ३. पाण्डु वर्ण का होना और ४ सदैव किसी बात को सोचते रहना ।

सन्निपातज मद के लक्षण


सभी दोषों से होनेवाले लक्षणों का होना, यह सिन्नपातज मद का लक्षण है।

बक्तव्य—मद्य के पीने से जो मद होता है, वह शीध्र ही उत्पन्न होता है और
शीध्र ही शान्त हो जाता है, उसी तरह ये रक्तज मद भी शीघ्र उत्पन्न और शान्त
होने के स्वभाव वाले होते हैं।

बक्तव्य-मद्यपान या विष-भक्षण जन्य मद भी रक्तज मद की तरह वात-पित्त और कफ को छोडकर नहीं होते। उनमें भी दोषों का अनुबन्ध होता है।

मद्यज मद का निदान

१. बिना कुछ खाये-पिये अकेले नित्य मद्य पीना, २ क्रोध-धोक आदि से ग्रस्त होने पर, ३ ज्यायाम या परिश्रम करने पर, ३ वेगावरोध होने पर, ४ जल या बन्न से पेट के भरे रहने पर जी मद्य पीता है, उसमे मद्यजन्य मद आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं।



प्रथम मद के लक्षण

प्रयम मद के होने पर बुद्धि और स्मरणशक्ति मे तीयता, प्रसम्नता, सुरा का बनुभव, भोजन, पेय पदार्थ और निद्रा मे रुचि की यृद्धि, पाठ करने, गाने और भाषण करने का मन होना तथा उनमे पदुता बाना, ये लक्षण होते हैं। यह मद बानन्दपर्धक होता है।

द्वितीय मद के लक्षण

मद या नक्षे की द्वितीयावस्था मे बुद्धि-स्मृति-याणी लटलडाने लगती हैं। इनकी विभिन्यक्ति वस्थप्ट होती है। वह मदहोश होकर पागलो जैसी हरकत एव बेढव तरीके से बावरण करता है। वह बशान्त एव बालस्य और निद्रा से विभिन्नत रहता है।

त्ततीय मद के लक्षण

तृतीय मद में वह मद्यपायी नयों के शिकञ्जे में फरेंस जाता है। उनकी अपनी नियन्त्रण-शक्ति (Governing power) नष्ट हो जाती है। वह अगम्या स्त्री या अगम्य पय की ओर भटक जाता है, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, अज्ञानताच्या अभक्ष्य पदायों का भक्षण करता है और मन में छिपी गोपनीय वार्ते भी प्रकट कर देता है।

चतुर्थं मद के लक्षण

इस चतुर्य मद में रोगी अपने होश गैंवा बैठता है तथा दूटी लकडी की तरह भूलुण्ठित हो जाता है। वह कार्य-अकार्य विवेकशून्य होता है तथा मरे हुए जैसा कही भी निष्क्रिय पढ़ा रहता है।

वक्तव्य — आचार्यं चरक ने द्वितीय मद की अवस्था पारकर किन्तु तृतीय मदावस्था मे पहुँचने के पूर्वं एक अन्य मद का उल्लेख किया है। वह दो मदावस्था के बीच की स्थित मदान्तर नाम से कही जाती है। जिसके लक्षण में कहा गया है, कि इस मदान्तर अवस्था में आक्रान्त व्यक्ति किसी भी प्रकार के अधुम-हानिकर या गलत काम कर सकता है। जैसे कोई पथिक ऐसे मार्ग पर नहीं चलता जहाँ प्राण-सकट हो, उसी तरह कीन ऐसा अबुद्धि होगा जो इस पागल बना देनेवाली प्राणहारक दशा में अपने आप को डालना चाहेगा।

वस्तुत यह रुक्षण तृतीय मद मे गतार्थ हो जाता है। अत. इसको मानने का भौचित्य नही प्रतीत होता।

चिकित्सासूत्र

- प्रथम मद हर्ष, उल्लास और आमोद को बढानेवाला होता है। अत उसमें
 सौम्य, रुचिकर आहार-विहार और व्यवहार करना चाहिए।
- २. द्वितीय, तृतीय एव चतुर्थं मद मे रोगी को विस्मयजनक बातों से, प्रिय मधुर गीत-वाद्य से अद्भृत वस्तु दिखलाकर उसके मन को एकाग्र करे।
- ३ तीक्षण नस्य, अञ्जन, कवलग्रह, घर्षण, उवटन, तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण वमन-विरेचन आदि से रोगी को होश में लावे और उसके मनोवल को बढाने का प्रयत्न करे।
- ४. होश-हवाश ठीक हो जाने पर लक्षण एव उपद्रवानुसार चिकित्सा की व्यवस्था करे।
- ५ स्नेहनं-स्वेदन करके दोष तथा रोगी के वल के अनुसार पञ्चकर्म का प्रयोग करना चाहिए।

चिकित्सा

- 9 प्रात काल अदरक⁽ ५ प्राम को 9० प्राम गुड के साथ देवे और रात में त्रिफला चूर्ण ६ ग्राम मन्दोष्ण जल से देना चाहिए।
- २. नागरमोथा और पित्तपापडा १०-१० ग्राम ४ लीटर जल मे अर्घाविशिष्ट पकाकर पीने के लिए देवे।
- ३ खजूर, मुनक्का, कोकम, इमली, फालसा और आँवले के चूर्ण को अनार के रस के साथ पीने योग्य बनाकर सबेरे शाम दे।
- ४ त्रिकटु चूर्ण ३ ग्राम, सोचरनमक है ग्राम जल मे घोलकर पिलावे। यह बातज मद मे लाभकर होता है। पित्तज मे वट की वरोह को पीसकर चीनी और बफं के पानी से पिलावे। कफज मे मद्य पिलाकर वमन एव लघन करावे और दीपनीय औषध दे।
 - ५ सुपारी खाने से हुए मद मे शीतल जल पिलाने और शीतोपचार करे।
 - ६. घतूरे के नशे में चीनी मिला हुआ गोदुग्ध पीने कों दे।
 - ७ भौग के नशे मे इमली का पानक या निम्बुजल पिलावे तथा खटाई खिलावे।

सिद्धयोग

- ८. मूर्च्छान्तक रस २०० मि० ग्रा० गोदुग्ध से ४ बार रोज दे।
- ९, कल्याण घृत १५ ग्राम गोदुग्ध से दिन मे ३ बार दे।
- १० अष्टाङ्ग लवण २-२ ग्राम नीबू के रस से ३-४ बार दे।
- ११ रससिन्दूर १२५ मि० ग्रा० पीपर चूर्ण है ग्राम व मधु से ३ बार दे।
- १२ वसन्तमालती १२५ मि० ग्रा० मधु से दिन मे ३ बार देना चाहिए।

मदात्यय

सामान्य निदान

१. खाली पेट मद्यपान, २. नित्य मद्यपान, ३. केवल मद्यपान, ४. क्रोध-भय-तृष्णा-शोक से पीडित अवस्था मे, ५ व्यायाम-भारवहन-मार्गगमन से थके होने पर, ६ वेगो को रोकने पर, ७. अति जल पीने तथा पेट के अधिक भरे रहने पर, ८ अध्यशन रहने पर, ९. उष्णता से अस्त होने पर और १० शरीर के दुवंल होने पर किया गया मद्यपान अनेक प्रकार के मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है।

संप्राप्ति

मद्य अपने प्रभाव से हृदय को आक्रान्त कर अपने (१) लघु गुण से ओज के गुरु गुण को नष्ट कर देता। इसी तरह (२) उष्ण गुण द्वारा शीत को (३) अम्ल गुण द्वारा मघुर गुण को (४) तीक्ष्ण गुण द्वारा मृदु गुण को (५) आधुग गुण द्वारा निर्मल गुण को (६) रूक्ष गुण द्वारा स्मिग्ध गुण को (७) व्यवायी गुण द्वारा स्थिर गुण को (८) विकासी गुण द्वारा कल्क्ष्ण गुण को (९) विकाद गुण द्वारा पिच्छिल-गुण को और (९) सूक्ष्म गुण द्वारा ओज के बहल गुण को नष्ट कर देता है। इसी तरह मद्य द्वारा ओज के गुणो के नष्ट हो जाने पर ओज पर अधित मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, उसके वाद मद्य, मदात्यय या नशा को जन्म देता है।

सामान्य रुक्षण


१ शरीर में अति वेदना, २ सम्मोह, ३. हृदय-व्यथा, ४. अरुचि, ५. सदा तृष्णा, ६. शीत या उष्ण ज्वर, ७ शिर-पार्श्वं तथा अस्थिसन्धियो मे बिजली के करेण्ट जैसी वेदना, ८ जोरदार जम्भाई, ९ फडकन, १० कम्पन, ११ थकावट, १२. उर स्तम्भ, १३. कास-श्वास, १४ हिक्का, १५ निद्रानाश, १६. कर्णरोग, १७ मुखरोग, १८ त्रिक मे जकडन, १९. वमन, २० अतिसार, २१ मिचली, २२. त्रिदोषज रोग, २३. भ्रम-प्रलाप, २४ असद् रूपदर्शन, २५ तृण-पर्ण-लता-पाशु- भस्म से शरीर ढँकना, २६ ऐसा आभास होना, जैसे कि कोई पक्षी चोच मार रहा हो या लेकर उड गया हो, २७ स्वप्न मे व्याकुल करनेवाले अशुभ दृश्यो को देखना, ये सव लक्षण-मदात्यय में होते हैं।

ल्पूष्णतीष्णसङ्गाम्लन्यवाय्याशुगमेव च। रूक्षं विकासि विश्वद मद्यं दशगुणं स्मृतम्॥

१ (क) मद्य के १० गुण---

⁽ख) मोन के १० ग्रुण---गुरुशीत मृदुश्र्ह्णं बहुलं मधुरं स्थिरम् । प्रसन्नं पिन्छिलं स्निग्धमोजो दशगुणं स्मृतम् ॥

⁽ग) मधं हृद्यमाविदय स्वगुणैरोजसो गुणान् । दशभिर्दश सङ्क्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ॥ च० चि० २४।२९–३१



वातज पानात्यय लक्षण

१ हिचकी, २ श्वास, ३. शिर कम्प, ४ पार्श्वेशूल, ५ निद्रानाश, ६. बहु प्रलाप।

पित्तज पानात्यय लक्षण

१ तृष्णा, २. दाह, ३. ज्वर, ४. स्वेद, ५ सूच्छा, ६ अतीसार, ७ विभ्रम, ८. हरितवर्णता ।

कफज पानात्यय लक्षण

वमन, २. अरुचि, ३ मिचली, ४. तन्द्रा, ५ भारीपन, ६. शीत लगना और
 गरीर का गीले कपडे से आवृत्त होने जैसा अनुभव करना ।

त्रिदोषज पानात्यय लक्षण

तीनो दोषों के लक्षणों से युक्त होना।

परमद का लक्षण

१ कफाधिक्य, २ अङ्गगौरव, ३ आस्यवैरस्य, ४ मल-मूत्रावरोघ, ५ तन्द्रा, ६ अरुचि, ७ तृष्णा, ८ शिर शूल, ९ सन्धिशूल ।

वक्तव्य — ये लक्षण मद्यपान की खुमार या प्रश्नाद्भावी अवसाद के हैं। मद्यपान से उत्तेजित विभिन्न अवयव मद्य-प्रभाव के शान्त होने पर श्रान्त और शिथिल हो जाते हैं। मद्य विष के समान विकासी होने से सन्धियों में शैथिल्य और पीढा उत्पन्न करता है।

पानाजीर्ण लक्षण

पानाजीण मे मद्य का पाचन न होने से-- १ तीव्र अफारा, २ वमन तथा ३ शरीर मे जलन होती है।

पानिधभ्रम लक्षण

(Chronic alcoholism)

१. हृदय तथा शरीराङ्गी मे सूचीवेधनवत् पीडा, २ नासा एव मुख से कफसाव, ३ कण्ठ से धुँबा-सा निकलना, ४ मूच्छी, ५. वमन, ६. शिर शूल, ७ शरीर मे दाह और ८. विभिन्न प्रकार के मद्य तथा भोजन में अरुचि ।

प्यसक के लक्षण

१. कफप्रतेक, २ कण्डशोष, ३. शब्दामहिष्णुता, ४ अतितन्दा-निद्रा ।

विक्षय के लक्षण

्र हृद्रोग, २ कण्ठरोग, ३ मम्मोह, ४. यमन, ५. येदना, ६. ज्वर, ७. यमन, ८ पाइकंपूल, ९ कास और १० ध्रम होना ।

मदात्यय के उपद्रव

१ हियका, २ ज्वर, ३ कम्प, ४. यमन, ५ पार्वपूल, ६. काम और ७ प्रम ।

। असाध्य लक्षण

१ प्रसम्बमान उपस्तिन बोष्ठ, २, बाह्र व्यक्तियोत्त, ३. आध्यन्तर व्यक्तियात्, ४. मुख में तेल लगा जैना मालूम देना, ५. जिल्ला, बोष्ठ, यांत काले-नीले होना, ६ बाँखें पीली होना वया। रक्त के समान लाल होना।

विकित्सासूत्र

- तभी गदात्यय त्रिदोपज होते हैं, किन्तु जिम दोप की अधिकता दील पढे,
 उस दोप की चिकित्सा पहले फरनी पाहिए।
- २ जब दीनो दोयों की ममता रहे, सो पहुने कक, फिर पिस, सब वायु की विकित्सा करे।
- ३ जिस मदिरा के ट्रीन या अतिमात्रा में अविधि पीने से मदारयय हुआ हो, जमी मदिरा के सम मात्रा में मविधि पीने के यह शान्त हो जाता है।
- ४ मदास्यय रोग के हरुका होने पर अप्र में एवि होने पर हितकर आहार-विहार करावे।
- ५. मदापान के तुरन्त बाद १५-२० ग्राम की में कीनी मिलाकर विला देने से नक्षा नहीं चढता है।
- ६. घ्वसक तथा विक्षय में दूध और भी का अधिक प्रयोग करे, अनुवासन और यापनवस्ति का प्रयोग तथा यातनामक सैन्यास्यास्त्र, खबटन और वातनासक पौद्धिक पथ्य देना चाहिए।
- ७ मचपान-जित अन्नरस की विद्याधता तथा धारीयता के कारण हाह, ज्वर, तृष्णा और मदिविद्यम होने पर पुन मद्य ही विलाना चाहिए, क्योंकि मद्य अस्लो में श्रेष्ठ है और उसका धारीय गुण अम्ल के साथ मिलकर मधुर गुण मे परिवर्तित हो जाता है।
 - ८. सशोधन, संशमन, शयन, लसुन और परिश्रम हितकर है।

चिकित्सा

वातज मदात्यय मे औषघ एवं वाहार-विहार

- १. पिण्ड खजूर, मुनक्का, वृक्षाम्ल (कोकम), इमली, अनार, फालसा और आँवले से सिद्ध जल मे लाजा का सत्तू घोलकर पिलाना चाहिए।
 - २ कालानमक, सोठ, मरिच, पीपर के चूर्ण डालकर जल मिश्रित मद्य पिलावे।
- ३ बिजौरा नीबू, वृक्षाम्ल, बेरमज्जा, अनार, अजवायन, आर्द्रक और सैन्धव-लवण पीसकर मिलाया हुआ हलका जल मिला मद्य पीना हितकर है।

४. लावा, तित्तिर, मुर्गा और मोर एव मृग, मछली तथा आनूप जीवो के मासरस को स्निग्ध और अम्ल द्रव्यों से संस्कृति कर अगहनी चावल के भात से खिलावे।

५ अभ्यग, उवटन, उष्ण स्नान, यौवन की ऊष्मा से गरम देहवाली विपुल नितम्ब-ऊष्-स्तनभार से आनम्र सुख सरसाने और आमोद-प्रमोद का अभिवर्षण करनेवाली प्रमदाओं का प्रगाढ आलिःङ्गन, उष्ण शयनागार, उष्ण आच्छादन, उष्ण प्रावार तथा उष्ण अन्तर्गृह निवास वातप्रवल मदात्यय का शीघ्र शमन करते हैं।

पित्तज मदात्यय मे औषघ एवं आहार-विहार

- १. कमरख, खजूर, मुनक्का, फालसा, खट्टे अनार, इनके रस की मद्य में मिलाकर जो का सत्त् और चीनी डालकर पिलाना चाहिए।
 - ्र २. मूँग के यूष में चीनी डालकर अथवा मधुर मासरस पिलाना चाहिए।
 - ३. मुनक्का, आंवला, खजूर और फालसा के रस से युक्त सत्तू का तर्पण पिलावे।
- ४ शीतल जल, शीतल आहार, शीतल वायु, शीतल शयन-आसन-ग्रह और खाने-पीने के शीतल द्रव्यों का प्रयोग पित्तज मदात्यय को शान्त करता है।
- ५ स्नान-अवगाहन शीतल जल मे करावे और सौम्य, मनोहर, रुचिवधंक शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धो की व्यवस्था करनी चाहिए।

कफ्ज मदात्यय चिकित्सा

- १. मदनफल चूर्ण ४-५ ग्राम या बच चूर्ण ४ ग्राम मद्य मे डालकर थोडा जल मिलाकर पिलाकर वमन करावे। रोगी के बल के अनुसार लघन करावे तथा दीपन औषधो का प्रयोग करे।
- २. कफज मदात्यय के रोगी का शरीर जब आमदोध से मुक्त हो जावे तो भूख लगने पर चीनी डालकर बनाये गये पुराने अरिष्ट मे धान के लावा का सत्तू मिलाकर अजवायन तथा सोठ का चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए।

३ खट्टे अनार या नीवू का रस डालकर परवल का यूष पिलावे या जी का सत्तू घोलकर पीने को देवे।

४. मासार्थी को मरिच चूर्ण, नीबू का रस, अजवायन और सोठ का चूर्ण डालकर भूना हुआ मास सेंधानमक डालकर देवे। ५ रूझ-उष्ण बन्नपान, गरम जल से स्नान, व्यापाम, उपवास, रूझ उवटन, गुरुवस्त्र धारण, आलिङ्गन मे उष्ण और सुस्तकर उरोज मादि अङ्गीवाली स्त्रियो का बालिङ्गन, प्रशिक्षित होनेवाली प्रिय ललनाओ द्वारा देह दबवाना आदि कफन मदात्यय के विकारों को दूर करते हैं।

सिज औषघ

६. अष्टाङ्क लवण—कालानमक, स्याहजीरा, इमली, अम्लवेत १-१ भाग, दालचीनी, छोटी इलायची, मरिच बाघा-आद्या भाग और चीनी १ भाग मिलाकर कूट-पीसकर रख ले। १-१ ग्राम दिन मे ३-४ वार जल से देवे।

त्रिदोषज मदात्यय चिकित्सा

 दोष की प्रवलता के अनुसार चिकित्सा करे, हवंग उपचार करे और दूध पीने को देवे।

घ्वंसक और विक्षय

इनमें वातज मदात्यय के समान चिकित्सा करनी चाहिए।

सामान्य चिकित्सा

- १. सर्वविद्य मदात्यय मे एलादि मोवक ५-१० ग्राम धारीष्ण दूध से २ वार दे।
- २. महाकल्याण वटी १२५ मि० ग्रा० की १ मात्रा मक्सन-मिश्री से सवेरे-शाम दे।
- ३ भोजनोत्तर श्रीखण्डासव २० मि० ली० की १-१ मात्रा समान जल से २ वार पिलावे।

पथ्य

गेहूँ, जौ, मूँग, पुराना चावल, परवल, चौलाई, आंवला, विजीरा नीबू, फालसा; मृग, तित्तिर, मुर्गा, मोर का मास एवं मनपसन्द मद्यपान पथ्य हैं।

सशोधन, सशमन, शयन, उपनास, मित्रसङ्गम, प्रिया-आश्लेप, चाँदनी, मणि-धारण, शीतल जल, चन्दनानुलेप, सगीत-वाद्य, ये पथ्य हैं।

खवध्य

स्वेदन, अञ्जन, धूच्चपान, नस्य, दातौन करना और पान खाना ये सब मदात्य रोगी के लिए अपध्य हैं।

द्वाविंश अध्याय

यौनसंक्रमित रोग तथा यौनमनोगत विकार

यौनसंक्रमित रोग

(Sexually Transmitted Diseases)

यौनसंक्रमित रितजन्य रोगो में—१ पूर्यमेह—सूजाक अथवा गनोरिया (Gonorrhoea), २ फिरङ्ग-आतशर्क-सिफिलिस (Syphilis) और ३ उपदंश-ध्वजमङ्ग-साफ्ट मेंकर (Soft chancre), ये तीन प्रमुख रोग है। इनके अतिरिक्त दो अन्य सक्रमण जनित रोग—१ रितजन्य वक्षणीय किणकार्बुद (Granuloma) तथा २ लिम्फो ग्रेन्यूलोमा होते हैं।

पूयमेह

(Gonorrhoea)

पर्याय और परिचय

पर्याय-इसे औपर्सागक मेह, त्रणमेह, आगन्तुकमेह, पूयमेह, सुजाक, गनोरिया और भृशोष्णवात कहते हैं।

यह एक तीन्न औपसर्गिक (सक्रमणशील) रोग है, जिसमे मूत्रम्गं मे शोथ होकर उसमे पूय निकलता है और वाद मे मूत्रप्रजनन-सस्थान के तथा शरीर के अन्य सस्थानों के विभिन्न अगों में शोथ होता है। स्त्रियों की योनि तथा मूत्रमागं में शोथ हो जाता है और फिर उनसे लसीका का स्नाव होने लगता है।

- निर्वचन—(१) पूयमेह रोग से आक्रान्त स्त्री के साथ सभीग करने से पुरुष को तथा पूयमेह से ग्रस्त पुरुष के साथ मैथुन करने से स्त्री को इस रोग का सक्रमण या उपसर्ग हो जाता है, इसलिए इस रोग को औपस्गिक मेह कहते हैं—'उपसर्गात् जात औपस्गिक'।
- (२) मूत्रमार्ग से पूय का स्नाव होने के कारण इस रोग को पूयमेह कहते हैं— 'पूय मेहत्यत पूयमेह'।
- (३) इसके लक्षण ज्ञणवत् होते हैं और इसका उपचार भी व्रणवत् होता है. इसलिए इसे व्रणमेह कहते हैं—'व्रणवत् तस्य लक्षणोपचारो भवत इति व्रणमेह ।
 - (४) आगन्तुक (जीवाणु) जन्य होने से इसे आगन्तुक मेह कहते हैं।
- (५) उष्णवात (जो मूत्राघात का एक भेद है) के लक्षण इस रोग मे तीव्र रूप मे उभडते हैं, इसलिए इसे भृशोष्णवात कहते हैं।

निदान

इस रोग के कारण दो बिन्दुओं के सदृश आकारवाले कीटाणु गोनोकोक्कस (Gonococcus) हैं।

संक्रमण

पूर्वमेहाकान्त पुरुष या पूर्वमेह से पीडित स्त्री के सहवान ने गह रोग स्वस्य व्यक्तियो पर भी बाक्रमण कर ऐता है। इनके रोगाणु मूत्रप्रजनन-सस्पान तथा क्लेप्सल स्वना से रारीर में प्रवेश करते हैं। पूर्वमेह्याली स्त्री के साथ सभीग करने अथवा पूर्वमेही बालक के नाथ गुर्वमेषुन करने, पूर्वमेह में पीटित स्त्री-पुरुष बालक के साथ बठने-बैठने, नोने बौर उनरे यस्त्र पर्वने आदि ने इस रोग का सक्रमण होता है।

सम्प्राप्ति

जिस स्थी की योजि बनेक रोगों के कारण जिन्य तथा कण्डूयुक्त हो अगवा को रज़क्वला हो और जो अनेक पुरुषों ने मंभोग करातो हो, ऐसी क्रियों के माम बामान्य होकर जब पुरुष मभीग करता है, तो उमें पूर्वमेंह हो जाता है। फल्क्यरप मूत्रमान के अन्दर की दलेटमल्बला में प्रण हो जाते हैं और उनमें बलेद निकलता रहता है। पूर्वमेही व्यक्ति जब किमी हवी के माय मभीग करता है, तो उम ह्वी को भी पूर्वमेह हो जाता है।

गोनोको रहम नामक औराणु के मूत्रमार्ग ने प्रवेश करने के कारण यह रोग होता है। २ से ८ दिन के अन्दर शिरतमिण फूली हुई समा लाल दिगलाई देती है। मूत्र में बाह और मूत्रहराष्ट्रना होती है। जोगाणु दारीर में भीतर प्रजनन सम्पान में प्रवेश कर जाने हैं, तो उनके प्रवेश की गति के अनुमार पुरवों में एपण, अधिवृषण, वस्ति, गुक्रायय, गविनी आदि में भोग उत्पार करते हैं सभा स्त्रियों में योनि, वर्मायय, बीजवाहिनी, पस्ति, उदरावरण आदि में प्रयेश करके घोष उत्पन्न करते हैं।

रुक्षण

इस रोग में क्षोम के मारण वार-वार ित्त मा उत्यान होता है। लिद्ध के अपमान में कण्डू होती है। मूत्रत्यान के समय लगहा वेदना और दाह होती है। घीरे-घीरे जिल्लामणि पर लाली और जीव हो लाता है। मूत्रमान में दाह होती है। रोगो वेचेन रहता है। पुन-पुन मूत्र मा केम होता है। मूत्रत्याम के नगय कच्ट होता है। जिल्ला वन जाला है और उनमे खाव खाने लग जाता है। कभी-गभी घोष के कारण मूत्रमान में रक्तलाव होता है और कभी-जभी पूप अन्दर ही घुष्क होकर मूत्रमान में अवरोध उत्तर कर देता है। मूत्रपथ का जिल्ला होनत हो जाता है और मूत्र दाह के साथ दो धाराओं में आता है। कदानित पीटा के नाथ विद्नात्यान होकर वीर्यम्वलन भी हो जाता है।

उपद्रव

मूत्रमार्गं में प्रविष्ट हुए जीवाणु धारीर में तीन मार्गों से फैलते हैं और उपद्रव उत्पन्न करते हैं—

(१) सरल साम्निध्य से —मूत्रमागं सित्ररोध, शिक्तमणि कोथ, अष्ठीला कोथ, शिक्तबिद्धाः, वस्तिकोष, व्यणकोष मादि उपद्रव होते हैं।

स्त्रियों मे भगोष्ठ शोथ, मूत्रमार्ग शोथ, योनिशोथ, गर्भाशयग्रीवा शोथ, गर्भाशय - शोथ, बीजवाहिनी शोथ, उदरकला शोथ, बीजग्रन्थि शोथ, मासिकधर्म के विकार, गर्भवती होने पर गर्भस्राव, नवजात वालक मे नेत्राभिष्यन्द आदि उपद्रव होते हैं।

- (२) हस्त से स्नावदूषित हाथ के नेत्र पर लगने से नेत्राभिष्यन्द, नासा में लगने से नासाशोथ एवं गुद में लगने से गुदशोथ होता है।
- (३) रक्तमार्ग से--जीवाणु के रक्त मे प्रविष्ट होने पर सन्धिशोथ, स्नायुशोथ, अन्तर्हुच्छोथ और जीवाणुमयता सादि उपद्रव होते हैं।

वक्तव्य — यह रोग हठी है, किन्तु घातक नही है। यह कुच्छ्रसाध्य रोग है। प्रारम्भ में यदि इसकी उचित चिकित्सा न की गयी, तो आजीवन वना रहता है।

चिकित्सासूत्र

- १ मैथुन का सर्वथा त्याग कर देवे । वेश्या तथा पुँख्रली स्त्रियो के साथ कदापि संभोग न करे ।
- २. शोथनाशक, व्रणनाशक, वातानुलोमक तथा मूत्रल औषघ्र, आहार-विहार की योजना बनानी चाहिए ।
- ३. रोगी को विस्तरे पर आराम से रहना चाहिए। दौडना, नाचना, सायिकल चलाना या घोडे पर सवारी करना छोड दे।
 - ४. चाय, काफी, कोको, गरम मसाले तथा मास-मछली न खावे।
- ५. दूध, तीसी का फाण्ट, भिण्डी का पानी, नारियल जल और सोडावाटर पिलावे।
 - ६. दूध की लस्सी और नीवू का शवंत पिलाना हितकर है।
 - ७ कामोत्तेजक विषयो का दर्शन, भाषण, पठन तथा चिन्तन नही करना चाहिए।
 - ८ रोगी का वस्त्र तौलिया आदि का अन्य लोग प्रयोग न करें।
 - ९. शिरन का स्पर्श करने पर जन्तुष्न घोल से हाथो को घो लेना चाहिए।
- १० शिश्न को दबाना या मसलना नही चाहिए। मलावरोध होने पर मुदु विरेचक औषध देनी चाहिए।

चिकित्सा

- १ चमेली के पत्ते के क्वाय, ववूल क्वाय, दारुहरिद्रा क्वाय या खदिर क्वाय मे अन्दाज से फिटकरी, कत्या और रसाञ्जन का वारीक चूणें मिलाकर उसकी उत्तरवस्ति दे और उसमे रूई भिगोकर शोयगुक्त शिक्त पर रखे। इसी क्वाय में लिङ्ग को निमन्जित करे और योनि का सिन्धन करे। पिचकारी दिन में ३ बार लगावे।
- २ औषध-प्रयोग के पूर्व कोष्ठशोधन कर लेवे और इसके लिए ३०० मि॰ ली० गरम दूध मे १५ से २५ ग्राम एरण्ड तैल मिलाकर पिलावे।
- ३ मूत्रविरेचनार्थं—राल का चूर्ण २ ग्राम और देशी चीनी २ ग्राम की १-१ मात्रा १ गिलास जल से दिन भर में १०-१२ बार दो-तीन दिनो तक देवे।

४. तीसरे दिन से दिन में ३ वार चन्दन का तेल ४-४ बूँद छोटे चतासे में गोदुग्ध से दे।

्र पूली के पत्तों के स्वरस २५० मि० ली० में कलमीमोरा ३ ग्राम मिलाकर

६. तृष्यश्चमूलाि योग—कुदा-कास-गम-ईम तमा दारकण्डे की जट, द्येत-चन्दन, ग्रेंसम्, समभाग में लेकर ३० ग्राम का ग्राथ बनाकर चीनी मिलाकर दिन में ३ बार दे।

७ पूर्यमेहारि चूर्ण—फिटकरी घुड, गलगीयोरा, छोटी इलावनी, संगजराहत, सफेद चन्द्रन, रेवत चीनो, शीतलगीनो, सफेद जीरा १०-१० ग्राम, बिरोजे का सत्य २० ग्राम, राल ३० ग्राम कोर नभी के बराबर भीनी मिलाकर पूर्ण बनावे। ३-३ ग्राम की माना दिन में ३ बार दूध की लम्मी में देवे।

८ मूत्रविरेचन चूर्ण—शीतल्पीनी, रेयतगीनी, छोटी इलायपी, जीरा १०-१० ग्राम, बल्मीसीरा २० प्राम स्था पीनी ५० ग्राम हाल्यर पूर्ण बनाये सथा ३-३ ग्राम द्रध की राम्सी से ४-५ बार रोज दे।

९ वट-जटा, पीपर-पूलर पाकट और महुता की छाए मिलित १५ ग्राम सेकर पीनकर, छानकर १०० मि० ली० जाउ मिछाकर ३० ग्राम घीनी हालकर और चन्दन का तेल ४ बूँद मिलाकर मबेरे-शाम पिलाना चाहिए।

१०. लनन्तमूल, मकोय, कपी, दुव्यिका, गोराव्, शांवला फल और पीवर की छाल का पृचक्-पृपम् १५ प्राप्त का प्राप्त वनाकर चीनी दाल मधेरे-दाम देवे ।

११. सीरा-गरुटी-फासनी-सरवूज-सरवूज, इनके बीज की गिरी ६-६ ग्राम, काह ६ ग्राम, बन्तमीमीरा ६ ग्राम और गोगर १० ग्राम ठेकर पूर्ण करके ९ गुराक बनापर दूध की कस्मी मे २-२ मण्ड पर निकाव ।

१२. दिलाजित्वादि यटी—पुत विलाजीत २० प्राम. दीता नीनी ४ प्राम, पापाणमेद ४ ग्राम, छोटी इलावची के दाने ४ प्राम, वही इलावची के दाने ४ प्राम, वही इलावची के दाने ४ प्राम, पुराना गुड ४ ग्राम, हरें पूर्ण ५ ग्राम, वहेटा पूर्ण ५ ग्राम और अविला पूर्ण ५ ग्राम लेकर, सबना पूर्ण कर वकायन और नीम के पत्ती के स्वरम से घोटकर ज्याली वेर के वरावर गोली वनावे। १ गोली प्रतिहिन ग्रात दूध की लहमी से मिलावे।

१३. मोती के सीप भी भम्म ६०० मि० ग्रा० तथा फिटकरी का फूला ६०० मि० ग्रा० की ४ मात्रा बनाकर दिन में ४ बार गोर्क्स में देवे।

१४ नागभस्म १२५ मि० ग्रा० की १ मात्रा दूछ की लक्ष्मी में दिन में ३ बार देवे।

१५. स्वर्णवग ५०० मि० ग्रा० तथा वीतलचीनी ४ ग्राम पूर्णकर ४ मात्रा वनाकर दिन मे ४ बार दूध से देवे ।

१६ सिढयोग-पन्द्रकला वटी, शिवा गुटिका, पन्द्रप्रभा वटी, गोशुरादि गुग्गुलु, मेहमुद्गर रस, पूर्णचन्द्र रस, पूर्यमेहान्तक पूर्ण, तृणपन्धमूलादि पवाय, महाभ्र वटी,

कन्दपंरस, वसन्ततिलक, वृहद् वगेश्वर रस आदि का उचित मात्रा और अनुपान के साथ प्रयोग करना लाभप्रद है।

व्यवस्थापत्र

१ सबेरे-दोपहर-शाम शिलाजित्वादि वटी १ ग्राम स्वर्ण वंग ३७५ मि० ग्रा० नागभस्म ३७५ मि० ग्रा० दूध की लस्सी से। ३ मात्रा २. ९ वजे व २ वजे पूयमेहारि चूर्ण ६ ग्राम १ गिलास जल से। २ मात्रा ३. भोजन के वाद २ वार चन्वनासव ४० मि० ली० वरावर जल से पीना । २ मात्रा ४. रात में सोते समय चन्द्रप्रभा वटी १ ग्राम दूध से।

पथ्य

नारियल का जल, वकरी या गाय का दूध, दूध की लस्सी, नीवू का शर्वत, पुराना चावल, जी, गेहूँ तथा मूँग की दाल।

अपथ्य

दौड-धूप करना, सायिकल चलाना, अंडा, मास, मछली, गरम मसाला, सुरा और मैथुन, ये सब अपथ्य हैं।

फिरङ्ग सिफिलिस

(Syphilis)

पर्याय और परिचय

इसे गरमी, आतशक, फिरक्न और सिफिलिस कहा जाता है। फिरिक्नियों (पोर्तुगीज) के साथ सहवास करने से भारतवर्ष में इस रोग का सक्रमण हुआ, इसलिए इसे फिरक्न कहते हैं। यह रोग एक मैथुनजन्य सक्रामक व्याधि है। सबसे पहले भाविमध्य ने इस रोग का वर्णन किया। यह दीर्घकालानुबन्धी औपसेंगिक रोग है। यह स्वोपाजित (Self-acquired) और माता के द्वारा होने से जन्मवल-प्रश्रुत (Congenital) होता है।

निदान

इस रोग का प्रधान कारण द्रिपोनिमा पैलिंडम (Treponema pallidum) नामक जीवाणु है। यह जीवाणु अत्यन्त सौम्य लालकण के समान किन्तु लम्बा और कुण्डलित होता है। यह जीवाणुनाशक द्रव्यों से शीघ्र ही मर जाता है, किन्तु आर्दे-स्यान में ४०-५० दिनो तक जीवित रहता है।

सहायक कारण—मिथुन या वंश-परम्परा इसके सहायक कारण हैं। वश-परम्परा से सहज फिरङ्ग होता है। इसका कारण सन्तानोत्पादक बीज का फिरङ्ग से प्रभावित होना है।

संप्राप्ति और संक्रमण

- (१) मैयुन—िफरङ्ग रोग से प्रस्त पुरुष या स्त्री के साथ मैयुन करने से इसका संक्रमण स्वस्थ व्यक्ति में होता है। मैयुन की रगड से जननेन्द्रिय की क्लेप्मल त्वचा पर जो सूक्ष्म क्षत बनते हैं, उनमें से जीवाणु करीर मे प्रवेश करता है। इस जीवाणु के बक्षत क्लेप्मल त्वचा द्वारा भी प्रवेश कर जाने की क्षमता होती है।
- (२) अमैयुनीय या बहिजंनेन्द्रिय मार्गे—अमैयुनीय उपसर्ग मुख्यतया चुम्बन से होता है और वहिजंननेन्द्रिय (Extra-genital) द्रणो में इसी कारण ७० प्रतिशत व्रण ओठो पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा स्थान स्तन का है। चिकित्सको और परिचारको की अगुलियो पर प्रण उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष सम्बन्ध के अतिरिक्त उपसृष्ट वस्त्र, पात्र आदि के द्वारा भी रोग का सक्रमण हो सकता है।
- (३) रक्तमार्ग-फिरङ्ग रोगियो के रक्त मे प्राथिमक, द्वितीयक और तृतीयक की पूर्वस्थिति मे चक्रकाणु होते हैं। यदि इस अवस्था मे फिरङ्गग्रस्त व्यक्ति का रक्त किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाय तो उसमे फिरङ्गरोग उत्पन्न हो जायेगा।
- (४) सहज मार्ग-फिरङ्गी व्यक्ति की सन्तान फिरङ्ग-पीडित होती है। पिता बच्चे को स्वय उपसृष्ट नहीं कर सकता, परन्तु पत्नी के द्वारा करता है। योनिमार्ग फिरङ्गयुक्त होने पर प्रसूति के समय वालक में भी उपसर्ग पहुँच सकता है।

फिरङ्ग के प्रकार

फिरङ्गरोग-- १ वाह्य, २. बाभ्यन्तर और ३. वाह्यान्तर भेद से तीन प्रकार का होता है---

- (१) वाह्य फिरङ्ग में फोडे निकलते हैं, जिनमें पीडा कम होती है और फूटने पर वण के समान वह सुखसाध्य होता है।
- (२) आभ्यन्तर फिरङ्ग सन्धिगत होता है। यह आमवात के समान पीडायुक्त शोफ को उत्पन्न करता है। यह कव्टसाध्य होता है।

उपवव

कृशता, वलहानि, नासिका का नीचे झुक जाना या टेढ़ी हो जाना, अग्निमान्ध, अस्यिकोप तथा अस्यिवक्रता (Ricket) ये फिरङ्ग के उपव्रव हैं।

साध्यासाध्यता

उपद्रव से रिहत नवीन और वाह्य साध्य, आभ्यन्तर कष्टसाध्य तथा क्षीण रोगी का उपद्रवसहित बाह्य या आभ्यन्तर प्रकार का फिरङ्ग्र, असाध्य होता है।

सश्वयकाल-२ से ६ सप्ताह तक है।

लक्षण

लक्षण तथा समय की दृष्टि से इस रोग की चार अवस्थाएँ होती हैं-

- (१) प्रथमावस्था—सम्भोग के दूसरे या तीसरे सप्ताह में केवल शिश्न पर या शिश्न के अग्रचमं के भीतर की ओर पीछे जोड़ के पास अथवा नीचे की ओर सीवन पर तथा मूत्रदिण्डका (Urethra) में छिद्र के ओष्ठों के भीतर तथा स्त्रियों में बृहद् भगोष्ठ के भीतरी अग पर एक छोटा-सा दाना पड़ जाता है, जो धीरे-धीरे बढ़कर फूट जाता है और बण बन जाता है। स्पर्श में यह कठिन होता है। इस ज्ञण से केवल लसीका का स्नाव होता है, जिसमें रोग के जीवाणु होते हैं। व्रण होने के एक या दो सप्ताह पश्चात् वक्षण की लसीका ग्रन्थियाँ फूलती हैं।
- (२) द्वितीयावस्था—इस अवस्था मे विष समस्त शरीर में फैल जाता है। ओठ, जीभ, तालु, कपोल के भीतरी भाग और गले के दोनो ओर की श्लेष्मल कला पर छाले पड जाते हैं, जी गोल या अर्घचन्द्राकार होते हैं। ग्रीवा, कोहनी तथा कक्षा की लसीका ग्रन्थियों भी फूलती हैं। ज्वर, शिर तथा सन्धियों मे पीडा और रक्ताल्पता आदि सर्वाङ्गिक लक्षण भी मिलते हैं।
- (३) तृतीयावस्था—यह अवस्था व्रण बनने के छह मास वाद तथा कदाचित् दो-तीन वर्ष,बाद भी प्रारम्भ होती है। त्वचा, उपत्वचा, लसीकाग्रन्थियाँ, मासपेशियाँ, अस्थ्यावरण, मस्तिष्कावरण, यक्कत्, प्लीहा, वृषणग्रन्थि आदि अङ्गो मे गाँठदार और चपटी ग्रन्थियाँ बनने लगती हैं, जिन्हे गमा (Gumma) कहते हैं। घीरे-घीरे इनमें सडन होकर, फिर फूटकर धूसर वर्ण का पूय बहता है। नासिका मे गमा होने से यह बैठ जाती है, तालु मे होने से वहाँ छिद्र बन जाता है, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में होने से पक्षाचात, पङ्गुता आदि विकार होते हैं। कान मे गमा होने से श्रवण-शक्ति और आँख मे होने से दर्शन-शक्ति नष्ट हो जाती है। जिह्ना-पर होने से वह फट जाती है।
- (४) चतुर्थावस्था—इस अवस्था मे प्रथमाक्रमण के तीन महीने के भीतर या पचीस-तीस वर्ष बाद भी विष का आक्रमण हो सकता है। इसमे मस्तिष्क-सस्थान पर विशेष प्रभाव पहने से उन्माद और कलायखञ्ज (लडखडाकर चलना) की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

फिरङ्गज तथा उपदंशज वण में अन्तर

फिरङ्गज व्रण उपदशज वर्ण १. मैथुन के पश्चात् तीसरे सप्ताह दाना १. तीसरे या चौथे दिन दाना प्रारम्भ निकलता है। होता है।

- २. यह साधारणतया एक होता है। २ साधारणतया अनेक दाने होते हैं।
- ३ व्रण तरुणास्थि के समान कठिन होता है। ३. व्रण मृदु होता है।
- ४. लसीकामय स्नाव होता है, दाह नहीं ४ दाह तथा रक्त एव पूय का स्नाव होता। होता है।
- ५ व्रण के किनारे न तो साफ, न पोले ५. व्रण के किनारे साफ कटे हुए, पोले एव और न ऊँचे उठे होते हैं। उठे हुए होते हैं।
- ६ पीडा नही होती।

- ६. त्रण मे अत्यधिक पीडा होती है।
- ७. स्नाव में ट्रिपोनिमा पैलिडा नामक ७ इसके स्नाव मे वैसिलस ड्यूक्रे जीवाणु मिलता है। मिलता है।
- ८ व्रण के दोनो ओर की वक्षण ग्रन्थियाँ ८. केवल व्रण की ओर की ग्रन्थियाँ फूलती हैं।
- ९ उपेक्षा से भी स्थानिक लक्षण शान्त ९ हो जाते हैं, किन्तु सार्वदैहिक लक्षण व्यक्त होते हैं।
- ९ उपेक्षा से स्थानीय घातुओं का अधिक नाश होता है। सार्वेदैहिक लक्षण नही होते।
- १० स्नाव को सूई द्वारा प्रविष्ट करने
 पर समान व्रण नही पैदा होता।
 पर समान व्रण पैदा हो जाता है।

चिकित्सासूत्र

- १ रक्तशोधन तथा शमन उपचार करना चाहिए।
- २ जननेन्द्रिय तथा जहाँ जिस अङ्ग मे व्रण या क्षत हो, जीवाणुनाशक घोल से तथा व्रणशोधन निम्वपत्र आदि के क्वाथ से प्रक्षालन करना चाहिए। त्रिफलाक्वाथ या भृगराज स्वरस से व्रण का प्रक्षालन करे।
 - ३. त्रण पर लेप लगावे और शोधन-रोपण औपधि-सिद्ध घृत लगावे ।
 - ४ वण का घूपन करें और आभ्यन्तर प्रयोग मे रक्तशोधक औषध एव आहार दे।

चिकित्सा

- 9. प्रक्षालन चमेली, जयन्ती, कनेर, मदार, अमलतास या गूलर के पत्ते के क्वाथ में रसींत और कच्ची फिटकरी का चूर्ण डालकर व्रण को धोवे।
- २ लेप—समभाग त्रिफला के वक्कल को कडाही मे रख सकोरे से ढँक कर पूल्हेपर चढाकर अन्तर्धूम भस्म कर, पीसकर घी मिलाकर व्रण पर लगावे।
 - रे रोपण तैल-आगारध्मादि तैल, गोजीतैल या जम्ब्वादि तैल फाहे से लगावे।
- ४ **घृत-प्रयोग**—भूनिम्बादि घृत, पञ्चारिवन्द घृत या अनन्तादि घृत ५ ग्राम २ बार रोज दे।
- ५ **क्वाय**—पटोलपत्र, निम्बत्वक्, त्रिफला, गुडूची, खैर की छाल, विजयसार ' इनके ५० मि० ली० सिद्ध क्वाथ मे ३ ग्राम त्रिफला चूर्ण मिलाकर १—१ मात्रा सबेरे-शाम दे।

सिद्धयोग

- ६ चोपचीनी चूर्ण २-२ ग्राम सबेरे-शाम मधु के साथ खिलावे।
- ७ भैरवरस १ गोली प्रतिदिन सायङ्काल मलाई मे रखकर खिलावे।
- ८. केशरादि वटी (सवीरवटी सि० यो० स०, यादवजी) १-१ गोली निगल कर चीनी मिला गोदुग्ध सबेरे शाम पीना।
 - ९ सारिवाद्यवलेह १०-१० ग्राम सवेरे-शाम गोदुग्ध से देवे ।
- १० निम्बादि चूर्णं निम्बपत्र चूर्णं ८० ग्राम, हरीतकी चूर्णं १० ग्राम, आंवला-चूर्णं १० ग्राम और हल्दी चूर्णं ५ ग्राम लेकर कूट लें, ३-३ ग्राम जल से सवेरे-शाम दे।
- १९ चोपचीन्यादि चूर्णं —चोपचीनी चूर्णं १६० ग्राम, चीनी ४० ग्राम, पीपर ५ ग्राम, पिपरामूल ५ ग्राम, कालीमिचं १० ग्राम, अकरकरा ५ ग्राम, गोखरू ५ ग्राम, सोठ ५ ग्राम, वायविडग ५ ग्राम और दालचीनी ५ ग्राम लेकर चूर्णं बनावे। सबेरे-शाम ३—३ ग्राम घी और १० ग्राम मध्न से देवे।
- १२ रसकपूरादि बटी—शुद्ध रसकपूर ४ ग्राम, शुद्ध शिंगरफ ४ ग्राम, अकरकरा ४ ग्राम, शुद्ध किया हुआ सफेद सिलया १ ग्राम, तलखचीन ४ ग्राम, इन सबको कूट-छान कर पानी मे घोटकर बाजरे के दाने के बराबर गोली बनाकर छाया में सुखा ले। १ गोली शाम को गरम जल से निगले। शीतल जल से बचे रहें।

नमक, मिर्च, तेल, खटाई और मैथुन का परित्याग करे। यह योग 'सक्रामक रोगविज्ञान' (श्रीवालकराम शुक्ल) का है।

- १३. सप्तशालि वटी (भा० प्र०)--१ गोली प्रतिदिन प्रात -काल जल से दे।
- १४. कज्जल्यादि मोदक--५ ग्राम सबेरे-शाम जल से देवे।
- 94. कन्जली—शुद्ध पारद १० ग्राम, शुद्धगन्धक २० ग्राम, दोनो को घोटकर कन्जली बना लेवे। रोगी के बलाबल का विचार कर उचित मात्रा मे गोघत के साथ प्रयोग करे।
- 9६ मल्लिसिन्दूर, रसकपूर, व्याधिहरण रस, त्रिफला गुग्गुलु, रसशेखर वटी, चोपचीनीपाक, रसमाणिक्य, खदिरारिष्ट, सारिवाद्यासव, महामिन्जिष्ठादि क्वाथ आदि स्रोषधो का यथायोग्य मात्रा-अनुपान के साथ प्रयोग करना चाहिए।

ध्यवस्थापत्र

१. दिन मे २ बार

 रसमाणिक्य
 २५० मि० ली०

 गुडूचीसत्त्व
 १ ग्राम

 मुक्ताशुक्ति
 ३ ग्राम

 २ मात्रा

चोपचीनी चूर्ण २ ग्राम और मधु से।

अथवा---

सवीरवटी १-१ गोली निगलकर चीनी मिला गोदुग्ध पीना।

- २ वाद मे महामञ्जिष्ठादि क्वाय पीना ।
- ३ भोजन के बाद

खदिरारिष्ट

४० मि० ली०

समान जल मिलाकर पीना। २ मात्रा

४. रात मे

आरोग्यवधिनी

१ ग्राम

गोदुग्ध से।

१ मात्रा

पध्य

गेहूँ की रोटी और गाय का दूध, मूँग की दाल, घी मे विना नमक-मसाले का परवल, करेला और लौकी तथा बाँवला देना पथ्य है।

सपध्य

दिन में सोना, मैथुन, मीठा, भारी अस, मूत्रवेग को रोकना, अम्ल, तक्र, लवण, श्रम तथा स्नान का त्याग करे।

उपवंश (ष्यजभंग)

पर्याय और परिचय

इसे उपदंश, सॉफ्ट सोर (Soft Sore), सॉफ्ट शैंकर (Soft Chancre) सादि कहते हैं।

यह मैथुनजन्य रोग है, जो रितसुख की वासना की लिप्सा की पूर्ति के लिए, इस रोग से ग्रस्त या अन्य योनिविकारों से ग्रस्त स्त्री के साथ मैथुन या व्यभिचार करने से उपस्य और उसके परिवेश में होनेवाला दारुण दु.ख है। यह कामिनी के मनोज-मन्दिर के रागभोग तथा प्रेम का एक निन्दनीय अभिशाप या प्रसाद है।

निवान

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान का मानना है, कि इस रोग का कारण उचूक्रे (Ducrey) नामक जीवाणु है, जो रक्तलीलुप (Haemophilus) जाति का है। यह पूर्यजनक जीवाणु है, जो द्रणों में, आसपास की धातुओं में और उपसृष्ट लसीकाग्रन्थियों में पाया जाता है। वेदयाक्षों तथा पुझली स्त्रियों की योनियों में यह पूर्यजनीवी के रूप में पाया जाता है। जो औरतें योनि की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देतीं, वे आसानी से इस रोग की शिकार बन जाती हैं। यह रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है।

वायुर्वेदोक्त निदान

१ चिरकाल से सहवास-मुक्ता, परित्यक्ता, ब्रह्मचयंद्रतद्यारिणी, रजस्वला,
 दीर्घलोमा, कर्कशलोमा, बितलोमा, योनिगत लोमा, सकुचितयोनिद्वारा, विस्तृतयोनि-

द्वारा, मैथुनाभिलाषहीना, अप्रक्षालितयोनिपथा, योनिरोगग्रस्ता, विकृत-दुष्टयोनिपथा, अकामुका स्त्री के साथ मैथुन ।

- २ जननेन्द्रिय पर नख, दन्त, विष, शूक या हस्तमैथुन या बन्धनजन्य आधात।
- ३ पशुजाति की स्त्री के साथ मैथुन, दूपित जल से लिङ्ग-प्रक्षालन ।
- ४. लिङ्ग-पीडन करना, शुक्र या मूत्र के वेग को रोकना, अति ब्रह्मचर्य रहना।
- ५ मैथुनक्रिया के पश्चात् लिङ्ग न घोना।

इत्यादि कारणो से वात आदि दोष व्रणयुक्त अथवा अक्षत शिश्न मे आकर शोथ आदि लक्षणो को जित्पन्न करते हैं, जिसे उपदश कहते हैं।

संक्रमण

इस रोग का उपसर्ग मैथुन के समय होता है। रोगी के व्यवहार मे आये हुए वस्त्र, रूमाल, धोती, पाजामा, पैण्ट, पात्र, आस्त्रन तथा ओढना-विछीना आदि के प्रयोग करने से एव सहवास-सहभोजन आदि से इस रोग का सक्रमण होता है। उपदश्च के रोगी के ज्रणस्नाव से भी सक्रमण फैलता है। ज्रण मे जो स्नाव भरा रहता है, वह अत्यन्त उपसर्गी होता है।

संप्राप्ति

मैथुन के बाद एक से चार दिन के बीच शिश्त पर ग्रन्थि बन जाती है, फिर उसमें लसीका भर जाती है। इसके चारों बोर शोध और रक्ताधिक्य होता है। एक-दो दिन में पूय उत्पन्न होता है और शोध विदीण होकर वण बन जाता है। इस वण का स्नाव जहां भी लगता है, वहाँ व्रण बना देता है, परिणामस्वरूप उपदश के मूल वण के निक्रट अनेक अनुवर्ती व्रण हो जाते हैं।

द्वण के स्थान—उपदश के जण गुह्य अग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी होते हैं, जैसे स्तन, बोष्ठ, ग्रीधा, हाथ पैर या सार्वदैहिक रूप से भी जण उत्पन्न हो जाते हैं। विशेषकर पुरुषों में इसका स्थान शिश्तमणि की त्वचा के भीतर या बाहर, शिश्तसेवनी और मणि के भीतरी मूत्रमार्ग में होता है। स्त्रियों में इसका स्थान लघु भगोष्ठ, भगाञ्जलिका, भगिशिश्तका (Clitoris) और भगालिन्द में होता है। स्नाव लग जाने पर बृहद् भगोष्ठ, मूलाधार, नितम्ब और उसकी भीतरी त्वचा पर भी जण हो सकता है।

सहजोपदश — यह तब होता है, जब माता अथवा पिता के द्वारा उपदश का जीवाणु सन्तान में सक्रमण करके वालक को उपदशग्रस्त बना देता है। इसको आजन्म या सहजोपदश कहते हैं। प्रसनकाल में प्रसनपथ के व्रण के स्पर्श से वालक के शरीर में जो उपदश होता है, उसे आजन्म उपदश नहीं कहते, अपितु उसे सक्रान्तोपदश कहते हैं। पिता के शुक्र के साथ और माता के आतंब के साथ उपदशाणु, जब भ्रूण में सचालित हो जाता है, तब तज्जन्य उपदश को सहजोपदंश अथवा आजन्म उपदश कहते हैं।

१ सु० नि० १२।१० तथा च० चि० २०।१६२-१६७।

लक्षण र

- १. शिश्न से शोथ, वेदना, राग, तीव्र फोडे की उत्पत्ति और उसका पक जाना।
- २. शिश्न के मणि भाग मे मासवृद्धि होकर व्रण बनना एव उससे स्नाव होना ।
- ३ त्रण से रक्त, कृष्ण, नील या घूसर वर्ण का स्नाव होना एव अग्निदग्धवत् पीडा होना।
 - ४ जननेन्द्रिय का विलन्न रहना और उससे सडी हुई गन्ध निकलना।
 - ५. जननेन्द्रिय मे टेढापन और कठोरता तथा जलन होना।
 - ६. ज्वर, तृष्णा की अधिकता, मूच्छा और वमन होना।
- ७. रोग बढने पर मणि, मूत्रेन्द्रिय, कदाचित् अण्डकीष का सडकर गिर जाना ये लक्षण होते हैं।

उपद्रव

स्वच्छता और उचित चिकित्सा के अभाव मे व्रण बढने लगता है, फिर रक्त-वाहिनी नली के गल जामे से रक्तस्राव होने लगता है। कभी-कभी शिश्त चर्म मे विद्रिध, शिश्तमणि कोथ, निरुद्धप्रकश (Phimosis), परिवर्तिका (Paraphimosis) हो जाते हैं। शिश्तव्रण में कोथ हो जाने से शिश्त गल जाता है।

इस रोग के आरम्भ में ही चिकित्सा न करने से शोथ, कृमि, दाह, पाक और विदीण शिश्न (गलित लिज्ज) होकर रोगी की मृत्यु तक हो जाती है।

चिकित्सासूत्र

- 9 रोगी का स्नेहन-स्वेदन करके मूत्रेन्द्रिय के मध्य भाग मे स्थित सिरा का वैधन करे अथवा जोक लगाकर रक्तमोक्षण करावे।
- २ दोष बढं हो तो स्नेहन-स्वेदन के पश्चात् वमन तथा विरेचन कराकर शोधन करे।
 - ३. यदि रोगी दुवंल हो तो निरूहवस्ति देकर कोष्ठ का शोधन करे।
- ४ उपदश में आभ्यन्तरशोधन, स्थानीय शोथ एव व्रण का शोधन, प्रलेप, परिषेक और रक्तमोक्षण करना चाहिए।
 - ५. उपदशज व्रण का पाक न होने पावे, इसके लिए प्रयत्नशील रहे।
- ६ पाक होने से सिरा, स्नायु, मास तथा त्वचा, ये गल जाते हैं। यदि पाक हो जावे, तो औषध या शस्त्र का प्रयोग करे। व्रण मे से पूय निकालकर उस पर देत-मधू मिश्रित तिलकहक रखे।
- ७ त्रणप्रक्षालन तत्परता से करे और इसके लिए नीम-पीपल कदम्ब-जामुन-बरगद-गूलर-शाल-अर्जुन और वेतस की छाल के क्वाय का प्रयोग करे या त्रिफला के क्वाय से घोवे।

चिकित्सा

१ त्रिफला को अन्तर्धूम जलाकर उसकी राख पीसकर मधु मिलाकर लगावे।

१ च० चि० ३०।१६८-१७५।

- २. रसौत, शिरीषवीज और हरीतकी, समभाग का चूणें मधु मिलाकर लेप करे।
- ३. पटोलादि क्वाथ—परवल की पत्ती, नीम की छाल, आँवला-हर्रा-बहेडा वक्कल, चिरायता, खदिर छाल तथा असनवृक्ष की छाल, समभाग लेकर मोटा कूट ले। २५ ग्राम लेकर आधा लीटर जल मे चतुर्थाशावशिष्ट पकाकर छानकर, उसमे त्रिफला चूर्ण २ ग्राम डालकर सवेरे-शाम पिलावे।
- ४. सर्जरस चूर्ण २ ग्राम, गोष्टत १० ग्राम चमेलीपत्र स्वरस २५ मि० ली० से २ बार रोज दे।
- ५. लेप--जायफल, वायविडग, तूतिया और ठवंग, समभाग मे लेकर मक्खन में मर्दन कर लेप लगाने से व्रण का शोधन तथा रोपण होता है।
- ६ चोपचीन्यादि चूर्ण ५-५ ग्राम या चोपचीनी पाक १०-१० ग्राम मधु से ' सबेरे-ज्ञाम दे।
- ७ व्रणहर चूर्ण-फिटकरी, गैरिक, तूतिया, सेंघानमक, लोघ, रसाञ्जन, दारु-हरिद्रा, हरताल, मैनसिल और छोटी इलायची, सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण बनाकर व्रणो पर बुरकना चाहिए।
- ८. अनन्तादि घृत या भूनिम्बादि घृत ५-५ ग्राम की मात्रा मे दूध से सबेरे-शाम दे।
- ९ अमीररस २५० मि० ग्रा० की २ मात्रा सने आटे के भीतर गोली बनाकर सबेरे-शाम निगलवाने, दाँत सें स्पर्श न करे। पथ्य नमकरहित रोटी-दूध से दे।
 - १०. गोरखमुण्डी और उशवा का क्वाथ सबेरे-शाम पिलावे।
- ११ सिद्धयोग—सवीर वटी, उपदंशगजकेशरी, भल्लातकावलेह, व्याधिहरण रस, रसगुग्गुलु, वरादि गुग्गुलु, रसशेखर, भैरवरस सादि का रोगी के बलानुसार उचित मात्रा मे प्रयोग करना लाभदायक होता है।

व्यवस्थापत्र

१. सवेरे-शाम

अमीररस

२५० मि० ग्रा०

२ मात्रा

मुनक्के के भीतर रखकर निगलना। बाद मे पटोलादि क्वाथ ५० मि० ली० पीना।

२ भोजन के बाद

सारिवाद्यासव

४० मि० ली०

२ मात्रा

बराबर जल मिलाकर पीना।

३. रात में सोते समय

आरोग्यविंघनी

१ ग्राम

गो दुग्ध से।

पश्य

वमन, विरेचन, उपस्थ के मध्य में सिरावेध, प्रक्षालन, प्रलेप, जौ, गेहूँ, अगहनी चावल, मूँग का यूष, घृत, करेला, परवल आदि पथ्य हैं।

अपष्य

लवण-अम्ल-कटु रस द्रव्य, तेल, मसाला, मैथुन, अग्नि, ध्रूप आदि का त्याग करे।

रतिजन्य वंक्षणीय कणिकार्बुद

(Granuloma Inguinal Venereum)

पर्याय और परिचय

पर्याय-लिङ्गार्श, लिङ्गवर्ती, कामजन्य कणिकार्बुद ये पर्याय हैं।

इस रोग में शिक्त में धान्य के अकुर के समान मासाकुर उत्पन्न हो जाते हैं। ये अंकुर एक-दूसरे के ऊपर छोटे-छोटे अनुक्रम से बढते हुए स्थिर हो जाते हैं। लिङ्ग की सन्धियों में अथवा शिक्त के अधोभाग में मुर्गी की शिखा के तुल्य मासाकुर दिखलाई पढते हैं। इनको लिङ्गार्श या लिङ्गवर्ती कहते हैं।

स्त्री के भगशिश्निका, भगोष्ठ तथा योनिमार्ग मे घान्य के अकुर के समान अकुर निकलते हैं। अन्त में इनसे बदबूदार स्नाव आने लग जाता है।

निदान—इस रोग का कारण एक जीवाणु है, जिसे क्लेविसला ग्रैन्युलोमेटिस (Clebsiella Granulomatis) कहते हैं।

संचयकाल—इसका सचयकाल कुछ दिनो से १२ सप्ताह तक होता है। अधिक खराव सगित के प्रधात् २-८ दिन के अन्दर शिश्त-प्रभृति और भगास्थि-भगिशिश्तका, इनमें से किसी एक स्थान की त्वचा मे एक छोटा-सा गोल ग्रन्थि वाला उभार पैदा हो जाता है। इसके ऊपर की त्वचा अत्यन्त मृदु और गुलावी वर्ण की होती है।

रुक्षण

त्वचा शीघ्र ही छिलकर क्षत युक्त हो जाती है और उससे बदबूदार पूर्य निकलने लगता है। यह व्रण शनै -शनै चारो तरफ फैल जाता है, साथ ही पुराने भागो में व्रणवस्तु बनती जाती है, जो फिर से व्रणित हो सकती है। यह रोग नम और मन्दोष्ण स्थान मे अधिकतर होता है। एव गुदा के चारो तरफ भगोष्ठ, योनि, वृषण और उसके मध्य के स्थानों में अधिक होता है।

इसी प्रकार यह रोग धीरे-धीरे पुरुषों के लिङ्ग, वृषण और उसके ऊपर के भाग गुददार और उसके आस-पास के स्थान और स्त्रियों में भगिशिष्टिनका, भगोष्ठ, योनि, सूत्रमार्ग, गुददार, ऊरु, वक्षण-प्रभृति भागों में फैल जाता है। इससे पतला और बदबूदार स्नाव निकलता है, जो कपडे खराब कर देता है।

मल-मूत्र और प्रजनन-मार्ग मे व्रण होने से रोगी को कष्ट और वेचैनी होती है।
मल-मूत्र त्याग करने मे असुविधा मालूम होती है।

उपसर्ग या उपद्रव

गुदवस्ति अथवा गुदा और योनि मे नाडीव्रण, गुप्ताङ्गी मे गजचमंता, मूत्रमागं का सकोच, शिश्नक्षय, ध्वजभग, वध्यता और कभी-कभी द्वितीय उपसगं जन्य वस्ति शोथ आदि अन्य विकार भी हो जाते हैं।

साध्यासाध्यता

यह मन्दगति से बढने वाला रोग है और चिरकालानुबन्धी होता है, जिसका प्रतिकार न होने पर जीवनपर्यन्त कष्टं देता रहता है और गुप्ताङ्गो को विकृत कर देता है।

यह स्वय तो घातक नही है, किन्तु कभी-कभी द्वितीयक उपसर्ग से उत्पन्न होने वाले वस्तिशोथ-प्रभृति उपसर्गों से रोगी की मृत्यु हो जाती है। अधुनातन चिकित्सा से इसकी कुच्छ्रसाध्यता मन्द हो गयी है।

स्थानिक चिकित्सा

- 9 पहले मासाकुरो को काटकर फिर क्षार से जला देना चाहिए, उसके बाद व्रणोपचार करना चाहिए।
- २. स्वर्जिकाक्षारादि चूर्ण-सज्जीखार, तूतिया, छैर छरीला, सुर्मा, रसौत, मन शिला और हरताल, इन सबको समभाग मे लेकर कूट-पीस कर छान ले। इसे मासाकुरो पर लगाने से वे नष्ट हो जाते हैं।
- ३. कुमारी योग— घृतकुमारी के पत्तो को मन्दोष्ण करके लिङ्ग के ऊपर लपेट कर डोरे से बाँघ देने से मासाकुर नष्ट हो जाते हैं।
- ४ गुङ्जा योग—गुङ्जा के मूल को बैल के मूत्र से पीसकर लेप करने से मासाकूर नष्ट हो जाते हैं।

वंक्षणसन्धीय लसकणिकार्बुद लिम्फो ग्रेन्युलोमा वेनेरियम इंग्वाइनल

(Lympho Granuloma Venerium Inguinal)

परिचय

यह किसी रोगाक्रान्ता के साथ मैथुन करते समय सक्रमण से होने वाला रोग है। इसमे वक्षणसिन्ध की लसीका-प्रन्थियों में सूजन हो जाती है। पूय की उत्पत्ति और नाडीव्रण प्रभृति उपद्रव भी हो जाते हैं। इसके साथ ज्वर, शूल, अङ्गसाद आदि सार्वेदैहिक लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं।

निदान

इसका कारण एक वाइरस (Virus) है, जो ग्रैन्युलोमा सिटैकोसिस ग्रुप (Granuloma Psittacosis group) का होता है। मैथुन द्वारा शरीर मे इसका व्यापक उपसर्गे होता है।

संक्रमण

इस रोग से बाक्रान्ता के साथ मैंचुन करने से यह रोग होता है। स्त्रियो की ोनि में द्रण उत्पन्न होता है, जिससे लसीका-वाहिनियो द्वारा भग मे भी द्रण हो ति हैं। इस रोग से पीडित स्त्री चिरकाल तक सभीग करने वाले पुरुषों को इस ोग से सक्रान्त कर सकती है।

लक्षण

पुरुषों में इसका क्षण शिश्न की त्वचा पर होता है और स्त्रियों में योनि के आत् भाग और गर्भाशयग्रीवा के निकट होता है। कभी-कभी बाहर के अवयव पर णोत्पत्ति के बदले भूत्रमार्ग में सूजन होती है। इस रोग में लस-ग्रन्थियों में ज्यापक शेय होने तथा पूर्य बनने पर भी अत्यन्त साधारण पीडा होती है।

चिकित्सा

- १. रोगी को विश्राम दे। यल के अनुसार विरेचन देकर कोष्ठ शुद्ध करे।
- २. मल्लसिन्दूर १०० मि० ग्रा० गुढूनीसत्व १ ग्राम के साथ मधु से प्रात. दे।
- ३ भोजनोपरान्त सारिवाद्यामव दे।

या

सदिरारिष्ट

४० गि० ली०

२ मात्रा

समान जल मिलाकर प्रतिदिन २ वार दे।

- ४ रातु में सोते समय उशवा चूर्ण १०-१५ ग्राम गरम जल से देवे ।
- ५ सबेरे-शाम आरोग्यविधनी १ ग्राम की २ मात्रा दूध से देना चाहिए।
- ६ बाह्य उपचार—स्वर्णक्षीरीमूल ५० ग्राम, कालीजीरी १० ग्राम, आमाहत्दा १० ग्राम, विषयलाण्डु ५० ग्राम, सिंगरफ १० ग्राम, इन्हें गोमूत्र में पीसकर गरम कर शोष पर दिन में २ बार छेप करे। अथवा एण्टीपलोजेस्टिन का छेप लगाकर सेंकना चाहिए।

पष्य-रोटी-दूध देवे ।

अपम्य-अम्ल-लवण-फटु रस पदार्थ, उष्ण पदार्थ और मैथुन ।

यौनमनोगत विकार

योषापस्मार, हिस्टीरिया, अपतन्त्रक

परिचय—यह एक विलक्षण मनोदैहिक रोग है, जिसमे कभी रोना, कभी हँसना, कभी वेहोश हो जाना, ये प्रधान चिह्न हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है, कि रोगी किसी प्रेतात्मा के कब्जे में हो। ययोकि लज्जा, शील, सकीच को छोडकर रोगिणी के शरीर में गजब की ताकत आ जाती है और उसके हँसने-वोलने या नाज-नखरे से देखनेवाले व्यक्ति के रोगटे खडे हो जाते हैं। पूछने पर रोगिणी से मालूम पडता है, कि जैसे उसकी नाभि से वायु का गोला उठकर गले में आकर अटक गया हो। उसके

हृदय, शख, शिर में पीडा और आक्षेप होता है और कभी-कभी वह वेहोशी हो जाती है। इसमें किसी भी रोग के लक्षण हो सकते हैं। रोगिणी स्वजनो का अपनी ओर सहानुभूति पूर्ण झुकाव लाने के लिए अनेक विचित्र चेष्टाएँ करती है।

निवान

- १. चिन्ता, शोक, भय, तिरस्कार, उपेक्षा, इसके प्रमुख कारण हैं।
- २. मानसिक द्वन्द्व (Mental conflict), इच्छाविघात, नैराश्य ।
- ३ मृदु स्वभाव, कामेच्छा की अनापूर्ति, यौन-आनन्द की अतृप्ति ।
- ४ रक्ताल्पता, गर्भाशय विकृति, रजोऽवरोध, कुटुम्बियो का निष्ठुर व्यवहार।
- ५. नखरा-नाज और विलासी स्वभाव, वयस्क होने पर विवाह न होना।
- ६. १५ वर्ष से ३५ वर्ष की आयु, दाम्पत्य-सुख का अभाव, उद्वेग ।
- ७. पुरुषो में भी यह रोग होता है, जिसके कारण हैं—प्रबल कामेच्छा होने पर सभोग का अवसर न पाना, अप्राकृतिक मैथुन, अतिश्रम, अनिद्रा आदि।
- ८ विवाहिता स्त्री की पति द्वारा उपेक्षा, सास-ननद आदि से कलह और प्रताहना, किसी बात का सदमा या बार-बार एक ही बात की ओर ध्यान जाना और निराश होना तथा वातप्रकोपक कारण।
 - ९ युवावस्था मे विधवा होना, अजीर्ण तथा मलावरोध होना।
 - १० अवरसत्त्व का होना, कामुक किताबें पढना, कामुक चित्र देखना आदि।

संप्राप्ति

स्वप्रकोपक कारणो से तथा काम-शोक-भय आदि मानस कारणो से प्रकृषित हुआ वायु अपने स्थान (पक्वाशय आदि) से ऊपर उठकर शिर की ओर जाता है, तो हृदय, शिर और शखप्रदेश को पीडित करता हुआ अगो को धनुप के समान झुका देता है तथा उनमे आक्षेप एव मूर्च्छा उत्पन्न करता है। श्वास-प्रश्वास में बडी कठिनाई होती है, आँखें कभी खुळी और कभी अधखुळी रहती हैं। रोगी वेहोशी की हाळत में कबूतर के समान घुरघुर की व्वनि करता है।

लक्षण

इस रोग मे—(क) मानसिक और (ख) शारीरिक ये दोनो तरह के लक्षण पाये जाते हैं।

(क) १. स्मरण शक्ति का नाश--रोगी अपना नाम-पता-कारोबार और सम्बन्धी को भूल जाता है। उसे एमेन्सिया (Amensia) हो जाती है।

- २. मूर्च्छा-रोगी कांपता, हल्ला करता, हॅमता, रोता, विलाप करता, कपढे नोचता-फाडता है और ऐसा करते-करते अचानक मूच्छित हो जाता है। उसके दाँत लग जाते हैं और कभी मुख से गाज भी आता है।
- ३. सोने मे चलना (Slecp walking)—रोगी सुप्तावस्था मे विस्तर छोडकर चलता-फिरता या जो काम नन मे रहना है वह करके पुन सो जाता है और जगने पर उस बात से इनकार करता है।

४. व्यक्तिस्व का ह्रास—रोगी को आत्मविस्मृति हो जाती है। वह अपने वातावरण, परिवेश और हैसियत को भूल जाता है और अशोभन, उच्छृह्मल बात-व्यवहार करने लग जाती है।

५ उद्वेग--मन की अस्थिरता, वेचैनी, सज्ञानाश, स्पर्शनाश, कम्पन, आक्षेप, हृदय की गति मे वृद्धि और शरीर-भार मे कमी होना इत्यादि लक्षण होते हैं।

- (ख) १. शारीरिक लक्षण —पक्षाघात (Paralysis), सज्ञाशून्यता (Anaesthesia) और शूल (Pain) होना, ये प्रमुख लक्षण हैं।
- २. रोगी का कोई अंग लकवाग्रस्त हो जाता है। वह आसन पर पडा-पडा अगो को हिलाता रहता है।
 - ३ रोगी की वाणी अस्पष्ट निकलती है और वह कांपता रहता है।
- ४. स्पन्तनिकार—रोगी कदाचित् आंखें नचाता है, मुख चवाता है या सिकोडता है, कभी शिर हिलाता है और यह सब वह अनजाने में वह करता रहता है, जिसका उसे ज्ञान नहीं होता।
- ५. स्पर्शेज्ञान का नाश या वढ जाना, कम दीखना, रस और गन्ध का ज्ञान न होना, अगो मे ऐंठन तथा उदर मे जूल होना।
- ६. शिर शूल, अरुचि, आध्मान, वमन, मन्दाग्नि और मलावरोध आदि लक्षण होते हैं।
 - ७ अचेतनता, बुद्धिविभ्रम, अनवसर हास्य और क्रन्दन।
 - ८ ऊँची वावाज में चिल्लाना, प्रलाप करना, प्रकाश से द्वेष ।
 - ९. उद्ग्डता, श्वासकष्ट, कण्ठ और आमाशय में वेदना।
 - १० स्पर्शे का ज्ञान वढ जाना, किसी-किसी अग मे सदा व्यथा।
- १९ उदर से उठकर वायुगोला का कण्ठ मे अवरोध होना और मूर्ज्छित होना, ये सब लक्षण होते हैं।

चिकित्सासूत्र

- १. रोग के मूल कारण को खोजकर उसका प्रतीकार करना चाहिए।
- २ कोष्ठशुद्धिकर औषध तथा आवश्यकतानुसार अन्य शोधन भी करे।
- ३. मानसिक सन्तुलन के स्थापनार्थ इष्टवस्तुलाभ, कामेच्छा पूर्ति, प्रहर्षजनक उपाय, मधुर व्यवहार और आश्वासन एव धैर्य बँघावे ।
 - ४. जत्तम पौष्टिक सुस्वादु, मनपसन्द आहार देना चाहिए।
- ५. सैर-सपाटे, पिकनिक मनाकर, चलचित्र दिखाकर और रमणीय उद्यान मे टहलाकर मनोविनोद का वातावरण तैयार करना चाहिए।
- ६ पित को स्नेह, सास-ससुर-ननद को सहानुभूतिपूर्ण उदार व्यवहार और मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए।
 - ७ रोगी को उसके मनपसन्द के काम मे लगाये रखना चाहिए।
 - ८. चिन्ता या सदमा, भय या शोक को दूर करने का यत्न करे।

९ मनोबल वढाने, मानसिक और शारीरिक विभ्राम देने का उपाय करे।

१० वायु का अनुलोमन और मन की सन्तुष्टि करनी चाहिए।

चिकित्सा

इसकी चिकित्सा दो स्तरों में क़ी जाती है—(क) वेग अथवा दौरा आने पर और (ख) दौरा समाप्त होने पर स्थायीरूप से रोग-निवारक।

- (क) १ दौरा आनेपर मूर्च्छा को दूर करने के लिए तीक्ष्ण कट्फल की छाल का बारीक चूर्ण सुँघाना चाहिए।
 - २ वातनाशक नारायण तैल की सर्वाङ्ग मे मालिश करे।
 - ३ शिर पर मक्खन या सौ बार पानी से घोया हुआ घी लगावे।
- ४ मुख और छाती पर ठडे जल के छीटे मारे अथवा तीव्र मूर्च्छा हो, तो चम्मच गरम कर ललाट पर दागे।
 - ५. शिर, ललाट और वक्ष पर वर्फ मे भिगोई कपडे की पट्टी रखे।
 - ६ शरीर के वस्त्र खोलकर ढीले कर दे, आँख पर पानी का छीटा दे।
 - ७ हथेली, पिण्डली और पैर के तलवे की मालिश करे।
- ८ एक छोटी शीशी मे चूना और नौसादर मिलाकर खूब हिला दें। इससे अमोनिया गैस बन जाती है, उसे सुँघाने से मूर्च्छा दूर होती है।
- ९ रोगी के दाँत लग जाते हैं, अत उनके बीच अँगुली कदापि न डाले, विक चम्मच डालकर मुख खोलना चाहिए।
 - १० नासिका के छिद्रो को बन्द कर देने से भी दाँत खुल जाते हैं।
 - ११. मसूडो पर सोठ-पीपर का महीन चूर्ण मलना चाहिए।
 - १२. होश लाने के लिए प्याज, हीग या कपूर सुँघाना भी ठीक है।
- (ख) दौरा समाप्त हो जाने पर रोग के कारणानुसार निम्न चिकित्सा करनी चाहिए—
- ्र मार्जारगन्ध (जुन्दवेदस्तर) घी में भुनी हीग, गुद्ध कुचला, जटामासी और बालबच १०-१० लेकर पीसकर, ब्राह्मी स्वरस मे घोटकर १२५ मिलीग्राम की गोली बनावे। इसे दिन में ४ वार १-१ गोली मधु से दे।
 - २. चन्वनावि लोह २-२ रत्ती ब्राह्मी स्वरस और मधु से ४ बार दे।
- ३ बालबच चूर्ण ५०० मि० ग्रा० और कालीमिचं ५ दाना पीसकर खट्टी दही ५० ग्राम के साथ सबेरे-शाम खिलावे।
- ४ वातकुलान्तक रस २५० मि० ग्रा०, स्मृतिसागर रस १२५ मि० ग्रा०, ब्राह्मी वटी १२५ मि० ग्रा० की १-१ मात्रा दिन मे ३ बार जटामासी चूर्ण १ ग्राम और मधु से दे।
 - ५ चिन्तामणि चतुर्मुख २५० मि० ग्रा० मघु व ब्राह्मी स्वरस से प्रात -साय दे।
- ६ हिस्टोरियानाशक चूर्ण-शुद्ध हीग २० ग्राम, दूधिया वच २० ग्राम, जटामासी २० ग्राम, मीठा कूठ ४० ग्राम, कालानमक ४० ग्राम, वायविडङ्ग १८० ग्राम सबको

कूट-पीसकर सुरक्षित रसे। २--२ ग्राम की भाषा मन्दोष्ण जल से दिन मे तीन बार २--३ माह तक देवे।

७. स्वर्णमाक्षीकभस्म, लीहमस्म, चतुर्भुज रस, रजतभस्म, प्रवालपवामृत, स्वर्णसूतकोखर, ब्राह्मी वटी, शिलाजित्वादि वटी, शिवा गृटिका, आरोग्यवधिनी वटी, इन बीपन्नो का रोगी की प्रकृति के अनुसार उचित मात्रा-अनुपान से प्रयोग करे।

पधा

सारिवक आहार दे, जो पौष्टिक, सुपच, यलवर्धक, वातानुलोमक और एचिकर हो। रोटी-दूध और फलो का रस देना उत्तम है।

अपध्य

भारी और फन्जकारक तथा गरम चीजें नही सानी चाहिए।

स्मरोन्माद या कामोन्माद

परिचय—उन्माद पागलपन को कहते हैं और जब किमी अभीष्ट स्थी से सभीग की तीय लालसा का विपात हो जाता है, तो इम स्थिति को कामातुर व्यक्ति वर्दादा नहीं कर पाता है, जिसके परिणामस्यरूप वह गुले आम भय-लज्जा सदाचार को छोड देता है और उसका दिमाग पागल हो जाता है, जिमे स्मरोन्माद कहते हैं। उसके मानस भाव जैमे—१. मन, २ बुद्धि, ३ मजा ज्ञान, ४ स्मृति, ५ इच्छा, ६ घोल, ७ चेप्टा और ८. आचार विद्यप्ट और विकृत हो जाते है। वह सदा उद्दिग्न, चन्यल बोर अनाप-रानाप बकनेवाला, कामातुर, भद्दी तथा अश्लील चेप्टाएँ करना रहता है।

निवान

इस रोग का प्रमुख कारण है, प्रेयसी स्त्री के सभोगगुद से अयवा रोगिणी स्त्री का प्रियतम पुरुष के साथ सभोग के अवसर से विश्वत होना। इसके अतिरिक्त खुक्र विकार या रजोदोष, जननेन्द्रिय के रोग या वायु का प्रकृषित होना, ये सहवर्ती कारण हैं।

लक्षण

स्तव्यता, कॅपकॅपी, श्रास, प्रलाप, पाण्डुना, चिन्ता, अधीरता और रुदन करना, ये लक्षण होते हैं। नेत्रों में लालिमा होती है, मन में भौति-भौति के विकल्प उठते हैं, कही चैन नहीं मिलता, निद्रा नहीं आती, धारीर कृश हो जाता है, लज्जा और शील का लाम हो जाता है। कामोन्माद का रोगी प्रेयसी या प्रियतम के चिन्तन में दिन-रात विह्लल रहता है।

काम की वश वशाएँ

- १. नयनो का आपस मे लहना।
- २. प्रेमी या प्रेमिका की ओर चित्त की आसस्ति।

- ३ प्रेमी या प्रेमिका के सम्बन्ध मे अनेक सकल्प-विकल्प उठना।
- ४. अपमानिता दयिता की तरह नीद का साथ छोड देना।
- ५. शरीर की धातुओं का ह्रास होकर कृशकाय हो जाना।
- ६ इन्द्रियो को अपने-अपने विषयो के भोग से निवृत्त होना।
- ७ लज्जा का नाश होना।
- ८ उन्माद।
- ९ मूच्छी।
- १०. मृत्यु ।
- ये काम की दश दशाएँ कही गयी हैं।

चिकित्सासूत्र

- १. स्मरोन्माद रोग मे प्रेयसी या प्रियतम का साहचर्य करा देना ही मुख्य
 चिकित्सा है। अथवा—
- २ जिसके कारण स्मरोन्माद हुआ हो, उसके प्रति किसी प्रकार से मन में द्वेष उत्पन्न कराना चाहिए।

तक्तव्य—असफल प्रेम के रोमाश्वकारी परिणाम होते देखे जाते हैं। इसके चलते आत्महत्या या प्रेयसी अथवा प्रेमी की हत्याएँ भी हो जाती हैं। यह रोग मृगनयनी की आंखो की उज्ज्वलता का अँघेरा पक्ष है। शम्भु, स्वयम्भू और विष्णु, विश्वामित्र और पराश्वर जैसे महर्षि भी इस रोग के वेग को नहीं रोक पाये। भर्तृहरि ने ग्लानि और क्षोभ से भरे मन से कहा है—

या चिन्तयामि सतत मिय सा विरक्ता साऽप्यन्यमिच्छति जन स जनोऽन्यसक्त । अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक् ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च' ॥

चिकित्सा

१ अमयादि चूर्ण—हरीतकी निर्वीज, पीपर, मुनक्का, बच, इन्द्रजो, शीतल चीनी, त्रित्रकमूल, निशोय, गजपीपर, इन्द्रायन की जढ, अतीस, कपूर और मदार की जड का छिलका, इनके समभाग का चूर्ण बनाकर रख ले। मात्रा—२—२ ग्राम, घी-मिश्री मिलाकर प्रात -साय सेवन करावे।

२ शुक्रमेह-नाशक शिलाजित्वादि वटी, वृहद् वगेश्वर, मदनमोदक, शिवा गुटिका, स्वर्णवग आदि का सेवन करावे।

३ इस रोग में कफ-नाशक और मेद को घटाने वाले आहार-विहार तथा भीषध का प्रयोग करना चाहिए।

1377

अग्निप्रदीपक, हलके, सुपच और वायु का अनुलोमन करने वाले आहार देवे ।

अवस्य

रोगी का मनोऽभिघात करना, भत्सेना करना तथा तीक्षण अम्ल, अवण और कटु रस द्रव्यों का प्रयोग अपध्य है।

बलात्कार

(Rape)

परिचय-परिमाधा—अपनी स्त्री के अलावे, जब कोई व्यक्ति १४ वर्ष से ऊपर आयुवाली किसी स्त्री के साथ, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी स्वतन्त्रता से दी गई स्वीकृति के बिना अथवा अन्यायपूर्ण रीतियो से स्वीकृति लेकर सम्मोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं।

सम्भोग या उसके लिए प्रयत्न करना भी बलत्कार समझा जाता है।

वक्तक्य-भारतवर्ष मे १४ वर्ष की आयु पूर्ण करने के प्रश्चात् स्त्री संमोग के लिए अपनी स्वीकृति दे सकती है और वह स्वीकृति मान्य होगी।

अप्राकृतिक मैथुन के प्रकार

- १ गुदमैथुन (Sodomy)।
- २ हस्तमैथुन (Masturbation)।
- ३ एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ मैथुन (Tribadism)।
- ४. पशुमेथुन (Bestiality)।

गुदमेयुन

किसी पुरुष का पुरुष, स्त्री अथवा बच्चे के साथ गुदा में मैथुन करना गुदमैथुन कहा जाता है। प्राय सभी देशों में गुदमैथुन प्रचलित है। निद्रा की अवस्था में बिना जगाये किसी के साथ गुदमैथुन नहीं किया जा सकता है। यदि स्वीकृति लेकर गुदमैथुन किया गया हो, तो इण्डियन पेनल कोड की धारा ३७७ के अनुसार कर्ती और कमें दोनों को न्यायालय से दण्ड मिलता है।

हस्तमेथुन

यह कमें न्यायालय द्वारा स्त्री या पुरुष के लिए दण्डनीय नही है। यह प्रायः उन व्यक्तियों में पाया जाता है, जो कमजोर मन के होते हैं, जिनकी स्त्री न हो और जिनकी कामपिपासा उग्र हो और जो कुसङ्कृति एव कामुक सग-सोहबत में रहते हो। स्त्रियों में हस्तमैंथुन कम देखा जाता है।

हस्तमैथुन के अभ्यस्त पुरुषों में निम्नािङ्कृत लक्षण पाये जाते हैं—

- १ मानसिक दुवंलता, लज्जा, सकोच, स्मृतिनाश आदि।
- २ बार-बार मुत्रोत्सर्ग का वेग उठना।
- ३ अण्डकोषों का लटक जाना।
- ४ शिश्नमुण्ड का रक्तवर्ण हो जाना।
- ५. आंखो का धँसना और उनके नीचे कालिमा होना ।

एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ मैयुन

यह यौनमनोगत रोग है। इसमे दो स्त्रियाँ कामेच्छा की सन्तुष्टि या वृद्धि के लिए शारीरिक आलिङ्गन के द्वारा अपनी जननेन्द्रियो को परस्पर रगडती हैं।

पशुमैथुन

मनुष्य द्वारा पशुजाति की स्त्री के साथ मैथुन करने को पशुमैथुन कहते हैं। इसके लिए कुत्ती, बिल्ली, गाय, गधी, घोडी, बकरी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यदि औरत द्वारा पशुमैथुन किया जाता है, तो वह प्राय कुत्ते, बन्दर आदि का प्रयोग करती है।

वक्तव्य काम एक स्वाभाविक क्षुष्ठा है और इसकी अग्नि जठराग्नि की अग्नि से अधिक तीव्र है, जिसे कमजोर मन का कामुक व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। वह किसी भी प्रकार अपनी भूख मिटाने के लिए उपाय ढूढ निकालता है। शास्त्र-कारों ने भी कहा है कि जब तक कोई पुरुष या स्त्री कामवासना के रसानुभव में मन्द होते हैं, तब तक उनके नीवी-बन्धन या लगोट कसे रहते हैं और उनमें शील, सकोच और नैतिकता होती है। किन्तु जब वे पञ्चबाण के बाण से बिद्ध हो जाते हैं, तो उनका धैर्य जवाब दे देता है, उनकी नैतिकता धूल चाटती रह जाती है और वे किसी भी उचित-अनुचित साधन से अपनी कामेच्छा को पूर्ण करते हैं।

माध्यवितान में उपदश के निदान में कहा गया है—'हस्ताभिघातात् नखदन्त-पातात्' अर्थात् हाथ से लिङ्ग को मसलने से, नखो या दाँतो के आघात से उपदश होता है, जिसकी टीका मधुकोष में इस प्रकार है—'दाक्षिणात्या स्त्रिय मुखे मैथुन कारयन्ति' अर्थात् दक्षिण प्रदेश की स्त्रियाँ मुख में मैथुन कराती हैं।

समिलिङ्गी मैथून — एकं पुरुष जब किसी दूसरे पुरुष के लिङ्ग पर अपने लिङ्ग का घर्षण कर मैथून करता है, तो वह समिलिङ्गी मैथून होता है। पाझात्य सस्कृति मे दो पुरुषो का परस्पर विवाह और विचित्र प्रकार की मैथून संस्कृतियों का उद्भव होने के समाचार आये दिन मिलते रहते हैं।

त्रयोविंश अध्याय

त्वचा के रोग

कुष्ठ रोग

परिचय—यह रोग बाठ महारोगों में गिना जाता है और कृष्णुसाध्य होता है। इसमें शरीर की त्वचा विकृत होती है और यह क्रमश अग्निम धातुमों तथा उपघातुमों को गलाता हुआ प्रारीर को अत्यन्त विकृत कर देता है। सुश्रुत ने इसे बोपसंगिक (सक्रामक) कहा है। इसे ससर्गंज बतलाया गया है। यह त्रिदोयज् होता है।

निर्वेचन—'कुष्णाति' अञ्जम् । 'बुप निष्कप्' (क्रघा० प० ते०) 'निकुषि' (उ० २।२) इति क्यन् । कुत्तितं तिष्ठति वा । 'मुपि-' (३।२।४) इति क । 'अम्बाम्ब-' (८।३।९७) इति यः । —अमरकोप-रामाश्रमी टीका २।६।५४।

वर्यात् जो रोग दारीर के बग, प्रत्यग, धातु, उपधातु को गलाकर विकृत बना दे या गिरा देवे, ऐसे अग-विकारकारक रोग को कुष्ठ कहते हैं। अप्टाञ्चसग्रहकार (निदान०१४) ने कहा है—'कालेनोपेशित यस्मात् सर्यं फ्रुष्ठाति तह्नपु ।'

यदि उचित ममय से चिकित्सा न की जाय, तो यह रोग समूचे शरीर को विकृत कर देता है।

निवान'

- (१) आहार-- १ विरुद्ध लगपान, द्रव-स्निग्ध सीर गुरु पदायों का अधिक सेवन ।
- २ शीत-उष्ण, सन्तर्पण-अपतर्पण, गुरु-अघु पदार्घी का व्यतिक्रम से सेवन अर्घात् शीत के बाद उष्ण फिर शीत, गुरु के बाद लघु फिर गुरु आदि ।
 - ३ नवीन बन्न, दही, मछली, बति लवण, बति सम्ल, उहद, बालू खाना ।
 - ४ पिष्ट अम्न, तिल, दूध, गुड का अधिक सेवन, अजीण रहने पर मोजन ।
- ५. जो, चीना, कोदो आदि जंगली छुद्र अयो को दूध, दही, मट्ठा, मुलयी, उहद, अतसी तथा कुसुम्भ के तेल के साथ खाना ।
- (२) विहार—६ भोजन के बाद व्यायाम करना, घूप में रहना, दिन मे सोना।
 - ७ घूप, परिश्रम या भय से आक्रान्त्र होकर महसा ठटे जल मे नहाना।
- ८ अम्नाजीणं होने पर मैथुन करना, विदग्ध आहार को बाहर निकाले विना विदाही पदार्य खाना, छदिनेग-निग्रह, स्नेहपान या वमन के बाद मैथुन करना।

१ च० चि० ६। गु० नि० ५।२ । स० ६० नि० १४ ।

- (३) भ्रष्ट आचरण-९. विद्वान् या ब्राह्मण या गुरुजन का अपमान करना।
- १० सज्जनो, साधुबो तथा श्रेष्ठजनो का तिरस्कार एव निन्दा करना।
- ११. इस जन्म मे या पूर्व जन्म मे पाप का आचरण करना !
- १२ पञ्चकर्मी का अविधि प्रयोग करना।
- १३ मल-मूत्रादि वेगो को रोकना।
- (४) कृमि--१४ रक्तज कृमियो का होना।
- (५) वशान-१५. कुष्ठग्रस्त माता-पिता के रज-वीर्यं का दृष्ट होना।
- (६) उपसर्ग- १६ कुष्ठरोगी के साथ मैथुन करना, अगो का स्पर्श करना, रोगी के श्वास को ग्रहण करना, एक ही वर्तन मे भोजन करना, एक ही शय्या पर सोना-बैठना, रोगी के वस्त्र आदि धारण करना।
- (७) १७ आधुनिक मत् से कुष्ठ (Leprosy) की उत्पत्ति एक दण्डाणु वैसिलस लेप्रा (Bacıllus lepra) के उपसर्ग से होती है।
- (८) चरक--१८ त्रिदोष, त्वचा, रक्त, मास और जलीय धातु का एक साथ दुष्ट होना।
- (९) सुश्रुत---१९. त्रिदोष-प्रकोपपूर्वंक त्वचा की विकृति तथा उपेक्षा करने पर रक्त-मास आदि की दुष्टि को कुष्ठ का कारण मानते हैं।
- (१०) सप्तक द्रव्य—२० वात, पित्त, कफ ये तीन दोष और त्वचा, रक्त मांस एव लसीका ये चार दूष्य कुष्ठजनक सप्तक द्रव्य है।

संप्राप्ति

उक्त निदानों के सेवन से प्रकुपित तीनों दोष शरीर में सन्वरण करते हुए त्वचा, रक्त, मास और लसीका को दूषित कर शिथिल कर देते हैं। तत्प्रधात त्वचा में स्थानसंश्रय करके वहाँ एक मण्डल बनाते हैं। यदि इस अवस्था में समुचित चिकित्सा न की गयी, तो दोष शरीर के भीतर अन्य धातुओं को भी दूषित कर देते हैं और कुष्ठरोग को उत्पन्न करते हैं।

सम्प्राप्तिचक

विरुद्ध आहार आदि एव जीवाणु---निदान---वातादि दोष-प्रकोप

त्वग्-रक्त-मास-लसीका का दूषण

दोषो का त्वचा मे स्थानसश्रय

कुष्ठरोग---मण्डलोत्पत्ति

पूर्वरूप

१. त्वचा का स्पर्श अत्यधिक चिकना या अत्यधिक रूक्ष होना।


- २. स्वेद की अधिकता अथवा स्वेद का सर्वथा अभाव होना ।
- ३. विर्वेणता, दाह, खुजली, सूनापन या सुई चुभाने जैसी पीडा ।
- ४. त्वचा पर चकत्ते होना, भ्रम, वणो मे अधिक पीडा, उनकी शीघ्र उत्पत्ति, तथा चिरस्थिति ।
 - ५ वरणो का रोपण होने परे रूक्षता एव अल्प कारण से भी वर्णो का बढ जाना।
 - ६ रोमहर्ष होना और रक्त का काला पड जाना, ये कुष्ठ के पूर्वेरूप हैं।

भेट

१ वातज, २. पित्तज, ३ कफज, ४ वातपित्तज, ५ वातकफज, ६ पित्तकफज और ७ सिन्निपातज भेद से कुष्ठ सात प्रकार के होते हैं। यद्यपि सभी कुष्ठ त्रिदोपज होते हैं, फिर भी दोषो की अधिकता के आधार पर वातज आदि व्यवहार किया जाता है।

इन सातो को महाकुष्ठ कहते हैं। इनमे दोषो के अधिक प्रकोप के अनुसार वर्ण, वेदना, आकार तथा लक्षणों में भिन्नता होती है।

सामान्य दोषप्रकोष से ग्यारह प्रकार के क्षुद्रकुष्ठ होते हैं, जिनमे त्वचा मे कण्डू, दाह, रूक्षता आदि लक्षण होते हैं।



महाकुष्ठ मे दोष और नाम-भिन्नता

			(3-	-	-		•	
दोष			चरक			सुध्रुत		अष्टाङ्गहृवय
वात		٩	कपाल	9	l	कपाल	٩	कपाल
पित्त		२	औदुम्बर	7	?	उदुम्बर	२	उदुम्बर
ৰূদ		Ę	मण्डल	3	ł	अरुण	₹.	मण्डल
वातपित्त		8	ऋष्यजिह्न	۲	1	ऋष्यजिह्न	٧.	ऋष्यजिह्न
पित्तकफ		4	पुण्डरीक	•	١	पुण्डरीक		पुण्डरीक े
कफवात		Ę	सिष्ठम	•	ę	दद्रु		ददु
त्रिदोष		ø	काकणक	•	9,	, काकणक		काकणक
	वात पित्त कफ वातपित्त पित्तकफ कफवात	वात पित्त कफ वातपित्त पित्तकफ कफवात	वात . १ पित्त २ कफ ३ वातिपत्त ४ पित्तकफ ५ कफवात ६	बोष चरक वात , १ कपाल पित्त २ औदुम्बर कफ ३ मण्डल वातिपत्त ४ ऋष्यजिह्न पित्तकफ ५ पुण्डरीक कफवात ६ सिष्टम	बोष चरक वात १ कपाल १ पित्त २ औदुम्बर कफ ३ मण्डल इ वातिपत्त ४ ऋष्यिजिह्न १ पित्तकफ ५ पुण्डरीक	बोष चरक वात १ कपाल १ पित्त २ औदुम्बर २ कफ ३ मण्डल ३ वातिपत्त ४ ऋष्यजिह्न ४ पित्तकफ ५ पुण्डरीक ५	बोष चरक सुश्रुत वात १ कपाल १ कपाल पित्त २ औदुम्बर २ उदुम्बर कफ ३ मण्डल ३ अरुण वातिपत्त ४ ऋष्यजिह्व ४ ऋष्यजिह्व पित्तकफ ५ पुण्डरीक ५ पुण्डरीक कफवात ६ सिष्टम ६ दद्रु	बोष चरक सुश्रुत वात १ कपाल १ कपाल १ पित्त २ औदुम्बर २ उदुम्बर २ कफ ३ मण्डल ३ अरुण ३. वातिपत्त ४ ऋष्यजिह्न ४ ऋष्यजिह्न ४. पित्तकफ ५ पुण्डरीक ५ पुण्डरीक ५ कफवात ६ सिष्टम ६ दद्गु ६.

·	क्षुद्रकुष्ठ ।	
	i i	
चरक	सुध्रुत	अष्टा <u>ङ</u> ्गहृदय
१ एककुष्ठ	एककुष्ठ-स्यूलारुषक	एककुष्ठ
२. चर्मकुष्ठ	किटिभ	चमंकुष्ठ
३ किटिभ	महाकुष्ठ	किटिभ
४ विपादिका	विसपं	विपादिका
५ अलसक	परिसर्पं	अलसक
६ दद्रु	चमँदल	सिघ्म
७ चर्मेंदल	पामा	चमंदल
८ पामा	सिघ्म	पामा
९ विस्फोटक	रकसा	विस्फोटक
१० शताच	विचर्चिका	शतारु
११ विचर्चिका		विचिंचका
	माध्यस्य से स्टब्स	

- कुष्ठ क रुक्षण
 १ कपालकुष्ठ—यह काले और लाल रग के खप्पर के समान और विषमा-कृति तथा रूक्ष, कठोर, तनु, सूचीवेधनवत् पीडायुक्त एव कृच्छ्रसाध्य होता है।
- २. औदुम्बर-यह गूलर के फल की आकृति का, मूर्ज के रंग के रोमवाला, पीडा-दाह-रक्तिमा और खुजली से युक्त होता है।
- ३ मण्डल--यह क्वेत या रक्तवणं के स्थिर, आई, चिकने और उठे हुए परस्पर संयुक्त अनेक मण्डलो या उभारों से संयुक्त होता है।
- ४ ऋष्पजिह्न —यह एक विशेष जाति के हिरण की जिह्ना के आकार का, कर्कश, लाल किनारोवाला, बीच मे श्याव और वेदनायुक्त होता है।
- ५. पुण्डरीक-यह सफेद एव लाल किनारे वाला, रक्तकमल जैसा उन्नत और मध्य मे क्वेत रक्तवर्ण का होता है।
- ६ सिम्म (सिहुला)—यह श्वेत या लाल रग का, लौकी के फूल के समान और प्राय छाती या पीठ पर होने वाला तथा रगडने पर भूसी जैसा चमडा छोडने वाला होता है।
- ७. काकणक -- यह रत्तीफल के वर्ण का अर्थात् आधा काला आधा लाल, पकने वाला, तीव्र वेदना-युक्त एव तीनो दोषो के लक्षणो से युक्त तथा असाध्य होता है।

क्षुद्रकुष्ठ के लक्षण

- १. एककुष्ठ—यह स्वेदरिहत, विस्तारवाला और मछली की त्वचा के समान काला-लाल होता है।
 - २ त्रमंकुष्ठ-इसमे हाथी की त्वचा के समान त्वचा मोटी हो जाती है।

- ३. किटिम—यह स्निग्ध कृष्ण वर्ण का, व्रणस्थान के समान खुरदरा और कठोर होता है।
- ४ विपादिका—इसमे हाथ या पैर मे फटन होकर वेदना होती है, कदाचित् खून बहने लगता है।
 - ५. अलसक -- यह रक्तवर्ण के फोडो से युक्त और खुजली युक्त होता है।
- ६. **रह**—यह दिनाय है, जिसमे भयक्ट्रर खुजली होती है और लालवर्ण की पिडकाओं से युक्त चकत्ते हो जाते हैं।
 - ७. चमंदल-यह रक्तवणं का, शूल-खुजली और स्फोटो से युक्त होता है।
- ८ पामा—यह नितम्ब, वक्षण आदि गरम स्थानो मे छोटी-छोटी अनेक फुन्सियो से युक्त, स्नाव खुजली और जंलन से युक्त कण्डूमय रोग है।
- ९ कच्छू—यह पकनेवाली खुजली है, जिसमे हाथ और नितम्ब प्रदेश मे तीव्र दाहयुक्त फफोले उठ जाते हैं, जिनसे स्नाव या पूय निकलता है।
 - विस्फोट—स्याव या रक्तवर्ण पतली त्वचायुक्त फफोलो को विस्फोट कहते हैं।
 - ११ शतार-यह रक्त-श्याववर्ण का, दाहयुक्त और अनेक व्रणीवाला होता है।

विचर्चिका

खुजली सहित, स्याववणं की अधिक स्नाव करनेवाली पिडकाओं के समूह को 'विचिक्ता' कहते हैं। यह उकवत है।

कुष्ट मे दोषानुसार लक्षण

वातज लक्षण	पित्तन लक्षण	कफज लक्षण
खुरदरा	दाह	घ्वेतता
र याव	रक्तिमा	शीतता
अरुण	स्राव	स्निग्धता
रूक्ष	े पाक	कण्डू
पीडायुक्त	क्लेद	स्थिरता
सकोच	आमगन्ध	गौरद आदि
हर्ष	अगपतन ['] आदि	
त्तोद		
शूल वादि		

घातुगत कुष्ठ के रूक्षण

रूक्षता ^ सूनापन	खुजली दुर्गेन्घित- पूय	 मेदगत अँगुलि आदि गलकर गिरना गमन मे असमर्थता	अस्थि-मन्जागत नासिका गल कर बैठ जाना नेत्र मे	अगो मे
र सूनापन अतिस्वेद	67	गमन में असमर्थता अगों में पीडा	नेत्र मे लालिमा	क्षत का फैलना

काविकित्सा

रोमहर्षे जैसी वेदना घाव का फैलना घाव मे तथा पिडका कृमि होना सभी फफोले स्वरनाश धातुओ के स्थिरता उक्त लक्षण

वक्तव्य-स्त्री के आतंव (स्त्री-बीज) तथा पुरुष के वीयं के कुष्ठ से दूषित होने पर उनकी सन्तान भी कुष्ठी ही होती है।

साध्यासाध्यता

१ त्वचा, रक्त और मास में स्थित तथा वात एवं कफ की अधिकता से होनेवाला कृष्ठ साध्य होता है।

२. मेदोगत कुष्ठ यदि द्वन्द्वज हो, तो याप्य होता है।

३ अस्थिगत, मञ्जागत, कृषियुक्त, पिपामायुक्ती, दाहयुक्त, मन्दाग्नियुक्त, त्रिदोपज, फटा हुआ, गिलताङ्ग, नेत्र लालिमायुक्त, वोलने की शक्ति से रहित और वमन-विरेचन-निरूह-अनुवासन एव शिरोविरेत्रन इन पन्त्रकर्मी से जिस कुष्ठ में लाभ होने की सभावना न हो, वह कुष्ठ असाध्य होता है।

सापेक्षं निदान

कुष्ठ

- यह वात-िपत्त-कफ द्वारा शरीर
 के त्वचा, रक्त, मास और जलीयधातु
 के दूषित होने से होता है। इसमें
 द्रव्यसमक कारण हैं।
- २ यह विलम्ब्से क्रियाशील, स्थिर एव निबंल रक्त-पित्तवाले दोषो के कारण होता है।
- इसमे गुरु-देवता आदि का तिरस्कार, असत्य भाषण और पापकर्म, ये कारण होते हैं।
- ४ यह त्रिदोषज होता है।
- ५ यह एक विशिष्ट जीवाणुजन्य रोग है।

विसर्पे

- १ यह भी तीनो दोष और त्वचा, रक्त, मास तथा जलीय घातु के दूषित होने से होता है। इसमे द्रव्यसप्तक कारण हैं।
- २. यह शीयकारी विसर्पणशील प्रवल रक्त-पित्तवाले दोषो से होता है।
- ३ इसमे पाप आदि कारण नही हैं।
- ४ यह एक-एक दोष से भी होता है।
- ५ इसकी उत्पत्ति में द्रव्यसप्तक कारण हैं। एवं प्रधान कारण मालागोलाणु (Streptococcus) है।

कुष्ठ की संक्रामकता

कुष्ठ आदि रोगो से पीडित रोगी के साथ मैथुन करने या निरन्तर सम्पर्क से

प्रसङ्गाद् गात्रसंस्पर्शात्रि श्वासात्र्रेसहमोजनात् ।। एकश्य्यासनाञ्जैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥

शरीर के स्पर्श से, श्वास से, साथ मे भोजन करने से, एक शय्या पर सोने से, रोगी के पहने वस्त्र और माला को धारण करने से, कुष्ठ, ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्राभिष्यन्द तथा अन्य औपसींगक रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य मे सक्रान्त हो जाते हैं।

चिकित्सासूत्र

- १. वातप्रधान कुष्ठो मे घृतपान, कफप्रधान मे सर्वप्रथम वमन और पित्तप्रधान में सर्वप्रथम रक्तमोक्षण और विरेचन का प्रयोग करे।
 - २ अल्प और उथले कुष्ठ मे पाछकर सीग से रक्त निकालना चाहिए।
 - ३ अवगाढ (गम्भीर धातुगत) मे सिरावेध द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिए।
- ४ दोषो को निकालने के लिए तीक्ष्ण प्रयोग हानिकर और वातप्रकोपक होता है, अत वार-बार और घीरे-घीरे दोषो का निर्हरण करना चाहिए ।

वमन---१५-१५ दिन पर । विरेचन---१-१ माह पर ।

अवपीड नस्य---३-३ दिन पर। रक्तमीक्षण---६-६ मास पर करावे।

- ५ विरेचन और रक्तमोक्षण के बाद धृतपान कराना चाहिए, अन्यथा वायु का प्रकोप होकर हानि की आशका होती है।
- ६ जिस कुष्ठ मे शस्त्र प्रयोग न किया जा सके अथवा जिसमे त्वचा मे शून्यता हो, उनमें रक्त और दोष को निकालने के बाद क्षार का प्रयोग करना चाहिए।
- ७. पाषाणवत् कठोर, शून्य, स्थिर और पुराने कुष्ठ मे विषघ्न औषध पिलाकर विष का लेप करे।
 - ८. संशमन-कुष्ठ की शान्ति के लिए तिक्त और कषाय द्रव्यो का प्रयोग करे।
 - ९ क्षुद्रकृष्ठो मे बाह्य और महाकुष्ठो मे आभ्यन्तर सशोधन अवस्य करे।
 - १०. निदानपरिवर्जन, दोषानुसार सशोधन तथा शमन उपचार तत्परता से करे।

चिकित्सा

बाह्य प्रयोग—१. एलादि लेप—बडी इलायची, कूठ, दारुहल्दी, सौंफ, चित्रक, वायविडग, रसौंत और हर्रा बारीक पीसकर जल मे मिलाकर लेप करे।

- २ सिद्धार्थक स्नान नागरमोथा, मदनफल, आंवला, हर्रा, बहेडा, करञ्ज की पत्ती, अमलतास की पत्ती, इन्द्रजौ, दारुहत्दी और खितवन की पत्ती सब समभाग में कुल १ किलो लेकर कूटकर १ बाल्टी जल में अर्घाविशष्ट पकाकर छानकर उस जल से स्नान करावे। इन्ही द्रव्यों का क्वाथ पिलावे तथा इनको ही बारीक पीसकर उबटन और लेप लगावे। यह सुलभ, सस्ता और लाभप्रद योग है।
- ३ मन शिलादि लेप—मैनसिल, हरताल, कालीमरिच, मदार का दूध इन सबको समभाग लेकर तिल मिलाकर लेप करे।

कुष्ठ जनरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । भौपसर्गिकरोगाश्च सङ्कामन्ति नरान्नरम् ॥ सु० नि० ५

पक्षात् पक्षाच्छर्दनान्यभ्युपेयान्मासान्मासात् संसनं चाप्यथस्तात् ।
 त्र्यद्दश्त् त्र्यद्दान्नस्तत्धावपीदान्मासेष्वस्र मोक्षयेत् षट्सु षट्सु ॥ चक्रदत्तः

४ तुत्थावि लेप-तूर्तिया, वायविडंग, कालीमरिच, कूठ, लोध और मैनसिल, सब समान भाग में लेकर बारीक पीसकर जल में लेप लगावे।

५ स्नान, पान, प्रदेह-गोमूत्र, निम्वपत्रक्वाथ और विडङ्गक्वाथ का प्रयोग करे।

६ अरुस की पत्ती, कोरया की छाल, छितवन की छाल, करव्ज, कनेर और नीम की पत्ती तथा खदिर छाल के समभाग के क्वाय का गोमूत्र मिलाकर पान, स्नान मे प्रयोग और पीसकर लेप मे प्रयोग करे।

- ७. नीम, विटङ्ग और खदिर इन तीनो का वाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयोग जैसे भी हो करना चाहिए।
- ८ धाह्य प्रयोगार्थ-मुर्दाशख, रसकपूर, सोहागा, तुत्य, गन्धक, कत्या, गोमूत्र, नीलगिरी तैल, चकवडबीज, कसौंदी, नीम का पचाग, चमेली के पत्ते, वायविडग और भजकटैया (स्वणंक्षीरी) ये औपछें त्वचा-कृमिनाशक हैं।
- ९ आभ्यन्तर प्रयोगार्थं खदिरसार, हरें, आंवला, हत्दी, छितवन, अमलतास, मजीठ, सरफोका, कसौंदी, वायविडग, चमेली के पत्ते, नीम, खैर, गूलर, भोजपत्र, क्वेत-रक्त चन्दन, विजयसार, उशवा, गोरखमुण्डी, चोपचीनी, सारिवा, सिहजन आदि औपधो को क्वाय एव चूणं आदि के रूप में प्रयोग करना अत्यन्त उपयोगी है।
 - ९० व्याप-पटोलादिक्वाय, महामञ्जिष्ठादिक्वाय और पटोलमूलादिक्वाय दे।
 - १९ चूर्ण-मञ्जिष्ठादिचूर्णं, निम्वादिचूर्णं, मुस्तादिचूर्णं और सोमराजीचूर्णं,दे ।
- १२. आसवारिष्ट खदिरारिष्ट, मञ्जिष्ठाद्यरिष्ट, सारिवाद्यरिष्ट, मध्वासव , और कनकविन्द्वरिष्ट का प्रयोग उत्तम है।
 - १३. वटी-आरोग्यवधिनी वटी, अमृता गुग्गुलू, एकविशतिक गुग्गुलू दे।
- १४ रसौषध -- रसमाणिवय, गन्धक रसायन, तालकेश्वर, गलत्कुष्ठारि, कुष्ठकुठार, शुद्ध गन्धक का योग्य मात्रा से प्रयोग करे।
- १५ घृत—महाखदिरघृत, त्रिफलाघृत, पचितक्तघृत, तिक्तपट्पलघृत, महातिक्तक-घृत का यथोचित प्रयोग करे।
- १६ तैल-बाह्य प्रयोगार्य-मरिचादि तैल, महामरिचादि तैल, तुवरक तैल, कुष्ठराक्षस तैल, जात्यादि तैल, सोमराजी तैल, करञ्ज तैल, निम्ब तैल आदि का प्रयोग करे।
- १७ वश कुष्ठान द्रध्य-आचार्यं चरक ने १ खदिर, २ हर्रे, ३ आँवला, ४ हल्दी, ५ भिलावा, ६ छितवन, ७ अमलतास, ८ कनेर, ९ वायविडग और १०. चमेली के पत्र, इन दशों को कुष्ठान कहा है।

व्यवस्थापत्र

(१) सामान्य

१. प्रात -साय
 क्षारोग्यविधनी वटी
 १ ग्राम
 रसमाणिक्य
 २५० मि० ग्रा०

ं स्वचा के रोग

गुडूचीसत्त्व ˆ	१ ग्राम
गोधृत से।	२ सात्रा
बाद मे महामञ्जिष्ठादि क्वाः	म १०० मि० ली
पीना ।	२ मात्रा
२. भोजनोत्तर २ बार	
श्वदिरादिष्ट	४० मि० ली०
समान जल से ।	२ मात्रा
३. ९ बजे व २ बजे दिन	
पन्वनिम्बादि चूर्णं	६ग्राम
जल से ।	२ मात्रा
४ रात मे सोते समय	
नारायण चूर्ण	५ ग्राम
मन्दोष्ण जल से ।	१ मात्रा
५ अभ्यग—महामरिचादि तैल	से ।
(२) वातप्रधान मे	
१ प्रात -साय	
आरोग्यवधिनी '	१ ग्राम
मन्दीष्ण जल से ।	२ मात्रा
बाद में पटोलमूलादि क्वाय	१०० मि० ली०
पीना ।	२ मात्रा
• २ भोजनोत्तर २ बार	
बदिरारिष्ट	४० मि० ली०
समान जल मिलाकर पीना ।	२ मात्रा
३. ९ बजे व २ बजे	
महायोगराज गुग्गुल्	२ ग्राम
जल से ।	२-मात्रा
४ रात मे सोते समय	
नारायण चूर्णं	५ ग्राम
मन्दोब्ण जर्ल से ।	१ मात्रा
(३) पित्तप्रधान में	
१ प्रात साय	
महातिक्तक घृत	३० ग्राम
गरम जल से।	२ मात्रा

कायचिकित्सा

	न र नार्ट्स ।
२ ९ बजे व २ बजे दि	न
पञ्चनिम्बादि चूर्ण	_ १० ग्राम
जल से ।	
३ भोजनोत्तर '	२ मात्रा
सारिवाद्यासव	४० मि० ली०
संमान जल से पीना ।	
४ रात में सोते समय	२ मात्रा
वारीग्यवधिनी	१ ग्राम '
जल से।	-
(४) कफप्रधान में	१ मात्रा
१. अमृतभल्लातक	0
पटोलमूलादि क्वाय से ।	१० ग्राम
र- भाजनात्तर	•
बदिरारिष्ट	४० मि० ली०
समान जल से पीना।	२ मात्रा
रे. रात में सोते समय	
मारोग्यवधिनी	१ ग्राम
जल से ।	१ मात्रा
(५) गलत्कुष्ठ में	
१. प्रात -साय-मध्याह्न	
<u>कुष्ठकु</u> ठार	१३ ग्राम
मधु से।	३ मात्रा
२ ९ बजे व ३ बजे	
पश्चनिम्बादि	१० ग्राम
जल से ।	२ मात्रा
३ भोजनोत्तर	
खदिरादिष्ट	४० मि० ली०
समान जल से पीना।	२ मात्रा
४ रात मे सोते समय	
आरोग्यवधिनी	१ ग्राम
जल से।	१ मात्रा

पध्य

सभी कुष्ठों में लघु अन्न और तिक्त रसवाले शाक पथ्य हैं। शुद्ध भिलावा, किला और निम्ब से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग हितकर है। पुराना धान्य, लि पशु-पक्षियों का मांस, मूँग की दाल, परवल का शाक हितकर है।

अपथ्य

गुरु अन्न, अम्लरस, दूध, दही, आनूपमास, मछली, गुड और तिल अपथ्य ग है।

किलास या श्वित्र

(Leucoderma)

परिचय

शरीर के किसी अग की त्वचा पर सफेंद दाग—सफेंद कुष्ठ—होने की किलास श्वित्र कहते हैं।

पर्याय—श्चित्र, किलास, वारुण ये पर्याय हैं। कही-कहीं चरण तथा चारुण भी यि कहे गये हैं। इसे बाह्य कुष्ठ (अष्टाङ्गसग्रह) भी कहा जाता है।

निर्वचन—१ किलास — किलेन इवैत्येन असित इति किलास । 'किल इवैत्य हनयो (तु० प० से०)। 'इगुपध-' (३।१।१३५) इति क । किलित इति ल । 'अस दीसी' (भ्वा० उ०से०)। अच् (३।१।१३४) अमरकोष— माश्रमी टीका।

२. श्वित्र—श्वेतते (इर्तिश्वित्रम्)। 'श्वितावर्णे' (भ्वा० आ० से०)। फायितच्चि—'(उ०२।१३) इति रक्।

निदान

- १ झूठ बोलना ।
- २ कृतघ्न होना।
- रे देवताओं की निन्दा करना।
- ४ गुरुजनो का अपमान।
- ५ पापकर्म करना।
- ६ विरुद्ध अन्नपान सेवन।
- ७ जन्मान्तर (पूर्वजन्म) मे किया गया दुष्कमें।
- ८. कुष्ठरोग के सभी निदान इसके भी निदान होते हैं।

आहार

- ९. मधु, राब (फाणित), मछली, बडहल, मूली और काकमाची का अधिक मात्रा मे लगातार सेवन करना।
 - lo. अजीर्ण होने पर भोजन करना।

१९ दूध-दही-तक्र-मांस-कुल्पी और तैलीय द्रव्यों का एक साथ सेवन करना।
१२. गुरु, स्निग्ध तथा द्रव पदार्थों का अधिक सेवन करना।

विहार

१३. वमन आदि के वेगो को रोकना।

१४ भय, श्रम या गर्मी लगने के तुरन्त बाद ठडा जल पीना।

१५ दिन में सोना और पचकमं का ठीक प्रयोग न होना।

वाप

१६. गुरु, ब्राह्मण या स्त्री का वध करना।

१७ चोरी करना, जलाशय को दूषित या नष्ट करना।

१८ परायी स्त्रो के साथ संभोग करना।

निदानार्यंकर रोग

१२ व्रण अम्लिपित्त या अतिसार की उचित चिकित्सा न करना या अधिक दिनो सक क्रिमिरोग का रहना।

२०. गम्भीर घातुगत वण या अग्निदग्घ होना ।

संप्राप्ति

पूर्वोक्त निदानों से कुपित दोष त्वचा में स्थानसश्रय करके अन्य धातुओं की दूषित कर त्वचा का वर्ण क्वेत करके किलास रोग उत्पन्न करते हैं।

सामान्य लक्षण

शरीर में त्वचा का रग सफेद हो जाता है और वह शनै शनै फैलता है। इसमे कोई पीडा नहीं होती। गर्मी के मौसम मे इसमें जलन मालूम होती है, जिसे रोगी सहन नहीं कर पाता है।

किलास के भेद

चरक ने दारुण, चारुण और श्वित्र को पर्याय नाम कहा है। इसे त्रिदोषज तथा त्रिविध बतलाया है। चरक ने धातुगत दोषों के आधार पर तीन वणों का उल्लेख किया है, किन्तु वाग्भट ने दोषों की प्रधानता से उन-उन धातुओं के आश्रित, वणों के आधार पर तीन प्रकार का बतलाया है।

सुश्रुत० नि० ५।१५ पर गयदास-टीका मे उद्घृत भालुकि वचन के अनुसार-

- १ रक्तवातुगत दोष से उत्पन्न किलास रक्तवर्ण का होता है, उसे दारुण कहते हैं।
- २. मासगत दोषो से उत्पन्न श्वित्र ताम्रवर्ण का होता है, जिसे वारण कहते हैं।
- ३ मेदोगत दोष से उत्पन्न श्वित्र स्वेतवर्ण का होता है, जिसे श्वित्र कहते हैं।

१. दारुण चारुण दिवत्रं किलासं नामभिस्त्रिम । विश्वेयं त्रिविधं तब्च त्रिदोषं प्रायशम तद् ॥ च० चि० ७।१७३

वाग्मटानुसार वातज श्वित्र—यह रक्तगत होता है और त्वचा रूक्ष तथा अरुण वर्ण की हो जाती है।

पैतिक श्वित्र—यह मासगत होता है और त्वचा कमलपत्र के समान ताम्रवर्ण की हो जाती है।

कफज श्वित्र—यह मेदगत होता है और त्वचा श्वेतवर्ण की स्निग्ध, घन, विस्तृत तथा खुजली युक्त होती है।

साध्यासाध्यता

- १ कृष्णरोम वाला, पतला, परस्पर चक्रते न मिले हो।
- २ नवीन उत्पन्न (एक वर्ष के अन्दर का हो), अग्निदग्ध न हो, तो साध्य होता है।
 - १ श्वेतरोम वाला, मोटा, परस्पर मिला हुआ तथा चिरकालीन।
- २ अग्निदंग्ध, अधिक देश में फैला हुआ, गुह्य (गोपनीय) अगो में उत्पन्न, ओठ तथा हथेली पर उत्पन्न नवीन श्वित्र भी असाध्य होता है।

सापेक्ष निवान

कुष्ठ	किलास
-------	-------

- १. यह कृमिजन्य होता है। १. इसमे कृमि का सम्बन्ध नही है।
- २ यह सक्रामक है। २ यह सक्रामक नहीं है।
- ३. इससे शरीर-घातुएँ नष्ट होती हैं। ३ शरीर-घातुएँ नही नष्ट होती हैं।
- ४ यह त्रिदोपज है। ४ यह एकदोषज भी है।
- ५ यह सप्तमातुगत है। ५. यह त्वचा, रक्त, मास, मेद मे होता है।

भ्वित्र सिध्मकुष्ठ पुण्डरीक कुष्ठ

- १ गहरा व्वेतमण्डल १ उथला व्वेतमण्डल १ व्वेताभमण्डल
- २ अरुण वर्ण, मध्यस्निग्ध २ अरुण वर्ण, मध्यस्निग्ध २. रक्त, रक्तसिरायुक्त
- ३ प्राय मुख, हस्त-पाद ३ प्राय उर प्रदेश में फैलने ३. पूर्य, लसीका, कण्डू, तथा उर प्रदेश। पर पीठ आदि पर कृमि, दाह, पाक आदि।

चिकित्सासूत्र

- १ चरक्-सूत्रस्थान अ० २४ मे इसे रक्तज रोगो मे गिना गया है। अत रक्तज रोगो की सामान्य चिकित्सा यथा—विरेचन, उपवास और रक्तमोक्षण करे।
 - २ इसकी चिकित्सा कुष्ठरोग के समान करनी चाहिए।
 - ३. सर्वप्रथम सशोधन और बाद मे सशमन उपचार करे।
- ३ यह पापकर्मं जरोग है, अत पापनाश के लिए दान-पुण्य, व्रत-उपवास आदि धार्मिक अनुप्रान करना चाहिए, बिना पाप कटे यह ठीक नहीं होता।
 - ४ वमन-विरेचन द्वारा शरीर का शोधन कर ससर्जन क्रम से पथ्य दे। ३९ का० दि०

चिकित्सा

- १. स्नेहपान कराकर स्नेहन करने के बाद, विशेष रूप से विरेचन कराने के लिए कठगूलर के फल का स्वरस या छाल का क्वाथ ५० मि० ली० २० ग्राम गुड मिलाकर पिलाना चाहिए।
- २. विरेचन हो जाने के बाद ३ दिन तक धूप में बैठना चाहिए और प्यास लगने पर पेया पिलानी चाहिए।
- ३ श्वित्र मे यदि स्फोट (त्रण) हो जाय, तो कण्टक अथवा सूई से भेदन कर लसीका का स्नाव करा देवे। तत्पञ्चात् सेंधानमक, कूठ, कदलीक्षार और नीलकमल को हाथी के मूत्र मे पीसकर लेप करना चाहिए।
- ४. क्वाय--कठगूलर की छाल, विजयसार, फूलप्रियड्गु और सौंफ, इनको समान भाग लेकर कूटकर, उसमे से २० ग्राम लेकर बाधा लीटर जल मे चतुर्थीशा-विशेष क्वाय बनाकर प्रात. १५ दिन तक पीना।
- ५ खैर की लकडी २५ ग्राम को कूटकर २ लीटर पानी मे औटाएँ, आधा जल जाने पर छान ले। यही जल पीने को देना चाहिए।
 - ६ महानील घृत का प्रयोग लाभप्रद होता है।
- ७ कालातिल १० ग्राम और वाकुची चूर्ण १-२ ग्राम जल से १ वर्ष तक प्रात. दे।
 - ८. अपराजिता की जड को पीसकर लगाना हितकर है।
 - ९ स्वर्णमाक्षीक १२५-२५० मि० ग्रा० मघु से सवरे-शाम दे।
- १० काले सर्प को जलाकर उमकी राख मे बहेडे का तेल मिलाकर लेप करना लामकर है। (सु० चि० ९।१७)
 - १९ गोमूत्र को पीना और उसे लगाना उत्तम है।
- १२ बाकुची बीज, लाक्षा, गोरोचन, रसाञ्जन, सौवीराञ्जन, पिप्पली लौह भस्म, इन सबको एक साथ पीसकर लेप करना चाहिए।
- १३ बाकुची ४ भाग, हरताल १ भाग, कासीस १ भाग लेकर नीम के पत्ते के स्वरस और गोमूत्र के साथ पीसकर वर्ती बना ले और उसकी विसकर लेप लगावे।
- १४ कायिकित्सा (ध्यानी जी, पृ० ४९१) मे एक सिद्धसम्प्रदाय की भौषध लिखी है---'करपणपत्तू' जिसका प्रयोग सफल् कहा गया है।
- १५ मनःशिलादि लेप--मैनसिल, वायविडग, कासीस, गोरोचन, भडभाड (सत्यानाशी-स्वर्णक्षीरी) के मूल की छाल और सेंघानमक इनको पीमकर लेप लगाने से श्वित्र शान्त हो जाता है।
- १६. ५सौबध—रसमाणिनय, आरोग्यविधनी, कैशोरगुग्गुलु, गुडूचीसत्व, खिदरारिष्ट आदि का आभ्यन्तर प्रयोग करना चाहिए।

पथ्य

लघु अन्न और तिक्त रस वाले शाक, त्रिफला, निम्ब से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग लामकारी है। पुराना अनहनी या साठी चावल, जागल पशु-पक्षियो का मास, मूग की दाल और परवल का शाक पथ्य है।

अपध्य

गुरु अन्न, अम्ल रस, दूध, दही, आनूप मास, मछली, गुड और तिल का सेवन अपथ्य है।

विसर्प

परिचय—यह शरीर के सर्वाङ्ग मे फैलने के स्वभाव वाला रोग है, जिसमे सरसो या मसूर के आकार की छोटी-छोटी पिडकाएँ निकलती हैं और उनमे वातादि दोषो की प्रधानता के अनुसार शोफ, ग्रन्थि, खुजली, स्नाव आदि लक्षण होते हैं। इसे परिसर्प भी कहते हैं।

निर्वचन—विविध प्रकार से शरीर के अगो मे सर्वेत्र फैलने के कारण इसे विसर्प या परिसर्प कहते हैं। 'विविध अनेकप्रकारेण सर्वत देहस्य सर्वाङ्गेषु परिसर्पणात विसर्प परिसर्पो वा'। तथा च चरक —

> 'विविधं सपंति यतो विसर्पस्तेन स स्मृत । परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वेत परिसर्पणात् ॥' (च० चि० २१)

निदान

- १ लवण, अम्ल, कटुरस-प्रधान तथा उष्ण-तीक्ष्ण पदार्थों का अधिक सेवन ।
- २ दही, दही का रायता, मठ्ठे का रायता या छेना अधिक खाना।
- ३ सुरा, सिरका, तीक्ष्ण मद्य, लशुन तथा विदाही द्रव्यो का सेवन।
- ४ क्षत होना, वेधकमं, गिरना और विष का प्रयोग।
- ५ वमन-वेगावरोध, शरत्काल का प्रभाव तथा यथासमय रक्त का अवसेचन न करना।

विसर्प के कारण सप्तघातु .

9 रक्त, २ लसीका, ३. त्वचा, ४ मास, ये दूष्य और वात, पित्त, कफ् ये तीन दोष मिलाकर ये सात धातुएँ विसर्प की उत्पत्ति कराती हैं।

वक्तन्य — (१) सहायक कारण — विषमाग्नि, चिरकालीन प्रमेह, मद्यसेवन सीलनयुक्त स्थान मे निवास तथा दूषित वायु-सेवन, रोग-क्षमता का ह्रास होना।

(२) प्रधान कारण—विसर्पं जनक माला गोलाणु—स्ट्रेप्टोकोक्कस एरिसिपे लैटिस—(Streptococcus erysipelatis) प्रधान कारण है।


सम्प्राप्ति

मिथ्या आहार-विहार से कुपित हुए वातादि दोष, त्वचा (तथा लसीका) मां और रक्त मे जांकर सर्वोञ्ज मे फैलनेवाले, अस्थिर, वातादि लक्षणों से युक्त विस्तृ एव अल्प उभारवाले शोध को शीझ उत्पन्न करते हैं। सर्वाङ्ग मे फैलने के कारण इसे विसर्प कहते हैं। (सु० नि० १०।३)

बोष-दूष्य-अधिष्ठान

- १. दोष-- त्रिदोष ।
- २. दूष्य-त्वचा, लसीका, रक्त, मास।
- ३. स्रोतस--रक्तवह ।
- ४. अधिष्ठान-त्वक् ।
- ५. आधुकारी रोग।





विसपं की विशेषताएँ

- १ त्वचा या घ्लेष्मलकला से घोष का प्रारम्भ ।
- २. सभी शरीर के अगो मे फैलने की प्रवृत्ति ।
- ३ शोथ का उभरा हुवा न होना अनुन्नत शोफ।
- ४ जत्पत्ति-स्थान में स्थायी रूप से रहना।
- ये चार विसपं के विशेष सूचक चिह्न हैं। विसपं को एरिसिप्लस (Erysipelas) कहते हैं।

क्षतज विसर्प का लक्षण

- १ क्षतस्थान पर अल्प उभारवाला शोय, लालिमा, दाह, पीडा।
- २ वेदनायुक्त फैलनेवाला शोय, ज्वर, काले रग की पिडकार्ये होना।

घातज विसर्पं का लक्षण

- १. वातज्वर के समान वेदना, शोथ, फडकन, सूई चुभाने जैसी पीडा।
- २. वर्गों में टूटन, यकावट, बायाम, संकोच और रोमाञ्च होना।

पित्तज विसर्प का लक्षण

- १ शीघ्र फैलना, पित्तज्वर के समान लक्षण और गहरा लालवर्ण होना।

 कफज विसर्प का लक्षण
- १, खुजली, स्निग्धता और कफज्वर के समान पीडा होना। संद्रिपातज विसर्प का रुक्षण
- १ तीनो दोषों के लक्षणों से युक्त होना ।

वातिपत्तज (अग्नि) विसर्प

- १ ज्वर, मुर्च्छी, वमन, अतिसार, प्यास, चनकर आना, ग्रन्थियो का फटना।
- २. अग्निमान्द्य, तमकश्वास, अरुचि और सर्वाङ्ग मे तप्त अगार जैसी जलन ।
- ३. विसर्पं स्थान का काला, नीला या लाल होकर अग्निद्ग्धवत् फफोलायुक्त होना ।
- ४. विसर्प का मर्मस्थान मे प्रवेश, वायु की प्रवलता से अगो मे पीडा, बेहोशी, अनिद्रा ।
- ५. हिक्का, श्वास, वेचैंनी से पीडित रोगी, जमीन पर बैठने या लेटने की चेष्टा करता हुआ मूच्छित होकर चिरनिद्रा में सदा के लिए सो जाता है।

वातकफज (ग्रन्थि) विसपं का लक्षण

- 9 स्व-प्रंकोपक कारणो से प्रकुपित कफ से अवरुद्ध वायु कफ को फैलाकर अथवा जिस व्यक्ति का रक्त वढा हुआ है, उसकी त्वचा, सिरा, स्नायु और मास मे रहने वाले रक्त को दूपित कर, लम्बी छोटी गोल या मोटी कठोर प्रत्थियो की माला (समूह) उत्पन्न करती है। इन प्रन्थियो का रग लाल होता है और साथ में पीडा तथा ज्वर भी होता है।
- २. रोगी को श्वास, खाँसी, अतिसार, मुख का सूखना, हिचकी, वमन तथा भ्रम, मोह, विवर्णता होती है।
- २. मूर्च्छा, अंगो का टूटना और अग्निमान्स, इन लक्षणो से युक्त प्रन्थियो की माला को अग्नि-विसर्प कहते हैं।

वक्तव्य-चक्रपाणि और विजयरक्षित सुश्रुतोक्त अपची को ग्रन्थिवसर्प मानते हैं।

पित्तकफज (कदंम) विसपं का लक्षण

- ९ ज्वर, अगो की स्तब्धता, निद्रा, तन्द्रा, शिर शूल, अगर्शीयल्य।
- २. अगविक्षेप, अगलेप की प्रतीति, अरुचि, भ्रम, मुच्छी, मन्दाग्नि।
- ३ अस्थियो मे टूटने जैसी पीडा, प्यास, इन्द्रियो में भारीपन, आममलत्याग।
- ४ स्रोतों मे अवरोध, प्राय आमाशय मे और एकदेशव्यापी होना।
- ५ अनितरुक्, अत्यधिक पीली, लाल और पाण्डुर वर्ण की पिडकायुक्त ।
- ६. काला, चिकना, अञ्जन के समान कृष्ण, मलिन, शोथयुक्त, भारी।

- ७ अन्त पाकवाला, अत्यधिक उष्ण, क्लिन्न, छुने पर फटनेवाला ।
- ८ मास के झडने से कीचड की तरह गीला, सिरा-स्नायु दर्शक।
- ९. शवगन्धी-मुर्दे जैसी गन्धवाला-इन लक्षणो से युक्त कर्दम-विसर्प होता है।

विसपं के उपद्रव

ज्वर, अतिसार, वमन, त्वचा तथा मास का फटना, क्लम, अविच तथा भोजन का ठीक से न पचना, ये विसर्प के उपद्रव है।

साध्यासाध्यता

- १ वातज, पित्तज और कफज विसर्प साध्य होते है।
- २ सन्निपातज और क्षतज विसर्प असाध्य होते हैं।
- ३ जिस पित्तज विसर्प मे शरीर अजनवत् कृष्ण हो, वह असाध्य होता है।
- ४ मर्मज विमर्प कृच्छसाध्य या असाध्य होते है।

चिकित्सासूत्र

- १ सामदोप कफस्थान मे हो तो लघन, वमन तथा औषध एव आहार मे तिक्तरस का सेवन करे।
- २ सामदोप पित्तस्थान मे हो तो लघन, वमन, तिक्तरस का सेवन करे, विशेष रूप से रक्तमोक्षण और विरेचन का प्रयोग करे।
- ३ वात के कारण विसप होने पर भी रूक्षण ही कृरना चाहिए, जिससे रस, रक्त. लसीकागत जलीय अश कम हो जावे।
- ४ वातप्रधान विसर्प मे तथा पित्तज विसर्प मे तिक्तपट्पल घृत या महातिक्तक घृत का प्रयोग करे।
 - ५ यदि पित्तज विसर्प मे दोष अधिक बढे हो, तो विरेचन का प्रयोग करे।
- ६ वातज मे स्नेह-प्रयोग, पित्तज मे शीतप्राय और कफज मे रूक्षप्रधान उपचार करे।
 - ७ अग्नि-विसर्पं मे वातिपत्तशामक और कर्दम मे कफपित्तशामक चिकित्सा करे।
- ८. ग्रन्थि-विसर्प मे प्रारम्भ से ही रक्त-पित्त की प्रधानता देखकर प्रारम्भ से ही रूक्षण, लच्चन, पञ्चक्षीरी वृक्षों की त्वचा के क्वाथ से परिषेचन तथा पञ्चक्षीरी वृक्षों की त्वचा से किंगित प्रदेह का प्रयोग, सिरावेध या जोक लगाकर रक्त का निर्हरण, वमन, विरेचन एवं कथाय तथा तिक्त द्रव्यों द्वारा सिद्ध पृत का प्रयोग अवसर के अनुसार करना चाहिए।
- ९. ग्रन्थि विसर्प मे वमन, विरेचन द्वारा ऊर्घ्यं एव अध शोधन हो जाने पर तथा रक्तमोक्षण के वाद वात कफनाशक चिकित्सा करे।

चिकित्सा

१ वमन-परवल पश्चाङ्ग, नीम की छाल, पीपर, मदनफल और इन्द्र जी का क्वाय उचित मात्रा मे पिलाकर वमन करावे।

- २. विरेचन---निशोथ चूर्ण ३-४ ग्राम गरम जल से देना चाहिए।
- ३ त्रिफला के क्वाथ में घृत और निशोध चूर्ण मिलाकर पिलावे।
- ४. घृत--महातिक्त घृत (कुष्ठघ्न), यात्रायमाणा घृत (गुल्मघ्न) १५-२० ग्राम २०० मि० ली० गरम दूध मे प्रात साय पिलावे ।
- ५ क्वाथ-किरातादि या पटोलादि या सारिवादि क्वाथ (चरक) प्रात साय दे।
- ६ अमृतादि क्वाथ गुरुच, अरुस-पत्ती, परवल-पत्ती, नागरमोथा, छितवन की छाल, खैरसार, नीम की पत्ती, हल्दी तथा दारुहल्दी समभाग लेकर जौकुट करे, २० ग्राम लेकर आधा लीटर जल मे पकावे, चौथाई बचे तो छानकर, ठण्डाकर सबेरे- शाम पिलावे।
- ७ प्रक्षालन-पञ्चवल्कल (पीपल, बरगद, गूलर, पाकड, महुआ) की छाल के क्वाथ से विसर्प-द्राण की धोना चाहिए। अथवा---
- ८ परवल की पत्ती, नीम की छाल, आंवला, हर्रा, वहेडा, मुलहठी और नील-कमल के समभाग के क्वाथ से विसर्प का प्रक्षालन करे।
- ९ प्रदेह—वातज मे रास्ना, नीलकमल, लालचुन्दन, मुलहठी और वरियार का मूल वारीक पीसकर घी मिलाकर लगाना चाहिए।
- १० पित्तज मे, खरा, सफेद चन्दन, लोध, कमलनाल, कमलपुष्प, अनन्तमूल, आंवला और हर्रा छिलका पीसकर प्रलेप लगावे।
- ११ कफ्ज मे त्रिफलादि प्रदेह—आँवला-हर्रा-बहेडा का छिलका, पदुमकाठ, खश, लज्जावन्ती, कनेर का मूल, नरकट का मूल और अनन्तमूल समभाग लेकर पीसकर लेप करे।
- १२. शतधौत धृत—नीम के काढे के जल से सौ वार घोया हुआ गाय का घी सभी विसर्पों मे उपयुक्त प्रदेह है।
- १३. चातिपत्तज (अग्नि) विसर्प मे पञ्चवल्कल के कल्क मे चौगुना शतधौत घृत मिलाकर प्रलेप लगावे।
- १४. कफवातज (ग्रन्थि) विसर्प मे, वटजटा, श्वेतगुञ्जा, कदलीस्तम्भ का कल्क चतुर्गुण शतधौत घृत मिलाकर लेप करे।
- १५ कफिपत्तज (कर्दम) विसर्प मे शिरीष की छाल का कपडछन चूर्ण चौगुने शतधौत धृत मे मिलाकर लेप अति लाभदायक है।

व्यवस्थापत्र

१ सवेरे-शाम
 भारोग्यवधिनी
 रसमाणिक्य
 गुढ्चीसत्त्व
 मधु से।
 वाद महामिङ्जिष्ठादि क्वाथ ५० ग्राम पीना।

२. भोजनोत्तर— खदिरादिष्ट

४० मि० ली०

र माः

समान जल मिलाकर पीना।

३ प्रक्षालन पञ्चवरकल क्वाथ से ।

४. लगाना जात्यादि घृत

पध्य

पुराना जी, गेहूँ, अगहनी चावल, मूँग, मसूर, चना, अरहर, मनखन, गोपृत, गोदुग्ध, करेला, परवल, छौकी, आँवला, अनार, अगूर-मुनक्का, अंजीर तथा तिक्त-कपाय रसवाले द्रव्य फालसा आदि हितकर हैं।

अपय्य

विरुद्ध आहार, गुरु भोजन, कुलथी, उडद, तिल, अम्लक्दु रसवाले द्रव्य, नमक, लहसुन, गरम मसाला, दही, खटाई, आनूपमास, स्वेदन, धूप, अग्निसेवन, परिश्रम, दिन मे शयन, क्रोध, व्यायाम, हवा का शोका, शोक, ईप्यां, वेगावरोध आदि अपथ्य हैं।

शीतिपत्त, उदर्द, कोठ

परिचय-- १. शीतिपत्त को प्रचलित भाषा मे जुलिपत कहते हैं। सर्वाङ्ग में लाल-लाल-स्दोरे उभड जाते हैं और उनमे जलन और असह्य खुजली होती है।

२ उबदं हड्डा काटने से उत्पन्न शोथ के समान त्वचा पर शोथ होना तथा साथ ही खुजली और ददं होना उददं है।

३ कोठ जब गोल मण्डलाकार शोथ होकर उसमे खुजली और लालिमा होती है, तो उसे कोठ कहते हैं।

तीनों का सामान्य निदान और संप्राप्ति

१ शरीर मे अचानक गरम और ठण्डे का सयोग प्रमुख कारण है। यह वात अनुभव सिद्ध है।

२ शीतल वायु के स्पर्श से कफ और वायु प्रकुपित होकर पहले से (स्वप्रकोपक हेतु से) प्रकुपित पित्त के साथ मिलकर वाहर त्वचा तथा आध्यन्तर रक्त आदि धार्तुओं मे फैलकर शीतिपत्त, उददें और कोठ, इन रोगो को उत्पन्न करते हैं।

सम्प्राप्ति

्शीतवातस्पर्श---निदान---कफ + वातप्रकोप + प्रकुपित पित्त सयोग

त्वचा एव रक्तादि घातुप्रसर

शीतिपत्त-उददं-कोठ-त्वचा मे स्थानसश्रय

ı

वक्तक्य—ये त्रिदोषज होते हैं। इनमे शीतिषत्त अग्रिम पिक्त का रोग है और दोषो की प्रधानता के भेद से उददं और कोठ उसकी ही अवस्थाएँ हैं। शीतिषत्त या जुलिपत्ती शरीर में एक साथ गर्मी सर्दी लगते से होता है। शरद एवं वसन्त ऋतुओं में यह प्राय होता है। सडी-गली चीजे, मछली, मांस, अण्डा, सिखया या क्विनीन के योग तथा अकुशमुख कृमि या गण्डूपद कृमि के उपसर्ग से यह रोग होता है।

आधुनिक विकित्सा वैज्ञानिक शीतिपत्त का कारण एलर्जी (Alergy) या अनूर्जता को मानते हैं। जब शरीर में किसी ऐसे द्रव्य का प्रवेश हो जाता है, जिसे शरीर की रोगक्षमता नहीं वर्दाश्त कर पाती है, तो इसके चिह्न उभड़ आते हैं।

पूर्वरूप

१. विपासा, २ अरुचि, ३. मिचली, ४. थकावट, ५ अगो मे भारीपन तथा ६. आँखो का लाल होना, ये पूर्वरूप हैं।

शीतिपत्त के लक्षण

- १ त्वचा पर हडूा काटने जैसा लाल शोध होना और खुजली होना।
- २ अधिक जलन होना और सूई चुभाने जैसी वेदना होना।
- ३ वमन और ज्वर होना,।

इसमे वायु की प्रधानता रहती है।

उवदं का लक्षण

- १ मण्डल के आकार का खुजलीयुक्त बोथ होना।
- २ शोथ मे लालिमा होना तथा मध्य मे गड्ढा होना ।
- ३. यह प्राय शिशिर ऋतु (माघ-फाल्गुन) में होता है।
- ४. कफ की प्रधानता होती है।

कोठ (विशेष निदान और लक्षण)

वमन के आयोग या निथ्यायोग से तथा निकलते हुए पित्त, कफ और अन्न के वेग को घारण करने से शरीर की त्वचा में खुजलीयुक्त लाल चकत्ते पड जाते हैं, उन्हें कोठ कहते हैं।

जब बार-बार कोठ होता है, तो उसे उत्कोठ कहते हैं।

सापेक्ष निदान

शीतपित्त	उ दर्द	क्रीठ
१. वाताधिक	कफाधिक	कफ-रक्ताधिक
,२ तोद (वेदना) अधिक	कण्डू वमन अधिक	कण्डूरोग अधिक
३. एक साथ शरीर मे गरमी,	शिशिर ऋतु	पञ्चकर्मं के
फिर सरदी लगने से होना	के प्रभाव से होना	मिथ्यायोग से होना

चिकित्सा-सूत्र

- १. गर्मी-सर्दी एक साथ शरीर मे न लगने दे।
- २ ज्यायाम या परिश्रम करके तुरत न नहावे।
- ३ उष्णता से पीडित होकर सहसा जलप्रवेश न करे।
- ४ शिशिर ऋतु मे शीत से बचाव रखे।
- ५ बिना जाने-समझे अण्डा, मछली आदि न खावे।
- ६. विरुद्ध भोजन और अप्रिय आहार से बचे।
- ७ अधिक गरम पदार्थं न खावे।

चिकित्सा

बाह्य प्रयोग---

- 9 ज्यों ही चकत्ते दिखलायी दें, त्यो ही कम्बल ओढाकर रोगी को लेटा देने से पसीना आकर शीतिपत्त शान्त हो जाता है।
 - २ शरीर मे गेरु और सरसो का तेल लगाकर रोगी को हवा से बचावे।
 - ३ दूब और हल्दी को पीसकर लेप करना चाहिए।
 - ४. यवक्षार और सेंधानमक के चूर्ण को कडवे तेल मे मिलाकर लगावे।
- ५ सफेद सरसो, हल्दी, कूठ, चकवड के बीज और काले तिल के महीन चूर्ण को कटुतैल में मिलाकर उबटन लगाना चाहिए।

आभ्यन्तर प्रयोग-

- ६ शुद्धस्वर्णगैरिक १ ग्राम और शुद्ध टकण १ रत्ती की १ मात्रा दिन में ४ बार जल से देवे।
 - ७. त्रिफला चूर्णं ६ ग्राम/२ मात्रा सवेरे-शाम अमृतादि क्वाथ से दे।
 - ८ हरिद्राखण्ड-५-५ ग्राम सबेरे-शाम जल से प्रयोग करे।
- ९ श्रीतिपत्तभञ्जन रस-२५० मि० ग्राम की १ मात्रा दिन मे २ वार गुड से दे।
 - १० आर्द्रकखण्ड-५ ग्राम की मात्रा सवेरे-शाम ठण्डे जल से दे।
 - ११ कैशोरगुग्गुलु —सवेरे-शाम १–१ ग्राम जल से देना चाहिए।
- १२, रसयोग---सूतशेखर, आरोग्यवधिनी, अश्वकचुकी, गन्धक रसायन, मलय-सिन्दूर और प्रवालपिष्टी का उचित मात्रा मे प्रयोग करे।

व्यवस्थापत्र

शीतपत्त मे--

१ दिन मे ३ बार हरिद्राखण्ड ६ ग्राम जल से ३ मात्रा

२ कामदुघा	६०० मि० ग्रा०
वगभस्म	६०० मि० ग्रा०
स्यणंमाधिक भस्म	१२५ मि० ग्रा०
मधु से ।	9 × 3
उरद मे—दिन मे ४ वार	
दरिद्वासण्ड	` ६ ग्राम
जल से ।	४ मात्रा
कोठ मे—दिन मे ३ बार	
बारोग्गवधिनी	१३ ग्राम
मधु से ।	

पय्य

अगहनी चावल, मूँग, मरेला, सहिजन फल, मूली, गरम जल एव कटु, तिक्त कपाय रसवाले द्रव्य दोषानुसार पष्य है।

अपय्य

दूध-चीनी के वने द्रव्य, मछली, जलेचरमास, नवीन मछ, वेगावरोध, दक्षिण की वायु, दिन मे सोना, विरुद्ध भोजन, धूप मे रहना, स्निग्ध, अम्ल, मधुर द्रव्य, मैपुन एव गुरु बन्न, ये अपध्य हैं।

वाह्य जीवाणुओ का सक्रमण

भावार्य मुश्रुत ने (मु॰ नि॰ ५) सक्रामक रोगों के सक्रमण के विषय में कहा है कि "मैयुन करने से, दारोर-स्पर्श से, एक-दूसरे की श्वास सूँघने से, साथ-साथ भोजन करने से, एक माध सोने-बैठने से, रोगी का वस्त्र पहनने से, माला धारण करने से, रोगी द्वारा प्रयुक्त अनुलेप लगाने से और इमी प्रकार के अन्य ससर्ग कार्यों से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को औपसर्गिक रोगों का मक्रमण हो जाता है।"

जब प्रत्यक्ष सपकं से कोई रोगी दूसरे नीरोग व्यक्ति को रोग देता है, तो उसे ससर्ग कहते हैं और जब अप्रत्यक्ष अनेक कारणो से रोग की उत्पक्ति होती है, तो 'उसको उपसर्ग कहा जाता है। इसे ही इन्फेक्शन (infection) कहते हैं।

उपसगं-स्थान

(Sources of infection)

कोई स्वस्थ व्यक्ति विकारकारक जीवाणुओं के ससर्ग से किस तरह रोगाक्रान्त हो जाता है, इसके मुख्य हेत् निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्यक्ष—सक्रामक रोगग्रस्त व्यक्ति के साक्षात् प्रत्यक्ष ससर्ग से कुष्ठ, विसर्प, मसूरिका, उपदश्च, फिरग रोग, पूयमेह, शोप, ज्वर, नेत्राभिष्यन्द आदि व्याधियो का प्रसार होता है।

- २ रोगी व्यक्ति के बोलने-खांसने अथवा छीकने से नजदीक में बैठे हुए मनुष्यों के घारीर मे, यूक-खखार के विन्दुओं के साथ जीवाणुओं का श्वास मार्ग से सक्रमण हो जाता है। प्रायः श्वासपथ के समस्त रोगों में इसी प्रकार सक्रमण होता है।
- ३ अलके विप (जलसभास) और मूपक देश में कुत्ते-सियार या चूहे का काटना भी इसी श्रेणी में आता है।
- (२) अप्रत्यक्ष-सक्रामक रोग से पीडित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त या स्पृष्ट भोजन, पेय पदार्थ, पात्र या दूषित वायु के द्वारा सक्रमण होने पर, रोगी के साथ साक्षात् सम्बन्ध न होने के कारण यह अप्रत्यक्ष सक्रमण या प्रसार माना जाता है।
- (३) कीटों द्वारा—कीट, पिस्सू, मिक्षका, जुँए, मच्छर और मत्कुण (खटमल) के द्वारा अनेक सक्रामक रोगो का सक्रमण होता है। इनमें से कुछ कीट, केवल विकारी जीवाणुओं का संवहन करते हैं, कुछ अपने द्वारीर में जीवाणुओं का सवर्धन करते हैं। कुछ अपनी सन्तानों में भी जीवाणुओं का सक्रमण कर रोग का प्रसार करते रहते हैं।
- (४) सवाहक मनुष्य-कुछ व्यक्ति व्याधिमुक्त हो जाने के बाद तथा कुछ गुप्त रूप से रोग से सक्रमित होने पर, स्वयं विना पीडित हुए ही जीवाणुओ का संवहन करते हैं। इन्हें स्वस्थ तथा रुण वाहक कहते हैं। इनके मल-मूत्र, यूक-छींक आदि से रोग का प्रसार होता है, क्योंकि उनके इन क्रिया-कलापों से खाद्य-पेय तथा जल आदि दूपित हो जाते हैं।
- (५) भूमि-धनुर्वात (टिटैनस) वातकोथ (गैस ग्रेंग्रीन) तथा अन्नविष-मयताकारक जीवाणु स्वभावत भूमि मे रहते हैं।
- किसी व्रण के साथ भूमि का सपके होने से उस भूमि में स्थित धनुर्वातकारी जीवाणु धनुर्वात की उत्पत्ति कर देता है।
 - २. इसी प्रकार बन्य जीवाणु वातिक कोय उत्पन्न कर देता है।
- ३. डिब्बे में बन्द शाक मे, भाजी में, मास और अन्न मे विषोत्पादक जीवाणु पहेंचकर रोगोत्पत्ति करते हैं।

संक्रमण का प्रसार

(Spread of infection)
(Dropiet infection)

(१) बिन्दूरसेप द्वारा—प्रत्येक व्यक्ति के मुख नासिका और गले में अनेक प्रकार के विकारी जीवाणु बैठे रहते हैं। भाषण करने, बोलने-छींकने से यूक के सूक्ष्म कणों के साथ उनका उत्सेपण होता है। एक व्यक्ति कई फीट तक सूक्ष्म बिन्दुओं के साथ जीवाणुओं को पहुँचा सकता है। ये बिन्दु जिस व्यक्ति पर पडते हैं, वह अपनी श्वास के साथ उन्हे नासा, मुख या गले में पहुँचाकर जीवाणु को अपने

शरीर मे भेज देता है। श्वास-संस्थान और गले के रोग प्राय इसी प्रकार फैलते हैं।

इसीलिए सिनेमा हाल, पुलिस बैरक, विद्यालय, अस्पताल आदि मे बैठने की सीट की अपेक्षित दूरी रक्षी जाती है। तथा आपरेशन थियेटसं (Operation theaters) मे डाक्टर, नर्स एवं परिचारक-गण अनिवार्य रूप से मास्क घारण करते हैं।

- (२) घूल के फण--राजयहमा का रोगी यत्र-तत्र थूकता है, तो थूक के साथ असंख्य जीवाणु मिट्टी में मिल जाते हैं और वह मिट्टी सूखकर धूल बनकर जब उडती है, तो उसके साथ जीवाणु फेंफडो में पहुँच जाते हैं और आक्रान्त व्यक्ति यहमा से पीडित हो जाता है।
- (३) अन्तर्प्रहण-(Ingestion)-दूषित खाद्य-पेयो द्वारा भी मानव शरीर में सक्रमण पहुँच जाता है। इसी दृष्टि से 'नोकनौजिया और नब्बे चूल्हा' की कहावत चितायं होती थी। छुआछूत को आज भूत कहा जाता है, जो एक विशिष्ट स्वास्थ्य सपदा की सरक्षक रही है। खाद्य-पेय का दूषित होना अनेक विन्दुओ पर टिका हुआ है-
 - १. पाचक के अशुद्ध हाथ और अशुद्ध पात्रं एव जल आदि।
 - २ खाद्य-पेय का खुला होना, जिन पर मृतिखया वैठती हैं।
 - ३ अहीर का अशुद्ध पात्र, अशुद्ध हाय और खुला, विना ढक्कन का वर्तन।
 - ४. एक ही वस्त्र'का शीचालय और भोजनालय मे धारण।
 - ५. मल-मूत्र के दूरीकरण मे बृटि का होना आदि।

अन्तर्गेहण से फैलने वाले रोगों मे आन्त्रिक ज्वर, अतिसार, सग्रहणी, हैजा, औपसींगक यकृत् शोध आदि प्रमुख हैं।

- (४) तन्त सेपण-जैसे पागल कुत्ता काटकर अलकें (रेबीन्) का अन्त क्षेपण कर देता है। चूहा के काटने से मूपिक-दंशज्वर हो जाता है। मच्छर से मलेरिया, फाइलेरिया, पीतज्वर और हेंगू फैलता है। पिस्सू प्लेग लाता है। जूं या चिल्लर तन्द्रिक ज्वर उत्पन्न करते हैं। मिष्ख्यों हैजा, मोतीझरा और सग्रहणी फैलाती हैं।
- (५) वायु द्वारा रोहिणी (डिप्यीरिया), हूपिंग कफ, लोहित ज्वर, रोमा-न्तिक, इन्फ्लुएञ्जा आदि का प्रसार होता है।

शरीर में संक्रमण के मागं

(१) श्वसन-सस्थान—इस मार्ग द्वारा राजयक्ष्मा, कुकुरखाँसी, रोहिणी, मसूरिका, रोमान्तिका, इन्पलूएञ्जा, फुस्फुस प्लेग, मस्तिष्क सुपुम्ना ज्वर आदि फैलते हैं।

- (२) पचन-संस्थान—हैजा, अतिसार, आन्त्रिक ज्वर, यक्ष्मा, कृमि-विकार, सग्रहणी आदि का प्रवेश इसी मार्ग से होता है।
- (३) त्वचा—दशकारक कीट, मलेरिया, कालाजार, अलकं, मूपिक-दश-ज्वर, फाइलेरिया आदि रोगो को त्वचा दश द्वारा उत्पन्न करते हैं।
- (४) क्षत या वण-द्वारा धनुर्वात, वातिक कोथ, अकुशमुख कृमि आदि उत्पन्न होते हैं।
- (।५) जननेन्द्रिय—की क्लेष्मल त्वचा क्रे सस्पर्श से फिरंग, पूयमेह (सुजाक), उपदश आदि का प्रवेश होता है।

चतुर्विश अध्याय

मधुमेह, धमनी-प्रतिचय तथा चयापचय विज्ञान

मधुमेह, सौद्रमेह या जोजोमेह

(हायवेटीज मेलाइटस Diabetes Mellitics)

परिचय—इसमे वार-वार पेशाव लगता है, मूत्र मे चीनी वाती है, मूत्र के साथ वपर बोज निकलता है, इसीलिए चरक मधुमेह को बोजोमेह कहते है। बोज मधुर स्वभाव का होता है, इसी कारण पेशाव मे चीटिया लगती हैं। मधु और धौद्र के समान मूत्र के होने से इसे मधुमेह या सौद्रमेह कहते हैं।

निदान^२

आहार-१. गुरु, स्निग्ध, अम्ल, लवण, नूतन अप्र-पान का सेवन ।

२ दही, दूछ, मिण्टाम्न, ग्राम्य-जलेचर-आनूप जीवो का मास साना ।

३ गुढ या चीनी के बने पीप्टिक कफ मेदीवर्धक पदार्थों का अधिक सेवन ।

विहार-४. आरामतल्बी, गद्दी पर मोना-वैठना, कोई श्रम का कार्य न करना।
५. किसी भी प्रकार का सोच-विचार न करना, नम्पस्रता का गुरा भोगना।

६. समयानुसार वमन-विरेचन आदि सशोधनो को न करना आदि ।

७ स्तान न करना और पैदल टहलने-घूमने से नफरत करना ।3

८. मन में कोई उत्साह न होना, अधिक मात्रा मे भोजन करना ।

९ वारीर का अधिक स्निग्ध और नितस्यूल होना।

सम्प्राप्ति

9 सभी तरह के प्रमेह उचित समय पर समुचित चिकित्सा न किये जाने पर ेमधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं। भ

२. स्व-प्रकोपक कारणों से प्रकुपित वायु जब रूक्षता के कारण कपाय रस से मिलकर मधुर स्वभाववाले बोज को गूत्राशय में ले आती है, तब मधुमेह को उत्पन्न करती है। "

१ कपाय मधुर रूखं क्षीद्रमेष्टं चदेद् बुध । अ० ४० नि० १० तथा शीद्ररसवर्ण क्षीद्रमेष्टी । सु० नि० ६ ।

२. आस्यासुख स्वप्नसुख दथीनि ग्राम्यौदकानूपरसा पयासि । नवान्नपान गुडवेकृत च प्रमेहहेतु कपाकृच्च मर्वम् ॥ च० वि० ६

राष्ट्रिमम्यवहार्येषु स्नानचङ्क्रमणिडपम् ।
 प्रमेहः क्षिप्रमम्यति नीटद्रमिवाण्टजः ॥ च० नि० ४।५०

४ सर्व ण्व प्रमेहास्तु कॉलेनाप्रतिकारिण । मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽमाध्या मवन्ति हि ॥ सु० नि० ६ ५. च० नि० ४।३७

३ कफ और पित्त जब वात की अपेक्षा न्यून (क्षीण) होते हैं, तब बढ़ा हुआ वायु घातुओ (वसा-मज्जा-ओज-लसीका) को मूत्राशय मे खीचकर ले आता है एव वातज प्रमेहो को उत्पन्न करता है।

४. जब प्रमेहजनक निदानों से घारीर में कफ, पित्त, मेद और मास की वृद्धि अधिक रूप में हो जाती है, तो इनके बढ़ने से क्की हुई वायु कुपित होकर, औज को लेकर जब मूत्राशय में प्रविष्ट होती है, तब कुच्छूसाध्य मधुमेह की उत्पत्ति होती है। 2

यह मधुमेह वात, पित्त और कफ के लक्षणों को बार-वार शरीर में दिखलाता है तथा नष्ट करके पून बढा देता है।

वक्तव्य-मधुमेह में निकनेवांवा अपर बोज मधुर स्वभाव का होता है, इसीलिए मूत्र में चीटिया लगती हैं—'मूत्रेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्च'—च० चि० ६।१४।

वाग्भट ने कहा है कि (विकृतावस्था मे) सभी प्रभेहो मे प्राय मधु के समान मधुर मूत्र आता है और शरीर भी प्राय मधुर हो जाता है, इन कारणो से सभी प्रमेह प्राय मधुमेहसज्ञक हो जाते हैं—

मधुर यच्च मेहेषु प्रायो मध्वव मेहति।

सर्वेऽिं मधुमेहाख्या साधुर्याच्च तनोरतः ॥'—अ० हः नि० १०।२१ इस कथन से मूत्र मे शकेंरा निकलने के साथ-साथ रक्तगत शकेंरादृद्धि का भी स्पष्ट सकेत किया गया है।

चरक ने भी कहा है कि शरीर पर मिक्खियों के अधिक बैठने से शरीर का रस मीठा हो गया है, ऐसा जानना चाहिए—

'मिक्षकोपसपंणेन शरीरमाधुर्यम्'—च० वि० ४।७।

'बद्यदिपियोलिकामिश्च शरीरसूत्राभिसरणम्'--च० नि० ४।४७ ।

प्रमेह के पूर्वरूप मे शरीर पर मिल्लयों और मूत्र मे चीटियां लगती हैं।

मधुमेह का प्रधान कारण वायु है और इसका प्रकोप धातुक्षय तथा अन्य दोषों के आवरण से हो सकता है। प्रमेह से शरीरपोषक धातुओं का क्षय होता है। जब पैतिक या कफज प्रमेहों की उपेक्षा की जाती है, तो धातुएँ अत्यधिक क्षीण हो जाती है, जिससे वायु कुपित होकर मधुमेह को उत्पन्न करती है। इस प्रकार मधुमेह दो प्रकार का होता है—१ स्वतन्त्र वातप्रकोपजन्य और २ आवरणदोष जनित या उपेक्षित प्रमेहजन्य।

आघुनिक दृष्टिकोण

प्राकृत वर्थात् स्वस्य दशा मे मूत्र मे शकरा नही रहती है। प्राकृत व्यवस्था मे मूत्र का सापेक्ष गुरुत्व (Specific gravity) १०१५ से १०२५ तक होती है। मूत्र-शकरा के होने पर यह १०३० से अधिक हो जाती है। '

१ च० चि० ६।६।

२ च० सू० १७।७९-८१ ।

चुनक पूर्णतया स्वस्थ रहते है, शेष तीनो प्रन्थियाँ मधुनिषूदनी (Insulin) की क्रिया को रोकती हैं। इस प्रकार इन चारो ग्रन्थियों के अन्त सावों की प्राकृत अवस्था शर्करा के परिवर्तनों का नियन्त्रण करती हैं। कभी-कभी मधुनिषूदनी की क्रिया बढ जाती है या अन्य तीनो ग्रन्थियों की क्रिया घट जाती है, तो रक्तगत शर्करा प्राकृत से भी कम हो जाती है, जिसे उप मधुमयता (Hypo glycaemia) कहते हैं। यह भी चिन्ताजनक स्थिति है। यदि तुरन्त शीध्रकारी उपायों द्वारा रक्तगत शर्करा की वृद्धि न की जाय, तो रोगी के प्राण सकट में पड जाते हैं। यह स्थित मधुनिषूदनी लेने के पश्चात् तुरन्त ग्लूकोज न लेने पर भी देखी जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि मधुमेह का प्रधान कारण अग्न्याशय का विकृत होना है।

साधारण मधुमेह मे भोजन के कुछ देर वाद तक रक्तगत शकरा की मात्रा प्राकृत से अधिक रहती है और उसका मूत्र द्वारा क्षरण होता रहता है, किन्तु मधुमेह की तीन्न अवस्था मे रक्तगत शकरा सदैव प्राकृताश से कई गुना अधिक रहती है और उसका उत्सगं भी मूत्र द्वारा होता रहता है। एवन्च शकरा समवर्त (Metobolism) का प्रभाव वसा और प्रोटीन पर भी पडता है। वसा समवर्त मे विकृति होने से अम्लोत्कर्ष (Ketosis) होता है, जिससे रक्त की क्षारीयता प्राकृत से बहुत कम हो जाती है और रोगी मे सन्यास के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

सामान्य पूर्वरूप

- १ पसीना अधिक आना, शरीर से गन्ध आना, अगो मे शिथिलता।
- २ शय्या और आसन पर सोने-बैठने की इच्छा, छाती-नेत्र-जीभ-कान मे मैल जमना।
 - ३ शरीर मे मोटापा होना, केश और नख का अधिक बढ जाना।
 - ४ शीतल द्रव्यो का प्रिय लगना, गला और तालु का सूखना, मुखमाधुर्य ।
 - ५ हाथ-पैर में जलन होना और मूत्र मे चीटियों का लगना।

लक्षण

वातप्रकोप के कारण मधुमेह का रोगी कवाय, पाण्डु और रूक्ष मूत्र का त्याग करता है (वह असाध्य होता है)।

मधुमेह मे रोगी मधु के समान मूत्र का त्याग करता है।

भेव

मधुमेह दो प्रकार का होता है--- १. स्वतन्त्र और २. परतन्त्र।

१ जो घातुक्षय के कारण प्रकुपित वायु से होता है, वह स्वतन्त्र होता है। दुवैल और कृश मधुमेही का रोग स्वतन्त्र होता है। स्वतन्त्र मधुमेह मे वात की दुष्टि से सीधे ही ओज की दुष्टि हो जाती है—यह सहज प्रमेही होता है।

२ यह पित्त या कफ से आवृत वायु द्वारा उत्पन्न होता है तथा प्रमेहो की उचित चिकित्सा के न करने से मधुमेह में परिणत होने से होता है। इसमे आवरक

दोष और वायु के लक्षण प्रकट होते हैं। यह परतन्त्र कहलाता है। इसके रोगी स्थूल और बलवान् होते हैं। इसमें लक्षण घटते-बढते रहते हैं। यह क्रमश. क्रुच्छ्रसाध्य हो जाता है।

सापेक्ष निदान

इक्षुवालिकामेह और श्रीतमेह (दोनो कफज) मे मूत्र मधुर निकलता है और मधुमेह में मूत्र मे मधुरता होने के साथ शरीर मे भी मधुरता होती है, अत इनका परस्पर सापेक्ष निदान अपेक्षित है।

	मधुमेह	इसुवा लिकामेह	शीतमेह
_			•
٩	वातज	कफज	ক দ্দজ
7	रोगी कृश या स्यूल	रोगीस्थूल	प्राय स्थूल
Ę	ओज क्षय के लक्षण	नही	नही
٧	असाध्य या याप्य	साध्य	साध्य
ų	मूत्र किन्धित् उष्ण	मूत्र किञ्चित् उष्ण	मूत्र शीत
Ę	अाविल मूत्र	बाविल मू त्र	नही
૭	चिरकारी	बाशुकारी	शाशुकारी
6	शरीरमाधुयं	•	

चिकित्सासूत्र

- १ निदान का दुढतापूर्वंक परित्याग करना चाहिए।
- २ सर्वप्रथम यह विचार करे कि—१ रोंगी स्थूल तथा बलवान् है और क्या इसका रोग सतर्पणजन्य है अथवा २ रोगी कृदा तथा दुर्बेल है और क्या इसका रोग अपतर्पणजन्य है ?
 - ३. स्थूल रोगी का सशोधन और कृश का सशमन उपचार करे।
 - ४ विधिवत् स्नान करना भौर सन्ध्या-सबेरे टहलना आवश्यक है।
- ५ आलस्य को शत्रु समझकर उसको छोड दे। विना जूता-छाता के पैदल घले और पदयात्रा का कार्यक्रम बना ले।
 - ६ भोजन मे चीनी, चावल, आलू और मिठाई को छोड़ दे।
 - ७ औषघ एवं आहार में तिक्तरस-प्रधान द्रव्यो का प्रयोग करे।
- ८ धन-ऐश्वर्यं का गर्वे छोडकर ऋषि-मुनियो की तरह प्राणधारण के लिए रूखे-सूखे भोजन पर निर्वाह करे।
 - ९ सूर्य की ध्रप और खुली वायु मे कुछ श्रम का कार्य करता रहे।
- १० मधु-अम्ल-लवण रसो का त्याग और रूक्ष एव कटु-तिक्त-कषाय रसो का सेवन करना हितकर है।

चिकित्सा

9 स्वरस--वित्वपत्र, त्रिकोलपत्र, निम्वपत्र, कच्ची हल्दी, कच्चा आंवलाफल, करेलाफल, गूलर की गीली छाल, जामुन की गीली छाल और ध्याज, इनमें जो

सुलम हो उसे सिल पर पीसकर कपडे के कोने मे रखकर छानकर स्वरस निकाल कर १०-२० ग्राम सबेरे-शाम पीना चाहिए। जो छाल कडी हो उसमे पानी डालकर घटनी की तरह पीसकर रस निकाल ले।

२. चूर्ण—जामुन की गुठली, गुडमार, लामज्जक, पूतिकरञ्ज के वीज की भीगी, त्रिफला निर्वीज, बरियार का वीज, गूलर की छाल और साम की गुठली, इनमें से सबको समभाग लेकर चूर्ण बनाकर ३-३ ग्राम सबेरे शाम जल से दे। सब न मिलें, तो जितने द्रव्य मिलें उनका ही चूर्ण बनाकर प्रयोग करे।

३ विजयसार या सप्तरंगी लकडी—इनके १०० ग्राम के टुकडे को ताँवे के पात्र मे जल भरकर उसमे रातभर रख दें और वह जल पीने के काम मे लावे।

४ क्वाथ-त्रिफलादि क्वाथ-आंवला-हर्रा-बहेडा (निर्वीज) बांस की पत्ती, नागरमोथा और पाठा को सममात्रा में लेकर २० ग्राम का क्वाथ बना सबेरे-शाम पीना चाहिए। यह वहुमूत्र में उपयोगी है।

५ शालसाराविगण (सुश्रुत० सूत्र० अ० ३८।१२) की औषधियाँ जो मिल सकेँ जनका क्वाथ सबेरे-शाम पीना हितकर है।

६ न्यग्रोधादि चूर्ण—वट-पीपर-पूलर-महुआ-सोनापाठा-विजयसार-अर्जुन-धव की छाल, अमलतास का गूदा, आम-जामुन की गुठली, कैथफल की मज्जा, चिरोंजी, मुलहठी, अरहर की जड, पठानी लोध, करज्जफल की गिरी, आंवला-हर्रा-बहेडा की फलमज्जा, इन्द्रजी और शुद्ध भल्लातक ५०-५० ग्राम लेकर चूर्ण कर सुरक्षित रख ले। इसकी ३ ग्राम की मात्रा त्रिफला क्वाथ ५० ग्राम से सबेरे-शाम देवे।

७. शिलाजतु प्रयोग—रोगी का वमन-विरेचन द्वारा शोधन करने के बाद उसे शालसारादि गण के क्वाथ की भावना देकर बारीक चूर्ण करके शिलाजीत को रख ले। इसकी है से १ ग्राम की मात्रा सबेरे-शाम दूध से दे और पथ्य मे रूक्ष अन्न तथा जागल पशु-पक्षियो का मासरस दे।

सुश्रुत ने १ तुला (१०० पल) लगभग ५ किलोग्राम शिलाजीत का सेवन कहा है—

'उपयुज्य तुलामेव गिरिजादमृतोपमात्। वपुर्वेणंबलोपेतो सधुमेहविवर्जितः।। जीवेद् वर्षेशत पूर्णमजरोऽमरसित्रम ।' सु० चि० १३ शिलाजीतसेवी कुलथी की दाल और कबूतर का माम नही खाना चाहिए। सिद्धयोग—

- ८. वसन्तकुसुमाकर २०० मि० ग्रा०, हल्दी का चूण १ ग्राम और अविले का चूण १ ग्राम शुद्ध मधु से सवेरे-शाम देवे।
 - ९ चन्द्रप्रमावटी १ ग्राम सबेरे-शाम दूघ से देवे ।
 - १० शिवागुटिका १ ग्राम दूध मे सबेरे-शाम देवे।
 - ११, वसन्तितलक रस २५० मि० ग्रा० की मात्रा त्रिकोल की पत्ती के रस से दे।

व्यवस्थापत्र

9	प्रात	-सायम्
---	-------	--------

शिवागुटिका १ ग्राम स्वर्णमाक्षीक भस्म <u>३०० मि० ग्रा</u>० २ मात्रा

गुडमार चूर्ण १ ग्राम मिलाकर जल से।

अथवा

चन्द्रप्रभा वटी	२ ग्राम
या	२ मात्रा
शुद्ध शिलाजीत	१ ग्राम
दूध के साथ दे।	२ मात्रा

२. ९ बजे व २ बजे दिन

Ę

जल से।

वसन्तकुसुमाकर	२५० मि० ग्रा०
गुडमार चूर्ण	२ ग्राम
हल्दी चूर्ण	२ ग्राम
जम्बी बीज चूर्ण	२ ग्राम
शुद्ध मधु से ।	२ मात्रा
रात में सोते समय	
न्यग्रोधादि चूर्ण	५ ग्राम

पश्य

१ मात्रा

पैदल चलना, न्यायाम करना, सार्वा, दागुन, कोदो, जो, चना, वास का चावल, मूँग, अरहर, परवल, करेला, चौलाई, पालक, प्याज, लहसुन, कच्चा केला, जामुन, कसेल, कमलकन्द, कुन्दल, जागल पशु-पक्षियो का मास, कबूतर, खरगोश, तीतर, मयूर, हरिण आदि के मास का सेवन पथ्य है। शारीरिक श्रम और पैदल चलना अति लाभकर है।

अपण्य

निदानोक्त विषयो का त्याग करे। मूत्रवेगावरोध, रक्तमोक्षण, आरामदेह गद्दे पर या आराम कुर्सी पर सोये-बैठे रहना, दिन मे सोना, नया अन्न, दही, मिठाई, मधुर-अम्ल-लवण पदार्थों का सेवन, आनूप मास, मैथुन, पिष्टान्न और विरुद्ध भोजन, ये सब अपथ्य हैं।

वातरक्त

इसका वर्णन अध्याय १९ मे किया गया है, अतएव वही देखें।

- २ शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलन स्थापित करना।
- ३. आचार-विचार की सात्त्विकता, चिन्ता, आलस्य, क्षोभ का शमन, पैदल चलना, नियमित दिनचर्या।

४ मन मे उत्साह, धैर्य और आत्मवल का जागरण।

चिकित्सा

१ एकल औषधो मे—१ अर्जुनत्वक् २ पुष्करमूल, ३. बच, ४. रसोन, ५ ताम्बूल पत्र, ६. शिलाजतु, ७. मुलहठी, ८. हिंगु, ९. पिप्पलो और १० आमलक का प्रयोग चूर्ण, क्वाय, घृत, आसव-अरिष्ट आदि के रूप में उचित मात्रा में करे।

२ वृहद्वातिचिन्तामणि १२५ मि० ग्रा०, हृदयाणैंव रस १२५ मि० ग्रा० तथा अर्जुनत्वक् चूर्ण १ ग्राम की १ मात्रा, दिन मे ऐसी ३ मात्रा मधु से दे।

३ स्वर्णमाक्षीक भस्म १२५ मि० गा०, अकीक पिष्टी १२५ मि० ग्रा०, जवाहर-मोहरा १२५ मि० ग्रा० की १ मात्रा मधु से दिन मे ३ बार दे।

४ सिद्धमकरध्वज १२५ मि० ग्रा० तथा अभ्रकभस्म १२५ मि० ग्रा० की १ मात्रा पान का रस १ चम्मच और मधु से दिन मे ३ बार दे।

५ ककुमादि चूर्ण अर्जुन की गीली छाल, बच, रास्ना, बला, नागवला, हरीतकी, कचूर, पुष्करमूल, पीपर और सीठ ये समान भाग मे लेकर कूट छानकर चूर्ण बना लें। २ ग्राम की मात्रा गोष्टत या मधु से दिन मे ३ वार।

सिद्धयोग---

- ६. चूर्ण-ककुभादि चूर्ण, हिंग्वादि चूर्ण, हिंड्गुद्धिरुत्तरादि चूर्ण।
- ७ ववाय-दशमूल नवाय, लघुपचमूल नवाय, अर्जुन नवाय।
- ८ वटी-आरोग्यवधिनी, चन्द्रप्रभावटी, शिवा गुटिका।
- ९. रस-चतुर्मुख रस, बृहद्वातिचन्तामणि, मकरध्वज, हृदयाणैव।
- १०. सस्म-अकीक भस्म, श्रुग भस्म, अभ्रक भस्म, सगयशव पिष्टी।
- १९ रसायन-अगस्त्य हरीतकी, वर्धमान पिप्पली, आमलकी रसायन।
- १२ अरिष्ट--अर्जुनारिष्ट, दशमूलारिष्ट, अश्वगन्धारिष्ट तथा वलारिष्ट। इनका प्रयोग उचित मात्रा और अनुपान के साथ करना चाहिए।

पय्य

- १ मन को अशान्त करने वाले प्रश्नो का समाधान करे।
- २ भोजन सात्त्विक, हलका, सुपाच्य और रुचिकर होना चाहिए।
- ३ टहलना-घूमना आदि हलके व्यायाम करना चाहिए।
- ४ चर्बीयुक्त रोगी को चर्बीवाले पदार्थ नही खाने चाहिए।
- ५ सेव, पपीता, अजीर, मुनक्का, बयुका, लहसुन, प्याज, नीवू, आलूबुसारा, करेला, परवल, अदरस साना चाहिए।
 - ६ जी, मूग, चना, तीना, पुराना अगहनी चावल पथ्य है।

अपश्य

मद्यपान, धूम्रपान, काफी, चाय, घृत, मक्खन, मलाई, अण्डा, मास, गुरु-स्निग्ध साहार, कन्द शाक, तली चीजें अपध्य है।

अतिमैथुन, क्रोध, ईर्ष्या, चिन्ता, निराशा, आलस्य का त्याग करना चाहिए। ये सब अपथ्य है।

चयापचय-विज्ञान

(Metabolism)

चयापचय क्या है ?

. प्राचीन आयुर्वेद का 'धातुपाक' ही चयापचय शब्द से जानना चाहिए। आधुनिक चिकित्साशास्त्र उसे मेटाबोलिज्म (Metaboligm) कहता है। इस प्रकार धातुपाक, चयापचय और मेटाबोलिज्म, ये तीनो शब्द समानार्थंक हैं।

सक्षेप मे आहार द्रव्यों के जठराग्नि द्वारा पचन और पचन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होकर घातुओं में पहुँचे हुए द्रव्यों का कोषों द्वारा उपयोग करके अपने-अपने प्रकृतिनियत कभी का सपादन एव इस क्रिया में विभिन्न मलों की उत्पत्ति होना, इन सब क्रियाओं का मिलित नाम धातुपाक है।

एवन्द्र भोज्य पदार्थों का ग्रहण (इजेशन—Ingestion), उनका पचन अर्थात् विलष्ट द्रव्यो का सरल द्रव्यो के रूप मे परिवर्तन, उनका आत्मसात्करण (Assimilation) अर्थात् सरल द्रव्यो के रूप मे परिणत हुए द्रव्यो को अपने शरीर के अनुरूप आकार-प्रकारवाले द्रव्यो के रूप मे पुन परिवर्तन करके उन्हें अपना अग बना लेमा, श्व्मस द्वारा प्राप्त ओवजन के साथ इनका सयोग कराकर उनके दहन (Oxidigestion) द्वारा उज्जाता, कर्मं आदि शक्तियो (Energy) के रूप मे उनका उपयोग करना, इस उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न मलो को पृथक् करना, इन सब क्रियाओ का मिलित नाम धातुपाक (Metabolism) है।

चैतन्यधारियों के अचेतनों से विशिष्ट जो धर्म होते हैं—प्रजनन, क्षोभ्यता, आकु-चन-प्रसारण-पृष्टि आदि, वे सब धातुपाक के परिणामस्वरूप होते हैं। क्योंकि ये क्रियायें आहार द्रव्यों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप ही प्राणियों द्वारा सम्पन्न की जाती हैं।

¹ Metabolism is the name given to the energy transformation which occurs in boilogical systems. The ability to effect such transformations distinguishes living cells from manimate substances, gives to the former their peculiar properties of irritability, growth and reproduction and makes possible the processes of conduction, contraction and secretion which characterize various specialized types of cells

⁻Hwell's Text Book of Phisiology p 1084 (Ed 1940)

'चरक' मे वर्णित चयापचय एवं यातुपाक^र आहारपाक की प्रक्रिया

(Process of Digestion and Metabolism)

मनुष्य अनेक प्रकार के हितकर—१ अशित २ पीत ३ लीढ और ४. खादित आहारों का सेवन करता है। वह आहार द्रव्य प्रदीप्त जठराग्नि के वल से प्रेरित अपनी-अपनी पाञ्चभौतिक अग्नि (ऊष्मा) द्वारा समुचित रूप से पचता है और जैसे काल क्षणभर भी विश्राम नहीं करता और लगातार गतिशील रहता है, उसी प्रकार सतत परिणत होकर किसी भी धातु में न रुकता हुआ सपूर्ण धातुओं में उचित रूप से (अनुपहत) पाक को प्राप्त होता हुआ सभी धातुओं की ऊष्मा वायु और स्रोतोवाले सपूर्ण शरीर को उपचय (वृद्धि) वल, वर्ण, सुख और आयु से युक्त करता है तथा शारीरिक धातुओं को बढाता है।

इस प्रकार शरीर की धातुएँ शारीरिक धातुओं का ही आहार करती हुई (उनसे पोषण द्रव्य ग्रहण करती हुई) अपनी प्रकृति अर्थात् साम्यावस्था का अनुवर्तन करती हैं।

बाहार का परिणाम और कार्य

आहार जब समुचित रूप से पच जाता है, तो उसका जो स्वच्छ भाग होता होता है, उसे रस कहते हैं। जो मलभाग रहता है, उसे किट्ट कहा जाता है। इस प्रकार आहार-परिणाम दो तरह का होता है— १. प्रसाद भाग रस और २ मल-भाग किट्ट।

 किट्ट से मूत्र, पुरीष, स्वेद, वात, पित्त, कफ, आंख-कान-नाक मुख रोमकूप और जननेन्द्रिय के मळ तथा केश, दाढी के वाल, रोम, नख आदि अंवयवो की चृढि होती है।

२ प्रसाद भाग (आहार रस) से रस, रक्त, मास, मेद, अस्यि, मज्जा, शुक्र, ओज, इन घातुओं की और घातुओं के सारभूत पाँचों जानेन्द्रियों के द्रव्य और शारीरिक सन्धियाँ बन्धनकारक स्नायु-कण्डरायें एवं कला आदि अवयवों की पुष्टि होती है। ये सभी मलस्वरूप और प्रसादस्वरूप धातुएँ रस एवं मल से पुष्ट होती

१. विविधमिशत पीत लीड खादितं जन्तोहितमन्तरिनसन्धुक्षितवलेन यथास्वेनोष्मणा सम्य-निवपच्यमान कालवदनवस्थितसर्वधातुपाकम् अनुपहतसर्वधात्ष्ममारुतस्रोत केवल शरीरमुप चयवलवणसुखायुषा योजयति शरीरधातून्त्वयति च । धातवो हि धात्वाहारा प्रकृतिमनुवर्तन्ते ।

२ यहाँ धातुपाक शब्द चयापचय और मेटाबोलिंग के अर्थ में प्रयुक्त है। अन्यत्र धातुपाक का लक्षण ज्वरितदान के असाध्य लक्षणवाले खोकों (माधवनि० ज्वर० श्रोक ६७ ७३) की टीका में इस प्रकार दिया गया है (किन्तु उक्त सन्दर्भ में उससे कुछ लेना नहीं है। यहाँ आहारपाक के अर्थ में ही जानें)—'निद्रानाषो हृदिस्तम्भो विष्टम्मो गौरवारुची। अरितर्वलहानिश्च धातुनां पाकलक्षणम्'।

हुईं आयु और शरीर के अनुसार अपनी उचित मात्रा का शरीर मे अनुसरण करती हैं और अपनी उचित मात्रा में रहती हुई रस और मल धातुएँ अपने आश्रयभूत समझातु (स्वस्थ पुरुष) की धातुओं को सम बनाये रखती हैं।

जब किन्ही कारणो से प्रमाद घातुएँ क्षीण या दृद्ध हो जाती है, तो आहाररस बाहारमूलक दृद्धि या क्षय के द्वारा शरीर के आरोग्य के लिए धातुओ को सम बनाये रस्तता है। इसी प्रकार किट्ट मल को सम बनाये रखता है। अपने प्रमाण से बढे हुए और बाहर निकलनेवाले मलो की कीत-उप्ण और विपरीत गुणवाले द्रव्यो द्वारा चिकित्सा करने पर ये मल शरीर धातुओ को समता मे रखनेवाले होते हैं।

घातुपाक के भेद

आहार द्रव्यो का शरीर की धातुओ द्वारा दो प्रकार से उपयोग होता है—
जठराग्नि द्वारा पाक होकर नवीन द्रव्यो के निर्माण के रूप मे तथा इन द्रव्यो का
उपयोग करके मलो की उत्पत्ति के रूप मे। नवीन द्रव्यो की उत्पत्ति को प्रसादपाक
तथा इन द्रव्यो का विघटन (तोड-फोड) करके उनके उपयोग और मलो की
उत्पत्ति को मलपाक कहते हैं। प्रसादपाक और मलपाक इन दोनो का मिलित नाम
धातुपाक या चयापचय है।

संवर्तन (Metabolism), परिवर्तन (Anabolism) सौर निवर्तन (Katabolism)

शरीर मे दो प्रकार की क्रियाएँ होती रहती हैं—एक ओर चीजो की (भोजन और श्वास द्वारा) आय होती है, तो दूमरी ओर (कार्य करने मे और मूत्र, घमं तथा श्वास द्वारा) व्यय होता है। शरीर के पोपण और दृद्धि के लिए दोनो तरह की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। वे सब भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएँ जिनके द्वारा शरीर मे जीवित पदार्थं की वृद्धि, रक्षण और क्षय होता है, सवतंन (Metabolism) कहलाती है। भोजन का पचना, फिर उसका आत्मीकृत होना, श्वास द्वारा ओपजन का ग्रहण होना, ओपजनीकरण जैसी रासायनिक क्रियाओ द्वारा आत्मीकृत पदार्थों से शक्ति उत्पन्न होना और यूरिया, अमोनिया, CO2 और जल आदि भौति-भौति के पदार्थों का बनना और फिर इन पदार्थों का श्वास, पसीना और मूत्र द्वारा त्यागा जाना, ये सब क्रियाएँ मिलकर सवतंन कहलाती है।

सवतंन में दो प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित है-

9. इस प्रकार की क्रिया द्वारा पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, भोजन द्वारा प्रोटीन, वसा, कार्वोज, जल और तरह-तरह के लवण और खाद्योज (विटामिन्स) एव श्वास द्वारा ओपजन। इन पदार्थों से शरीर वनता है, उसकी रक्षा होती है और उसकी वृद्धि होती है। ये सभी क्रियाएँ परिवर्तन कहलाती हैं। परिवर्तन सवर्तन का

1

१ च० स० २८।४।

वह अश है, जिसके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ जीवित शरीर के भाग वन जाते हैं। जैसे—श्वेतसार और कार्वोज से अगूरी शक्कर और शक्रेराजन का वनना और शक्रेराजन का यकृत में इकट्ठा रहना, भोजन की प्रोटीनों से रक्त की प्रोटीनों का वनना और इन प्रोटीनों से विविध सेलों की वृद्धि होना, भोजन के खिटक, स्फुर इत्यादि लवणों का ग्रहण किया जाना और फिर इनसे अस्थि का वनना और भौति-भाति के लवणों का सेलों में जमा रहना एवं वसा का शरीर के विविध भागों में इकट्ठा होना। यह सब परिवर्तन निर्माण की प्रक्रिया है।

२ दूसरी क्रिया परिवर्तन के विरुद्ध है। हर समय रासायनिक क्रियाओ द्वारा जीवोज का क्षय होता रहता है। ओपजनीकरण से शक्ति उत्पन्न होती है और वसा तथा शकरा से CO₂ और जल एव प्रोटीनों के क्षय से यूरिया, अमीनिया इत्यादि पदार्थ वनते हैं। ये पदार्थ मूत्र, पसीने और श्वास द्वारा शरीर से वाहर निकलते हैं। सवर्तन के इस अश को (जिसके द्वारा परिवर्तन से ग्रहण किये गये पदार्थों का नाश होता है) निवर्तन कहते हैं। सवर्तन = परिवर्तन + निवर्तन, यह स्पष्ट है।

शरीर पर प्रभाव

जब परिवर्तन और निवर्तन बराबर हो, तो शरीर न घटता है और न ही बढता है। शरीर का भार ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसा कि २०-४० वर्ष की आयु में बहुधा होता है। जब परिवर्तन निवर्तन से अधिक होता है अर्थात् आय अधिक हो और ज्यय कम हो, तो शरीर की वृद्धि होती है, जैसे बाल्यकाल मे। जब निवर्तन (ज्यय) परिवर्तन से अधिक होता है तो शरीर का भार घटने लगता है और शरीर दुवंल हो जाता है, जैसे वृद्धावस्था और रोगों में।

प्रणालीविहीन प्रन्थियो (विशेषकर चुल्लिकाग्रन्थि, पिटचुट्री, उपवृक्क और थाइमस) का सवर्तन से विशेष सम्बन्ध है। चुल्लिकाग्रन्थि के कम काम करने से एक प्रकार का बौनापन और मोटापन हो जाता है और उसके अधिक काम करने से हाथ-पैर लम्बे हो जाते हैं और शरीर का आकार देवकाय जैसा लम्बा हो जाता है।

न्यूनतम घातुपाक

सुमावस्था मे जीवन घारण के लिए हृदय और रक्तवहसस्थान, दवसनसस्थान तथा पचनसस्थान अपना-अपना कार्य करते ही रहते हैं। देहोध्मा के सरक्षण के लिए तापोत्पत्ति भी चालू रहती है। इन क्रियाओं मे होनेवाला धातुपाक किसी प्रकार घटाया नहीं जा सकता। इन कार्यों मे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन्हें न्यूनतम धातुपाक कहते हैं।

न्यूनतम घातुपाक मे मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न ताप लगभग १० प्रतिशत होता है। श्रम—सामान्य शारीरिक व्यायाम से न्यूनतम घातुपाक के प्रमाण मे २५ से ६० प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। तीव्र व्यायाम मे १५०० प्रतिशत तक वृद्धि होना सभव है।

घातुपाक (चयापचय) में अग्नियो की मुस्य भूमिका

किये हुए भोजन का पाक, शरीर मे उसका प्रसार और उसके दारा धातुओं की पुष्टि आदि कमें त्रियिध और त्रयोदश अग्नियों के अधीन हैं और व्यानवायु तथा स्रोतों की अविकृति की भी अग्नियों के ताथ सहकारिता होती है।

प्रकार—१. जठराग्नि २. भूताग्नि सीर ३ धात्वग्नि भेद से तीन अग्नियाँ हैं। सत्या—१ जठराग्नि, ५ भूताग्नि (१ भीम २ आप्य ३ आग्नेय ४ वायन्य और ५ नाभस्) और ७ धात्यग्नि (१ रसाग्नि २ रक्ताग्नि ३ मासाग्नि ४. मेदोऽग्नि ५ अस्ट्यग्नि ६ यज्ज्ञाग्नि और पुरुषो मे ७ धुक्राग्नि तथा स्त्रियो मे ७. आर्तवाग्नि) मिलकर कुल १३ अग्नियाँ होती हैं।

धात्विनियों की मन्दता से धातुओं की वृद्धि और अतिसीक्षणता से धातुओं का क्षय होता है।

क्षीण हुए किसी घातु की चृद्धि करनी हो, तो तीक्ष्ण हुई उम घातु की अग्नि को मन्द करना चाहिए और वृद्ध घातु को धीण करना हो तो उमकी अग्नि की प्रदीप्त करना चाहिए।

चठरानि अपने स्पान में रहती हुई इन धारविनयों को वल प्रदान करती है। भूतानि प्रत्येक प्रत्येक धारविन में अग्नपानगत प्रत्येक भूत के पानन तथा विवेचन (पृयक्र एक लिए पृषक् लिन होती है। इस प्रकार प्रत्येक धातु में पांच भूतों की पाचक अग्नियां होती हैं, उन्हें भूताग्नि कहते हैं। इस प्रकार एक जठराग्नि मात धारविन और पांच भूताग्नि पारकर मुद्द अग्नियां होनी हैं।

नथ्य किपाशारीर की दृष्टि में विचार करें, तो मुख ने प्रवाशयपर्यन्त अन्नपान पर क्रिया करनेवाले पाचक रम ही जठनामि कहे जा सकते है। इनके अतिरिक्त धरीर में गन्यियों में धरित होनेवाले रम (अन्त मानो रस) सीधे रस-रक्त में मिलकर जिमन्न धातुओं तथा अवयवों में पहुँचकर धातुपाक तथा धातुपुष्टि की क्रिया को उद्दीपित करते हैं। ये अन्त छावी रम ही आयुर्वेद के धात्विन प्रतीत होते हैं।

आम और चपापचयजन्य विकार

साम दो प्रकार का होता है -- १ जठराग्नि की दुवंछता से महास्रोत मे अपनव

यथान्त्रेनीप्मणा पान, झरीटा यान्ति धौनव ।
 स्रोतमा च यथास्वेन धातु पुष्यति धातुन ॥ ण० नि० ९।३९

अत्रस्य पक्ता मर्वेषा प्रनृणामिष्यो मत ।
 तन्मूलान्ते हि तदमृद्धिद्ययहिद्ययात्मका ॥ च० च० १५।३०

३ मीमाप्यारनेयत्रायन्या पश्चोष्माण सनाभसा । पञ्चादारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि ॥ च० नि० १५।१३

४ मप्तमिर्देह्या । रो थातवी द्विविध पुन । यथास्वमन्त्रिभ पार्क यान्ति किट्टप्रमादवत् ॥ च चि० १५।१५

(आम⁹) अन्नरस और २. घाट्निग्नियो की दुर्बलता से घातुओं में अपक्व रसघातु (आमरस^२)।

साम³—जठराग्नि या घात्वग्नि किसी भी अग्नि की दुवँलतावश बने आम अन्नरस या आम घातुरस से युक्त वातादि दोष, रस-रक्त-मल-मूत्रादि दूब्य तथा इनसे उत्पन्न रोग साम कहे जाते हैं।

साम मलों के चिह्न⁸—स्वेद, मूत्रादि स्रोतो का अवरोध, बलहानि, गौरव (भारीपन), वायु का असम्यक् सचार, आलस्य, अजीर्ण, यूक का अधिक आना, पुरीषादि मलो की अप्रवृत्ति, अक्षि और क्लम, ये साम मलो के लक्षण हैं।

नन्यमत से आम की न्याख्या"

प्रोटीन आदि भौषधद्रन्यों का जठराग्नि तथा धात्वग्नि द्वारा पाक (क्रमश अन्य द्रन्यों में रूपान्तर) होकर अन्त में एक-एक मल के रूप में परिवर्तन होता है। यथा—प्रोटीनों का जठर में एमाइनो एसिंड्स के रूप में, धात्वग्नियों द्वारा यूरिया के रूप में तथा कार्बोहाइड्रेट्स और स्नेहों का अन्त में अङ्गाराम्ल के रूप में परिवर्तन होता है। दोनो अग्नियों की मन्दता से यदि अन्तिम द्रव्य न बनकर मध्यवर्ती अर्धपक्व द्रव्य बनें, तो उन्हें आम कहेंगे।

जैसे प्रोटीन्स के अपूर्ण पाक से यूरिक एसिड बनता है, जिसका सिग्धवात मे, सिन्ध्यों में स्यानसभय होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और स्नेहों के अधूरे पाक से तक्राम्ल या लैक्टिक एसिड बनता है। मधुमेहादि में कार्बोहाइड्रेट्स का पाक अपूर्ण रह जाने से स्नेहो का भी पाक अधूरा रह जाता है, जिससे अर्धपक्व अम्ल द्रव्य उत्पन्न होते हैं।

तकाम्ल का आमवात (रिजमेटिज्म) मे पेशियों मे सस्यानसम्रय होता है। इन्स्युलीन के हीनयोग से या यकुत् के विकारवश द्राक्षाशकरा का ग्लायकीजन में परिवर्तन न हो, तो वह आम ही कही जायेगी। याकुत पित्त के रञ्जक द्रव्य के अन्त्रों में, पाक से अन्त में वह रञ्जक द्रव्य बनता है, जिसके कारण मल का विशिष्ट वर्ण होता है। यह पाक अधूरा रहने से विविध अधंपक्व रञ्जक द्रव्य बनते हैं, जिसके कारण विशेषत वच्चों में हरे-पीले दस्त होते हैं। हीमोग्लोबीन के अधंपक्व

१ जठरानलदौर्वल्यादविषक्वस्तु यो रस । स आगसज्जो देहे सर्वदोषप्रकोषण ॥ च० चि० १५।४४

२ उष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाधमपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ अ० ह० सू० १३।२५

३ आमेन तेन सयुक्ता दोषा दूष्याश्च दृषिता । सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तुदुद्भवा ॥ अ० ह० स० ११।०७

४ स्रोतोरोघगळअञ्गगैरवानिलमूढता । आलस्यापक्तिनिष्ठीवमळसङ्गारुचिक्लमा ॥ लिङ्गं मलाना सामाना । अ० हृ० स० १३।२३-२४

५ क्रियाशारीर, देसाई सस्करण ८, ५० ६५६-५७।

समास बनें तो रक्त में जो विकृति होती है, उसे मेट्हीमोग्लोधीनीमिस्ना कहते हैं। आमाश्य आदि में प्रोटीन आदि का अपूर्ण पाक होकर जो द्रव्य बनते हैं, वे भी बाम ही हैं। रसधातु का पाक अधूरा रहने से (वैधक मत से) कफ अधिक निकलता है। यह कफ भी आम है। कफ में म्यूसीन नामक प्रोटीन होता है, उसका पाक होकर शरीरोपयोगी प्रोटीन नहीं बन पाता है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। रोग जन्तुओं के उत्पन्न किये यिप या आगन्तु विष धमता द्वारा अप्रतिकृत होकर पड़े रहें अर्घात् तोउ-फोडकर बाहर न निकाल दिये जाये, तब तक आम ही कहे जायेंगे।

सामरस अवाक्त्या युक्तन्य (निरके के समान संयान की प्राप्त होकर) विषयत् हो जाता है।

धात्यिन के अपचय से राजयहमा—अपनी अपनी अनि ने प्रत्येक धातु का निरन्तर परिवाक होकर प्रसाद भाग ने पोषण और फिट्ट का विह्निमन होता रहता है। पूर्व-पूर्व धातु की समृद्धि होने से उत्तर-उत्तर धातुएँ भी गमृद्ध होती रहती हैं और जब ममृचित रूप ने धात्यिन-स्थापार नही होता है, तब पूर्व-पूर्व धातु के हास से उत्तरोत्तर धातुओं वा हास होते रहने से राजयहमा हो जाता है, जिसे अनुनेम सम कहते हैं। इस प्रकार उचित धातुपाक ने स्वस्थता और अनुचित धातु-पाक से रोगों का आक्रमण होता है।

२. अपच्यमानं शुक्तस्व यात्यनं वियम्भयताम् । च० नि० १५।४१

र. यात्यमणा चापचयाद् राजयहमा प्रवर्गत । च० चि० ८१४०

व्याख्याकार---

कॉ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य १०१ पी:एच० डी०, डी० एस-सी० १० श्रावकथन लेखक— श्रावकथन लेखक—

एव

डाँ० प्रभाकर जनार्वन देशपाण्डे

नन्प्रति उपलब्ध चरक-मंहिना ८ स्थानों तथा १२० अध्यायों में विभक्त है। प्रस्तुत सहिता काय चिकित्सा का सर्वमान्य ग्रन्थ है। जैमे समस्त संस्कृत-बाब्मय का आधार वैदिक माहिस्य है, ठीक वैमे हो काव चिकित्सा के क्षेत्र में जितना भी परवर्ती साहित्य लिखा गया है, उन सब का उपजीव्य चरक है।

चरकसिता के अन्त में मन्यकार की प्रतिशा है—यदिहासित तदन्यन्न यन्नेहासित म तत् कचित्'। इसका अभिप्राय यह है कि काय-चिकित्सा के मम्बन्ध में जो साहित्य स्पाल्यान रूप में अथवा सन्न रूप में इसमें उपलब्ध है, वह अन्यन्न भी प्राप्त हो सकता है, और जो इसमें नहीं है, वह अन्यन्न भी सुलम नहीं है। चरक का यह डिण्डिमधोब सुलनात्मक दृष्टि मे सबंदा देखा जा सकता है।

दूसरी विशेषता महर्षि चरक की यह रही है—'पराधिकारे न तु विस्तरोक्तिः'। रन्होंने अपने तन्त्र के अतिरिक्त दूसरे विषय के आचार्यों के क्षेत्र में टॉंग अवाना पसन्द नहीं किया, अतुएव उन्होंने कहा है—'अन्न धान्यन्तरीयाणाम् अधिकारः क्रियाविधी'।

इस प्रकार के सादर्श प्रन्थ पर भट्टारहरिचन्द्र आदि अनेक स्वनामधन्य मनीवियों ने टीकाएँ लिखकर इसके रहस्यों का उद्घाटन सम्ध समय पर किया है।

इसके पूर्व भी चरक की कित्य ज्याख्यों एँ लिखी गयी हैं, वे विषय का बोध भी कराती हैं। चरकसिंदता की चरक-चिन्नका टांका के रूप में लेखक का इस दिशा में यह स्तुत्य प्रयास है। इसमें वयासम्भव चरक के रहस्यमय गूढ स्थलों का सरस भाषा में आशय स्पष्ट किया गया है। स्थल विशेष पर पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी नाम भी दे दिये गये हैं। आषश्यकतानुसार प्रकरण विशेष पर आधुनिक चिकित्सा-सिक्षानों का तुरुनात्मक दृष्टि से भी समावेश कर दिया गया है, जिससे पाठकों को विषय को ममझने में सुविधा हो। माथ ही कठिन स्थलों को विशेष वक्तव्य तथा टिप्पणियों द्वारा प्राञ्चल किया गया है। प्रथम भाग (सूझ निदान-विमान शारीर-इन्द्रियस्थान) २०००० दितीय भाग (चिकित्सा करप-सिक्षिस्थान)

सचित्र स्त्रीरोग-चिकित्सा ढॉ० जहानसिंह चौहान मूल्य १५०-०० सचित्र इजेक्शन-चिकित्सा ढॉ० जहानसिंह चौहान मूल्य १२५-०० सचित्र नेत्र-विज्ञान
डॉ० शिवनाथ खन्ना
मूल्य १२५-००
सचित्र प्रसूति-तन्त्र
डॉ० शिवनाथ खन्ना
मूल्य १२५-००